

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 71 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W19-540705

ND 37478

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 02770

Société : R.A.M

☐ Actif

☒ Pensionné(e)

☐ Autre

Retraite

Nom & Prénom :

KILLOU HASSAN

Date de naissance :

01/04/56

Adresse :

LOT SOCOMA N° 1345 MARRECH

Tél. 06 66 78 15 20

Total des frais engagés :

812/20 DH

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

DR. FADOUACH S.
Professeur Cardiologie
Cardiologue Adulte et Pédiatrique
Tél : 09 24 43 43 15 - 05 24 43 32 23
Code INPE : 071078794

Date de consultation :

02-06-2020

Nom et prénom du malade :

AIT MANSOUR mina

Age: 56 ANS

Lien de parenté :

Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie :

Maladie chronique

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :


Dans le cas où la maladie présente un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : 10/06/2020



Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FÉES ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin
02/06/2020	CS+RCC		250 DM	

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	02/06/20	562,20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX						
Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FÉES ET HONORAIRES																				
Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins. Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.																				
SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :																
				COEFFICIENT DES TRAVAUX MONTANTS DES SOINS DEBUT D'EXECUTION FIN D'EXECUTION																
ODF PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE <table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">D</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> <tr> <td colspan="2">G</td> </tr> </table>			H		25533412	21433552	00000000	00000000	D		00000000	00000000	35533411	11433553	B		G		COEFFICIENT DES TRAVAUX
H																				
25533412	21433552																			
00000000	00000000																			
D																				
00000000	00000000																			
35533411	11433553																			
B																				
G																				
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS DATE DU DEVIS DATE DE L'EXECUTION																
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS				VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION																

Cabinet de consultations et d'explorations cardio-vasculaires



Dr. FADOUACH Sabah

Professeur en Cardiologie
Cardiologie adulte et pédiatrique
Explorations cardiovasculaires

الدكتورة فدواش صباح

أستاذة في أمراض
القلب والشرابيين
للکبار والأطفال

02 JUN 2020

Marrakech, le : مراکش، في :

M. AT MANSUR - MINA

122.30
x 2
①

Dafloin 500 (SV)

20100
x 11
②

Alinbm (SV)



x 1 mois

3/49 le 1er x 4 mois

22.80
14.00
puis
③

Cantharel (SV)

24 le 1er x 7

Alphapril 100 (SV)

Rue Ibn Aicha - résidence El Hadiqa - porte D - Rez de Chaussée N° - Gueliz - Marrakech

E-mail : sabah.fadouach@gmail.com - Tél. : 05 24 43 43 15 - Fax : 05 24 43 32 22

رفقة بن عائشة، إقامة الحديقة - الباب د - الطابق السفلي رقم 1 - جليز - مراکش

④ Voltaire pomme 60,00
1 exp. le Dr



562,20



210g

DR. FABOUCH S.
Cardiologue Adulte et pédiatrique
Tél : 05 24 43 15 05 24 43 32 23
07 17 70 04



CINTBOM® 4ma. Comprimé, Boîte de 10.

Acénocoumarol

4

PPV :
Exp :
N° Lot :

Sintrom® 4 mg
Acétocoumarol 10 comprimés



6 || 118000 || 181187

Médicament autorisé N° : 512/17DMP/21/NRQ

[illegible]

4 **سنتروم** **كومارول**



6 || 118000 || 181187 |

4

Sintrom® 4 mg 
Acénocoumarol 10 comprimés



6 118000 181187

Sintrom® 4 mg
Acénocoumarol 10 comprimés



6118000181187

Médicament autorisé N° : 512/17DMP/21/NRQ

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillots dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

- pour éviter la formation de caillots dans une veine ;
- après une intervention chirurgicale ;

pas interdits, à condition que vous soyez régulier et sachez vous en servir. Par exemple, si vous prenez du Sintrom, vous devrez éviter toute consommation de produits alcoolisés, car le médicament et l'alcool, étant donné que l'alcool risque de nuire à l'action de votre médicament, peuvent avoir des effets négatifs sur votre organisme.

[illegible]

ils : les sports ou les comportements violents susceptibles d'entraîner des accidents graves, l'utilisation d'un véhicule ou à utiliser des machines.

sont pas interdits, à condition de les répartir dans votre alimentation de manière régulière et sans excès.

le traitement par Sintrom, vous devrez éviter toute consommation d'alcool, étant donné que l'alcool risque de modifier l'action de votre organisme.

tion pendant la grossesse et l'allaitement : l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte, si de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet médicament pendant votre grossesse. Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sans attendre, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

ment est possible. IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE
FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE
FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE

0

pas interdits, à condition de les répartir dans votre alimentation de manière régulière et sans excès.

l'association pendant la grossesse et l'allaitement : l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte, cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire catégoriquement pendant votre grossesse.

...aguant pendant votre grossesse. Si vous souhaitez faire enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particuliers, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

0.

Interdits, à condition de les répartir dans votre alimentation de manière régulière et sans excès.

Traitement, par Sintrom, vous devez éviter toute consommation d'alcool, étant donné que l'alcool risque de modifier l'action de votre organisme.

En savoir plus : consultez le site www.sintrom.com ou contactez-nous en ligne avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives.

pendant la grossesse et l'allaitement : la prise de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte, ou pendant votre grossesse, doit vous prescrire cet traitement. Si vous souhaitez interrompre, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particuliers, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse. Il n'est possible.

nt est possible.
 nement sera interrompu avant le début de la grossesse.
 CON GÉNÉRAL, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE
 ALLATEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE
 OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN
 ENT

sports ou les comportements violents susceptibles d'entraîner des

sports ou les comportements violents susceptibles d'entraîner des blessures.

Effets secondaires : Lactose. Son utilisation est contre-indiquée chez les personnes présentant une intolérance au galactose, un déficit congénital en lactase ou un syndrome de malabsorption du glucose et du fructose.

CINTBOM® 4ma. Comprimé, Boîte de 10.

Acénocoumarol

4

PPV :
Exp :
N° Lot :

Sintrom® 4 mg
Acétocoumarol 10 comprimés



6 || 118000 || 181187

Médicament autorisé N° : 512/17DMP/21/NRQ

[illegible]

4 **سنتروم** **كومارول**



6 || 118000 || 181187 |

4

Sintrom® 4 mg 
Acénocoumarol 10 comprimés



6 118000 181187

Sintrom® 4 mg
Acénocoumarol 10 comprimés



6 118000 181187

Médicament autorisé N° : 512/17DMP/21/NRQ

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillots dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

- pour éviter le caillot dans une veine;

pas interdits, à condition que vous soyez régulier et sachez vous en servir. Par exemple, si vous prenez du Sintrom, vous devrez éviter toute consommation de viande rouge, de poisson gras, d'huile de poisson, d'alcool, étant donné que l'alcool risque de modifier l'action de votre médicament.

Enfin, si vous souffrez d'insuffisance sur votre organisme, il est préférable d'opter pour une association avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives.

En conclusion, si vous souffrez d'insuffisance rénale, il est important de surveiller votre tension artérielle, de contrôler votre glycémie et de surveiller votre poids. Si vous remarquez une prise de poids importante, consultez votre médecin.

Enfin, si vous souffrez d'insuffisance rénale, il est important de surveiller votre tension artérielle, de contrôler votre glycémie et de surveiller votre poids. Si vous remarquez une prise de poids importante, consultez votre médecin.

[illegible]

ils : les sports ou les comportements violents susceptibles d'entraîner des accidents graves, l'utilisation d'un véhicule ou à utiliser des machines.

sont pas interdits, à condition de les répartir dans votre alimentation de manière régulière et sans excès.

le traitement par Sintrom, vous devrez éviter toute consommation d'alcool, étant donné que l'alcool risque de modifier l'action de votre organisme.

tion pendant la grossesse et l'allaitement : l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte, si de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet allaitement pendant votre grossesse. Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sans traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

ment est possible. IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE
FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT DE MANDER L'AVIS DE VOTRE

pas interdits, à condition de les répartir dans votre alimentation de façon régulière et sans excès.

action avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

général pendant la grossesse et l'allaitement. L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte ou si vous avez besoin de ce médicament. En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire ce médicament pendant votre grossesse. Évitez d'absorber d'autres médicaments pendant votre grossesse. Seul cas toléré.

... agulant pendant votre grossesse. Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particuliers, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

interdits, à condition de les répartir dans votre alimentation de manière régulière et sans excès.

ment par un alcool, vous devrez éviter toute consommation d'alcool, étant donné que l'alcool risque de modifier l'action de votre organisme.

n pendant la grossesse et l'allaitement :
 L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse et l'allaitement. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte, ou si, au cours de votre traitement, vous avez besoin, de votre médecin peut décider de vous prescrire une autre thérapie ou des thérapies alternatives.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant votre grossesse, votre médecin peut décider de vous prescrire cet traitement. Sauf cas très particuliers, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse et il est possible.

nt est possible.
 nement sera interrompu avant le début de la grossesse.
 CON GÉNÉRAL, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE
 ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE
 OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN
 ENT

sports ou les comportements violents susceptibles d'entraîner des

sports ou les comportements violents susceptibles d'entraîner des blessures.

Effets secondaires : **Effet notoire** : Lactose. Le médicament contient du Lactose. Son utilisation est déconseillée chez les personnes présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

Mode d'emploi : **Comment prendre Sintrom** 4 mg, comprimé ?

SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.


Acénoquimol

PPV :
Exp :
N° Lot :

20,00

سنتروم 4
ملغ
آسینوکومول

Sintrom® 4 mg
Acénoquimol 10 comprimés



6 118000 181187


Médicament autorisé N° : 512/17DMP/21/NRQ

PPV :
Exp :
N° Lot :

20,00

سنتروم 4
ملغ
آسینوکومول

Sintrom® 4 mg
Acénoquimol 10 comprimés



6 118000 181187

Médicament autorisé N° : 512/17DMP/21/NRQ

PPV :
Exp :
N° Lot :

20,00

سنتروم 4
ملغ
آسینوکومول

Sintrom® 4 mg
Acénoquimol 10 comprimés



6 118000 181187

Médicament autorisé N° : 512/17DMP/21/NRQ

Les A.V.C. empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine est donc nécessaire pour que ce médicament permette de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillots dans les artères et les veines. Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie.

terdits, à condition de les répartir dans votre alimentation de manière régulière et sans excès. Si vous devez éviter toute consommation de l'alcool, étant donné que l'alcool risque de modifier l'action de votre organisme.

avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

pendant la grossesse et l'allaitement :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, ayez besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet médicament pendant votre grossesse. Si vous êtes enceinte, évitez d'être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particuliers, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

Il est possible de continuer à utiliser le médicament pendant la grossesse et l'allaitement. Il convient au cours de la grossesse de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

0.

à condition de les répartir dans votre alimentation de manière régulière et sans excès. Si vous devez éviter toute consommation de l'alcool, étant donné que l'alcool risque de modifier l'action de votre organisme.

avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

pendant la grossesse et l'allaitement :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, ayez besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet médicament pendant votre grossesse. Si vous êtes enceinte, évitez d'être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particuliers, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

Il est possible de continuer à utiliser le médicament pendant la grossesse et l'allaitement. Il convient au cours de la grossesse de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

0.

à condition de les répartir dans votre alimentation de manière régulière et sans excès. Si vous devez éviter toute consommation de l'alcool, étant donné que l'alcool risque de modifier l'action de votre organisme.

avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

pendant la grossesse et l'allaitement :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, ayez besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet médicament pendant votre grossesse. Si vous êtes enceinte, évitez d'être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particuliers, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

Il est possible de continuer à utiliser le médicament pendant la grossesse et l'allaitement. Il convient au cours de la grossesse de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

les sports ou les comportements violents susceptibles d'entraîner des blessures. L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les personnes souffrant d'une intolérance au galactose ou d'un déficit en lactase de Lapp ou d'un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

5. Précautions d'emploi (voir page 2/5).

daflon® 500 mg

comprimé pelliculé

à l'eau purifiée micronisée



daflon® 500 mg

30 comprimés pelliculés



it de prendre ce médica-
ment pour vous.
7 suivant scrupuleusement les
re médecin ou votre pharma-
in de la lire,
conseil ou information.
à tout effet indésirable qui ne
si vous ne ressentez aucune

122,70

دافلون® 500

30 قرصا ملينا

ET DANS

SANTS AGIS-

3: système

un vascu-

se (jambe

ent des st-

DE

à l'un des

autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Alertissements et précautions

Crise hémorroïdaire

Si les troubles hémorroïdaires ne cèdent pas en 15 jours, il est indispensable de

consulter votre médecin.

Troubles de la circulation veineuse

Ce traitement a toute son efficacité lorsqu'il est associé à une bonne hygiène de vie.

• Eviter l'exposition au soleil, la chaleur, la station debout prolongée, l'excès de

• La marche à pied et éventuellement le port de bas adaptés favorisent la cir-

culatation sanguine.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Daflon 500 mg,

comprimé pelliculé.

Enfants

Sans objet

AUTRES MEDICAMENTS ET DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou

pourriez prendre tout autre médicament.

DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ AVEC DES ALIMENTS ET

BOISSONS

Sans objet

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou plani-

fiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de

prendre ce médicament.

Grossesse

Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter l'utilisation de DAFLON pendant

la grossesse.

Allaitement

En l'absence de données sur le passage du médicament dans le lait maternel,

l'allaitement est déconseillé pendant la durée de traitement.

Conduite des véhicules et utilisation de machines

Sans objet

DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé contient

Sans objet

3. COMMENT PRENDRE DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de

votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien

en cas de doute.

Insuffisance veineuse : La dose recommandée est de 2 comprimés par jour, soit 1

comprimé à midi et 1 comprimé le soir, au moment des repas.

DAFLON[®] 500 mg

comprimé pelliculé

à l'eau purifiée micronisée



DAFLON[®] 500 mg

30 comprimés pelliculés



il de prendre ce médica-
ment pour vous.
7 suivant scrupuleusement les
re médecin ou votre pharma-
in de la lire.
conseil ou information.
à tout effet indésirable qui ne
si vous ne ressentez aucune

122,70

500 mg

30 قرصات ملين

ET DANS
SANTS AGIS-
3: système
un vascu-
se (jambe
ent des st-
DE

autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Alertissements et précautions

Crise hémorroïdaire

Si les troubles hémorroïdaires ne cèdent pas en 15 jours, il est indispensable de

consulter votre médecin.

Troubles de la circulation veineuse

Ce traitement a toute son efficacité lorsqu'il est associé à une bonne hygiène de vie.

• Eviter l'exposition au soleil, la chaleur, la station debout prolongée, l'excès de

• La marche à pied et éventuellement le port de bas adaptés favorisent la cir-

culatation sanguine.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Daflon 500 mg,

comprimé pelliculé.

Enfants

Sans objet

AUTRES MEDICAMENTS ET DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou

pourriez prendre tout autre médicament.

DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ AVEC DES ALIMENTS ET

BOISSONS

Sans objet

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou plani-

fiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de

prendre ce médicament.

Grossesse

Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter l'utilisation de DAFLON pendant

la grossesse.

Allaitement

En l'absence de données sur le passage du médicament dans le lait maternel,

l'allaitement est déconseillé pendant la durée de traitement.

Conduite des véhicules et utilisation de machines

Sans objet

DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé contient

Sans objet

3. COMMENT PRENDRE DAFLON 500 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de

votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien

en cas de doute.

Insuffisance veineuse : La dose recommandée est de 2 comprimés par jour, soit 1

comprimé à midi et 1 comprimé le soir, au moment des repas.

1. QU'EST-CE QUE VOLTARÈNE EMULGEL TOPIQUE 1%, gel ET

LOT : M0375
EXP : JUN 2022
PPV : 60,00 DH

Voltarène Emulgel Topique
Gel pour application cutanée

Tube de 100 g



1% ريتين فوطا رين
اسم الحاصل، توتيك

e (il calme la
uniquement

ndinites des
endons des
u après un
ment de la

TRE AVANT

tion par vous-même dans le cadre d'une arthrose douloureuse des
doigts.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez utilisé plus de Voltarène Emulgel Topique 1%, gel que
vous n'auriez dû:

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir
immédiatement un médecin.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, Voltarène Emulgel Topique 1%, gel est
susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y
soit pas sujet:

Exceptionnellement, peuvent survenir des réactions pouvant être

طريقا طوله 10 سم (انظر الارسم).

- الجرعة المستعملة في كل تطبيق تكون بنسبة 4 غ من الجيل. وطابق ذلك
- فصال مؤلم في الأماكن المصابة والركبتين:



84/min 10 mm/s

aVR

aVL

aVF

25 mm/s 0.05-35 Hz FSD AT

02 JUN 2020

25 mm/s

36.420

83/min 10 mm/s

25 mm/s 0.05-35 Hz FSD AT-174