

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W19-458445

38417

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Matricule : 1905

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : MABAB

et MASSAN

Date de naissance : 01/01/1956

Adresse : 491 MAY AL MASSAII

Tél. : 0661 197365

Total des frais engagés : 496,90 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. CHAOUKI JEDDI  
Neuro Psychiatre  
Bd Moulay Abdellah, Résidence Gb. Abdellah  
Bloc A 6ème Etage n° 14 - Marrakech  
Tel. : 05 24 43 43 11

Date de consultation : 12/08/2020

Nom et prénom du malade : TOSSI TOURIA Age:

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : effets psychotiques

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.


J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : ALAIJ

Le : 02 SEP. 2020

Signature de l'adhérent(e) :





## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
12.08.22	CM.PSY		30000	INP : 07110839576 Dr. CHAZOUKI Nouvel Hôpital Rue Aït Benhaddou, Résidence Bab Doukkala 40000 Marrakech Télé. 0524 43 43 11

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	12/08/2020	196,95

INR: 072068651

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires



## AUXILIAIRES MEDICAUX

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.


SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>							
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>  MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>  DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>  FIN D'EXECUTION <input type="text"/>							
<b>DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE</b> <b>H</b> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>25533412</td><td>21433552</td></tr> <tr><td>00000000</td><td>00000000</td></tr> <tr><td>00000000</td><td>00000000</td></tr> <tr><td>35533411</td><td>11433553</td></tr> </table> <b>D</b> <b>G</b> <b>B</b>				25533412	21433552	00000000	00000000	00000000	00000000	35533411	11433553
25533412	21433552										
00000000	00000000										
00000000	00000000										
35533411	11433553										
<b>[Création, remont, adjonction]</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession											
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>  MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>  DATE DU DEVIS <input type="text"/>  DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>							
<b>O.D.F PROTHESES DENTAIRES</b> 											

Dr GHAZOUAN Jamal  
Neuro psychiatre  
Ancien Médecin chef  
de l'hôpital Ibn Nafis

دكتور غزوان جمال  
اختصاصي في الأمراض  
النفسية والعصبية  
طبيب رئيس مستشفى  
ابن نفيس سابق

Marrakech, le: 11/8/2022

Nom: Tosni  
Prénom: TOURIA



Boulevard Moulay Abdellah, Résidence Bab Doukkala  
N° 16 - Bloc A 3 ème étage - Tél : 05 24 43 43 11

Témo

® 2,5 mg

am

sable

mg, comprimé sécable  
UTILISE ?

GlaxoSmithKline Maroc  
Ain El Aouda  
Région de Rabat  
PPV : 83 70 DH  
6 118001 140237

apparenté aux benzodiazépines.

Il est préconisé dans le traitement de l'anxiété  
celle-ci s'accompagne de troubles gênants, ou en  
prévention et/ou traitement des manifestations liées à un  
sevrage alcoolique.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable ?

Ne prenez jamais TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable  
dans les cas suivants : • allergie connue à cette classe de  
produits ou à l'un des composants du médicament, •  
insuffisance respiratoire grave, • syndrome d'apnée du  
sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil), •  
insuffisance hépatique grave, • myasthénie (maladie  
caractérisée par une tendance excessive à la fatigue  
musculaire).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE  
DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE  
PHARMACIEN.

**Faites attention avec TEMESTA 2,5 mg, comprimé  
sécable**

**Mises en garde spéciales :** Si une perte d'efficacité survient  
lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas  
la dose.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement peut entraîner,  
surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance  
physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la  
survenue de la dépendance : • durée du traitement, • dose, •  
antécédehts d'autres dépendances médicamenteuses ou  
non, y compris alcoolique.

La dépendance peut survenir même en l'absence de ces  
facteurs favorisants.

**Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à  
votre pharmacien.**

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer  
l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se  
caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en  
quelques jours, de signes tels que anxiété importante,  
insomnie, douleurs musculaires, mais on peut observer  
également une agitation, une irritabilité, des maux de tête, un  
engourdissement ou des picotements des extrémités, une  
sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts  
physiques, etc...

**Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être  
définies avec votre médecin.**

La diminution très PROGRESSIVE des doses et  
l'espacement des prises représentent la meilleure prévention

de ce phénomène de sevrage. Cette période sera d'autant  
plus longue que le traitement aura été prolongé.  
Malgré la décroissance progressive des doses, un  
phénomène de REBOND sans gravité peut se produire, avec  
réapparition TRANSITOIRE des symptômes (anxiété) qui  
avaient justifié la mise en route du traitement.

Des troubles de mémoire ainsi que des altérations des  
fonctions psychomotrices sont susceptibles d'apparaître  
dans les heures qui suivent la prise du médicament.  
Chez certains sujets, ce médicament peut provoquer des  
réactions contraires à l'effet recherché : insomnie,  
cauchemars, agitation, nervosité, euphorie ou irritabilité,  
tension, modifications de la conscience, voire des  
comportements potentiellement dangereux (agressivité  
envers soi-même ou son entourage, ainsi que des troubles  
du comportement et des actes automatiques).

**Si une ou plusieurs de ces réactions surviennent,  
contactez le plus rapidement possible votre médecin.**  
Les benzodiazépines et produits apparentés doivent être  
utilisés avec prudence chez le sujet âgé, en raison du risque  
de somnolence et/ou de relâchement musculaire qui peuvent  
favoriser les chutes, avec des conséquences souvent graves  
dans cette population.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit  
pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de  
malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en  
lactase (maladies métaboliques rares).

**Précautions d'emploi :** Ce traitement médicamenteux ne  
peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il  
convient de demander conseil à votre médecin. Il vous  
indiquera les conduites pouvant aider à la lutte contre  
l'anxiété.

La prise de ce médicament nécessite un suivi médical  
renforcé notamment en cas d'insuffisance rénale, de maladie  
chronique du foie, d'alcoolisme et d'insuffisance respiratoire.  
Ce médicament ne traite pas la dépression. Chez le sujet  
présentant une dépression, il ne doit pas être utilisé seul car  
il laisserait la dépression évoluer pour son propre compte avec  
persistance ou majoration du risque suicidaire.

La prise d'alcool est formellement déconseillée pendant la  
durée du traitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE  
DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE  
PHARMACIEN.

**Prise ou utilisation d'autres médicaments :** Si vous  
prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en  
à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Grossesse :** Ce médicament ne sera utilisé pendant la  
grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous  
découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin  
qui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le  
traitement.

**Allaitement :** Ce médicament passe dans le lait maternel  
en conséquence, l'allaitement est déconseillé.  
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien  
avant de prendre tout médicament.

# DEROXAT

Paroxétine

20mg

comprimé pelliculé  
sécable

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

**Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce que DEROXAT 20mg, comprimé pelliculé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DEROXAT 20mg, comprimé pelliculé sécable ?
3. Comment prendre DEROXAT 20mg, comprimé pelliculé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DEROXAT 20mg, comprimé pelliculé sécable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

**1. QU'EST-CE QUE DEROXAT 20mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique : antidépresseur – Inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine – code ATC : N06 AB 05

**DEROXAT est un traitement destiné aux adultes souffrant de dépression et/ou de troubles anxieux.**

Les troubles anxieux dans lesquels DEROXAT peut être prescrit sont les suivants :

- troubles obsessionnels compulsifs (pensées répétitives, obsessionnelles avec comportement incontrôlable)
- trouble panique (attaques de panique, y compris celles causées par la peur des lieux publics, l'agoraphobie)
- trouble anxiété sociale (peur ou rejet de situations où vous devez être en société)
- état de stress post-traumatique (anxiété causée par un événement traumatique)
- anxiété généralisée.

DEROXAT appartient à la classe de médicaments appelés Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine (ISRS).

Les personnes souffrant de dépression ou d'anxiété présentent un taux de sérotonine (substance présente dans le cerveau) diminué.

Le mécanisme d'action de DEROXAT et des autres ISRS n'est pas complètement connu, mais ils augmenteraient le taux de sérotonine dans le cerveau.

Page 1 sur 4

01 : 19E003

TEMESTA 2,5MG  
CP SEC B30

P.P.V : 29DH50

S

a

V

6 118000 011576

Si vous ou d'auto-agression, contactez immédiatement votre médecin ou

un ami ou un parent, en lui expliquant que vous êtes dépressif ou que vous souffrez d'un trouble anxieux, et en lui demandant de lire cette notice. Vous pouvez lui demander de vous signaler s'il pense que votre dépression ou votre anxiété s'aggrave, ou s'il s'inquiète d'un changement dans votre comportement.

### Effets indésirables importants observés avec DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable

Des patients traités par DEROXAT développent une réaction appelée akathisie, qui comprend le fait de **se sentir agité et de ne pas pouvoir rester assis ou debout tranquillement**. D'autres patients développent un **syndrome sérotoninergique** ou **syndrome malin des neuroleptiques**, comportant certains ou la totalité des symptômes suivants : sensation de grande agitation ou d'irritabilité, sensation de confusion, d'agitation, sensation de chaleur, transpiration, tremblement, frissons, hallucinations (vision ou sons étranges), rigidité des muscles, contractions involontaires des muscles ou rythme cardiaque accéléré. La sévérité de ces symptômes peut s'aggraver conduisant à une perte de connaissance. Si vous remarquez un de ces symptômes, **contactez votre médecin**. Pour plus d'information sur les effets indésirables de DEROXAT lire ci-dessous la rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables éventuels ? ».

### Autres médicaments et DEROXAT 20mg, comprimé pelliculé sécable

Certains médicaments peuvent modifier l'action de DEROXAT, et augmenter le risque d'effets secondaires. DEROXAT peut également modifier l'action d'autres médicaments.

Ces médicaments incluent :

- des médicaments appelés **inhibiteurs de la monoamine oxydase** (IMAO, incluant le moclobémide et le chlorure de méthylthioninium (bleu de méthylène)),
- la thioridazine ou le pimozide, qui sont des médicaments **anti-psychotiques**,
- l'aspirine, l'ibuprofène et d'autres médicaments appelés AINS (Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens) comme le célecoxib, l'étodolac, le diclofénac et le méloxicam, utilisés **contre la douleur et l'inflammation**,
- le tramadol et la péthidine, des médicaments **contre la douleur**,
- des médicaments appelés triptans, comme le sumatriptan, indiqués pour traiter la **migraine**,
- d'autres **antidépresseurs** incluant des ISRS et des antidépresseurs tricycliques.