

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



## Déclaration de Maladie

N° P19- 048950

ND: 38483

Optique

Autres

### Maladie

### Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 0218 Société :

Actif  Pensionné(e)  Autre :

Nom & Prénom : MERNISSI DRISS

Date de naissance : 1940

Adresse : Rue Aïn Asseddine Bm 2

Appart 10 Crème étape CIL CAF 7

Tél. : 0522367664 Total des frais engagés : 1276, Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 14/07/2020

Nom et prénom du malade : MERNISSI DRISS Age: 80

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie :


En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : 03 SEP. 2020

Signature de l'adhérent(e) :



## SOINS ET PROTHESES DENTAIRES

Le praticien est prié de présenter la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins

Veuillez fournir une facture

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

 <b>MUPRAS</b> Mutuelle de Prévoyance & d'Actions Sociales de Royal Air Maroc		W16-068113		DATE DE DEPOT ...../...../201...	
A REMPLIR PAR L'ADHERENT		Mme 0258		<i>[Signature]</i>	
Nom & Prénom <b>MERNISI DRISSE</b>					
Fonction : <b>RETRAITE</b>		Phones <b>0522327854</b>			
Mail <b>[Signature]</b>					
<b>MEDECIN</b>		Prénom du patient <b>MERNISI DRISSE</b>			
Adhérent <input checked="" type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant <input type="checkbox"/>		Age <b>1940</b>		Date <b>14/07/2020</b>	
Nature de la maladie				Date 1ère visite	
<i>Embarquement croisière + Drs. G. Dupuis</i>					
S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances					
Nature des actes		Nbre de Coefficient		Montant détaillé des honoraires	
				<i>Dr. G. Dupuis Pr. ASA et Cardiologie Cardiologue Internationnal CIBD Maroc</i>	
<b>PHARMACIE</b>		Date <b>14/07/2020</b>		<i>PHARMACIE LA SOHRO 44, Avenue de l'Indépendance 6-7 Rue Abdellatif Ben Youssef 10000 CASABLANCA Tél. 05 22 36 26</i>	
Montant de la facture				<i>1226,00 DH</i>	
<b>ANALYSES - RADIOGRAPHIES</b>		Date :			
Désignation des Coefficients		Montant détaillé des Honoraires			
<b>AUXILIAIRES MEDICAUX</b> Date :					
Nombre AM    PC    IM    IV				Montant détaillé des Honoraires	



Hôpital sans Tabac  
Fumer tue

مستشفى بدون تدخين  
التدخين يقتل

Casablanca, le : .....

## ORDONNANCE

Docteur : .....

Dr. Ameur. Msi

27 NO - Dep 50mg

1p/1j

976,00 27 Coralan 5mg 488,-- x 2

1p x 21j

27 Lanlu special 50mg

1/2 p le mat.

41 Vandyfén 80 40.5-- x 4

162,00 1p x 21j

57 Glucenor 300g = 1 p x 215  
138,00 690 x 215 (62)

61 Kalief = 1 p 15

71 Aoflansil 760 mg = 1 p/15

mr Zoua

1276,00

PHARMACIE LA SOURCE  
Dr. El Mounaï MOUNA  
65, rue de la République  
Tunis 1005  
Tunisie  
Tél: 72222222 / 93.22.36.26.60

Dr. El Mounaï Mohamed BENOUNA  
Pr. en Cardiologie  
Cardiologue interne et interne  
CHU Ibn Rochd

# Coralan® 5 mg

Ivabradine

comprimés pelliculés

# Coralan® 75

Ivabradine

## Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car :

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Les symptômes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car :

6 118001130030  
CORALAN 5 mg  
Boîte de 28 comprimés

PPV:262DH00

OUS.

... ou les signes

... applique aussi à tout effet

## QUE CONTIENT CETTE NOTICE ?

1. Qu'est-ce que Coralan et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Coralan ?
3. Comment prendre Coralan ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Coralan ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations ?

## 1. QU'EST-CE QUE CORALAN ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Coralan (ivabradine) est un médicament pour le cœur utilisé dans :

- le traitement symptomatique de l'angor stable ou « angine de poitrine » (une maladie qui provoque des douleurs thoraciques) chez les adultes ayant une fréquence cardiaque supérieure ou égale à 70 battements par minute.

Coralan est utilisé chez les patients adultes présentant une intolérance ou ne pouvant pas prendre de médicaments pour le cœur appelés bêta-bloquants.

Coralan est également utilisé en association aux bêta-bloquants chez des patients adultes insuffisamment contrôlés par les bêta-bloquants.

- le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique chez l'adulte dont la fréquence cardiaque est trop élevée (supérieure ou égale à 75 battements par minutes). L'ivabradine est utilisée en association au traitement standard comprenant les bêta-bloquants ou en cas de contre-indication ou d'intolérance aux bêta-bloquants.

## Informations sur l'angor stable (communément appelé

« angine de poitrine ») :

L'angor stable est une maladie cardiaque qui se manifeste lorsque le cœur ne reçoit pas suffisamment d'oxygène. Il apparaît généralement entre 40 et 50 ans. Le symptôme le plus fréquent de l'angor stable est une douleur ou une gêne dans la poitrine. L'angor stable se manifeste plus volontiers lorsque le cœur bat plus rapidement dans des situations telles qu'un effort physique, une émotion, une exposition au froid ou après un repas. Cette accélération du cœur peut provoquer une douleur dans la poitrine chez les personnes souffrant d'angor stable.

## Informations sur l'insuffisance cardiaque chronique :

L'insuffisance cardiaque chronique est une maladie cardiaque qui apparaît lorsque votre cœur n'arrive pas à pomper suffisamment de sang dans le reste de l'organisme. Les symptômes les plus fréquents sont difficultés respiratoires, sensation de fatigue, fatigue et gonflement des chevilles.

## Comment agit Coralan ?

Coralan agit principalement en réduisant la fréquence cardiaque de quelques battements par minute. Cela diminue le besoin du cœur en oxygène, particulièrement dans les situations au cours desquelles une crise d'angine de poitrine est susceptible de se produire. De cette manière, Coralan aide à éviter et à réduire le nombre de crises d'angine de poitrine. De plus, une fréquence cardiaque élevée affecte le bon fonctionnement du cœur et le pronostic vital chez les patients insuffisants cardiaques chroniques, l'action spécifique de l'ivabradine sur la fréquence cardiaque permet d'améliorer le fonctionnement cardiaque et le pronostic vital de ces patients.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CORALAN ?

### Ne prenez jamais Coralan :

- si vous êtes allergique à l'ivabradine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6) ;
- si votre fréquence cardiaque au repos avant le traitement est trop lente (inférieure à 70 pulsations par minute) ;
- si vous souffrez d'un choc cardiogénique (affection cardiaque nécessitant une hospitalisation) ;
- si vous souffrez d'un trouble du rythme cardiaque ;
- si vous venez de subir une attaque cardiaque ;
- si votre tension artérielle est très faible ;
- si vous souffrez d'un angor instable (une forme sévère dans laquelle la douleur dans la poitrine est très fréquente, avec ou sans effort) ;
- si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque récemment aggravée ;
- si votre fréquence cardiaque est exclusivement imposée par un pacemaker ;
- si vous souffrez d'une maladie grave du foie ;



# Coralan® 5 mg

Ivabradine

comprimés pelliculés

# Coralan® 7,5 mg

Ivabradine

comprimés pelliculés

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à un pharmacien qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

## JE CONTIENT CETTE NOTICE ?

Qu'est-ce que Coralan et dans quel cas est-il utilisé ?

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Coralan ?

Comment prendre Coralan ?

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comment conserver Coralan ?

Contenu de l'emballage et autres informations ?

## QU'EST-CE QUE CORALAN ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Coralan (ivabradine) est un médicament pour le cœur utilisé dans le traitement symptomatique de l'angor stable ou « angine de poitrine » (une maladie qui provoque des douleurs thoraciques) chez les adultes ayant une fréquence cardiaque supérieure ou égale à 70 battements par minute.

Coralan est utilisé chez les patients adultes présentant une intolérance ou ne pouvant pas prendre de médicaments pour le cœur appelés bêta-bloquants.

Coralan est également utilisé en association aux bêta-bloquants chez des patients adultes insuffisamment contrôlés par les bêta-bloquants.

Le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique chez l'adulte dont la fréquence cardiaque est trop élevée (supérieure ou égale à 75 battements par minute). L'ivabradine est utilisée en association au traitement standard comprenant les bêta-bloquants ou en cas de contre-indication ou d'intolérance aux bêta-bloquants.

## Informations sur l'angor stable (communément appelé « angine de poitrine ») :

L'angor stable est une maladie cardiaque qui se manifeste lorsque le cœur ne reçoit pas suffisamment d'oxygène. Il apparaît généralement entre 40 et 50 ans. Le symptôme le plus fréquent de l'angor stable est une douleur ou une gêne dans la poitrine. L'angor stable se manifeste le plus volontiers lorsque le cœur bat plus rapidement dans des situations comme un effort physique, une émotion, une exposition au froid ou après un repas. Cette accélération du cœur peut provoquer une douleur dans la poitrine chez les personnes souffrant d'angor stable.

## Informations :

L'insuffisance cardiaque chronique est une maladie cardiaque lorsque votre cœur n'arrive pas à pomper suffisamment d'oxygène dans le reste de l'organisme. Les symptômes respiratoires, sensatifs

## Comment agit Coralan ?

Coralan agit principalement en ralentissant le cœur. Il empêche les battements cardiaques de prendre trop d'oxygène, particulièrement lors d'une crise d'angine de poitrine. Coralan aide à éviter les crises d'angine de poitrine.

De plus, une fréquence cardiaque élevée affecte le bon fonctionnement du cœur et le pronostic vital chez les patients insuffisants cardiaques chroniques, l'action spécifique de l'ivabradine sur la fréquence cardiaque permet d'améliorer le fonctionnement cardiaque et le pronostic vital de ces patients.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CORALAN ?

### Ne prenez jamais Coralan :

- si vous êtes allergique à l'ivabradine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6);
- si votre fréquence cardiaque au repos avant le traitement est trop élevée (inférieure à 70 pulsations par minute);
- si vous souffrez d'un choc cardiogénique (affection cardiaque nécessitant une hospitalisation);
- si vous souffrez d'un trouble du rythme cardiaque;
- si vous venez de subir une attaque cardiaque;
- si votre tension artérielle est très faible;
- si vous souffrez d'un angor instable (une forme sévère dans laquelle la douleur dans la poitrine est très fréquente, avec ou sans effort);
- si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque récemment aggravée;
- si votre fréquence cardiaque est exclusivement imposée par un pacemaker;
- si vous souffrez d'une maladie grave du foie;

ur vous.

les signes  
tout effet



CORALAN 5 mg  
Boîte de 56 comprimés

PPV:448DH00



CORALAN 7,5 mg  
Boîte de 56 comprimés

PPV:448DH00

qui apparaît  
ang dans le  
difficultés  
chevilles.

taque de  
œur en  
elles une  
manière,  
poitrine.



# Tardyferon® 80 mg

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes.

Vous devez toujours prendre scrupuleusement les informations fournies par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourrez la consulter à tout moment.
- Adressez-vous à votre pharmacien.
- Si vous ressentez un quelconque malaise ou une réaction indésirable qui ne serait pas mentionnée dans la rubrique 4.

- Vous devez vous adresser à votre pharmacien pour toute amélioration ou si vous avez des questions.

319334



6 118001 103041

## Tardyferon® 80mg 30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA  
41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca  
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

319334



6 118001 103041

## Tardyferon® 80mg 30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA  
41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca  
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

319334



6 118001 103041

## Tardyferon® 80mg 30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA  
41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca  
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

319334



6 118001 103041

## Tardyferon® 80mg 30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA  
41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca  
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations pratiques.

### 1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON 80 mg, comprimé ET DANS QUELS

PRÉPARATIONS ANTIANEMIQUES

Ce médicament est un apport en fer par carence en fer et pour la grossesse lorsqu'un apport alimentaire suffisant n'est pas assuré.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TARDYFERON 80 mg, comprimé ?

Ne prenez jamais TARDYFERON 80 mg, comprimé

- si vous êtes allergique aux composants contenus dans la rubrique 6.
- si vous avez une anémie dans le sang) non liée à une maladie inflammatoire.

#### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé.

Si vous prenez TARDYFERON 80 mg, comprimé pour un manque de fer, il faudra également rechercher la cause de ce manque afin de la traiter.

Si votre manque de fer est associé à une maladie inflammatoire, le traitement par TARDYFERON 80 mg ne sera pas efficace.

En raison du risque d'ulcérations buccales et d'altération de la couleur dentaire, les comprimés ne doivent pas être sucrés, mâchés ou gardés dans la bouche mais avalés entiers avec de l'eau.

Si vous ne pouvez pas suivre cette instruction ou si vous rencontrez des difficultés de déglutition, veuillez contacter votre médecin.

D'après des données publiées dans la littérature, il a été observé des colorations de la paroi du tube gastro-intestinal chez des patients

âgés souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'une augmentation de la tension qui recevaient des médicaments pour ces maladies et une supplémentation en fer pour traiter leur anémie.

### Précautions d'emploi

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il est conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps qu'une tasse de thé.

neutre et TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé peuvent déclencher des effets indésirables.

En effet, certains médicaments ne peuvent pas être pris en même temps, alors que d'autres médicaments peuvent subir des changements spécifiques (de dose, de moment ou de forme).

nez des médicaments injectables contenant du fer. Prenez des médicaments contenant de l'acide ascorbique.

ez certains antibiotiques (les cyclines ou les sulfamates).

nez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les vitamines D, les phosphates, le strontium).

nez un médicament pour traiter une maladie de l'œil (la penicillamine).

nez un médicament pour traiter une maladie de l'hypothalamus (la thyroxine).

nez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthyldopa, la levodopa, la carbidopa).

nez du zinc ou du calcium.

nez un médicament pour traiter une acidité excessive de l'estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon actif (sels d'aluminium, de calcium et de magnésium).

nez un médicament pour traiter l'hypercholestérolémie (l'amidon).

otre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

### 3. COMMENT PRENDRE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé avec des aliments ou des boissons

La consommation concomitante de laitage, de thé, de café, de jus de fruits, de légumineuses, d'œufs ou de céréales empêche l'absorption du fer par l'organisme.

esse, allaient pendant la grossesse.

l'utilisation de ce médicament est possible chez la femme qui allaitait. Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucune donnée disponible sur les effets de la capacité à conduire et utiliser des machines.

### 3. COMMENT PRENDRE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

### Posologie

Ce médicament est réservé aux enfants de plus de 6 ans et aux adultes.

# GLURENOR comprimés 30 mg

## Gliquidone

### CATEGORIE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Sulfamide Hypoglycémiant. Antidiabétique Oral.

### INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Traitement du diabète sucré (type II) non insulinodépendant lorsque le régime alimentaire et l'exercice ne sont pas suffisants.

### \* VIGNETTE

GLURENOR® 30 mg

60 comprimés O

PPV 69DH

Glurenor est un hypoglycémiant oral.

Il est recommandé pour le traitement de l'hypoglycémie dans le diabète de type II.

Il peut également être utilisé pour le traitement de l'hypoglycémie dans le diabète de type I.

Il peut également être utilisé pour le traitement de l'hypoglycémie dans le diabète de type II.

Il peut également être utilisé pour le traitement de l'hypoglycémie dans le diabète de type I.

Il peut également être utilisé pour le traitement de l'hypoglycémie dans le diabète de type II.

Il peut également être utilisé pour le traitement de l'hypoglycémie dans le diabète de type I.

Il peut également être utilisé pour le traitement de l'hypoglycémie dans le diabète de type II.

Il peut également être utilisé pour le traitement de l'hypoglycémie dans le diabète de type I.

Il peut également être utilisé pour le traitement de l'hypoglycémie dans le diabète de type II.

Il peut également être utilisé pour le traitement de l'hypoglycémie dans le diabète de type I.

Il peut également être utilisé pour le traitement de l'hypoglycémie dans le diabète de type II.

Il peut également être utilisé pour le traitement de l'hypoglycémie dans le diabète de type I.

Il peut également être utilisé pour le traitement de l'hypoglycémie dans le diabète de type II.

Il peut également être utilisé pour le traitement de l'hypoglycémie dans le diabète de type I.

Il peut également être utilisé pour le traitement de l'hypoglycémie dans le diabète de type II.

Il peut également être utilisé pour le traitement de l'hypoglycémie dans le diabète de type I.

Il peut également être utilisé pour le traitement de l'hypoglycémie dans le diabète de type II.

### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au principe actif, aux sulfonylurées en général ou à l'un des excipients.

Les sulfonylurées sont contre-indiquées dans le diabète de type I (insulinodépendant), acido-cétosique, et l'allaitement, en cas de fonction rénale ou hépatique gravement compromise ou en cas d'insuffisance cardiaque.

### PRÉCAUTIONS D'USAGE

L'usage des hypoglycémiants oraux du groupe des sulfonylurées doit être limité aux patients adultes atteints de diabète non insulinodépendant lorsque le régime et l'administration d'insuline n'est pas indiquée.

En cas de manifestations hypoglycémiantes (voir effets indésirables) administrer des hydrates de carbone; dans le cas de la perte de conscience, il faut effectuer une perfusion lente i.v. de solution glucosée.

En cas de traumatismes, d'interventions chirurgicales, de maladies infectieuses et de fièvre, il peut s'avérer nécessaire de maintenir un contrôle métabolique approprié.

Les patients doivent apprendre à reconnaître les premiers symptômes de l'hypoglycémie (qui sont, en général, la faiblesse, la tête, l'irritabilité et la dépression, les troubles du sommeil, les tremblements, la forte transpiration) afin de pouvoir avertir en temps utile leur médecin, qui doit être aussi informé en cas de fièvre ou de troubles digestifs intercurrents.

### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

L'activité hypoglycémiant des sulfonylurées peut être augmentée par le dicumarol et ses dérivés, par les inhibiteurs des mono amino oxydases, par les bêta-bloquants, par les sulfamidiques, par le phénylbutazone et ses dérivés, par le chloramphénicol, par les tetracyclines, par la cyclophosphamide, par le probénécide, le phénylpyridol, les tuberculostatiques et par les salicylates; elle peut être au contraire diminuée par les sympathicomimétiques, la chlorpromazine, les corticostéroïdes, les contraceptifs oraux et les hormones thyroïdiennes, les diurétiques thiazidiques et les préparations d'acide nicotinique.

Il faut également agir avec prudence lors de l'administration simultanée de bêta-bloquants.

Chez les patients traités avec des sulfonylurées, il faut tenir compte de la possibilité d'un effet antabuse après ingestion de boissons alcoolisées.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou si vous avez pris récemment tout autre type de médicament, même ceux sans prescription médicale.

### MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Le traitement aux sulfonylurées de patients ayant un déficit en G6PD peut entraîner une anémie hémolytique.

Le Gliquidone doit donc être utilisé avec précaution chez ces patients et doit être considéré une alternative thérapeutique.

Le médicament contient du lactose, en cas d'intolérance à certains sucres, informez votre médecin traitant avant de prendre ce médicament.

### Grossesse et allaitement

#### Grossesse

Glurenore est contre-indiqué pendant la grossesse. Dans ce cas le traitement à l'insuline est instauré.

Les patientes voulant programmer une grossesse doivent en informer leur médecin.

Demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre n'importe quel médicament.

#### Allaitement

Comme il n'existe pas de données sur le passage du gliquidone dans le lait maternel, Glurenor ne doit pas être pris par les femmes qui allaitent.

### Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Il n'existe pas de données sur l'effet du gliquidone sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Toute fois, Glurenor peut causer des effets indésirables, les patients doivent être informés pour



DR/SE  
M/2/20

M<sup>le</sup> 0258

Le 14.1.2020

## DECLARATION DE MALADIE CHRONIQUE (✓)

(A adresser au médecin conseil de la MUPRAS sous pli confidentiel)

### A remplir par le praticien

Je soussigné:

Dr. El Ghali Mohamed BENOUNA  
Pr. ass. en Cardiologie  
Cardiologue Interventionnel  
CHU Ibn Rochd

Certifie que Mlle, Mme, M<sup>le</sup>: Nerissa Driss

Présente

Enfys A coronary + Drs. Cardiop

Nécessitant un traitement d'une durée de:

Avce

Dont ci-joint l'ordonnance:

(A défaut noter le traitement prescrit):

(✓) : Valable 3 mois

Contact: 05-22-22-78-14 Fax 05-22-22-78-18