




## **SOINS ET PROTHESES DENTAIRES**

Le praticien est prié de présenter la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins

Veuillez fournir une facture.

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des soins	Coefficient	Coefficient des												
				<input type="text"/>												
				<b>Montant des soins</b> <input type="text"/>												
<b>O.D.F.</b> <b>Prothèses dentaires</b>	Détermination du coefficient masticatoire			<b>Début d'exécution</b> <input type="text"/>												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center; padding-bottom: 5px;">H</td> <td style="width: 33%; text-align: center; padding-bottom: 5px;">D</td> <td style="width: 33%; text-align: center; padding-bottom: 5px;">G</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25533412</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">21433552</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">35533411</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">11433553</td> </tr> </table>			H	D	G	25533412	00000000	21433552	00000000	00000000	00000000	35533411	00000000	11433553	<b>Fin d'exécution</b> <input type="text"/>
H	D	G														
25533412	00000000	21433552														
00000000	00000000	00000000														
35533411	00000000	11433553														
	<p style="text-align: center;"><b>(Création, Remont, adjonction)</b> Fonctionnel, thérapeutique, nécessaire à la profession</p>			<b>Coefficient des travaux</b> <input type="text"/>												
				<b>Montant des soins</b> <input type="text"/>												
				<b>Date du devis</b> <input type="text"/>												
				<b>Fin de</b> <input type="text"/>												


<b>VOLET ADHERENT</b>	NOM : <b>DRISS</b>	Mle <b>0258</b>
DECLARATION N°	<b>W16-068110</b>	
Date de Dépôt	Montant engagé	Nbre de pièces Jointes
<b>Durée de validité de cette feuille est de (3) trois mois</b>		
Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs avérés par la Mutuelle.		



W16-068110

**DATE DE DEPO**

1/201

A REMPLIR PAR L'ADHERENT		Mle 0258			
Nom & Prénom MERNISSI DRISS		<i>[Signature]</i>			
Fonction : RETRAITÉ	Phones 0522 367554				
Mail	<i>[Signature]</i>				
MEDECIN	Prénom du patient MERNISSI DRISS				
Adhérent <input checked="" type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant <input type="checkbox"/>	Age .....				
Nature de la maladie	Date 1ère visite 15/04/2020				
S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances					
Nature des actes 15/04/2020	Nbre de Coefficient	Montant détaillé des honoraires			
		6			
PHARMACIE Date 15/04/2020					
Montant de la facture					
ANALYSES - RADIOGRAPHIES Date :					
AUXILIAIRES MEDICAUX Date :					
Nombre		Montant détaillé des Honoraires			
AM	PC	IM	IV		



Hôpital sans Tabac  
Fumer tue

مستشفى بدون تدخين  
التدخين يقتل

Casablanca, le : 15-04-2020

## ORDONNANCE

Docteur : .....

M. Ameurri Dris

~~126 x 2~~  
~~231 x 2~~  
~~448 x 2~~  
~~8961~~  
~~302 x 130~~  
~~1050 x 4~~  
~~2021 x 2~~  
~~65 x 161~~  
~~2110~~

Bay no - Dose 50mg = 1 p<sup>s</sup>

Loratad 5mg = 1 p x 2 J

Tarot fein 6 = 1 cp x 2 J

Glucom 30mg = 1 p x 2 J

Gildactine 30mg = 1/2 cp x 2 J




#1 Ardonwil Abou = Ap1j



Dr. El Ghoul Mohamed BENOUNA  
Pr. ass en Cardiologie  
Cardiologue Interventionnel  
CHU Lyon Rochefort

Mr Zouine



MF cora

# Coralan® 5 mg

Ivabradine

comprimés pelliculés

# Coralan® 7,5 mg

Ivabradine

comprimés pelliculés

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou un pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Les personnes qui ont la même maladie que vous peuvent en avoir besoin mais leur maladie est peut-être différente.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien ou à votre médecin. Il peut s'agir d'un effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.



PPV:448DH00

NXG50068



PPV:448DH00

NXG50068

'eur être nocif, même si les signes

ci s'applique aussi à tout effet

## QUE CONTIENT CETTE NOTICE ?

1. Qu'est-ce que Coralan et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Coralan ?
3. Comment prendre Coralan ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Coralan ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations ?

## 1. QU'EST-CE QUE CORALAN ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Coralan (ivabradine) est un médicament pour le cœur utilisé dans :

- le traitement symptomatique de l'angor stable ou « angine de poitrine » (une maladie qui provoque des douleurs thoraciques) chez les adultes ayant une fréquence cardiaque supérieure ou égale à 70 battements par minute.

Coralan est utilisé chez les patients adultes présentant une intolérance ou ne pouvant pas prendre de médicaments pour le cœur appelés bêta-bloquants.

Coralan est également utilisé en association aux bêta-bloquants chez des patients adultes insuffisamment contrôlés par les bêta-bloquants.

- le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique chez l'adulte dont la fréquence cardiaque est trop élevée (supérieure ou égale à 75 battements par minutes). L'ivabradine est utilisée en association avec d'autres médicaments pour traiter l'insuffisance cardiaque.

## QUELQUES FAITS IMPORTANTS À CONNAÎTRE

**Maladie cardiaque chronique :** maladie cardiaque qui apparaît progressivement et qui entraîne des difficultés de circulation du sang dans le corps. Les symptômes sont couramment des difficultés respiratoires, des crampes dans les jambes et des gonflements des chevilles.

**Angine de poitrine :** douleur dans la poitrine due à une insuffisance cardiaque. La fréquence cardiaque de l'adulte peut être élevée et la pression dans les artères du cœur peut être élevée. De cette manière, l'angine de poitrine peut entraîner des difficultés respiratoires et des douleurs dans la poitrine.

**Insuffisance cardiaque :** maladie cardiaque qui entraîne une faible circulation du sang dans le corps. Les symptômes sont couramment des difficultés respiratoires, des crampes dans les jambes et des gonflements des chevilles. Les patients insuffisants cardiaques peuvent également souffrir d'insuffisance cardiaque chronique de l'ivabradine sur la fréquence cardiaque et le fonctionnement cardiaque et le pronostic vital de ces patients.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CORALAN ?

### Ne prenez jamais Coralan :

- si vous êtes allergique à l'ivabradine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6);
- si votre fréquence cardiaque au repos avant le traitement est trop élevée (supérieure ou égale à 70 battements par minute).

## ICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# asilix® Spécial 500 mg, comprimé sécable

rosémide

SANOFI

euillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice. Vous pourriez

Si vous avez d'autres questi

Ce médicament vous a  
pourrait leur être nocif,

Si vous ressentez un quel  
s'applique aussi à tout eff

### ce contient cette notice ?

Qu'est-ce que LASILIX SPECIAL 500 mg, comprimé  
sécable et dans quels cas est-il utilisé ?

Quelles sont les informations à connaître avant de  
prendre LASILIX SPECIAL 500 mg, comprimé sécable ?

Comment prendre LASILIX SPECIAL 500 mg,  
comprimé sécable ?

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comment conserver LASILIX SPECIAL 500 mg,  
comprimé sécable ?

Contenu de l'emballage et autres informations.

### QU'EST-CE QUE LASILIX SPECIAL 500 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

ce pharmacothérapeutique : code ATC C03CA01

#### RETIQUE DE L'ANSE

Le médicament est indiqué dans le traitement :

insuffisance rénale chronique avant le stade de  
l'hémodialyse (clairance de la créatinine  $\geq 5 \text{ ml/min}$ ) :

hypertension artérielle ou rétention hydrosodée.  
insuffisance rénale chronique au stade de

de la relire.

médecin, ou votre pharmacien.

crit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il  
r maladie sont identiques aux vôtres.

arlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci  
pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

- Si vous souffrez d'une défaillance brutale des fonctions du rein (insuffisance rénale aiguë).
- Si vous avez des difficultés importantes pour uriner à cause d'un blocage de l'écoulement de l'urine (obstruction des voies urinaires).
- Si vous avez une diminution du volume total de sang dans votre corps.
- Si vous êtes déshydraté(e).
- Si vous avez une diminution excessive de potassium dans le sang (voir la section 4 « Quels sont les effets indésirables éventuels ? »)
- Si vous avez une diminution excessive de sodium dans le sang
- Si vous avez une maladie du foie (hépatite ou insuffisance hépatique sévère), surtout si vous avez également une défaillance des fonctions du rein, nécessitant ou non une dialyse (hémodialysé et insuffisant rénal sévère).
- Si vous avez une maladie grave du foie associée à des troubles du cerveau (encéphalopathie hépatique).
- Si vous prenez un autre médicament, assurez-vous que l'association avec LASILIX SPECIAL n'est pas

# Tardyferon® 80 mg

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en scrupuleusement les informations fournies dans cette notice par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourrez la consulter à tout moment.
- Adressez-vous à votre pharmacien si vous avez des questions.
- Si vous ressentez un quelconque malaise ou symptôme indésirable qui ne serait pas mentionné dans la rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre pharmacien pour une amélioration ou si vous vous sentez faibles.



6 118001 103041  
Tardyferon® 80mg  
30 comprimés pelliculés  
Distribué par COOPER PHARMA  
41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca  
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

## Quel contenu cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg, comment ça est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître sur TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comment et quand ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comment et où ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

### PRÉPARATIONS ANTIANÉMIQUES

Ce médicament est un apport en fer. Il est recommandé dans les cas de carence en fer et pour prévenir cette carence pendant la grossesse lorsqu'un apport alimentaire en fer est insuffisant.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?

### Ne prenez jamais TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au fer ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous avez une anémie (quantité insuffisante de globules rouges dans le sang) non liée à une carence en fer.

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé.

Si vous prenez TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé pour un manque de fer, il faudra également rechercher la cause de ce manque afin de la traiter.

Si votre manque de fer est associé à une maladie inflammatoire, le traitement par TARDYFERON 80 mg ne sera pas efficace.

En raison du risque d'ulcérations buccales et d'altération de la couleur dentaire, les comprimés ne doivent pas être sucrés, mâchés ou gardés dans la bouche mais avalés entiers avec de l'eau.

Si vous ne pouvez pas suivre cette instruction ou si vous rencontrez des difficultés de déglutition, veuillez contacter votre médecin.

D'après des données publiées dans la littérature, il a été observé des colorations de la paroi du tube gastro-intestinal chez des patients

âgés souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'une augmentation de la tension qui recevaient des médicaments pour ces maladies et une supplémentation en fer pour traiter leur anémie.

### Précautions d'emploi

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il est conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps qu'un thé.

### Produits et TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé

Ne prenez pas TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé sauf si votre état nécessite cela. En effet, certains médicaments ne peuvent être pris en même temps, alors que d'autres médicaments nécessitent des changements spécifiques (de dose, de moment de prise).

Ne prenez pas des médicaments injectables contenant du fer. Ne prenez pas des médicaments contenant de l'acide

strontium. Certains antibiotiques (les cyclines ou les

macrolides) peuvent pour traiter une fragilité osseuse (strontium).

Ne prenez pas de médicament pour traiter une maladie des os (ostéoporose).

Ne prenez pas de médicament pour traiter une maladie de Parkinson (levodopa, la carbipoda).

Ne prenez pas de médicament pour traiter une acidité excessive (laxatifs, charbon ou sucre et de magnésium).

Ne prenez pas de médicament pour traiter l'hypercholestérolémie (statines).

Ne prenez pas de médicament si vous prenez, avez ou allez prendre un autre médicament.

Ne prenez pas de médicament si vous prenez, avez ou allez prendre un autre médicament.

Ne prenez pas de médicament si vous prenez, avez ou allez prendre un autre médicament.

Ne prenez pas de médicament si vous prenez, avez ou allez prendre un autre médicament.

Ne prenez pas de médicament si vous prenez, avez ou allez prendre un autre médicament.

Ne prenez pas de médicament si vous prenez, avez ou allez prendre un autre médicament.

Ne prenez pas de médicament si vous prenez, avez ou allez prendre un autre médicament.

Ne prenez pas de médicament si vous prenez, avez ou allez prendre un autre médicament.

Ne prenez pas de médicament si vous prenez, avez ou allez prendre un autre médicament.

Ne prenez pas de médicament si vous prenez, avez ou allez prendre un autre médicament.

Ne prenez pas de médicament si vous prenez, avez ou allez prendre un autre médicament.

Ne prenez pas de médicament si vous prenez, avez ou allez prendre un autre médicament.

# GLURENOR comprimés 30 mg

## Gliquidone

**CATEGORIE PHARMACOTERAPEUTIQUE**

Sulfamide Hypoglycémiant. Antidiabétique Oral.

**INDICATIONS THERAPEUTIQUES**

Traitement du diabète sucré (type II) non insulinodépendant lorsque le régime alimentaire ne suffit pas à eux seuls pour un contrôle adéquat de la glycémie.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité au principe actif, aux sulfonylurées en général ou à l'un des excipients. Les sulfonylurées sont contre-indiquées dans le diabète de type I (insulinodépendant), acide et l'allaitement, en cas de fonction rénale ou hépatique gravement compromise ou en cas d'insuffisance surrenalienne.

**PRÉCAUTIONS D'USAGE**

L'usage des hypoglycémiants oraux du groupe des sulfonylurées doit être limité aux patients ne peut être contrôlé par un régime et à qui l'administration d'insuline n'est pas indiquée. En cas de manifestations hypoglycémiques (voir effets indésirables) administrer des hydrates de conscience, il faut effectuer une perfusion lente i.v. de solution glucosée.

En cas de traumatismes, d'interventions chirurgicales, de maladies infectieuses et de fièvre, il peut maintenir un contrôle métabolique approprié.

Les patients doivent apprendre à reconnaître les premiers symptômes de l'hypoglycémie (qui sont, en général, le mal de tête, l'irritabilité et la dépression, les troubles du sommeil, les tremblements, la forte transpiration) afin de pouvoir avertir en temps utile leur médecin, qui doit être aussi informé en cas de fièvre ou de troubles digestifs intercurrents.

**INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS**

L'activité hypoglycémante des sulfonylurées peut être augmentée par le dicumarol et ses dérivés, par les inhibiteurs des mono amino oxydases, par les bêta-bloquants, par les sulfamidiques, par le phénylbutazone et ses dérivés, par le chloramphénicol, par les tetracyclines, par la cyclophosphamide, par le probénécide, le phényramidol, les tubercolostatiques et par les salicylates ; elle peut être au contraire diminuée par les sympathicomimétiques, la chlorpromazine, les corticostéroïdes, les contraceptifs oraux et les hormones thyroïdiennes, les diurétiques thiazidiques et les préparations d'acide nicotinique.

Il faut également agir avec prudence lors de l'administration simultanée de bêta-bloquants.

Chez les patients traités avec des sulfonylurées, il faut tenir compte de la possibilité d'un effet antabuse après ingestion de boissons alcoolisées.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou si vous avez pris récemment tout autre type de médicament, même ceux sans prescription médicale.

**MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Le traitement aux sulfonylurées de patients ayant un déficit en G6PD peut entraîner une anémie hémolytique.

Le Gliquidone doit donc être utilisé avec précaution chez ces patients et doit être considéré une alternative thérapeutique.

Le médicament contient du lactose, en cas d'intolérance à certains sucres, informez votre médecin traitant avant de prendre ce médicament.

*Grossesse et allaitement**Grossesse*

Glurenor est contre-indiqué pendant la grossesse. Dans ce cas le traitement à l'insuline est instauré.

Les patientes voulant programmer une grossesse doivent en informer leur médecin.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre n'importe quel médicament.

*Allaitement*

Comme il n'existe pas de données sur le passage du gliquidone dans le lait maternel, Glurenor ne doit pas être pris par les femmes qui allaitent.

*Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines*

Aucune étude n'a été effectuée sur la capacité à conduire ou à utiliser des machines. Toutefois, Glurenore peut causer une hypoglycémie. Les patients devraient être informés pour savoir reconnaître les symptômes de l'hypoglycémie et agir avec prudence lorsqu'ils conduisent des véhicules ou utilisent des machines.

# **NO-DEP® 50mg**

**Sertraline**

LOT : 256

PER : OCT 2021

PPV : 126 DH 80

**30 Comprimés pelliculés  
sécables**

**CiplaMaroc**

# **NO-DEP® 50mg**

**Sertraline**

LOT : 256

PER : OCT 2021

PPV : 126 DH 80

**30 Comprimés pelliculés  
sécables**

**CiplaMaroc**



MUPRAS  
Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

Le 15.04.2020

N° 0258

## DECLARATION DE MALADIE CHRONIQUE (✓)

(A adresser au médecin conseil de la MUPRAS sous pli confidentiel)

### A remplir par le praticien

Je soussigné:

Dr. El Ghali Mohamed BENOUNA  
Pr. ass. en Cardiologie  
Cardiologue Interventionnel  
CHU Ibn Rochd

Certifie que Mlle, Mme, M : Rehana Davis

Présente

CMi / Plaie de canari

Nécessitant un traitement d'une durée de:

Anne

Dont ci-joint l'ordonnance: .....

(A défaut noter le traitement prescrit).....

(✓) : Valable 3 mois

Contact: 05-22-22-78-14 Fax 05-22-22-78-18