

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

adiologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

tique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

taire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

die et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

ND 38783

Déclaration de Maladie : N° P19-0016234

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 1856 Société : RAM.

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : SIASSI KHANATI

Date de naissance :

1956

Adresse : 50 lot KHALFAOUI OUJDA.

Tel : 066711282 86

Total des frais engagés : 180,80 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 23/07/2020

Nom et prénom du malade : SIASSI KHANATI Age : 64

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) : 23/07/2020.

Le : 23/07/2020

ACCUEIL

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
23/07/20 C		C		Dr Khalifa Ibn Alawi

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	23/07/2020	135.60
	23/07/2020	45,40

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODT

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
-----	-----
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

CŒFFICIENT DES TRAVAUX	
MONTANTS DES SOINS	
DEBUT D'EXECUTION	
FIN D'EXECUTION	
CŒFFICIENT DES TRAVAUX	
MONTANTS DES SOINS	
DATE DU DEVIS	

وصفة طبية Ordonnance

Casablanca, le :

23/7/2010

ن = سلسی کھنایا

22.60x6
ن = Topiramate 200 mg

185,60 = ١٨٥,٦٠
1010825

ن = ٢ - ٥ - ١

x 0.2 ml

ن = انتوپراما

ن = مونیا اکراما
Dr. Mounia AKRAMA
Docteur en Pharmacie
59, Rue Aouinet Essarak, Hay Salam
Tél.: 05 36 71 00 00 - 05 36 71 00 00

NOTICE

Dénomination du médicament

TOPIRAMATE GT 25 mg, 50 mg, 100 mg et 200 mg

Comprimés pelliculés

Boîte de 10 (TOPIRAMATE GT 25 mg)

Boîte de 30 (TOPIRAMATE GT 50 mg, 100 mg et 200 mg)

DCI : Topiramate

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
 3. Comment prendre TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
 6. Informations supplémentaires.
1. QU'EST-CE QUE TOPIRAMATE GT, COMPRIME PELLICULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique :

TOPIRAMATE GT appartient à un groupe de médicaments appelés « médicaments antiépileptiques ».

Indications thérapeutiques :

Il est utilisé :

- seul pour traiter les convulsions chez les adultes et les enfants à partir de 6 ans,
- avec d'autres médicaments pour traiter les convulsions chez les adultes et les enfants âgés de 2 ans et plus,
- pour prévenir les migraines chez l'adulte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE

Informez votre médecin, ou consultez un service médical immédiatement si vous avez les effets indésirables suivants :

Très fréquents (pouvant affecter plus de 1 personne sur 10)

- dépression (nouvelle ou aggravée)

Fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 10)

- convulsions (crises épileptiques)
- anxiété, irritabilité, changement d'humeur
- problèmes de concentration, ralenti
- des problèmes de mémoire (de sévérité accrue)
- calculs rénaux, uriner de façon

Lot: PD0407A
Per: 04/2022
PPV: 22DH60



Peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 100)

- niveau d'acide augmenté dans les voies respiratoires, y compris un essoufflement, des vomissements, fatigue excessive, et des battements irréguliers
- diminution ou perte de la transpiration (en particulier chez les jeunes enfants exposés à de fortes températures)
- avoir des pensées d'automutilation grave, essayer de se provoquer de graves automutilations
- perte d'une partie du champ visuel

Rares (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 1 000)

- glaucome - blocage du fluide au niveau de l'œil entraînant une augmentation de la pression dans l'œil, une douleur, ou une vision diminuée

D'autres effets indésirables incluent les suivants, s'ils deviennent graves, parlez-en à votre médecin ou pharmacien :

Très fréquents (pouvant affecter plus d'une personne sur 10)

- nez bouché, nez qui coule ou mal de gorge
- picotements, douleurs et/ou engourdissements de différentes parties du corps
- somnolence, fatigue
- sensations vertigineuses
- nausées, diarrhée
- perte de poids

Fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 10)

- anémie (faible numération des globules rouges)
- réaction allergique (comme une éruption cutanée, des rougeurs, des démangeaisons, gonflement du visage, urticaire)
- perte d'appétit, diminution de l'appétit
- agression, agitation, colère, comportement abnormal
- difficulté à s'endormir ou à rester endormi
- problèmes ou troubles du langage, troubles de l'élocution
- maladresse ou manque de coordination, sensation d'instabilité lors de la marche
- diminution de la capacité à effectuer des tâches de routine
- diminution, perte, ou pas de goût

NOTICE

Dénomination du médicament

TOPIRAMATE GT 25 mg, 50 mg, 100 mg et 200 mg

Comprimés pelliculés

Boîte de 10 (TOPIRAMATE GT 25 mg)

Boîte de 30 (TOPIRAMATE GT 50 mg, 100 mg et 200 mg)

DCI : Topiramate

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
 3. Comment prendre TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
 6. Informations supplémentaires.
1. QU'EST-CE QUE TOPIRAMATE GT, COMPRIME PELLICULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique :

TOPIRAMATE GT appartient à un groupe de médicaments appelés « médicaments antiépileptiques ».

Indications thérapeutiques :

Il est utilisé :

- seul pour traiter les convulsions chez les adultes et les enfants à partir de 6 ans,
- avec d'autres médicaments pour traiter les convulsions chez les adultes et les enfants âgés de 2 ans et plus,
- pour prévenir les migraines chez l'adulte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE

Informez votre médecin, ou consultez un service médical immédiatement si vous avez les effets indésirables suivants :

Très fréquents (pouvant affecter plus de 1 personne sur 10)

- dépression (nouvelle ou aggravée)

Fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 10)

- convulsions (crises épileptiques)
- anxiété, irritabilité, changement d'humeur
- problèmes de concentration, ralenti
- des problèmes de mémoire (de sévérité accrue)
- calculs rénaux, uriner de façon

Lot: PD0407A

Per: 04/2022

PPV: 22DH60



Peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 100)

- niveau d'acide augmenté dans les voies respiratoires, y compris un essoufflement, des vomissements, fatigue excessive, états irréguliers)
- diminution ou perte de la transpiration (en particulier chez les jeunes enfants exposés à de fortes températures)
- avoir des pensées d'automutilation grave, essayer de se provoquer de graves automutilations
- perte d'une partie du champ visuel

Rares (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 1 000)

- glaucome - blocage du fluide au niveau de l'œil entraînant une augmentation de la pression dans l'œil, une douleur, ou une vision diminuée

D'autres effets indésirables incluent les suivants, s'ils deviennent graves, parlez-en à votre médecin ou pharmacien :

Très fréquents (pouvant affecter plus d'une personne sur 10)

- nez bouché, nez qui coule ou mal de gorge
- picotements, douleurs et/ou engourdissements de différentes parties du corps
- somnolence, fatigue
- sensations vertigineuses
- nausées, diarrhée
- perte de poids

Fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 10)

- anémie (faible numération des globules rouges)
- réaction allergique (comme une éruption cutanée, des rougeurs, des démangeaisons, gonflement du visage, urticaire)
- perte d'appétit, diminution de l'appétit
- agression, agitation, colère, comportement abnormal
- difficulté à s'endormir ou à rester endormi
- problèmes ou troubles du langage, troubles de l'élocution
- maladresse ou manque de coordination, sensation d'instabilité lors de la marche
- diminution de la capacité à effectuer des tâches de routine
- diminution, perte, ou pas de goût

NOTICE

Dénomination du médicament

TOPIRAMATE GT 25 mg, 50 mg, 100 mg et 200 mg

Comprimés pelliculés

Boîte de 10 (TOPIRAMATE GT 25 mg)

Boîte de 30 (TOPIRAMATE GT 50 mg, 100 mg et 200 mg)

DCI : Topiramate

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
 3. Comment prendre TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
 6. Informations supplémentaires.
1. QU'EST-CE QUE TOPIRAMATE GT, COMPRIME PELLICULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique :

TOPIRAMATE GT appartient à un groupe de médicaments appelés « médicaments antiépileptiques ».

Indications thérapeutiques :

Il est utilisé :

- seul pour traiter les convulsions chez les adultes et les enfants à partir de 6 ans,
- avec d'autres médicaments pour traiter les convulsions chez les adultes et les enfants âgés de 2 ans et plus,
- pour prévenir les migraines chez l'adulte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE

Informez votre médecin, ou consultez un service médical immédiatement si vous avez les effets indésirables suivants :

Très fréquents (pouvant affecter plus de 1 personne sur 10)

- dépression (nouvelle ou aggravée)

Fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 10)

- convulsions (crises épileptiques)
- anxiété, irritabilité, changement d'humeur
- problèmes de concentration, ralenti
- des problèmes de mémoire (de sévérité accrue)
- calculs rénaux, uriner de façon

Lot: PD0407A

Per: 04/2022

PPV: 22DH60



Peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 100)

- niveau d'acide augmenté dans les voies respiratoires, y compris un essoufflement, des vomissements, fatigue excessive, états irréguliers)
- diminution ou perte de la transpiration (en particulier chez les jeunes enfants exposés à de fortes températures)
- avoir des pensées d'automutilation grave, essayer de se provoquer de graves automutilations
- perte d'une partie du champ visuel

Rares (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 1 000)

- glaucome - blocage du fluide au niveau de l'œil entraînant une augmentation de la pression dans l'œil, une douleur, ou une vision diminuée

D'autres effets indésirables incluent les suivants, s'ils deviennent graves, parlez-en à votre médecin ou pharmacien :

Très fréquents (pouvant affecter plus d'une personne sur 10)

- nez bouché, nez qui coule ou mal de gorge
- picotements, douleurs et/ou engourdissements de différentes parties du corps
- somnolence, fatigue
- sensations vertigineuses
- nausées, diarrhée
- perte de poids

Fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 10)

- anémie (faible numération des globules rouges)
- réaction allergique (comme une éruption cutanée, des rougeurs, des démangeaisons, gonflement du visage, urticaire)
- perte d'appétit, diminution de l'appétit
- agression, agitation, colère, comportement abnormal
- difficulté à s'endormir ou à rester endormi
- problèmes ou troubles du langage, troubles de l'élocution
- maladresse ou manque de coordination, sensation d'instabilité lors de la marche
- diminution de la capacité à effectuer des tâches de routine
- diminution, perte, ou pas de goût

NOTICE

Dénomination du médicament

TOPIRAMATE GT 25 mg, 50 mg, 100 mg et 200 mg

Comprimés pelliculés

Boîte de 10 (TOPIRAMATE GT 25 mg)

Boîte de 30 (TOPIRAMATE GT 50 mg, 100 mg et 200 mg)

DCI : Topiramate

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
 3. Comment prendre TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
 6. Informations supplémentaires.
1. QU'EST-CE QUE TOPIRAMATE GT, COMPRIME PELLICULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique :

TOPIRAMATE GT appartient à un groupe de médicaments appelés « médicaments antiépileptiques ».

Indications thérapeutiques :

Il est utilisé :

- seul pour traiter les convulsions chez les adultes et les enfants à partir de 6 ans,
- avec d'autres médicaments pour traiter les convulsions chez les adultes et les enfants âgés de 2 ans et plus,
- pour prévenir les migraines chez l'adulte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE

Informez votre médecin, ou consultez un service médical immédiatement si vous avez les effets indésirables suivants :

Très fréquents (pouvant affecter plus de 1 personne sur 10)

- dépression (nouvelle ou aggravée)

Fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 10)

- convulsions (crises épileptiques)
- anxiété, irritabilité, changement d'humeur
- problèmes de concentration, ralenti
- des problèmes de mémoire (de sévérité accrue)
- calculs rénaux, uriner de façon

Lot: PD0407A

Per: 04/2022

PPV: 22DH60



Peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 100)

- niveau d'acide augmenté dans les voies respiratoires, y compris un essoufflement, des vomissements, fatigue excessive, états irréguliers)
- diminution ou perte de la transpiration (en particulier chez les jeunes enfants exposés à de fortes températures)
- avoir des pensées d'automutilation grave, essayer de se provoquer de graves automutilations
- perte d'une partie du champ visuel

Rares (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 1 000)

- glaucome - blocage du fluide au niveau de l'œil entraînant une augmentation de la pression dans l'œil, une douleur, ou une vision diminuée

D'autres effets indésirables incluent les suivants, s'ils deviennent graves, parlez-en à votre médecin ou pharmacien :

Très fréquents (pouvant affecter plus d'une personne sur 10)

- nez bouché, nez qui coule ou mal de gorge
- picotements, douleurs et/ou engourdissements de différentes parties du corps
- somnolence, fatigue
- sensations vertigineuses
- nausées, diarrhée
- perte de poids

Fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 10)

- anémie (faible numération des globules rouges)
- réaction allergique (comme une éruption cutanée, des rougeurs, des démangeaisons, gonflement du visage, urticaire)
- perte d'appétit, diminution de l'appétit
- agression, agitation, colère, comportement abnormal
- difficulté à s'endormir ou à rester endormi
- problèmes ou troubles du langage, troubles de l'élocution
- maladresse ou manque de coordination, sensation d'instabilité lors de la marche
- diminution de la capacité à effectuer des tâches de routine
- diminution, perte, ou pas de goût

NOTICE

Dénomination du médicament

TOPIRAMATE GT 25 mg, 50 mg, 100 mg et 200 mg

Comprimés pelliculés

Boîte de 10 (TOPIRAMATE GT 25 mg)

Boîte de 30 (TOPIRAMATE GT 50 mg, 100 mg et 200 mg)

DCI : Topiramate

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
 3. Comment prendre TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
 6. Informations supplémentaires.
1. QU'EST-CE QUE TOPIRAMATE GT, COMPRIME PELLICULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique :

TOPIRAMATE GT appartient à un groupe de médicaments appelés « médicaments antiépileptiques ».

Indications thérapeutiques :

Il est utilisé :

- seul pour traiter les convulsions chez les adultes et les enfants à partir de 6 ans,
- avec d'autres médicaments pour traiter les convulsions chez les adultes et les enfants âgés de 2 ans et plus,
- pour prévenir les migraines chez l'adulte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE

Informez votre médecin, ou consultez un service médical immédiatement si vous avez les effets indésirables suivants :

Très fréquents (pouvant affecter plus de 1 personne sur 10)

- dépression (nouvelle ou aggravée)

Fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 10)

- convulsions (crises épileptiques)
- anxiété, irritabilité, changement d'humeur
- problèmes de concentration, ralenti
- des problèmes de mémoire (de sévérité accrue)
- calculs rénaux, uriner de façon

Lot: PD0407A

Per: 04/2022

PPV: 22DH60



Peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 100)

- niveau d'acide augmenté dans les voies respiratoires, y compris un essoufflement, des vomissements, fatigue excessive, états irréguliers)
- diminution ou perte de la transpiration (en particulier chez les jeunes enfants exposés à de fortes températures)
- avoir des pensées d'automutilation grave, essayer de se provoquer de graves automutilations
- perte d'une partie du champ visuel

Rares (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 1 000)

- glaucome - blocage du fluide au niveau de l'œil entraînant une augmentation de la pression dans l'œil, une douleur, ou une vision diminuée

D'autres effets indésirables incluent les suivants, s'ils deviennent graves, parlez-en à votre médecin ou pharmacien :

Très fréquents (pouvant affecter plus d'une personne sur 10)

- nez bouché, nez qui coule ou mal de gorge
- picotements, douleurs et/ou engourdissements de différentes parties du corps
- somnolence, fatigue
- sensations vertigineuses
- nausées, diarrhée
- perte de poids

Fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 10)

- anémie (faible numération des globules rouges)
- réaction allergique (comme une éruption cutanée, des rougeurs, des démangeaisons, gonflement du visage, urticaire)
- perte d'appétit, diminution de l'appétit
- agression, agitation, colère, comportement abnormal
- difficulté à s'endormir ou à rester endormi
- problèmes ou troubles du langage, troubles de l'élocution
- maladresse ou manque de coordination, sensation d'instabilité lors de la marche
- diminution de la capacité à effectuer des tâches de routine
- diminution, perte, ou pas de goût

NOTICE

Dénomination du médicament

TOPIRAMATE GT 25 mg, 50 mg, 100 mg et 200 mg

Comprimés pelliculés

Boîte de 10 (TOPIRAMATE GT 25 mg)

Boîte de 30 (TOPIRAMATE GT 50 mg, 100 mg et 200 mg)

DCI : Topiramate

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
 3. Comment prendre TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver TOPIRAMATE GT, comprimé pelliculé ?
 6. Informations supplémentaires.
1. QU'EST-CE QUE TOPIRAMATE GT, COMPRIME PELLICULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique :

TOPIRAMATE GT appartient à un groupe de médicaments appelés « médicaments antiépileptiques ».

Indications thérapeutiques :

Il est utilisé :

- seul pour traiter les convulsions chez les adultes et les enfants à partir de 6 ans,
- avec d'autres médicaments pour traiter les convulsions chez les adultes et les enfants âgés de 2 ans et plus,
- pour prévenir les migraines chez l'adulte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE

Informez votre médecin, ou consultez un service médical immédiatement si vous avez les effets indésirables suivants :

Très fréquents (pouvant affecter plus de 1 personne sur 10)

- dépression (nouvelle ou aggravée)

Fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 10)

- convulsions (crises épileptiques)
- anxiété, irritabilité, changement d'humeur
- problèmes de concentration, ralenti
- des problèmes de mémoire (de sévérité accrue)
- calculs rénaux, uriner de façon

Lot: PD0407A
Per: 04/2022
PPV: 22DH60



Peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 100)

- niveau d'acide augmenté dans les voies respiratoires, y compris un essoufflement, des vomissements, fatigue excessive, états irréguliers)
- diminution ou perte de la transpiration (en particulier chez les jeunes enfants exposés à de fortes températures)
- avoir des pensées d'automutilation grave, essayer de se provoquer de graves automutilations
- perte d'une partie du champ visuel

Rares (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 1 000)

- glaucome - blocage du fluide au niveau de l'œil entraînant une augmentation de la pression dans l'œil, une douleur, ou une vision diminuée

D'autres effets indésirables incluent les suivants, s'ils deviennent graves, parlez-en à votre médecin ou pharmacien :

Très fréquents (pouvant affecter plus d'une personne sur 10)

- nez bouché, nez qui coule ou mal de gorge
- picotements, douleurs et/ou engourdissements de différentes parties du corps
- somnolence, fatigue
- sensations vertigineuses
- nausées, diarrhée
- perte de poids

Fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 10)

- anémie (faible numération des globules rouges)
- réaction allergique (comme une éruption cutanée, des rougeurs, des démangeaisons, gonflement du visage, urticaire)
- perte d'appétit, diminution de l'appétit
- agression, agitation, colère, comportement abnormal
- difficulté à s'endormir ou à rester endormi
- problèmes ou troubles du langage, troubles de l'élocution
- maladresse ou manque de coordination, sensation d'instabilité lors de la marche
- diminution de la capacité à effectuer des tâches de routine
- diminution, perte, ou pas de goût