

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Déclaration de Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

40191

Déclaration de Maladie : N° P19- 0023464

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1864

Société : R.A. M

Actif

Pensionné(e)

Autre : RETRAITE

Nom & Prénom : KOUTANI - MED

Date de naissance :

Adresse : CITE HASSANI - RAJA S28 N° 947 CASA

Télé : 05 22 89 19 44

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

Dr. Nabil GAITI
CARDIOLOGIE
Bd. My Razzouk - Casablanca
05 22 38 09 GSM: 06 61 24 30 13

16 SEP. 2020



Signature de l'adhérent(e) :

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
15/09/2022	654266		300,00	 Dr. Najib GARTI CARDIOLOGUE-RTHMologue 19 Bd. M. Racine Casablanca Tél: 0522 36 09 09 GSM: 06 61 30 06

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Dr. Najib GARTI 16, Angle Bd. M. Racine Casablanca Tél.: 0522 89 50 05	15/09/2022	300,00

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	CCEFFICIENT DES TRAVAUX	
					
MONTANTS DES SOINS				DEBUT D'EXECUTION	
FIN D'EXECUTION				CCEFFICIENT DES TRAVAUX	
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE				DATE DU DEVIS
	H	25533412	21433552		
D	00000000	00000000			
	00000000	00000000			
	35533411	11433553			
B					
G					
MONTANTS DES SOINS	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



Cardiologie Val d'Anfa

**URGENCES
24/24**

05 22 36 09 09

Flaminiaie 22 Jana 24
16, Angio Bd. Hassan - Casablanca
Tel : 05 22 36 09 09

Dr Najib GARTI

Cardiologue - Rythmologue

Pace Maker

Défibrillateurs

Cryoablation de la Fibrillation
auriculaire

Traitements des troubles du rythme
par Radiofréquence

Echocardiographie Doppler Couleur

Epreuve d'effort

Holter tensionnel et rythmique

Diplômé de la faculté de médecine
de Limoges (France)

Sur Rendez - Vous

Gsm : 0661 24 30 06

Casablanca le

Mr (Mme)

KASERDE

Fahim

Dr. Najib GARTI
CVA
CARDIOLOGUE-RHYTHMOLOGUE
19, Bd. M. Rachid - Casablanca
Tel: 05 22 36 09 09. GSM: 06 61 24 30 06

182,80 x 3 - S.I prethrombo 12,5 : 7 sp'

43,00 x 3 - Aneglos 5 sp'

76,90 - Neflunar 5 sp' 1 re + x 3 m

22,90

Co bolip 2 sp'

24,60

Robessin 5 sp' Dr. NAJIB GARTI 2

F = 800,40



6 118001 030408
O VOLTAREN® SR 75 mg
Comprimés enrobés

PPV : 76.20 DH

PPV 24DH60 EXP 04/2023
LOT 02035



CVA
Cardiologue Rythmologue
19, Bd. Franklin Roosevelt (Ex. Bd. M. Rachid) - Casablanca
Tel : 05 22 36 09 09 - GSM : 06 61 24 30 06

19, Bd. Franklin Roosevelt, Anfa (Rez de chaussée Clinique Val D'anfa) - Casa
Patente N° 35615328 - IF 40713811 - INPE 091066621 - ICE 001584040000063

Tél : 05 22 36 09 09 - Tél / Fax : 05 22 36 08 88

E-mail : garti.naj@hotmail.fr - Site : www.cvaryrhythmologie.com

ANGLOR®

Amlodipine

Boîte de 30 comprimés

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Composition du médicament :

ANGLOR® 5 mg

• Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise :
Amlodipine Besilate 6,935 mg

Quantité correspondant à amlodipine 5 mg

ANGLOR® 10 mg

• Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise :
Amlodipine Besilate 13,870 mg

Quantité correspondant à amlodipine 10 mg

• Composition qualitative en excipients :

Cellulose microcristalline, calcium hydrogen phosphate anhydre, amidon de maïs desséché type A, Stéarate de magnésium.

2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

ANGLOR® contient la substance active amlodipine qui appartient au groupe de médicaments appelés inhibiteurs calciques.

3. Indications thérapeutiques :

ANGLOR® est utilisé pour traiter l'augmentation de la pression artérielle (hypertension), ou un certain type de douleur thoracique dénommée angor, dont une forme rare est l'angor de Prinzmetal.

Chez les patients présentant des valeurs élevées de la pression artérielle, ce médicament agit en relaxant les vaisseaux sanguins, de telle sorte que le sang les traverse plus facilement. Chez les patients atteints d'angor, ANGLOR® agit en améliorant l'apport sanguin au muscle cardiaque, qui reçoit ainsi plus d'oxygène, ce qui prévient l'apparition d'une douleur thoracique. Ce médicament n'apporte pas de soulagement immédiat pour la douleur thoracique liée à l'angor.

4. Posologie :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La posologie initiale recommandée d'ANGLOR® est de 5 mg une fois par jour. Cette dose peut être augmentée jusqu'à 10 mg d'ANGLOR® une fois par jour.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

Pour les enfants et les adolescents (de 6 à 17 ans), la dose initiale habituelle recommandée est de 2,5 mg par jour. La dose maximale recommandée est de 5 mg par jour. Les comprimés d'ANGLOR® à 2,5 mg ne sont actuellement pas disponibles.

• Mode d'administration

Voie orale.

Ce médicament peut être utilisé avant ou après la consommation d'aliments et de boissons. Il est préférable de prendre ce médicament à la même heure tous les jours avec un verre d'eau. Ne prenez pas ANGLOR® avec du jus de pamplemousse.

• Durée du traitement

Il est très important de continuer à prendre votre traitement. Pensez à consulter votre médecin avant de ne plus avoir de comprimé.

5. Contre-indications :

Ne prenez jamais ANGLOR®, comprimé :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'amlopidine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, ou aux autres inhibiteurs calciques. Cela peut se manifester par des démangeaisons, des rougeurs de la peau ou des difficultés respiratoires.
- Si vous présentez une baisse sévère de la pression artérielle (hypotension).
- Si vous présentez un rétrécissement de la valve aortique (sténose aortique) ou un choc cardiogénique (une affection dans laquelle votre cœur était incapable d'apporter suffisamment de sang à l'organisme).
- Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque après une crise cardiaque.

6. Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Consultez votre médecin immédiatement si vous présentez l'un des effets indésirables suivants après la prise de ce médicament,



• Respiratoire
• Gonflement
• Gonflement
peau, infiltré
• Réaction
peau, infiltré
• Crise cardiaque
• Inflammation
d'un bras
Les effets indésirables peuvent également être:
• Effets indésirables.
• Gonflement (œdème) des chevilles.
Les effets indésirables fréquents suivants ont été observés au moins une fois sur une semaine, vous devriez contacter votre médecin si vous présentez ces effets indésirables.
• Maux de tête, sensations vertigineuses, malaises, nausées.
• Palpitations (conscience de vos battements cardiaques).
• Douleur abdominale, nausées.
• Perturbation du transit abdominal, diarrhée, indigestion.
• Fatigue, faiblesse.
• Troubles visuels, vision double.
• Crampes musculaires.

D'autres effets indésirables figurant sur la liste suivante peuvent également être rencontrés. Veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.
Effets indésirables peu fréquents : pouvant affecter jusqu'à 1% des patients.
• Changement de l'humeur, anxiété, dépression, insomnie.
• Tremblements, anomalies du goût, perte de sensation.
• Sensations d'engourdissement ou de fourmillement.
• Tintements dans les oreilles.
• Diminution de la pression artérielle.
• Éternuements et écoulement nasal provoqués par l'angor.
• Toux.
• Bouche sèche, vomissements (nausées).
• Chute des cheveux, augmentation de la transpiration, changement de coloration de la peau.
• Difficulté pour uriner, augmentation des envies de uriner.
• Incapacité d'obtenir une érection, gêne ou augmentation de la taille.
• Douleur, malaise.
• Douleurs articulaires ou musculaires, douleurs dorsales.
• Augmentation ou diminution du poids.

Effets indésirables rares : pouvant affecter jusqu'à 0,1% des patients.
• Confusion.
Effets indésirables très rares : pouvant affecter jusqu'à 0,01% des patients.
• Diminution du nombre des globules blancs, diminution anormale d'hématomes ou des saignements.
• Augmentation du sucre dans le sang (hyperglycémie).
• Trouble des nerfs entraînant une faiblesse, des troubles sensitifs.
• Gonflement des gencives.
• Ballonnement abdominal (gastre).
• Anomalies de la fonction hépatique, inflammation et élévation des enzymes hépatiques pouvant avoir un caractère chronique.
• Augmentation de la tension musculaire.
• Inflammation des vaisseaux sanguins, souvent accompagnée d'effets indésirables cutanés.
• Sensibilité à la lumière.
• Troubles combinant de la rigidité, des tremblements et de la faiblesse.

7. Mises en garde spéciales et précautions particulières :

Mises en garde et précautions d'emploi

Adresssez-vous à votre médecin, pharmacien ou voisin si vous présentez l'un des effets indésirables suivants.

- Crise cardiaque récente.
 - Insuffisance cardiaque.
 - Augmentation sévère de la pression artérielle (crise d'angor).
 - Maladie du foie.
 - Vous êtes une personne âgée et votre dose a été augmentée.
- Enfants et adolescents

ANGLOR® n'a pas été étudié chez l'enfant âgé de moins de 6 ans. Pour le traitement de l'hypertension chez les enfants et les adolescents, veuillez vous adresser à votre médecin.

8. Interactions :

- Interactions avec d'autres médicaments : Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez ou prévoyez de prendre un médicament obtenu sans ordonnance. ANGLOR® peut affecter ou être affecté par d'autres médicaments, notamment :
 - Le kétoconazole, litraconazole (médicaments antifongiques).
 - Le ritonavir, l'indinavir, le nelfinavir (appelés en VIH).
 - La rifampicine, l'érythromycine, la clarithromycine.
 - Hypericum perforatum (millepertuis).
 - Le vérapamil, le diltiazem (médicaments pour le cœur).
 - La dométroline (perfusion pour les augmentations de pression).
 - La simvastatine (médicament utilisé pour réduire le cholestérol).
 - La ciclosporine (médicament immunosupresseur).

ANGLOR® peut diminuer votre pression artérielle. Si vous prenez ce médicament avec d'autres médicaments destinés à traiter l'augmentation de la pression artérielle, il est possible que l'effet de certains d'entre eux soit diminué.

ANGLOR®

Amlodipine

Boîte de 30 comprimés

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Composition du médicament :

ANGLOR® 5 mg

• Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise :
Amlodipine Besilate 6,935 mg

Quantité correspondant à amlodipine 5 mg

ANGLOR® 10 mg

• Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise :
Amlodipine Besilate 13,870 mg

Quantité correspondant à amlodipine 10 mg

• Composition qualitative en excipients :

Cellulose microcristalline, calcium hydrogen phosphate anhydre, amidon de maïs desséché type A, Stéarate de magnésium.

2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

ANGLOR® contient la substance active amlodipine qui appartient au groupe de médicaments appelés inhibiteurs calciques.

3. Indications thérapeutiques :

ANGLOR® est utilisé pour traiter l'augmentation de la pression artérielle (hypertension), ou un certain type de douleur thoracique dénommée angor, dont une forme rare est l'angor de Prinzmetal.

Chez les patients présentant des valeurs élevées de la pression artérielle, ce médicament agit en relaxant les vaisseaux sanguins, de telle sorte que le sang les traverse plus facilement. Chez les patients atteints d'angor, ANGLOR® agit en améliorant l'apport sanguin au muscle cardiaque, qui reçoit ainsi plus d'oxygène, ce qui prévient l'apparition d'une douleur thoracique. Ce médicament n'apporte pas de soulagement immédiat pour la douleur thoracique liée à l'angor.

4. Posologie :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La posologie initiale recommandée d'ANGLOR® est de 5 mg une fois par jour. Cette dose peut être augmentée jusqu'à 10 mg d'ANGLOR® une fois par jour.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

Pour les enfants et les adolescents (de 6 à 17 ans), la dose initiale habituelle recommandée est de 2,5 mg par jour. La dose maximale recommandée est de 5 mg par jour. Les comprimés d'ANGLOR® à 2,5 mg ne sont actuellement pas disponibles.

• Mode d'administration

Voie orale.

Ce médicament peut être utilisé avant ou après la consommation d'aliments et de boissons. Il est préférable de prendre ce médicament à la même heure tous les jours avec un verre d'eau. Ne prenez pas ANGLOR® avec du jus de pamplemousse.

• Durée du traitement

Il est très important de continuer à prendre votre traitement. Pensez à consulter votre médecin avant de ne plus avoir de comprimé.

5. Contre-indications :

Ne prenez jamais ANGLOR®, comprimé :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'amlopidine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, ou aux autres inhibiteurs calciques. Cela peut se manifester par des démangeaisons, des rougeurs de la peau ou des difficultés respiratoires.
- Si vous présentez une baisse sévère de la pression artérielle (hypotension).
- Si vous présentez un rétrécissement de la valve aortique (sténose aortique) ou un choc cardiogénique (une affection dans laquelle votre cœur était incapable d'apporter suffisamment de sang à l'organisme).
- Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque après une crise cardiaque.

6. Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Consultez votre médecin immédiatement si vous présentez l'un des effets indésirables suivants après la prise de ce médicament,



• Respiratoire
• Gonflement
• Gonflement
peau, infiltré
• Réaction
peau, infiltré
• Crise cardiaque
• Inflammation
d'un bras
Les effets indésirables peuvent également être:
• Effets indésirables.
• Gonflement (œdème) des chevilles.
Les effets indésirables fréquents suivants ont été observés au moins une fois sur une semaine, vous devriez contacter votre médecin si vous présentez ces effets indésirables.
• Maux de tête, sensations vertigineuses, malaises, nausées.
• Palpitations (conscience de vos battements cardiaques).
• Douleur abdominale, nausées.
• Perturbation du transit abdominal, diarrhée, indigestion.
• Fatigue, faiblesse.
• Troubles visuels, vision double.
• Crampes musculaires.

D'autres effets indésirables figurant sur la liste suivante peuvent également être rencontrés. Veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.
Effets indésirables peu fréquents : pouvant affecter jusqu'à 1% des patients.
• Changement de l'humeur, anxiété, dépression, insomnie.
• Tremblements, anomalies du goût, perte de sensation.
• Sensations d'engourdissement ou de fourmillement.
• Tintements dans les oreilles.
• Diminution de la pression artérielle.
• Éternuements et écoulement nasal provoqués par l'angor.
• Toux.
• Bouche sèche, vomissements (nausées).
• Chute des cheveux, augmentation de la transpiration, changement de coloration de la peau.
• Difficulté pour uriner, augmentation des envies de uriner.
• Incapacité d'obtenir une érection, gêne ou augmentation de la taille.
• Douleur, malaise.
• Douleurs articulaires ou musculaires, douleurs dorsales.
• Augmentation ou diminution du poids.

Effets indésirables rares : pouvant affecter jusqu'à 0,1% des patients.
• Confusion.
Effets indésirables très rares : pouvant affecter jusqu'à 0,01% des patients.
• Diminution du nombre des globules blancs, diminution anormale d'hématomes ou des saignements.
• Augmentation du sucre dans le sang (hyperglycémie).
• Trouble des nerfs entraînant une faiblesse, des troubles sensitifs.
• Gonflement des gencives.
• Ballonnement abdominal (gastre).
• Anomalies de la fonction hépatique, inflammation et élévation des enzymes hépatiques pouvant avoir un caractère chronique.
• Augmentation de la tension musculaire.
• Inflammation des vaisseaux sanguins, souvent accompagnée d'effets indésirables cutanés.
• Sensibilité à la lumière.
• Troubles combinant de la rigidité, des tremblements et de la faiblesse.

7. Mises en garde spéciales et précautions particulières :

Mises en garde et précautions d'emploi

Adresssez-vous à votre médecin, pharmacien ou voisin si vous présentez l'un des effets indésirables suivants.

- Crise cardiaque récente.
 - Insuffisance cardiaque.
 - Augmentation sévère de la pression artérielle (crise d'angor).
 - Maladie du foie.
 - Vous êtes une personne âgée et votre dose a été augmentée.
- Enfants et adolescents

ANGLOR® n'a pas été étudié chez l'enfant âgé de moins de 6 ans. Pour le traitement de l'hypertension chez les enfants et les adolescents, veuillez vous adresser à votre médecin.

8. Interactions :

- Interactions avec d'autres médicaments : Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez ou prévoyez de prendre un médicament obtenu sans ordonnance. ANGLOR® peut affecter ou être affecté par d'autres médicaments, notamment :
 - Le kétoconazole, litraconazole (médicaments antifongiques).
 - Le ritonavir, l'indinavir, le nelfinavir (appelés en VIH).
 - La rifampicine, l'érythromycine, la clarithromycine.
 - Hypericum perforatum (millepertuis).
 - Le vérapamil, le diltiazem (médicaments pour le cœur).
 - La dométroline (perfusion pour les augmentations de pression).
 - La simvastatine (médicament utilisé pour réduire le cholestérol).
 - La ciclosporine (médicament immunosupresseur).

ANGLOR® peut diminuer votre pression artérielle. Si vous prenez ce médicament avec d'autres médicaments destinés à traiter l'augmentation de la pression artérielle, il est possible que l'effet de certains d'entre eux soit diminué.

ANGLOR®

Amlodipine

Boîte de 30 comprimés

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Composition du médicament :

ANGLOR® 5 mg

• Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise :
Amlodipine Besilate 6,935 mg
Quantité correspondant à amlodipine 5 mg

ANGLOR® 10 mg

• Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise :
Amlodipine Besilate 13,870 mg
Quantité correspondant à amlodipine 10 mg

• Composition qualitative en excipients :

Cellulose microcristalline, calcium hydrogen phosphate anhydre, amidon de maïs desséché type A, Stéarate de magnésium.

2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

ANGLOR® contient la substance active amlodipine qui appartient au groupe de médicaments appelés inhibiteurs calciques.

3. Indications thérapeutiques :

ANGLOR® est utilisé pour traiter l'augmentation de la pression artérielle [hypertension], ou un certain type de douleur thoracique dénommée angor, dont une forme rare est l'angor de Prinzmetal.

Chez les patients présentant des valeurs élevées de la pression artérielle, ce médicament agit en relaxant les vaisseaux sanguins, de telle sorte que le sang les traverse plus facilement. Chez les patients atteints d'angor, ANGLOR® agit en améliorant l'apport sanguin au muscle cardiaque, qui reçoit ainsi plus d'oxygène, ce qui prévient l'apparition d'une douleur thoracique. Ce médicament n'apporte pas de soulagement immédiat pour la douleur thoracique liée à l'angor.

4. Posologie :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La posologie initiale recommandée d'ANGLOR® est de 5 mg une fois par jour. Cette dose peut être augmentée jusqu'à 10 mg d'ANGLOR® une fois par jour.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

Pour les enfants et les adolescents (de 6 à 17 ans), la dose initiale habituelle recommandée est de 2,5 mg par jour. La dose maximale recommandée est de 5 mg par jour. Les comprimés d'ANGLOR® à 2,5 mg ne sont actuellement pas disponibles.

• Mode d'administration

Voie orale.

Ce médicament peut être utilisé avant ou après la consommation d'aliments et de boissons. Il est préférable de prendre ce médicament à la même heure tous les jours avec un verre d'eau. Ne prenez pas ANGLOR® avec du jus de pamplemousse.

• Durée du traitement

Il est très important de continuer à prendre votre traitement. Pensez à consulter votre médecin avant de ne plus avoir de comprimé.

5. Contre-indications :

Ne prenez jamais ANGLOR®, comprimé :

- Si vous êtes allergique [hypersensible] à l'amlopidine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, ou aux autres inhibiteurs calciques. Cela peut se manifester par des démangeaisons, des rougeurs de la peau ou des difficultés respiratoires.
- Si vous présentez une baisse sévère de la pression artérielle [hypotension].
- Si vous présentez un rétrécissement de la valve aortique [sténose aortique] ou un choc cardiogénique (une affection dans laquelle votre cœur était incapable d'apporter suffisamment de sang à l'organisme).
- Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque après une crise cardiaque.

6. Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Consultez votre médecin immédiatement si vous présentez l'un des effets indésirables suivants après la prise de ce médicament.



Les effets indésirables fréquents suivants ont été observés

- Maux de tête, sensations vertigineuses, malaises, nausées.
- Palpitations (conscience de vos battements cardiaques).
- Douleur abdominale, nausées.
- Perturbation du transit abdominal, diarrhée, constipation.
- Fatigue, faiblesse.
- Troubles visuels, vision double.
- Crampes musculaires.

D'autres effets indésirables figurant sur la liste suivante peuvent également survenir.

- Sensations d'engourdissement ou de fourmillement.
- Tintements dans les oreilles.
- Diminution de la pression artérielle.
- Éternuements et écoulement nasal provoqués par l'angor.
- Toux.
- Bouche sèche, vomissements (nausées).
- Chute des cheveux, augmentation de la transpiration, changement de coloration de la peau.
- Difficulté pour uriner, augmentation des envies de uriner.
- Incapacité d'obtenir une érection, gêne ou augmentation de la taille.
- Douleur, malaise.
- Douleurs articulaires ou musculaires, douleurs dorsales.
- Augmentation ou diminution du poids.

Effets indésirables rares : pouvant affecter jusqu'à 1% des patients.

- Diminution du nombre des globules blancs, diminution anormale d'hématomes ou des saignements.
- Augmentation du sucre dans le sang [hyperglycémie].
- Trouble des nerfs entraînant une faiblesse, des troubles sensitifs.
- Gonflement des gencives.
- Ballonnement abdominal [gastre].
- Anomalies de la fonction hépatique, inflammation des enzymes hépatiques pouvant avoir une origine virale.
- Augmentation de la tension musculaire.
- Inflammation des vaisseaux sanguins, souvent accompagnée d'œdème.
- Sensibilité à la lumière.
- Troubles combinant de la rigidité, des tremblements et de la faiblesse.

7. Mises en garde spéciales et précautions particulières

Mises en garde et précautions d'emploi

Adresssez-vous à votre médecin, pharmacien ou voisin de pharmacie.

Vous devez informer votre médecin si vous présentez :

- Crise cardiaque récente.
- Insuffisance cardiaque.
- Augmentation sévère de la pression artérielle [crise d'angor].
- Maladie du foie.
- Vous êtes une personne âgée et votre dose a été augmentée.

Enfants et adolescents

ANGLOR® n'a pas été étudié chez l'enfant âgé de moins de 6 ans. Pour le traitement de l'hypertension chez les enfants et les adolescents, veuillez vous adresser à votre médecin.

8. Interactions :

• Interactions avec d'autres médicaments :

- Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez ou prévoyez de prendre un médicament obtenu sans ordonnance. ANGLOR® peut affecter ou être affecté par d'autres médicaments.
- Le kétéconazole, litraconazole [médicaments antifongiques].
- Le ritonavir, l'inidavir, le neflavirin [appelés en VIH].
- La rifampicine, l'érythromycine, la clarithromycine.
- Hypericum perforatum [millepertuis].
- Le vérapamil, le diltiazem [médicaments pour le cœur].
- La dométroline [perfusion pour les augmentations de pression].
- La simvastatine [médicament utilisé pour réduire le cholestérol].
- La ciclosporine [médicament immunosupresseur].

ANGLOR® peut diminuer votre pression artérielle. Si vous prenez ce médicament avec d'autres médicaments destinés à traiter l'augmentation de la

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Bipreterax® Arginine

Péridopril arginine / Indapamide

Comprimé pelliculé

182,80

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice < Cf. Quels sont les effets indésirables éventuels ?>.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que BIPRETERAX 10 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre BIPRETERAX 10 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre BIPRETERAX 10 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver BIPRETERAX 10 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE BIPRETERAX 10 MG/2,5 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : périndopril et diurétiques, code ATC : C09BA04
BIPRETERAX Arginine 10 mg/2,5 mg est une association de deux principes actifs, le périndopril et l'indapamide. Ce médicament est un anti-hypertenseur et est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle. BIPRETERAX Arginine 10 mg/2,5 mg est indiqué chez les patients recevant déjà séparément des comprimés de périndopril 10 mg et d'indapamide 2,5 mg. Ces patients peuvent prendre à la place un comprimé de BIPRETERAX Arginine 10 mg/2,5 mg qui contient les deux principes actifs. Le périndopril appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC). Ceux-ci agissent en dilatant les vaisseaux sanguins, facilitant ainsi le travail du cœur pour expulser le sang dans les vaisseaux. L'indapamide est un diurétique. Les diurétiques augmentent la quantité d'urine produite par les reins. Cependant, l'indapamide est différent des autres diurétiques ; il n'enrôle qu'une légère augmentation de la quantité d'urine produite. Ces deux principes actifs réduisent la pression artérielle et agissent ensemble pour la contrôler.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE BIPRETERAX 10 MG/2,5 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais BIPRETERAX Arginine 10 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique au périndopril ou à tout autre inhibiteur de l'enzyme de conversion, à l'indapamide ou à tout autre sulfamide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament - Cf. Contenu de l'emballage et autres informations.
- si vous avez déjà eu des symptômes tels que des sifflements respiratoires, un gonflement de la face ou de la langue, des démangeaisons intenses ou des éruptions cutanées sévères lors d'un traitement antérieur par IEC ou si vous ou un membre de votre famille a déjà eu ces symptômes quelques qu'en soient les circonstances (état appelé angio-oedème ou œdème de Quincke).
- si vous avez du diabète ou une insuffisance rénale et que vous êtes traité(e) par un médicament contenant de l'insuline pour diminuer votre pression artérielle.
- si vous avez une maladie sévère du foie ou si vous souffrez d'un état appelé encéphalopathie hépatique (troubles neurologiques graves rencontrés lors de l'insuffisance hépatique sévère).
- si vous avez une maladie sévère du rein avec diminution de l'apport sanguin au rein (néphrose de l'artère rénale).
- si vous êtes diabète ou si vous bénéficiez d'un autre type de filtration sanguine. En fonction de la machine utilisée, BIPRETERAX peut ne pas être adapté.
- si vous avez un taux anormalement bas de potassium dans votre sang.

- cisapride, diphenoxylate (utilisés pour traiter les troubles gastriques et digestifs), digoxine ou autres digitaliques (pour le traitement de problèmes cardiaques), bacoferol (pour traiter la raideur musculaire survenant notamment lors de scieroses multiples), médicaments pour traiter le diabète tels qu'insuline ou metformine ou gliptines, calcium y compris les suppléments calciques, laxatifs stimulants (ex : sené), anti-inflammatoires non-stéroïdiens (ex : ibuprofène) ou dose élevée de salicylates (ex : aspirine), amphotéricine B par injection (pour traiter une infection fongique sévère), médicaments pour traiter des troubles mentaux tels que dépression, anxiété, schizophrénie... (ex : antidépresseurs tricycliques, neuroleptiques), tétracosactide (pour traiter la maladie de Crohn), triméthoprime (pour le traitement d'infections), vasodilatateurs incluant les dérivés nitrés (produits permettant de dilater les vaisseaux sanguins), médicaments utilisés dans le traitement de l'hypotension, du choc ou de l'asthme (ex : éphédrine, noradrénaline ou adrénaline).

BIPRETERAX 10 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

Il est conseillé de prendre BIPRETERAX Arginine 10 mg/2,5 mg ayant un repas. **GROSSESSE ET ALLAITEMENT**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez d'être enceinte, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre BIPRETERAX Arginine 10 mg/2,5 mg avant d'être enceinte ou dès que vous apprenez que vous êtes enceinte. Il vous recommandera de prendre un autre médicament à la place de BIPRETERAX Arginine 10 mg/2,5 mg.

BIPRETERAX Arginine 10 mg/2,5 mg est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire très gravement à votre enfant.

Allaitement

BIPRETERAX Arginine 10 mg/2,5 mg est contre-indiqué chez les femmes qui allaitent. Votre médecin pourra choisir un autre traitement si vous souhaitez allaiter, surtout si votre enfant est nouveau-né ou prématûre.

Consultez votre médecin immédiatement.

CONDUITE DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES

BIPRETERAX Arginine 10 mg/2,5 mg n'affecte pas la vigilance mais des réactions individuelles comme des étourdissements ou de la fatigue en relation avec une baisse de la pression artérielle peuvent survenir chez certains patients. Par conséquent, votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines peut être diminuée.

BIPRETERAX 10 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé content du lactose.

Si votre médecin vous a informé que vous présentez une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE BIPRETERAX 10 MG/2,5 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est d'un comprimé par jour. Le comprimé doit être avalé avec une goutte quotidienne, de préférence le matin et avant le repas.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Bipreterax® Arginine

Péridopril arginine / Indapamide

Comprimé pelliculé

182,80

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice < Cf. Quels sont les effets indésirables éventuels ?>.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que BIPRETERAX 10 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre BIPRETERAX 10 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre BIPRETERAX 10 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver BIPRETERAX 10 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE BIPRETERAX 10 MG/2,5 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : périndopril et diurétiques, code ATC : C09BA04
BIPRETERAX Arginine 10 mg/2,5 mg est une association de deux principes actifs, le périndopril et l'indapamide. Ce médicament est un anti-hypertenseur et est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle. BIPRETERAX Arginine 10 mg/2,5 mg est indiqué chez les patients recevant déjà séparément des comprimés de périndopril 10 mg et d'indapamide 2,5 mg. Ces patients peuvent prendre à la place un comprimé de BIPRETERAX Arginine 10 mg/2,5 mg qui contient les deux principes actifs. Le périndopril appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC). Ceux-ci agissent en dilatant les vaisseaux sanguins, facilitant ainsi le travail du cœur pour expulser le sang dans les vaisseaux. L'indapamide est un diurétique. Les diurétiques augmentent la quantité d'urine produite par les reins. Cependant, l'indapamide est différent des autres diurétiques ; il n'enrôle qu'une légère augmentation de la quantité d'urine produite. Ces deux principes actifs réduisent la pression artérielle et agissent ensemble pour la contrôler.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE BIPRETERAX 10 MG/2,5 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais BIPRETERAX Arginine 10 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique au périndopril ou à tout autre inhibiteur de l'enzyme de conversion, à l'indapamide ou à tout autre sulfamide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament - Cf. Contenu de l'emballage et autres informations.
- si vous avez déjà eu des symptômes tels que des sifflements respiratoires, un gonflement de la face ou de la langue, des démangeaisons intenses ou des éruptions cutanées sévères lors d'un traitement antérieur par IEC ou si vous ou un membre de votre famille a déjà eu ces symptômes quelques qu'en soient les circonstances (état appelé angio-oedème ou œdème de Quincke).
- si vous avez du diabète ou une insuffisance rénale et que vous êtes traité(e) par un médicament contenant de l'insuline pour diminuer votre pression artérielle.
- si vous avez une maladie sévère du foie ou si vous souffrez d'un état appelé encéphalopathie hépatique (troubles neurologiques graves rencontrés lors de l'insuffisance hépatique sévère).
- si vous avez une maladie sévère du rein avec diminution de l'apport sanguin au rein (néphrose de l'artère rénale).
- si vous êtes diabète ou si vous bénéficiez d'un autre type de filtration sanguine. En fonction de la machine utilisée, BIPRETERAX peut ne pas être adapté.
- si vous avez un taux anormalement bas de potassium dans votre sang.

- cisapride, diphenoxylate (utilisés pour traiter les troubles gastriques et digestifs), digoxine ou autres digitaliques (pour le traitement de problèmes cardiaques), bacoferol (pour traiter la raideur musculaire survenant notamment lors de scieroses multiples), médicaments pour traiter le diabète tels qu'insuline ou metformine ou gliptines, calcium y compris les suppléments calciques, laxatifs stimulants (ex : sené), anti-inflammatoires non-stéroïdiens (ex : ibuprofène) ou dose élevée de salicylates (ex : aspirine), amphotéricine B par injection (pour traiter une infection fongique sévère), médicaments pour traiter des troubles mentaux tels que dépression, anxiété, schizophrénie... (ex : antidépresseurs tricycliques, neuroleptiques), tétracosactide (pour traiter la maladie de Crohn), triméthoprime (pour le traitement d'infections), vasodilatateurs incluant les dérivés nitrés (produits permettant de dilater les vaisseaux sanguins), médicaments utilisés dans le traitement de l'hypotension, du choc ou de l'asthme (ex : éphédrine, noradrénaline ou adrénaline).

BIPRETERAX 10 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

Il est conseillé de prendre BIPRETERAX Arginine 10 mg/2,5 mg ayant un repas. **GROSSESSE ET ALLAITEMENT**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez d'être enceinte, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre BIPRETERAX Arginine 10 mg/2,5 mg avant d'être enceinte ou dès que vous apprenez que vous êtes enceinte. Il vous recommandera de prendre un autre médicament à la place de BIPRETERAX Arginine 10 mg/2,5 mg.

BIPRETERAX Arginine 10 mg/2,5 mg est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire très gravement à votre enfant.

Allaitement

BIPRETERAX Arginine 10 mg/2,5 mg est contre-indiqué chez les femmes qui allaitent. Votre médecin pourra choisir un autre traitement si vous souhaitez allaiter, surtout si votre enfant est nouveau-né ou prématûre.

Consultez votre médecin immédiatement.

CONDUITE DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES

BIPRETERAX Arginine 10 mg/2,5 mg n'affecte pas la vigilance mais des réactions individuelles comme des étourdissements ou de la fatigue en relation avec une baisse de la pression artérielle peuvent survenir chez certains patients. Par conséquent, votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines peut être diminuée.

BIPRETERAX 10 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé content du lactose.

Si votre médecin vous a informé que vous présentez une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE BIPRETERAX 10 MG/2,5 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est d'un comprimé par jour. Le comprimé doit être avalé avec une goutte quotidienne, de préférence le matin et avant le repas.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Bipreterax® Arginine

Péridopril arginine / Indapamide

Comprimé

182,80

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice < Cf. Quels sont les effets indésirables éventuels ?>.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que BIPRETERAX 10 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre BIPRETERAX 10 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre BIPRETERAX 10 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver BIPRETERAX 10 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE BIPRETERAX 10 MG/2,5 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : périndopril et diurétiques, code ATC : C09BA04
BIPRETERAX Arginine 10 mg/2,5 mg est une association de deux principes actifs, le périndopril et l'indapamide. Ce médicament est un anti-hypertenseur et est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle. BIPRETERAX Arginine 10 mg/2,5 mg est indiqué chez les patients recevant déjà séparément des comprimés de périndopril 10 mg et d'indapamide 2,5 mg. Ces patients peuvent prendre à la place un comprimé de BIPRETERAX Arginine 10 mg/2,5 mg qui contient les deux principes actifs. Le périndopril appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC). Ceux-ci agissent en dilatant les vaisseaux sanguins, facilitant ainsi le travail du cœur pour expulser le sang dans les vaisseaux. L'indapamide est un diurétique. Les diurétiques augmentent la quantité d'urine produite par les reins. Cependant, l'indapamide est différent des autres diurétiques ; il n'enrôle qu'une légère augmentation de la quantité d'urine produite. Ces deux principes actifs réduisent la pression artérielle et agissent ensemble pour la contrôler.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE BIPRETERAX 10 MG/2,5 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais BIPRETERAX Arginine 10 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique au périndopril ou à tout autre inhibiteur de l'enzyme de conversion, à l'indapamide ou à tout autre sulfamide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament - Cf. Contenu de l'emballage et autres informations.
- si vous avez déjà eu des symptômes tels que des sifflements respiratoires, un gonflement de la face ou de la langue, des démangeaisons intenses ou des éruptions cutanées sévères lors d'un traitement antérieur par IEC ou si vous ou un membre de votre famille a déjà eu ces symptômes quelques qu'en soient les circonstances (état appelé angio-oedème ou oedème de Quincke).
- si vous avez du diabète ou une insuffisance rénale et que vous êtes traité(e) par un médicament contenant de l'insuline pour diminuer votre pression artérielle.
- si vous avez une maladie sévère du foie ou si vous souffrez d'un état appelé encéphalopathie hépatique (troubles neurologiques graves rencontrés lors de l'insuffisance hépatique sévère).
- si vous avez une maladie sévère du rein avec diminution de l'apport sanguin au rein (néphrose de l'artère rénale).
- si vous êtes diabète ou si vous bénéficiez d'un autre type de filtration sanguine. En fonction de la machine utilisée, BIPRETERAX peut ne pas être adapté.
- si vous avez un taux anormalement bas de potassium dans le sang.

- cisapride, diphenoxylate (utilisés pour traiter les troubles gastriques et digestifs), digoxine ou autres digitaliques (pour le traitement de problèmes cardiaques), bacoferol (pour traiter la raideur musculaire survenant notamment lors de scléroses multiples), médicaments pour traiter le diabète tels qu'insuline ou metformine ou gliptines, calcium y compris les suppléments calciques, laxatifs stimulants (ex : sené), anti-inflammatoires non-stéroïdiens (ex : ibuprofène) ou dose élevée de salicylates (ex : aspirine), amphotéricine B par injection (pour traiter une infection fongique sévère), médicaments pour traiter des troubles mentaux tels que dépression, anxiété, schizophrénie... (ex : antidépresseurs tricycliques, neuroleptiques), tétracosactide (pour traiter la maladie de Crohn).
- triméthoprime (pour le traitement d'infections), vasodilatateurs incluant les dérivés nitrés (produits permettant de dilater les vaisseaux sanguins).
- médicaments utilisés dans le traitement de l'hypotension, du choc ou de l'asthme (ex : éphédrine, noradrénaline ou adrénaline).

BIPRETERAX 10 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

Il est conseillé de prendre BIPRETERAX Arginine 10 mg/2,5 mg avant un repas. **GROSSESSE ET ALLAITEMENT**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez d'être enceinte, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre BIPRETERAX Arginine 10 mg/2,5 mg avant d'être enceinte ou dès que vous apprenez que vous êtes enceinte. Il vous recommandera de prendre un autre médicament à la place de BIPRETERAX Arginine 10 mg/2,5 mg.

BIPRETERAX Arginine 10 mg/2,5 mg est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire très gravement à votre enfant.

Allaitement

BIPRETERAX Arginine 10 mg/2,5 mg est contre-indiqué chez les femmes qui allaitent. Votre médecin pourra choisir un autre traitement si vous souhaitez allaiter, surtout si votre enfant est nouveau-né ou prématûre.

Consultez votre médecin immédiatement.

CONDUITE DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES

BIPRETERAX Arginine 10 mg/2,5 mg n'affecte pas la vigilance mais des réactions individuelles comme des étourdissements ou de la fatigue en relation avec une baisse de la pression artérielle peuvent survenir chez certains patients. Par conséquent, votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines peut être diminuée.

BIPRETERAX 10 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé content du lactose.

Si votre médecin vous a informé que vous présentez une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE BIPRETERAX 10 MG/2,5 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est d'un comprimé par jour. Le comprimé doit être avalé avec une goutte quotidienne, de préférence le matin et avant le repas.

Codolipraine

PARACETAMOL ET CODEINE

PPV: 22DH20

PER: 04/22

LOT: JT344

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

COMPOSITION

Paracétamol	400,00 mg
Phosphate de codeïne hémihydraté	20,00 mg
(Quantité correspondant à codeïne base)	15,62 mg
Excipients : gélatine, acide stéarique, amidon de pomme de terre, povidone, pour un comprimé.	

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé sécable - boîte de 16.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTALGIQUE CENTRAL ET PERIPHERIQUE (N. Système nerveux central)

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Traitement chez l'adulte des douleurs d'intensité modérée à intense, qui ne sont pas soulagées par l'aspirine ou le paracétamol utilisé seul.

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- allergie connue au paracétamol ou à la codeïne,
- maladie grave du foie,
- chez l'asthmatique,
- en cas d'insuffisance respiratoire,
- allaitement.

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre médecin avec des médicaments contenant de la buprénorphine, de la nalbuphine ou de la pentazocine.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES

En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons s'accompagnant d'expectoration, en cas de maladie du foie ou d'insuffisance rénale ainsi que chez les sujets âgés, un avis médical est indispensable. Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée en raison du risque de dépendance.

PRECAUTION D'EMPLOI

La prise de boissons alcoolisées durant le traitement est déconseillée.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, Notamment avec la buprénorphine, la nalbuphine ou la pentazocine, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient du paracétamol et de la codéine. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (cf. posologie).




KASSEDE Fatima

Fatima, Kasid Id.Pat :

Datas : 15/09/2020 11:01:09 45 bpm

Dr. Najib GARTI
CARDIOLOGUE-RTHMOPA
19, Bd. Mv Racine - Casablanca
Tel: 05 22 36 09 09 GSM: 06 61 24 39 76

Dr. Najib GARTI
CARDIOLOGUE-RTHMOPA
19, Bd. Mv Racine - Casablanca
Tel: 05 22 36 09 09 GSM: 06 61 24 39 76



Dép. :

25mm/s 10mm/mV 0.05-25Hz/50Hz Cardioline ECG200+ v.2.01.5558