

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|---|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> Réclamation | : contact@mupras.com |
| <input type="checkbox"/> Prise en charge | : pec@mupras.com |
| <input type="checkbox"/> Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W19-557983

40224

Maladie Dentaire Optique Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 9271

Société : RAM

Actif Pensionné(e) Autre

Nom & Prénom : YAKOUT Abdellmoujed

Date de naissance : 09-03-67

Adresse :

Tél. : 0611899083

Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le : / /

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
				INP : <input type="text"/>

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
AMILI Bouchaib pharmacie Ouled Hriz 50 Mohamed V, Berrechid tel: 0522 33 73 51 T.P.F: 062047295	28-07-2020	51,40

ANALYSES - RADIGRAPHIES


Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F PROTHESES DENTAIRES



DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
	00000000	00000000
G	35533411	11433553
B		

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

DES

MONTANTS
DES SOINS

DEBUT
D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

CŒFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DATE DU
DEVIS

DATE DE
L'EXECUTION

PHARMACIE OULED HRIZ
KAMILI Bouchaïb
pharmacien

124, Bd. Med V - Berrechid - Tél. : 33.73.51

FACTURE N° 2327

Date.....

M.....
Y.A KOUTY Abdelmejid.

MODE DE PAIEMENT : ESPECES CHEQUE TRAITE

DATE DE REGLEMENT: **28-07-2020**

Qté	DESIGNATION	Prix Unitaire	Montant
01	Sotrema	19,00	19,00
01	DEFAL	39,60	39,60
<p>Atteche la presente facture à la somme de cinquante et un dirhams et 60 centimes</p>			

KAMILI Bouchaïb

Pharmacie Ouled Hriz

124, Bd. Mohamed V Berrechid

Tél: 0522 33 73 51

INPE: 062047295

DIFAL®

Diclofénac de sodium

Formes	Composition	Présentation
DIFAL® 25 mg	Diclofénac sodique 25 mg / 50 mg	
DIFAL® 50 mg	amidon de maïs, cellulose microcristalline, lactose, PVP30, amidon de maïs prégalatinisé, stéarate de magnésium, dioxyde de silice colloidal qsp 1 comprimé GR.	Boîte de 30
Comprimés gastro-résistants	Excipients à effet notable : lactose - colorant jaune orangé S	
DIFAL® 25 mg / 100 mg	Diclofénac sodique 25 mg / 100 mg	
Suppositoires	lactose, aérosol, glycérides hémisynthétiques qsp 1 suppositoire.	Boîte de 10
DIFAL® 75 mg Injectables	Diclofénac sodique 75 mg	
Solution injectable	Excipients qsp 1 ampoule injectable IM de 3 ml	
IM 75 mg / 3 ml	Excipients à effet notable : sodium métabsulfite - propylène glycol, alcool benzylique.	Boîtes de 2/5 ampoules de 3 ml

PROPRIÉTÉS :

Le diclofénac est un composé non stéroïdien possédant des propriétés anti-inflammatoires, antalgiques, antipyétiques, agissant par inhibition de la synthèse des prostaglandines.

INDICATIONS :

Elles procèdent de l'activité anti-inflammatoire du diclofénac, de l'importance des manifestations d'intolérance auxquelles le médicament donne lieu et de sa place dans l'éventail des produits anti-inflammatoires actuellement disponibles.

Elles sont limitées au traitement symptomatique des affections suivantes :

• **Rhumatismes inflammatoires chez les enfants :** suppositoire à 25 mg (enfant > 16 kg, soit environ 4 ans), comprimé à 25 mg (enfant ≥ 6 ans) et comprimé à 50 mg (enfant à partir de 35 kg, soit environ 12 ans).

• **Prévention de l'arthrite chez les enfants à partir de 15 ans (comprimés à 25 mg et à 50 mg, suppositoires à 100 mg).**

• **Traitement symptomatique au long cours des rhumatismes inflammatoires chroniques et de certaines arthroses dououreuses et invalidantes :** notamment polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante ou syndromes apparentés, tels que le syndrome de Fessinger-Leroy-Reiter, et rhumatisme psoriasique.

• **Traitement symptomatique de courte durée des poussées aiguës des rhumatismes arthritiques (épaulés dououreuses aiguës, tendinites, bursites), arthrites microcrystallines, tendinites, douleurs articulaires, radiculalgies sévères.**

• **Traitement des dysménorrhées essentielles, après bilan étiologique.**

• **Solution injectable à 75 mg/3 ml :** traitement symptomatique de courte durée des rhumatismes inflammatoires en poussée, lombalgies aiguës, radiculalgies, crises de coliques néphrétiques.

CONTRE-INDICATIONS :

• DIFAL® (toutes formes) est contre-indiqué chez l'enfant de moins de 12 mois ;

• Enfants de moins de 6 ans pour les formes : comprimé 25 mg, 50 mg, suppositoire 100 mg et injectable 75 mg ;

• Enfants de moins de 16 kg : suppositoire à 25 mg, en raison du dosage inadapté ;

• Enfant de moins de 35 kg : comprimé à 50 mg en raison du dosage inadapté ;

• Enfants de moins de 15 ans : suppositoire 100 mg et injectable 75 mg ;

• Antécédents d'hémorragie ou de saignement digestif au cours d'un précédent traitement par AINS ;

• Hypersensibilité au diclofénac ou à l'un des composants ;

• Grossesse : dès le 5ème mois ;

• Insuffisance hépatocellulaire sévère ;

• Insuffisance rénale sévère ;

• Insuffisance cardiaque sévère non contrôlée ;

• Antécédent d'asthme ou d'urticaria suite à la prise d'acide acétylsalicylique ou d'autres médicaments anti-inflammatoires ;

• Antécédents récents de rectites ou de rectorragies (pour les suppositoires à 25 mg et à 100 mg) ;

• Contre-indication liée à la voie intramusculaire solution injectable à 75 mg/3 ml : troubles de l'hémostase ou traitement anticoagulant en cours.

• Chez les prémaîtrés et nouveau-nés à terme, en raison de la présence d'acide benzylique.

Enfant à partir de 6 ans : demander avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Respecter la prescription médicale.

ENFANT à partir de 12 mois : 2 à 3 mg/kg/jour, à répartir en 2 à 3 prises, soit à titre indicatif

• DIFAL® 25 mg suppositoire : 100 mg à 150 mg / 3 fois par jour ;

• Enfant à partir de 6 ans : DIFAL® 25 mg et 50 mg comprimé ;

• Enfant < 25 kg : 1 comprimé à 25 mg 2 fois par jour ;

• Enfant de 25 à 35 kg : 1 comprimé à 25 mg 2 à 3 fois par jour ;

• Enfant de 35 à 50 kg : 2 comprimés à 25 mg ou 1 comprimé à 50 mg 2 à 3 fois par jour.

ADULTE ET ENFANT de plus de 15 ans : DIFAL® 25 mg et 50 mg comprimé.

• Traitement des poussées aiguës : 150 mg par jour pendant 7 jours maximum, soit 2 comprimés à 25 mg ou 1 comprimé à 50 mg 3 fois par jour.

Effet hépatique : comme avec la plupart des AINS, taux d'une ou plusieurs enzymes hépatiques, persistantes ou non, d'aggravation de la fonction hépatique ou d'autres manifestations.

Précautions d'emploi : le diclofénac, comme tout mé cyclo-oxygénases et des prostaglandines, peut altérer recommandé chez les femmes qui souhaitent concevoir. Au cours de traitement prolongé, il est recommandé fonctions hépatique et rénale.

• Comprimés gastro-résistants à 25 mg et à 50 mg : ce usage est déconseillé chez les patients présentant en l'absence de l'appétit ou un syndrome de malabsorption hépatique rare.

• DIFAL® 75mg injectable contenu de l'alcool benzylique toxiques et des réactions allergiques chez les nourrissons et les enfants jusqu'à 3 ans.

• DIFAL® 75mg injectable contenu de propylène glycol et peut provoquer des réactions semblables à ceux provoqués par l'alcool.

• DIFAL® 75mg injectable contenu du métabsulfite de sodium et peut provoquer des réactions allergiques sévères et une gêne respiratoire.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse : - Jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée : l'utilisation de DIFAL® ne doit être envisagée que si nécessaire.

- Entre 12 et 24 semaines d'aménorrhée, une prise brève ne doit être prescrite que si nécessaire. Une prise prolongée est fortement déconseillée.

- Au delà de 24 semaines d'aménorrhée (toute prise, même ponctuelle, est contre-indiquée). Une prise par mésusage au-delà de 24 semaines d'aménorrhée (5 mois révolus) justifie une surveillance cardiaque et rénale, fœtale et/ou néonatale selon le terme d'exposition. La durée de cette surveillance doit être adaptée à la demande d'élimination de la molécule.

Allaitement : le diclofénac passe dans le lait maternel, par mesure de précaution il convient d'éviter de l'administrer chez la femme qui allait.

En cas de douleur ou de complications, demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

DIFAL® est un médicament. Ne pas laisser à la portée des enfants.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES :

Aucune étude spécifique sur l'aptitude à conduire et à utiliser des machines n'a été effectuée. Toutefois, les patients doivent être informés qu'en cas de survenue de troubles de la vision, de somnolence, de vertiges ou autres troubles du système nerveux central, il est recommandé de s'abstenir de conduire ou d'utiliser des machines.

SURDOSEAGE :

Symptômes : céphalées, agitation motrice, secousses musculaires, irritabilité accrue, ataxie, vertiges, convulsions, surtout chez l'enfant en bas âge : douleurs épigastriques, nausées, vomissements, hématémèse, diarrhée, ulcère gastroduodenal ; troubles de la fonction hépatique (oligurie) ;

Conduite : état de transfert immédiat en milieu hospitalier spécialisé ; évacuation rapide du produit ingéré par lavage gastrique (pour les formes orales) ; traitement symptomatique : accélération d'élimination, dialyse en cas d'intoxication grave s'accompagnant d'insuffisance rénale, diazépam ou phénobarbital en cas de convulsions.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

Si vous oubliez d'utiliser DIFAL : ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Les dommages d'origine chroniques et d'études épidémiologiques indiquent constamment une augmentation du risque d'événements cardio-vasculaires (par exemple infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral) associé à un traitement par le diclofénac, particulièrement à forte dose (150 mg/jour) et lors d'administration prolongée. Les effets indésirables les plus fréquemment observés sont de nature gastro-intestinale. Des ulcères péptiques, perforations ou hémorragies gastro-intestinales, parfois fatales, peuvent survenir, en particulier chez le sujet âgé.

Des nausées, vomissements, diarrhées, flatulences, constipation, dyspepsie, stomatite ulcéraive, douleur abdominale, hématémèse, exacerbation d'une rectocolite ou d'une maladie de diverticulite, peuvent survenir à la suite de l'administration d'AINS. Moins fréquemment, des gastrites ont été observées.

Effets cardio-vasculaires : cédème, hypertension et insuffisance cardiaque ont été rapportés en association au traitement par AINS.

Effets gastro-intestinaux :

peu fréquents : en début de traitement, nausées, vomissements, diarrhées, crampes abdominales, douleurs épigastriques, dyspepsie, anorexie, éructations.

Rares : ulcère gastroduodenal, perforation ou hémorragie digestive ; cellules-csident sont d'autant plus fréquentes que la posologie utilisée est élevée.

Effets hémorragiques : hémorragie digestive, ulcères, hémorragie dans les cellules qui colite hémorragique non spécifique, exacerbation de colite ulcéreuse. Ont été signalés des pancréatites, des cas de complications Vaisse rectale ; effets locaux (liés à la voie d'administration) : irritations locales, anites, rectites.

Effets cutanés : cas isolés : chutes de cheveux, réactions de photosensibilisation : très rarement : des réactions bulleuses (Stevens-Johnson, syndrome de Lyell) ont été observées.

Réactions d'hypersensibilité : Dermatologiques : éruption cutanée, urticaire, eczéma ; Respiratoires : bronchospasme, pneumopathie d'hypersensibilité ; Autres : cas isolés de déshydratation, y compris purpura allergique, d'hypotension.

Effets sur les systèmes nerveux centraux : peu fréquents : céphalées, étourdissements ou vertiges.

Rarement : somnolence.

Effets sur le rein : rétention hydrosodée avec possibilité d'œdème, hyperkaliémie.

Effets sur les reins : rétention hydrosodée avec, chez les patients présentant des facteurs de

DIFAL®
Diclofénac sodique 100 mg
Boîte de 10 Suppositoires

P.P.V. : 32,40 DH

118000 190363



LOT 192017 1

EXP 09 2024

19,00
PPV 19 00

ISONE 5 mg, comprimé sécable. Boîte de 30.

ISONE 20 mg, comprimé sécable. Boîte de 20.

Prednisone

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ISONE, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ISONE, comprimé sécable ?
3. Comment prendre ISONE, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ISONE, comprimé sécable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE ISONE, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC: H02AB07

GLUCOCORTICOÏDES - USAGE SYSTÉMIQUE.

(H. Hormones systémiques non sexuelles).

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un corticoïde (également appelé anti-inflammatoire stéroïdien).

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans et de plus de 20 kg.

Ce médicament est utilisé dans de nombreuses maladies, où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire. Son action est utile dans le traitement de nombreuses affections inflammatoires ou allergiques.

A fortes doses, ce médicament diminue les réactions immunitaires et est donc également utilisé pour prévenir ou traiter le rejet de greffes d'organes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ISONE, comprimé sécable ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ISONE, comprimé sécable :

- Si vous êtes allergique à la prednisone ou à l'un des autres composants contenus dans ISONE, comprimé sécable, mentionnés à la rubrique 6.
- Si vous avez une infection.
- Si vous souffrez actuellement d'une maladie virale (hépatite virale, varicelle) ou qui peut réapparaître (herpès, zona).
- Si vous avez des problèmes mentaux et que vous n'êtes pas traité pour ceux-ci.
- Si vous devez être vacciné par un vaccin vivant (par exemple contre la rougeole, la varicelle, la fièvre jaune...).
- Chez l'enfant de moins de 6 ans car il peut avaler de travers le comprimé et s'étouffer.

Avertissements et précautions:

Ce médicament doit être pris sous stricte surveillance médicale.

Avant le traitement, prévenez votre médecin:

- Si vous avez été vacciné récemment.
- Si vous avez un ulcère digestif, une maladie qui a été opérée récemment pour un problème.
- Si vous avez du diabète (taux de sucre dans le sang élevé).
- Si vous avez une infection (notamment si vous avez des symptômes de la peau).
- Si vous souffrez d'ostéoporose (maladie de la moelle osseuse et des os).
- Si vous avez séjourné dans les régions tropicales ou en Afrique, en raison du risque de maladie parasitaire.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre ISONE, comprimé sécable si vous souffrez de:

- Sclérodermie (également connue sous le nom de sclérose systémique, une maladie auto-immune), car des doses journalières de 15 mg ou plus peuvent augmenter le risque de développer une complication grave appelée crise rénale sclérodermique. Les signes d'une crise rénale sclérodermique sont, entre autres, une augmentation de la pression sanguine et une diminution de la production d'urine. Votre médecin peut vous conseiller de faire contrôler régulièrement votre pression sanguine et votre urine.

pendant et après le traitement:

- Prévenez immédiatement votre médecin si vous ressentez des douleurs au niveau des tendons (reconnaissable par des douleurs lors de mouvements). En effet, ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons voire de manière exceptionnelle d'une rupture des tendons.

Ce médicament peut également entraîner la survenue de crises liées à la présence de phéochromocytome (tumeur des glandes surrénales) et pouvant mettre votre vie en danger.

- Évitez le contact avec les personnes atteintes de la varicelle ou de la rougeole.

- Prévenez le médecin que vous prenez ou que vous avez pris ce médicament (pendant une année après l'arrêt du traitement) si vous devez vous faire opérer ou si vous êtes dans une situation de stress (fièvre, maladie).

- Votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en particulier pauvre en sel, en sucre et riche en protéines.

- Si le traitement est prolongé, votre médecin vous prescrira également un apport en calcium et vitamine D.

- Contactez votre médecin en cas de vision floue ou d'autres troubles visuels.

Autres médicaments et ISONE, comprimé sécable

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Vous devez éviter de prendre ce médicament :

- Si vous prenez de l'aspirine à des doses supérieures ou égales à 1 g par prise et/ou 3 g par jour,

- ou si vous devez être vacciné.

Certains médicaments peuvent augmenter les effets de ISONE, comprimé sécable et il est possible que votre médecin souhaite vous surveiller attentivement si vous prenez ces médicaments (y compris certains médicaments pour traiter l'infection à VIH : ritonavir, cobicistat).

La forme pharmaceutique de ce médicament n'est pas adaptée aux enfants de moins de 6 ans. Cependant les nourrissons prématurés traités par d'autres médicaments de la même classe, une échographie cardiaque doit être effectuée pour surveiller la structure et la fonction du muscle cardiaque.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse qu'en cas de nécessité. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. Par conséquent, l'allaitement est à éviter durant le traitement.

Sportifs

La substance active de ce médicament (la prednisone) peut rendre positifs les tests pratiqués lors des contrôles anti-dopage.

ISONE, comprimé sécable contient du lactose