

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Prothèse dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Déclaration : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

S : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 068684

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 479 Société : RAM

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : FANGAR AHMED

Date de naissance : 01/01/1946

Adresse : RESIDENCE EL MANSOUR AG-10 GHANDI &

YACOB EL MANSOUR 144.37 APP. 6 CASS

Tél. : 0663295031 Total des frais engagés : 39.59 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 17/09/2020

Nom et prénom du malade : Fangar Ahmed Age : 74

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Endocr

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASS Le : 17/09/2020

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires
07/9/2020			300,00
17/9/2022			

Dr. BENHIMA Touria
Endocrinologue Métabolique
30, Rue Felix et Max Guet
Tél: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 55
Dr. BENHIMA Touria
Endocrinologue Métabolique
30, Rue Felix et Max Guet
Tél: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 55

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur Date Montant de la Facture

17.9.22 1979,70

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue Date Désignation des Coefficients Montant des Honoraires

07 B30+B80
29 B30+B100
20 B200+B50
20 PC

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien Date des Soins Nombre AM PC IM IV Montant détaillé des Honoraires

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES


Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'OD

SOINS DENTAIRES

Dents Traitées Nature des Soins Coefficient



COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H
25533412 21433552
00000000 00000000
D 00000000 00000000 G
35533411 11433553
B


[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Benhima Touria

Diplômée de la Faculté de Médecine de Toulouse

SPECIALISTE EN ENDOCRINOLOGIE

ET MALADIES METABOLIQUES

Diabète - Obésité - Nutrition

Cholestérol - Glandes - Stérilité

Ménopause - Andrologie

Sur rendez-vous

NovoMix® 30 FlexPen®
100U/ml
Suspension injectable
5 stylos pré-remplis de 3ml
PPV : 581 DH



8-9674-73-270-1

6 118001 121298

NovoMix® 30 FlexPen®
100U/ml
Suspension injectable
5 stylos pré-remplis de 3ml
PPV : 581 DH



8-9674-73-270-1

6 118001 121298

الدركتور بنهيمه ثرية

خريجة كلية الطب بتولوز
اختصاصية في أمراض الغدد
الهرمونية

السكر - التغذية - السمنة

الإضطرابات الهرمونية الجنسية

الكولسترول - العقم

بالموعد

Casablanca, le 17/9/2020

Farzan AHMED

$581 \times 2 = 1162$

NovoMix 30 FlexPen SV

26 us/c mati

$12,90 \times 6 = 77,40$

Ipradial LP 600 SV

1 - 0 - 1

Novoflex 8mm

$26,20 \times 4 = 104,80$

Lysopuric 100 SV

$42,20 \times 5 = 211,00$

Calcigina D SV

Dane 100.000

Slyno 0.5 SV

Wandobesure

Wandobesure

Suprimase 50

Régimes

1979,70

Diète

goutte

Pen Salién

Dr. BENHIMA Touria
Endocrinologie Maladies
Métaboliques
77, Rue Félix et Max Guedj
Tél. : 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

CALCIFIX®

CALCIUM + VITAMINE



سو Thema
• Sothema

Fabriqué par les Laboratoires SOTHEMA
B.P. N° 1, 27182 Bouskoura - Maroc
L. TAZI, Pharmacien Responsable

42,20

CALCIFIX®

CALCIUM + VITAMINE



سو Thema
• Sothema

Fabriqué par les Laboratoires SOTHEMA
B.P. N° 1, 27182 Bouskoura - Maroc
L. TAZI, Pharmacien Responsable

42,20

CALCIFIX®

CALCIUM + VITAMINE



سو Thema
• Sothema

Fabriqué par les Laboratoires SOTHEMA
B.P. N° 1, 27182 Bouskoura - Maroc
L. TAZI, Pharmacien Responsable

42,20

CALCIFIX®

CALCIUM + VITAMINE



سو Thema
• Sothema

Fabriqué par les Laboratoires SOTHEMA
B.P. N° 1, 27182 Bouskoura - Maroc
L. TAZI, Pharmacien Responsable

42,20

CALCIFIX®

CALCIUM + VITAMINE



سو Thema
• Sothema

Fabriqué par les Laboratoires SOTHEMA
B.P. N° 1, 27182 Bouskoura - Maroc
L. TAZI, Pharmacien Responsable

42,20

ملغ 0,5

90 قرصا

عن طريق الفم



ريباكليتيد
كولينورم®

141,50



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بعد	قبل	مساء	منتصف	صباح	المدة		

ملغ 0,5

90 قرصا

عن طريق الفم



ريباكليتيد
كولينورم®

141,50



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بعد	قبل	مساء	منتصف	صباح	المدة		

ملغ 0,5

90 قرصا

عن طريق الفم



ريباكليتيد
كولينورم®

141,50



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بعد	قبل	مساء	منتصف	صباح	المدة		

LYSOPURIC®

ALLOPURINOL 100 mg

FORME ET PRESENTATIONS :

Comprimés dosés à 100 mg d'allopurinol : boîte de 50 ou de 100.

COMPOSITION :

Allopurinol : 100 mg.

Excipients Q.S.P. 1 comprimé

Excipient à effet notoire : lactose.

INDICATIONS :

L'allopurinol est indiqué dans le traitement de l'hyperuricémie et de l'hyperuraturie. Il diminue l'uricémie et la teneur en acide urique dans le sang et diminue la fréquence des crises de goutte.

En cas d'hyperuricémie, l'allopurinol est à utiliser en association avec un traitement symptomatique de la douleur.

INDICATIONS :
- Traitement de l'hyperuricémie.
- Traitement de l'hyperuraturie.

CONTRAINDICATIONS :
- Hypersensibilité à l'allopurinol ou à l'un des composants.

- Enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme galénique).

- Allaitement.

POSOLOGIE :
La posologie usuelle est de 100 mg à 300 mg par jour soit 1 à 3 comprimés/j en fonction de l'uricémie et de l'uraturie.

Dans les hyperuricémies secondaires aux hémopathies malignes et à leur traitement par cytotoxiques : la posologie moyenne peut s'élever jusqu'à : chez l'adulte : 10 mg/kg/jour, à répartir dans la journée chez l'enfant : 20 mg/kg/jour.

Chez les insuffisants rénaux, la posologie doit être adaptée en fonction de la clairance de la créatinine.

100 à 80 ml/min : 300 mg/j - 80 à 40 ml/min : 200 mg/j et 40 à 20 ml/min : 100 mg/j - < 20 ml/min : 100 mg / 1 jour sur 2.

Dialyse : en cas de nécessité absolue, administrer l'allopurinol à la fin des séances d'hémodialyse sans dépasser la dose de 200 mg par séance.

MISES EN GARDE :
Mises en garde : L'hyperuricémie peut être à l'origine de complications graves (crises de goutte, insuffisance rénale, etc.).

- En cas de contre-indication.
- Le syndrome de Lyell peut survenir.

- Dans le cas de traitement par cytotoxiques, la posologie doit être adaptée en fonction de la clairance de la créatinine.

- En raison de l'absence de données sur l'absorption.

Précautions d'emploi :
- Ne jamais commencer un traitement par l'allopurinol lors d'une crise aiguë de goutte.

- Chez les gouteux, la colchicine (1mg/24h) doit être systématiquement associée à l'allopurinol dans les 2 ou 3 premiers mois de traitement, afin d'éviter le déclenchement d'une crise aiguë.

- L'uricémie et l'uraturie des 24 heures seront vérifiées à intervalles réguliers.

- Chez les patients atteints de syndrome de leishmaniose ou de lymphome, une diurèse (boire abondamment) abondante sera assurée afin d'éviter la survenue de lithiase xanthique.

- Chez les patients atteints d'hémopathies malignes, il est recommandé de corriger l'hyperuricémie ou l'hyperuraturie existante avant d'initier le traitement par les cytotoxiques.

- Une attention particulière est recommandée chez les insuffisants rénaux en raison de la fréquence accrue des effets indésirables.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :
Grossesse : L'utilisation de l'allopurinol est déconseillée pendant la grossesse.

Allaitement : Ce médicament passe en quantité non négligeable dans le lait maternel. Il est donc contre-indiqué en cas d'allaitement.

Conduite et utilisation de machines : Prévenir les patients de la survenue possible de vertiges.

EN CAS DE DOUTE, DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

TENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.

EFFETS INDESIRABLES :
- Système sanguin et lymphatique : rarement modification de la formule sanguine et très rarement aplasie médullaire chez les patients à risque souffrant d'insuffisance rénale.

- Système immunitaire : risque peu fréquent de réaction d'hypersensibilité généralisée avec fièvre, éruption cutanée, polyadénopathie, atteinte hépatique et/ou rénale, hyperéosinophilie. Le syndrome d'hypersensibilité généralisée est rare et peut être fatal. Des chocs anaphylactiques ont rarement été rapportés.

- Système nerveux : très rarement, neuropathies périphériques, céphalées.

- Système auditif et labyrinthique : très rarement vertiges.

- Système gastro-intestinal : peu fréquent : douleurs gastriques, nausées, diarrhée, vomissements - généralement évités en absorbant le médicament après le repas - très rare : stomatites.

- Système hépatique : peu fréquent : hépatite, élévation des enzymes hépatiques.

- Système cutané et sous-cutané : fréquent : éruptions et prurit, rougeurs, vésicules, syndrome Stevens-Johnson ou de Lyell (rarement). Arrêter immédiatement le traitement dans ce cas. Très rare : alopecie.

- Système musculo-squelettique : accès de goutte en début de traitement.

- Système génital : très rare : gynécomastie.

TOUT EFFET INDESIRABLE SURVENU LORS DU TRAITEMENT DOIT ETRE SIGNALÉ AU MEDECIN TRAITANT OU AU PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Déconseillées : Vidarabine, Azathioprine, Didanosine.

Nécessitant des précautions d'emploi : Anticoagulants oraux, Chlorpromamide, Théophylline (et par extrapolation, aminophylline).

A prendre en compte : - Pénicillines A : risque accru de réactions cutanées.

CONSERVATION : Conserver à une température inférieure à 25 °C et à l'abri de l'humidité.

DELIVRANCE : Liste I - uniquement sur ordonnance.

LYSOPURIC® comprimés 100 mg Bte/ 50 : AMM N : 175 DMP/21/EXP.

LYSOPURIC® comprimés 100 mg Bte/100 : AMM N : PH 569.

Révision : janvier 2012

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES GALENICA
Z.I. Ouled Saleh - Casablanca - Maroc

Impr. Adair
NLYC89VFA01

DECLARATION DE MALADIE CHRONIQUE ☒

(À adresser au médecin conseil de la MUPRAS sous pli confidentiel)

Je soussigné : Dr. BENHIMA Toun

Certifie que Mlle, Mme, M. : Hamza AHMED

Présente DAVID HIA @ neuropath

Nécessitant un traitement d'une durée de :

de 3 mois

Dont ci-joint ordonnance :

(à défaut noter le traitement prescrit)


Dr. BENHIMA Toun
Endocrinologie Métabolique
70, Rue Fakhri el-Makh Guedj - Casablanca
Tel : 0522-22-8354 / 0522-22-8355

Docteur Benhima Touria

Diplômée de la Faculté de Médecine de Toulouse

**SPECIALISTE EN ENDOCRINOLOGIE
ET MALADIES METABOLIQUES**

Diabète - Nutrition - Obésité
Cholestérol - Glandes - Stérilité

Sur Rendez-vous

SANG

- ☒ Glycémie
- à jeûn = 8h J1
 - pp 2h = 10h J2
 - pp 4h = 12h J3
 - pp 2h = 15h J3
 - pp 4h = 16h J4
 - pp 2h = 22h J1
- ☐ **HGPO (75G) toutes les demi - heures** sur deux heures
à 8h à jeûn J1
- ☒ Hb A1 C
- ☒ Fructosamine
- ☐ Urée
- ☐ Créatinine
- ☒ Débit de filtration glomérulaire (MDRD) - (CKD épi)
- ☒ Acide urique
- ☐ Cholestérol Total
- ☐ C.HDL - LDL
- ☐ Triglycérides
- ☐ Ionogramme sanguin - Kaliémie
- ☐ Calcémie - Phosphorémie - 25 OH D (2+3)
- ☐ Phosphatases alcalines
- ☐ Magnésium sérique et globulaire
- ☐ NFS - Plaquettes
- ☐ VS - C.R.P
- ☐ Groupage
- ☐ Fer sérique - Ferritine
- ☐ Electrophorèse des protides
- ☐ Temps de Céphaline Kaolin
- ☐ Fibrinémie
- ☐ Transaminases - C.P.K
- ☐ GGT
- ☐ Taux de Prothrombine
- ☐ AG - HBs
- ☐ AC - Anti HBs
- ☐ AC - Anti HBc
- ☐ AC - Anti HCV
- ☐ Bilirubine
- ☐ Amylasémie - Lipasémie
- ☐ AC antiendomysium
- ☐ AC antigliadine
- ☐ AC Anti Transglutaminases
- ☐ Latex Xaler Rose
- ☐ ACAN

Dr. BENHIMA Touria
Casablanca, le 08/03/2023
Endocrinologie Maladies
Métaboliques

FANCARD ALMAGS
Dr. Max Guedj et Max Guedj - Casablanca
Tél: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

- ☐ PTH intacte
- ☒ TSH - US - T4L - T3E
- ☐ ACAT : anti Tg et anti TPO.
- ☐ AC antirécepteurs de la TSH
- ☐ Thyroglobuline - Thyrocalcitonine
- ☐ Cortisol de 8 h - de 16 h
- ☐ ACTH - ARP
- ☐ Aldostéronémie
- ☐ FSH - LH
- ☐ Oestradiol - Progestérone - 17 OHP
- ☐ Δ 4 - androstène dione
- ☐ SDHA
- ☐ Testostéronémie
- ☐ PRL à 8h à jeûn (après 20 mn allongé(e))
- ☐ GH - I.G.F1
- ☐ Stimulation GH / Insuline
- ☐ Stimulation GH / Glucagon
- ☐ Stimulation GH / L dopa
- ☐ AC. anti HIV
- ☐ PSA totale
- ☐ ACE
- ☐ AFP
- ☐

URINES

- ☐ ECU ± antibiogramme - Compte d'Addis
- ☐ Micro - albuminurie (échantillon)
- ☐ RAC = $\frac{\text{micro albuminurie}}{\text{créatinurie}}$ (sur échantillon)
- ☐ Glycosurie / 24 H
- ☐ Protéinurie / 24 H
- ☐ Clearance de la créatinine / 24 heure corrigée
- ☐ Cortisol libre / 24 H
- ☐ 17 Céto - 17 OH / 24H
- ☐ Calciurie / 24H
- ☐ Phosphatiurie / 24 H
- ☐ Métanéprine- Normétanéprine / 24H
- ☐ V.M.A. / 24H
- ☐ Aldostéronurie / 24H

SELLES

- ☐ Hélicobacter pylori
- ☐ Coprologie et parasitologie
- ☐ Recherche de sang

AUTRES

- ☐ Frottis cervico-vaginal
- ☐ Spermogramme ± Culture
- ☐ ECB vaginal ± Culture
- ☐ IDR à 10 u. tuberculine
- ☐ Recherche de BK : ED ± Culture

Dr. LOUANLI
40, Rue Prince de Monaco - Diabète
Tél: 022 29 83 54 / 022 29 84 50

Dr. BENHIMA Touria
Endocrinologie Maladies
Métaboliques
70, Rue Félix et Max Guedj
Tél.: 022.29.84.50 / 29.83.54

INP : 093001980
IF : 706552
ICE : 001654761000041

FACTURE

Casablanca le 07-09-2020

MUPRAS
Mr Ahmed FANGAR
Prescripteur : Dr Touria BENHIMA

Demande N° 2009070016

Analyses :

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
9105	Prélèvement sanguin	E22	E
0100	Acide urique	B30	B
0117	Fructosamine	B80	B
0118	Glycémie	B30	B
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B
0161	T4 libre	B200	B
0448	Debit de Filtration Glomérulaire DFG	B50	B

Total des B : 490

TOTAL DOSSIER : 680.00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : six cent quatre-vingts dirhams

Dr Nouredine LOUANJLI

Dr. LOUANJLI Nouredine - Biologiste
Laboratoire d'Analyses Médicales
LABOMAC - Casablanca
40, Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca
Tél : 05 22 20 74 22 / Fax : 05 22 26 83 03

Prélèvement à Domicile Tél : 06 77 06 70 95

Date du prélèvement : 07-09-2020 à 07:32
Code patient : 1906110020
Né(e) le : 01-01-1946 (74 ans)

Mr Ahmed FANGAR
Dossier N° : 2009070016
Prescripteur : Dr Touria BENHIMA

ESTIMATION DU DEBIT DE FILTRATION GLOMERULAIRE - DFG

02-06-2020

11.5

Créatinine

11.5 mg/L
102 µmol/L

5

Clairance calculée selon Cockcroft :
Cockcroft-Gault

57 mL/min/1.73m² (>90)

66

Clairance calculée selon MDRD :
Modification of Diet in Renal Disease

66 mL/min/1.73m² (>90)

62

Clairance calculée selon CKD-EPI :
Chronic Kidney Disease - Epidemiology Collaboration

63 mL/min/1.73m² (>90)

Les valeurs de D.F.G exprimées en mL/min/1.73 m² et estimées selon CKD-EPI apportent une amélioration par rapport à la formule MDRD-4 (notamment pour les valeurs de DFG>60 où l'équation MDRD sous-estime les valeurs)
Limite des formules de calcul: enfants, femmes enceintes, âge supérieur à 75 ans, patients obèses ou très maigres, cirrhose décompensée, dénutrition, augmentation ou diminution de la masse musculaire, médicaments nephrotoxiques. Dans ces cas-ci, une clairance sur urines de 24 heures est préférable.

02-06-2020

45

Acide Urique

(Dosage enzymatique - Roche Diagnostics Cobas)

48 mg/L (35-70)
0.29 mmol/L (0.21-0.42)

BILAN THYROIDIEN


02-06-2020

9.3

Thyroxine libre (T4L)

(Technique ECLIA (Cobas Roche - Liaison XL - Mindray 2000CLI))

12.7 pg/mL (9.3-17.0)
16.3 pmol/L (11.9-21.8)



التحليلات الطبية لـ
Laboratoire d'Analyses Médicales
LABOMAC
Dr. LOUANJLI Nouredine
10, Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca
Tél: 0522 20 74 22 / 0522 29 77 06 / 0522 29 14 95 / 06 61 06 15 99 / 06 61 06 35 99 / Fax: 0522 26 83 03
Validé par : Dr. Nouredine LOUANJLI
Page 2 / 2

Prélèvement à Domicile Tél : 06 77 06 70 95

40. Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca C.P. 20.080

محج الأمير مولاي عبدالله - الدار البيضاء - ر ب

Tél.: 05 22 47 33 83 / 05 22 20 74 22 / 05 22 29 77 06 / 05 22 29 14 95 / 06 61 06 15 99 / 06 61 06 35 99 / Fax : 05 22 26 83 03

e.mail : labomac1@gmail.com / n.louanjli@gmail.com - site internet : www.labomac.ma

Date du prélèvement : 07-09-2020 à 07:32
Code patient : 1906110020
Né(e) le : 01-01-1946 (74 ans)

Mr Ahmed FANGAR
Dossier N° : 2009070016
Prescripteur : Dr Touria BENHIMA




BIOCHIMIE SANGUINE

Glycémie à jeûn

(Hexokinase G6PD-H - Roche Diagnostics Cobas)


1.03 g/L (0.70-1.10)
5.72 mmol/L (3.89-6.11)



Hémoglobine glyquée par HPLC

(Tosoh G8-HPLC)

7.8 % (4.0-6.0)



Les pièges de l'HbA1c:

1- Les situations qui surestiment le dosage de l'HbA1c :

Hypertriglycéridémie, insuffisance rénale/hyperurémie (Hb carbamylée), déficit en fer (anémies), vitamine b12, folates, splénectomie, abus d'opiacés, d'alcool ou d'acide acétylsalicylique, hyperbilirubinémie, présence d'hémoglobine foetale HbF (thalassémie).


2- Les situations qui sous-estiment le dosage de l'HbA1c :

Vitamines C et E, maladie hépatique chronique, hémodialyse, hémolyse, transfusion sanguine, présence d'HbS et C (facilement dépistées grâce au dosage par HPLC), splénomégalie, médicaments : dapsons, antiviraux, interféron, fer, EPO et grossesse.

Fructosamine

(Technique colorimétrique Cobas Roche Diagnostic)

284 µmol/L (205-285)



Dr. LOUANJLI
10, Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca
Tél: 0522 26 01 03
Validé par Dr. Nouredine LOUANJLI
Page 1 / 2