

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Déclaration de Maladie

N° W19-573902



Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1545

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : BENYASS Abdelfatif

Date de naissance : 08/03/54

Adresse : 107125 TRANCHE D' ALMASINA AL JAHIDA

Tél. : 0662184250

Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

Nom et prénom du malade : BENYASS Abdelfatif

Age : 66

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA

Le : 30/10/2020

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du attestant le Paiement de
15/02/2019	Acte de vente	1	1000000	INP : 09102147 CETTE RECETTE EST VALIDE POUR TOUTE MENTION DE LA SOCIETE D'ENREGISTREMENT DU PRETENDANT

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien Cachet du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
LAHOU FAYE PHARMACIE LILIA 378 Avenue de la République 94110 Arcueil	24/8/2023	2322,50



ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	


VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553



[Création, remont, adjonction]
fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

IENT
AVAUX

A simple rectangular outline with a thin black border, designed to look like a piece of paper for drawing or writing.

A large, empty rectangular box with a thin black border, designed for children to draw or write in.

EXECUTION

5

A blank rectangular box with a thin black border, intended for a child to draw a picture related to the question.

DE DU
IS


10

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

ORDONNANCE

Le 24/08/2023



Benyass Abdelhafid

126,00 x 12 = 1344,00 - 1) Co Amanel (2).

192,00 x 7 = 1344,00 - 2) Pyrostacine (7)

39,70 x 4 = 18,80 24 x 3 = 72

7) Fnedine p

134,50 x 3 = 403,50 1 an

4) Fnedine cp

49,80 x 2 = 99,60

5) Flagyl 2 g x 3 = 6 g (2)

22,20 x 3 = 66,60

6) Co-doliprane e

232,2150

PHARMACIE ELIAS
MADINA AL JADIDA
LAZLOU Fatem
Pharmacie de la
Nouvelle Cité
D'Almouline

41

W 0 (3)

3 - (2)

3

(2)

3

(2)

3



Signature et cachet du médecin

Titulaire de l'AMM au Maroc : POLYMEDIC
Quartier Arsalane-Rue Amyot d'Inville
CASABLANCA-MAROC
FUCIDINE® 250 mg
Comprimé pelliculé
Boîte de 10 comprimés



6 118001 200511
PPV : 134 DH 50

Titulaire de l'AMM au Maroc : POLYMEDIC
Quartier Arsalane-Rue Amyot d'Inville
CASABLANCA-MAROC
FUCIDINE® 250 mg
Comprimé pelliculé
Boîte de 10 comprimés



6 118001 200511
PPV : 134 DH 50

Fucidine® 2%

pommade Tube de 15 g

30,70

iliser des mouchoirs à usage u

ندليل يمكن التخلص منها ورميها بع

Fucidine® 2%

pommade Tube de 15 g

30,70

uer sans se serrer la main, ne

s les bras et ne pas embrasse

حية دون مصافحة ، لا تعانق وتن

Fucidine® 2%

pommade Tube de 15 g

30,70

distancier d'au moins un mètre

sonne autour de soi,

مسافة الأمان، مترا واحد عن كل من

Fucidine® 2%

pommade Tube de 15 g

30,70

er obligatoirement son masque d

se déplacer à l'extérieur,

ارتد القناع الواقي لل

9
JS EN
OTÉGER ET P
SÉGE

PPV : 134 DH 50

134,50

main très régulière

30,70

er ou éternuer par son coude ou dans un

oir,

أو العطس في مرفقك أو في منديل

PPV : 22 DH 20
PER : 06/21
LOT : J1517

PPV : 22 DH 20
PER : 05/22
LOT : J1411



PPV : 22 DH 20
PER : 03/22
LOT : J792



125,00

125,00

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

PYOSTACINE® 500 mg

Pristinamycine
comprimé pelliculé

SANOFI

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Pyostacine et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Pyostacine
3. Comment prendre Pyostacine
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Pyostacine
6. Informations supplémentaires.

le corps ou l'apparition d'une fièvre, une augmentation de la fatigue importante, une

rubrique 4. Quels sont les effets

Prévenez votre médecin si vous prenez ce médicament à base de virginiamycine.

EN CAS DE DOUBTE NE PAS HESITER A DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments

Autres médicaments et Pyostacine

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien, notamment s'il s'agit d'anticoagulants ou aux appétitifs antivitamines K qui sont prescrits pour éviter la formation de caillots. Il est contre-indiqué de prendre en même temps Pyostacine et un médicament contenant de la colchicine utilisée pour traiter les articulations gonflées et douloureuses liées à un excès d'acide urique (goutte).

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Vous ne devez pas utiliser ce médicament si vous allaitez.

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat-R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Pyostacine 500mg cp b 16
P.P.V : 192,00 DH
118000 061717

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

PYOSTACINE® 500 mg

Pristinamycine
comprimé pelliculé

SANOFI

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Pyostacine et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Pyostacine
3. Comment prendre Pyostacine
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Pyostacine
6. Informations supplémentaires.

le corps ou l'apparition d'une fièvre, une augmentation de la fatigue importante, une

rubrique 4. Quels sont les effets

Prévenez votre médecin si vous prenez ce médicament à base de virginiamycine.

EN CAS DE DOUBTE NE PAS HESITER A DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments

Autres médicaments et Pyostacine

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien, notamment s'il s'agit d'anticoagulants ou aux appétitifs antivitamines K qui sont prescrits pour éviter la formation de caillots. Il est contre-indiqué de prendre en même temps Pyostacine et un médicament contenant de la colchicine utilisée pour traiter les articulations gonflées et douloureuses liées à un excès d'acide urique (goutte).

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Vous ne devez pas utiliser ce médicament si vous allaitez.

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat-R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Pyostacine 500mg cp b 16
P.P.V : 192,00 DH
118000 061717

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

PYOSTACINE® 500 mg

Pristinamycine
comprimé pelliculé

SANOFI

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Pyostacine et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Pyostacine
3. Comment prendre Pyostacine
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Pyostacine
6. Informations supplémentaires.

le corps ou l'apparition d'une fièvre, une augmentation de la fatigue importante, une

rubrique 4. Quels sont les effets

Prévenez votre médecin si vous prenez ce médicament à base de virginiamycine.

EN CAS DE DOUBTE NE PAS HESITER A DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments

Autres médicaments et Pyostacine

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien, notamment s'il s'agit d'anticoagulants ou aux appétitifs antivitamines K qui sont prescrits pour éviter la formation de caillots. Il est contre-indiqué de prendre en même temps Pyostacine et un médicament contenant de la colchicine utilisée pour traiter les articulations gonflées et douloureuses liées à un excès d'acide urique (goutte).

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Vous ne devez pas utiliser ce médicament si vous allaitez.

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat-R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Pyostacine 500mg cp b 16
P.P.V : 192,00 DH
118000 061717

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

PYOSTACINE® 500 mg

Pristinamycine
comprimé pelliculé

SANOFI

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Pyostacine et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Pyostacine
3. Comment prendre Pyostacine
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Pyostacine
6. Informations supplémentaires.

le corps ou l'apparition d'une fièvre, une augmentation de la fatigue importante, une

rubrique 4. Quels sont les effets

Prévenez votre médecin si vous prenez ce médicament à base de virginiamycine.

EN CAS DE DOUBTE NE PAS HESITER A DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments

Autres médicaments et Pyostacine

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien, notamment s'il s'agit d'anticoagulants ou aux appétitifs antivitamines K qui sont prescrits pour éviter la formation de caillots. Il est contre-indiqué de prendre en même temps Pyostacine et un médicament contenant de la colchicine utilisée pour traiter les articulations gonflées et douloureuses liées à un excès d'acide urique (goutte).

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Vous ne devez pas utiliser ce médicament si vous allaitez.

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat-R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Pyostacine 500mg cp b 16
P.P.V : 192,00 DH
118000 061717

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

PYOSTACINE® 500 mg

Pristinamycine
comprimé pelliculé

SANOFI

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Pyostacine et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Pyostacine
3. Comment prendre Pyostacine
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Pyostacine
6. Informations supplémentaires.

le corps ou l'apparition d'une fièvre, une augmentation de la fatigue importante, une

rubrique 4. Quels sont les effets

Prévenez votre médecin si vous prenez ce médicament à base de virginiamycine.

EN CAS DE DOUBTE NE PAS HESITER A DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments

Autres médicaments et Pyostacine

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien, notamment s'il s'agit d'anticoagulants ou aux appétitifs antivitamines K qui sont prescrits pour éviter la formation de caillots. Il est contre-indiqué de prendre en même temps Pyostacine et un médicament contenant de la colchicine utilisée pour traiter les articulations gonflées et douloureuses liées à un excès d'acide urique (goutte).

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Vous ne devez pas utiliser ce médicament si vous allaitez.

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat-R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Pyostacine 500mg cp b 16
P.P.V : 192,00 DH
118000 061717

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

PYOSTACINE® 500 mg

Pristinamycine
comprimé pelliculé

SANOFI

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Pyostacine et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Pyostacine
3. Comment prendre Pyostacine
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Pyostacine
6. Informations supplémentaires.

le corps ou l'apparition d'une fièvre, une augmentation de la fatigue importante, une

rubrique 4. Quels sont les effets

Prévenez votre médecin si vous prenez ce médicament à base de virginiamycine.

EN CAS DE DOUBTE NE PAS HESITER A DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments

Autres médicaments et Pyostacine

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien, notamment s'il s'agit d'anticoagulants ou aux appétitifs antivitamines K qui sont prescrits pour éviter la formation de caillots. Il est contre-indiqué de prendre en même temps Pyostacine et un médicament contenant de la colchicine utilisée pour traiter les articulations gonflées et douloureuses liées à un excès d'acide urique (goutte).

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Vous ne devez pas utiliser ce médicament si vous allaitez.

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat-R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Pyostacine 500mg cp b 16
P.P.V : 192,00 DH
118000 061717

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

PYOSTACINE® 500 mg

Pristinamycine
comprimé pelliculé

SANOFI

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Pyostacine et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Pyostacine
3. Comment prendre Pyostacine
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Pyostacine
6. Informations supplémentaires.

le corps ou l'apparition d'une fièvre, une augmentation de la fatigue importante, une

rubrique 4. Quels sont les effets

Prévenez votre médecin si vous prenez ce médicament à base de virginiamycine.

EN CAS DE DOUBTE NE PAS HESITER A DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments

Autres médicaments et Pyostacine

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien, notamment s'il s'agit d'anticoagulants ou aux appétitifs antivitamines K qui sont prescrits pour éviter la formation de caillots. Il est contre-indiqué de prendre en même temps Pyostacine et un médicament contenant de la colchicine utilisée pour traiter les articulations gonflées et douloureuses liées à un excès d'acide urique (goutte).

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Vous ne devez pas utiliser ce médicament si vous allaitez.

certains composants

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat-R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca

Pyostacine 500mg cp b 16
P.P.V : 192,00 DH





Avaler les comprimés avec de l'eau.

c) Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré :

1 à 3 fois par jour, selon les indications.

d) Durée du traitement

Pour être efficace, régulièrement aux doses médicin vous l'aura prescrit. La disparition de la fièvre signifie pas que vous êtes fatigué n'est pas due à l'infection elle-même. Le traitement serait sans effet sur cette impression et retarderait votre guérison.

Cas particuliers : la durée de traitement de la lambliaose (infection due à un parasite) est de 5 jours ; la durée de traitement de l'amibiase (infection due à un parasite) et de certaines vaginites (infection du vagin) est de 7 jours ; pour la trichomonase (infection due à un parasite), c'est un traitement en une prise unique.

e) Conduite à tenir en cas de surdosage :

En cas de vomissements, difficulté à coordonner les mouvements, désorientation, consultez votre médecin. Il peut être amené à vous prescrire un traitement.

5. EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Comme tout produit actif, ce médicament peut chez certaines personnes entraîner des effets plus ou moins gênants :

- Manifestations digestives :

- nausées, vomissements, crampes au niveau de l'estomac, diarrhée;

- inflammation de la langue avec sensation de bouche sèche, inflammation de la bouche, goût métallique dans la bouche, perte d'appétit;

- exceptionnellement, cas de pancréatite (inflammation du pancréas) réversible à l'arrêt du traitement.

- Manifestations au niveau de la peau et des muqueuses :

- bouffées de chaleur avec rougeur du visage, démangeaisons, éruption sur la peau parfois accompagnée de fièvre ;

- urticaire (éruption cutanée analogue à celle que provoque la piqûre d'ortie), brusque gonflement du visage et du cou d'origine allergique (œdème de Quincke), exceptionnellement choc d'origine allergique.

- Manifestations nerveuses :

- maux de tête ;

- atteinte des nerfs des membres ;

- convulsions, vertiges, mauvaise coordination des mouvements volontaires.

- Troubles psychiques :

- confusion, hallucinations.

- Troubles sanguins :

- très rares cas de taux anormalement bas de globules blancs ou de plaquettes dans le sang.

- Manifestations au niveau du foie :

• très rares cas d'anomalies réversibles du bilan hépatique et d'hépatite due à l'obstruction des voies biliaires.

- Autres :

coloration brun-rougeâtre des urines due au médicament.
IGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

i. CONSERVATION

je ne dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

i. DATE DE REVISION DE LA NOTICE

avril 2009.

8. CONSEILS D'EDUCATION SANITAIRE

Que savoir sur les antibiotiques ?

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus.

Aussi, votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle.

Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré l'action d'un antibiotique. Ce phénomène est appelé résistance : il rend certains traitements antibiotiques inactifs. La résistance s'accroît par l'usage abusif ou inapproprié des antibiotiques.

Vous risquez de favoriser l'apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison ou même de rendre inactif ce médicament, si vous ne respectez pas :

• la dose à prendre,

• les moments de prise,

• et la durée de traitement.

En conséquence, pour préserver l'efficacité de ce médicament :

1) N'utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a prescrit.

2) Respectez strictement votre ordonnance.

3) Ne réutilisez pas un antibiotique sans prescription médicale même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.

4) Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n'est peut-être pas adapté à sa maladie.

5) Une fois votre traitement terminé, rapportez à votre pharmacien toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et appropriée de ce médicament.

REF: 60-161-160360-202024

LOT: 101

600360

FLAGYL 500 mg

CP PEL B20

P.P.V : 49DH80



6 118000 060062

sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.16 - Ain Sebaâ
20250 Casablanca



Avaler les comprimés avec de l'eau.

c) Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré :

1 à 3 fois par jour, selon les indications.

d) Durée du traitement

Pour être efficace, régulièrement aux doses médicin vous l'aura prescrit. La disparition de la fièvre signifie pas que vous êtes fatigué n'est pas due à l'infection elle-même. Le traitement serait sans effet sur cette impression et retarderait votre guérison.

Cas particuliers : la durée de traitement de la lambliaose (infection due à un parasite) est de 5 jours ; la durée de traitement de l'amibiase (infection due à un parasite) et de certaines vaginites (infection du vagin) est de 7 jours ; pour la trichomonase (infection due à un parasite), c'est un traitement en une prise unique.

e) Conduite à tenir en cas de surdosage :

En cas de vomissements, difficulté à coordonner les mouvements, désorientation, consultez votre médecin. Il peut être amené à vous prescrire un traitement.

5. EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Comme tout produit actif, ce médicament peut chez certaines personnes entraîner des effets plus ou moins gênants :

- Manifestations digestives :

- nausées, vomissements, crampes au niveau de l'estomac, diarrhée;

- inflammation de la langue avec sensation de bouche sèche, inflammation de la bouche, goût métallique dans la bouche, perte d'appétit;

- exceptionnellement, cas de pancréatite (inflammation du pancréas) réversible à l'arrêt du traitement.

- Manifestations au niveau de la peau et des muqueuses :

- bouffées de chaleur avec rougeur du visage, démangeaisons, éruption sur la peau parfois accompagnée de fièvre ;

- urticaire (éruption cutanée analogue à celle que provoque la piqûre d'ortie), brusque gonflement du visage et du cou d'origine allergique (œdème de Quincke), exceptionnellement choc d'origine allergique.

- Manifestations nerveuses :

- maux de tête ;

- atteinte des nerfs des membres ;

- convulsions, vertiges, mauvaise coordination des mouvements volontaires.

- Troubles psychiques :

- confusion, hallucinations.

- Troubles sanguins :

- très rares cas de taux anormalement bas de globules blancs ou de plaquettes dans le sang.

- Manifestations au niveau du foie :

• très rares cas d'anomalies réversibles du bilan hépatique et d'hépatite due à l'obstruction des voies biliaires.

- Autres :

coloration brun-rougeâtre des urines due au médicament.
IGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

i. CONSERVATION

je ne dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

i. DATE DE REVISION DE LA NOTICE

avril 2009.

8. CONSEILS D'EDUCATION SANITAIRE

Que savoir sur les antibiotiques ?

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus.

Aussi, votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle.

Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré l'action d'un antibiotique. Ce phénomène est appelé résistance : il rend certains traitements antibiotiques inactifs. La résistance s'accroît par l'usage abusif ou inapproprié des antibiotiques.

Vous risquez de favoriser l'apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison ou même de rendre inactif ce médicament, si vous ne respectez pas :

• la dose à prendre,

• les moments de prise,

• et la durée de traitement.

En conséquence, pour préserver l'efficacité de ce médicament :

1) N'utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a prescrit.

2) Respectez strictement votre ordonnance.

3) Ne réutilisez pas un antibiotique sans prescription médicale même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.

4) Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n'est peut-être pas adapté à sa maladie.

5) Une fois votre traitement terminé, rapportez à votre pharmacien toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et appropriée de ce médicament.

REF: 60-161-160360-202024

LOT: 101

600360

FLAGYL 500 mg

CP PEL B20

P.P.V : 49DH80



6 118000 060062

sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.16 - Ain Sebaâ
20250 Casablanca