

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

0 Réclamation	: contact@mupras.com
0 Prise en charge	: pec@mupras.com
0 Adhésion et changement de statut	: adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Déclaration de Maladie

N° W19-504345

43271



Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e) M 845 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre

Nom & Prénom : MAMOUT NABILA

Date de naissance : 22/09/1978

Adresse : 600, Bd Houllay - 1000 Casablanca

Tél. : 0625134208

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 07/09/2020

Nom et prénom du malade : MAMOUT NABILA MANAR

Age :
32

Lien de parenté : Lui-même Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 0625

Le : 06/09/2020

Signature de l'adhérent(e) :

MAMOUT NABILA MANAR

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE DE BORDEAUX Annal EX ALLIANCE JARMACIEN CASA Bordeaux 22 27 521	20/09/2016	187,10

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

AUXILIAIRES MEDICAUX						Montant détaillé des Honoraires	
Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre					
		A M	P C	I M	I V		

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H		CCEFFICIENT DES TRAVAUX
	25533412 00000000 00000000 35533411	21433552 00000000 00000000 11433553	
D	G		MONTANTS DES SOINS
	B		
[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Therapeutique, nécessaire a la profession			
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>			
D	G		DATE DU DEVIS
	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
B	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		DATE DE L'EXECUTION
	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Professeur Fawzi MIKOU

Gynécologue - Obstétricien

Ex. Enseignant à la Faculté de Médecine de Casablanca
Diplômé de Collège de Médecine des Hôpitaux de Paris
ACCOUCHEMENT - CHIRURGIE GYNÉCOLOGIQUE
ET CANCÉROLOGIQUE - MALADIES DU SEIN
ENDOSCOPIE - STÉRILITÉ - MÉDECINE FOETALE

الدكتور فوزي ميكو

أستاذ بكلية الطب بالدار البيضاء سابقا

طبيب ملحق سابق بمستشفيات باريس

اختصاصي في التوليد، جراحة أمراض النساء

وأمراض السرطان - أمراض الثدي والرحم - الع

الجراحة بالمنظار الداخلي

07 Sept 2020
Casablanca Le: _____

PHARMACIE DE BORDEAUX
Mlle Amal EL ALLALI
164, Bd Bordeaux - CASA

PHARMACIEN
Mlle Amal EL ALLALI
164, Bd Bordeaux - CASA
Tél: 05 22 27 75 21

PHARMACIE DE BORDEAUX
Mlle Amal EL ALLALI
164, Bd Bordeaux - CASA
Tél: 05 22 27 75 21

1/ Primolut Nor

1670
1670

2 cpl

1 mois

2/ Exacyl

53,20

145x85 1245

13

3/ Taufly

40,50

14x2 80 n

Professeur Fawzi MIKOU
187, Bd Abdelmoumen, en face station tramway (Faculté de Médecine) 3^{ème} étage - Casablanca
Tél/Fax: 0522 48 48 05 - GSM: 0664 44 52 44 - E-mail: pr.fawzimikou@gmail.com

187, Bd Abdelmoumen, en face station tramway (Faculté de Médecine) 3^{ème} étage - Casablanca

Tél/Fax: 0522 48 48 05 - GSM: 0664 44 52 44 - E-mail: pr.fawzimikou@gmail.com

187, Bd Abdelmoumen, en face station tramway (Faculté de Médecine) 3^{ème} étage - Casablanca

Tél/Fax: 0522 48 48 05 - GSM: 0664 44 52 44 - E-mail: pr.fawzimikou@gmail.com

Professeur Fawzi MIKOU

Gynécologue - Obstétricien

Ex. Enseignant à la Faculté de Médecine de Casablanca
Diplômé de Collège de Médecine des Hôpitaux de Paris
ACCOUCHEMENT - CHIRURGIE GYNÉCOLOGIQUE
ET CANCÉROLOGIQUE - MALADIES DU SEIN
ENDOSCOPIE - STÉRILITÉ - MÉDECINE FOETALE

الدكتور فوزي ميكو

أستاذ بكلية الطب بالدار البيضاء سابقا

طبيب ملحق سابق بمستشفيات باريس

اختصاصي في التوليد، جراحة أمراض النساء

وأمراض السرطان - أمراض الثدي والرحم - العقم

الجراحة بالمنظار الداخلي

07 SEP. 2020
Casablanca Le: _____

Mme MAMOUT NABILA MANAR

Note D'honoraires

- Consultation: 200 DH

- Echographie: 300 DH

Professeur Fawzi MIKOU
Gynécologue et Obstétricien
187, Bd Abdelmoumen - Casablanca
Tél: 0522 48 48 05
ICE: 002203081000026

187 شارع عبد المولمن - أمام محطة ترامواي (كلية الطب) - الطابق الثالث - الدار البيضاء

الهاتف/الفاكس: 0522 48 48 05 - الهاتف المحمول: 0664 44 52 44

187 , Bd Abdelmoumen, en face station tramway (Faculté de Médecine) 3^{ème} étage - Casablanca

Tél/Fax: 0522 48 48 05 - GSM: 0664 44 52 44 - E-mail: pr.fawzimikou@gmail.com

EXA

(ACIDE TF)

53,20

EXACYL comprimés pelliculés

- Boîte de 20 dosés à 250 mg.
- Boîte de 20 dosés à 500 mg.

EXACYL solution buvable :

- Boîte de 5 ampoules de 10 ml dosées à 1 g.

INDICATIONS :

Ce médicament est un ANTI-HEMORRAGIQUE préconisé dans les saignements.

CONTRE-INDICATIONS :

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Thrombose.
- Insuffisance rénale grave.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Prévenir le médecin en cas de grossesse et d'allaitement.

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

AUTRES EFFETS POSSIBLES DE CE MÉDICAMENT :

Comme tout produit actif, ce médicament peut chez certaines personnes entraîner des effets plus ou moins gênants : nausées, vomissements, vertiges.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Voie orale

EXACYL comprimés pelliculés :

- Adultes : 2 à 4 g par 24 h à répartir en 2 ou 3 prises.
- Enfants : 20 mg/kg par jour en moyenne.

EXACYL solution buvable :

- Adultes : 2 à 4 ampoules par 24 h, à répartir en plusieurs prises.
- Enfants : se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A

Primolut-Nor® 10 mg

Comprimés

Acétate de Noréthistérone

Boîte de 30

VEUILLEZ lire attentivement cette notice avant d'utiliser les comprimés Primolut-Nor car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la re lire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

s'aggravent pendant l'utilisation de ce médicament.

46,70

46,70

Antérieur

- si vous avez une maladie de la thyroïde (maladie de Basedow)
- si vous avez la maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique (inflammation chronique du côlon)
- si vous avez un LED (lupus érythémateux disséminé, maladie du système immunitaire)

- si vous avez un SHU (syndrome hémolytique et urémique, trouble de coagulation sanguine entraînant une insuffisance rénale)
- si vous avez une drépanocytose
- si vous avez une maladie qui est apparue pour la première fois ou qui s'est aggravée pendant la grossesse ou pendant une utilisation antérieure d'hormones sexuelles, par exemple perte auditive, porphyrie (maladie métabolique), hépatite, maladie cutanée ou chorée de Sydenham (maladie neurologique)
- si vous avez un angio-œdème héréditaire. Discutez immédiatement avec votre médecin si vous développez des symptômes d'angio-œdème, comme gonflement du visage, de la langue ou de la gorge et/ou des difficultés à avaler ou une urticaire accompagnée de difficultés respiratoires. Les produits contenant de l'œstrogène peuvent causer ou aggraver ces symptômes d'angio-œdème. Consultez votre médecin en cas d'apparition pour la première fois, récidive ou d'aggravation d'un des états mentionnés ci-dessus pendant l'utilisation de Primolut-Nor.

Primolut-Nor et thrombose

Une thrombose est un caillot sanguin à l'intérieur d'un vaisseau sanguin pouvant causer l'obstruction du vaisseau.

Les résultats des recherches indiquent que l'utilisation de contraceptifs oraux d'œstrogénostéroïdes augmente le risque de thrombose chez la femme comparé à une femme qui ne prend aucun contraceptif oral.

Une thrombose peut survenir dans les veines profondes de la jambe (thrombose veineuse profonde). Une thrombose veineuse peut se développer même si vous n'utilisez pas de contraceptifs oraux. Elle peut aussi se développer pendant la grossesse. Si le caillot sanguin se détache et se met en mouvement dans une veine où il s'est formé, il peut migrer jusqu'aux artères pulmonaires, les bouchant et causer un caillot de sang dans un vaisseau du poumon (une embolie pulmonaire). Dans de rares cas, des thromboses peuvent aussi survenir dans vaisseaux cardiaques et elles peuvent entraîner une crise cardiaque. Une thrombose ou une rupture d'un vaisseau sanguin du cerveau peut entraîner un accident vasculaire cérébral.

Le risque total de thromboembolie veineuse chez les utilisatrices de contraceptifs œstrogéniques combinés (faible dose d'œstrogène, moins de 50 microgrammes d'éthynodioladénil) est 2-3 fois plus élevé que chez les non-utilisatrices qui sont pas enceintes. Le risque accru est inférieur au risque lié à la grossesse ou à l'accouchement.

La thromboembolie veineuse qui se manifeste sous forme d'une thrombose veineuse profonde et/ou d'une embolie pulmonaire peut apparaître au cours de l'utilisation de tout contraceptif combiné.

Dans des cas extrêmement rares, une thrombose peut survenir dans d'autres organes, comme le foie, les intestins, les reins, le cerveau ou les yeux.

Le risque de thrombose est accru aussi immédiatement après l'accouchement.

QUAND CONTACTER VOTRE MÉDECIN ?

Examens médicaux réguliers

- Lorsque vous utilisez Primolut-Nor, votre médecin vous dira dans quels cas vous devez vous faire examiner à intervalles réguliers.

Contactez votre médecin dans les plus brefs délais si

- vous observez des changements dans votre état de santé, tout particulièrement si ces changements se rapportent à des aspects mentionnés dans cette notice (voir aussi rubriques « N'utilisez jamais Primolut-Nor » et « Avertissements et précautions »); n'oubliez pas les facteurs concernant vos proches.

Qu'est-ce que Primolut-Nor ?

1. Qu'est-ce que Primolut-Nor et dans quel cas est-il utilisé

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Primolut-Nor

3. Comment utiliser Primolut-Nor

4. Quels sont les effets indésirables éventuels

5. Comment conserver les comprimés Primolut-Nor

6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Primolut-Nor et dans quel cas est-il utilisé ?

Primolut-Nor est un produit d'ostrostéroïde (progestérone à progestérone) c.à.d. un produit hormonal de synthèse possédant des caractéristiques similaires à celles de la progestérone, qui est une hormone féminine naturelle.

Primolut-Nor est utilisé pour le traitement de différentes hémorragies dysfonctionnelles et de l'absence de règles (amenorrhée) due à diverses causes, pour soulager les symptômes du syndrome prémenstruel, pour le traitement d'une affection de la glande mammaire (mastopathie), pour déclencher la menstruation et pour le traitement de l'endométriose.

Primolut-Nor contient de l'acétate de noréthistérone, qui est souvent utilisé pour traiter des maladies autres que celles mentionnées dans cette notice. Si nécessaire, demandez conseil à votre médecin, votre pharmacien ou un autre professionnel de santé et suivez toujours leurs instructions.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Primolut-Nor ?

N'utilisez jamais Primolut-Nor

- si vous êtes allergique à la noréthistérone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6)

- si vous êtes enceinte ou si vous pensez être enceinte

- si vous allez

- si vous avez ou vous avez eu une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral (causés par une thrombose ou une rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau)

- si vous avez ou vous avez eu une maladie qui peut être un signe précurseur soit d'une crise cardiaque (par ex. angine de poitrine, causant une douleur thoracique intense et pouvant irradier vers le bras gauche) soit d'un accident vasculaire cérébral (par ex. accident ischémique transitoire sans séquelles irréversibles)

- si vous présentez plusieurs facteurs de risque de thrombose

- si vous avez ou vous avez eu un certain type de migraine (accompagné de symptômes des neurologiques focaux, comme des troubles de la vision, des difficultés d'écoulement ou des sensations de faiblesse ou d'engourdissement dans une partie du corps)

- si vous avez un diabète accompagné de maladie vasculaire

- si vous avez ou vous avez eu une maladie sévère du foie et que votre médecin vous a dit que votre fonction hépatique ne s'est pas encore normalisée. Les symptômes d'une maladie du foie peuvent être, par exemple, une jaunisse et/ou des dérangements généraux

- si vous avez ou vous avez eu une tumeur du foie bénigne ou maligne

- si vous avez ou vous avez eu une tumeur maligne dont la croissance est influencée par les hormones sexuelles, comme un cancer du sein ou un cancer des organes de reproduction.

Si vous développez l'une des maladies ou l'un des états mentionnés ci-dessus pour la première fois pendant l'utilisation des comprimés Primolut-Nor, arrêtez leur utilisation et contactez un médecin.

Avertissements et précautions

Adresssez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Primolut-Nor.

L'hormone sexuelle (la progestérone) contenue dans ce produit se transforme partiellement en œstrogène. Pour cette raison, il faut prendre en considération, non seulement les mises en garde concernant les comprimés Primolut-Nor, mais aussi les mises en garde générales concernant les contraceptifs combinés.

Pendant l'utilisation de Primolut-Nor, une prudence spéciale s'impose dans certaines situations. Des examens médicaux réguliers peuvent être nécessaires. Discutez avec votre médecin avant de commencer l'utilisation de Primolut-Nor si l'un des états suivants vous concerne ou si vous développez ces états ou qu'ils



Professeur MIKOU Fawzi
Gynécologue obstétricien ,187 Bd Abdelmoumen Casablanca
Tel :0522484805
pr.fawzimikou@gmail.com

Gynécologie Rapport

Page 1/1

Professeur Mikou Fawzi

Informations sur le patient / l'examen

Date d'examen: 07.09.2020

ID Patient VSX802198-20-09-07-7
Nom MAMOUT, NABILA
DOB,Age 22.09.1978,41
Sexe Féminin

Mesures 2D	Valeur	m1	m2	m3	m4	m5	m6	Méth.
Utérus								
Longueur	5.22 cm	5.22						moy.
Hauteur	4.12 cm	4.12						moy.
Épaisseur Endo.	9.32 mm	9.32						moy.
Longueur Col de l'utérus	3.59 cm	3.59						moy.

Commentaire

UTERUS AUGMENTE DE TAILLE GLOBULEUX ADENOMYOSIQUE

ENDOMETRE EPAISSI

COL RAS

OVAIRES RAS

Professeur Fawzi MIKOU
Gynécologue Obstétricien - Casablanca
187 Bd Abdelmoumen - Casablanca
Tel : 0522 48 48 05
CE : 00220308100026