

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



## Déclaration de Maladie

Nº P19- 051017

### Maladie

### Dentaire

### Optique

### Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 07934

Société : RAM 11.04.8

Actif  Pensionné(e)

Autre : Retraitée

Nom & Prénom : B.E.N.N.I.S Naima

Date de naissance : 18.05.1958

Adresse : Massrif ext.

Tél. : 06.61.13.05.22 Total des frais engagés : 2208 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. Ghizlane BOUDEGGA  
Hépato-Gastro Entérologue Proctologue  
158, Av. Omar Al Khayam 1er Etage N° 1  
Beauséjour - Casablanca  
Tél : 05 22 36 86 18

Date de consultation : 29.09.2020

Nom et prénom du malade : Nae Bennia

Lien de parenté :  Lui-même

Companion 16.01.2020 Enfant

Nature de la maladie : Pathologie digestive

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 01.10.2020

Signature de l'adhérent(e) :

ACCUEIL

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
29.09.2020	C	C		Dr. Ghizlane BOUJEDDANE Hépato-Gastro Entérologue-Proctologue 158, Av. Omar Al Khayam 1er Elage N° 1 Beauséjour - Casablanca Tél : 05 22 36 86 18

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
ROUTE BRAHIM ROUDADIA VIAZ D'EL JADIDA ROUTE BRAHIM ROUDADIA ROUTE BRAHIM ROUDADIA	01/10/20	908,60

## ANALYSES - RADIOPHGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
RADIOLOGIE SOCITE DR. BELKAÏD - DR. BRAHIM ROUDADIA ROUTE BRAHIM ROUDADIA ROUTE BRAHIM ROUDADIA	01/10/20	T.D.N. ASD-palV	2000 dh

## AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
				
				
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H	25533412	21433552	
		00000000	00000000	
	D	00000000	00000000	
		35533411	11433553	
	B			
(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession				
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXEC

# **RADIOLOGIE SOCRATE**

FACTURE N°01887/20

Casa 01.10.20

Nom & prénom : BENNIS NAIMA

Examens	Prix
T.D.M. Abdomio-pelvienne	2000.00
TOTAL :	<b>2000.00</b>

Arrêtée la présente facture à la somme de :  
Deux mille dirhams.

Angle Bd Brahim Roudani et Rue Nassih Eddine-Résidence ANFA 1.  
Casa. ☎ 0522.25.73.13-0522.25.75.05 Patente:35803986 TVA. 817/43  
R.C. 79363 I.F. 01003328 CNSS:2626036 ICE : 001321320000087

*RADIOLOGIE SOCRATE*  
Angle Bd. Brahim Roudani Rue Nassih Eddine-Rés. Anfa 1 Casablanca  
0522.25.73.13-0522.25.75.05



الفحص بالأشعة سocrates  
RADIOLOGIE SOCRATE

الدكتور محمد بلقاضي العباسي  
Dr. Mohammed BELCADI ABASSI

الدكتور جمال بناني  
Dr. Jamal BENNANI

Cas. 01.10.20.

N° BENNI 8 Naino.



208, 6<sup>e</sup> Ulme - Km 300

1 floor de l'orl.

ROUTE D'EL JADIDA  
240 Bd Brahim Roudani  
Tél: 05 22 99 57 45

RADIOLOGIE SOCRATE  
Angle Bd. Brahim Roudani Rue  
Nassih Eddine Rés. Anfa 1 - Casablanca  
Tél. : 05 22 25 73 13 / 05 22 25 75 05 - Fax : 05 22 98 79 06 - E-mail : rxsocrate@hotmail.fr

# Docteur Ghizlane BOUDEGGA

Spécialiste des maladies de l'appareil digestif  
et du foie

Diplôme de Proctologie de l'Université de Rennes  
(hémorroïdes, fissure, fistule)

Endoscopie digestive

Certificat Universitaire d'échographie de Casablanca  
Ancienne interne au CHU Ibn Rochd

# الدكتورة غزلان بودغا

اختصاصية في أمراض الجهاز الهضمي،

الكبد و أمراض المخرج

الفحص الداخلي بالمنظار

الفحص بالصدى

طبية داخلية سابقاً بالمستشفى الجامعي ابن رشد



Casablanca, le 29/09/2020

الدار البيضاء، في

Nne Bennis Naima

- Gélos
- Sensation de pesanteur au niveau de l'hypochondre gauche
- A l'examen: sensibilité HC Cilie
- Echographie: Néphrolithie

⇒ TDM abdominale pelvienne

RADIOLOGIE SOCRATE  
Dr. BELCADI - Dr BENNANI  
Angle Bd Brahim Roudani Rue  
Nassir Eddine Rés Anfa 1 Casablanca  
Tél : 0522 25 73 13 - 0522 25 75 06

Dr. Ghizlane BOUDEGGA  
Hépato-Gastro Entérologue-Proctologue  
158, Av. Omar Al Khayam 1er Etage N° 1  
Beauséjour - Casablanca  
Tél : 05 22 36 86 18

158, شارع عمر الخيام، الطابق الأول، رقم 1، بولنجر الدار البيضاء  
158, Av. Omar Al khayam - 1er étage, N° 1- Beauséjour - 20200 Casablanca

📞 : 05 22 36 86 18 - 📩 : boudegga.ghizlane@gmail.com



الفحص بالأشعة سقراط  
RADIOLOGIE SOCRATE

الدكتور محمد بلقاضي العباسى  
Dr. Mohammed BELCADI ABASSI

الدكتور جمال بنانى  
Dr. Jamal BENNANI

CASABLANCA LE : 1er octobre 2020

NOM : BENNIS  
PRENOM : Naima  
MEDECIN TRAITANT : DR. BOUDEGGA Ghizlane

T.D.M. Abdomino-pelvienne

\* Renseignements cliniques :

Pesanteur de l'HG avec sensibilité .

\* Technique d'examen :

Examen réalisé en coupes axiales de 5 mm jointives avant et après injection de produit de contraste .

\* Résultats :

- Foie non augmenté de taille , de contours réguliers et de densité homogène ne présentant pas de lésion focale visible .
- Vésicule biliaire alithiasique à paroi fine et voies biliaires non dilatées .
- Reins, rate et pancréas sans anomalie focale .
- Absence de masse abdominale décelable .
- Absence d'adénopathies aorto-caves ou cœlio-mésentériques .
- Absence d'épanchement liquidiens abdominal .
- Utérus de taille normale, de contours réguliers et densité homogène.
- Les deux ovaires sont sans particularité .
- Vessie sans anomalie pariétale .
- Absence de masse ou de collection pelvienne .

\* Au total :

T.D.M. abdomino-pelvienne sans particularité chez cette patiente .

CONFRATERNELLEMENT

DR. M. BELCADI

RADIOLOGIE SOCRATE  
Dr. BELCADI - Dr BENNANI

Angle Bd. Brahim Roudani Rue

Nassih Eddine Prolongement Socrate Casablanca

نيل 032823

ملتقى شارع ابراهيم الرومي وطريق الجديدة سابقا - إقامة أنفا 1 - الدار البيضاء

Angle Bd. Brahim Roudani (Ex Route d'El Jadida) et Rue Nassih Eddine (Prolongement Socrate) - Résidence Anfa 1

Casablanca - Tél. : 05 22 25 73 13 / 05 22 25 75 05 - Fax : 05 22 98 79 06 - E-mail : rxsocrate@hotmail.fr



## Notice d'emploi : informations destinées aux utilisateurs

### Ultravist® 300

(300 mg d'iode/ml)

### Ultravist® 370

(370 mg d'iode/ml)

solution pour injection ou perfusion ou solution buvable  
Iopromide

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de commencer à utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Ce médicament est spécialement prévu pour des examens diagnostiques et ne doit par conséquent être utilisé que sur ordre et sous la surveillance de votre médecin.
- Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin (le radiologue) qui vous injecte l'iopromide, au personnel médical qualifié de l'hôpital ou du centre d'IRM ou à votre pharmacien.
- Si vous remarquez des effets indésirables, adressez-vous à votre médecin ou pharmacien ou au personnel médical qualifié. Ceci vaut également pour les effets indésirables qui ne figurent pas dans cette notice. Voir la rubrique 4.

#### La notice contient les rubriques suivantes :

1. Qu'est-ce qu'Ultravist et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Ultravist ?

3. Comment utiliser Ultravist ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver Ultravist ?

6. Contenu de l'emballage et informations supplémentaires

## 1. Qu'est-ce qu'Ultravist et dans quels cas est-il utilisé ?

Ultravist est un produit de contraste radiologique iodé, monomère et non ionique.

Les rayons X sont absorbés par l'iode. Les parties du corps dans lesquelles Ultravist se trouve deviennent ainsi mieux visibles.

Le produit de contraste vous est administré par un personnel qualifié et formé.

Ultravist est utilisé pour :

- la visualisation radiologique des vaisseaux sanguins (angiographie, angiographie numérisée avec soustraction par voie intra-artérielle)
- le renforcement du contraste en tomodensitométrie
- la visualisation des reins et des voies urinaires (urographie)
- la visualisation de cavités corporelles (exceptions : myélographie, ventriculographie, cisternographie).

Ultravist est un médicament à usage diagnostique.

## 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Ultravist ?

Votre médecin ou le personnel qualifié et formé ne mélangera pas Ultravist avec d'autres médicaments afin de limiter le risque d'éventuelles intolérances.

**Ultravist ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :**

- si vous êtes allergique à l'iopromide ou à l'iode ou à l'un des autres composants de ce médicament, qui sont mentionnés à la rubrique 6.

**Mises en garde et précautions d'utilisation**

Veuillez consulter votre médecin ou le personnel médical qualifié avant d'utiliser Ultravist.

**Tous les types d'utilisation**

**Réactions d'hypersensibilité (réactions allergoïdes ou anaphylactoïdes)**

Informez votre médecin dans les cas suivants :

- si vous avez déjà présenté une réaction à un autre produit de contraste,
- si vous souffrez ou si vous avez déjà souffert d'asthme bronchique ou d'autres allergies,

Le risque d'une réaction de type allergique à Ultravist (y compris des réactions sévères) étant alors plus élevé. Votre médecin décidera si l'examen prévu peut être effectué ou non.

Après utilisation d'Ultravist et indépendamment de la dose administrée, des réactions de type allergique (allergoïdes) peuvent survenir à des degrés de gravité différents pouvant aller jusqu'au choc et se manifestant par des symptômes de différente nature, par exemple sous forme de réactions cardiovasculaires (cœur et vaisseaux sanguins), respiratoires (voies respiratoires) et cutanées (peau).

De telles réactions surviennent de manière irrégulière et ne sont donc pas prévisibles dans chaque cas individuel. La plupart de ces réactions apparaissent dans la demi-heure qui suit l'administration du produit de contraste. Il peut cependant aussi se produire des

l'administration d'un produit de contraste dans une artère. Les patients atteints de maladies vasculaires cérébrales symptomatiques, ayant subi récemment un accident vasculaire cérébral ou souffrant d'attaques ischémiques transitoires fréquentes sont exposés à un risque plus élevé de complications neurologiques induites par un produit de contraste.

#### Autres facteurs de risque

Les patients atteints d'une maladie particulière des glandes surrénales (phéochromocytome) peuvent présenter un risque plus élevé de développement d'une crise d'hypertension (crise hypertensive) après administration intravasculaire d'un produit de contraste.

Les symptômes d'une faiblesse musculaire maladive (myasthénie grave) peuvent être renforcés par Ultravist.

#### Utilisation dans les cavités corporelles

Chez les patients présentant une inflammation aiguë du pancréas (pancréatite) et une inflammation aiguë des voies biliaires (cholangite), un examen endoscopique du canal pancréatique et biliaire (CPRE, cholango-pancréatographie rétrograde par voie endoscopique) au moyen d'Ultravist ne doit être effectué qu'après avoir évalué précisément le rapport bénéfice/risque. Un examen ne doit être effectué que 3 à - 4 semaines après diminution des symptômes aigus, sauf si des mesures thérapeutiques doivent être prises immédiatement, comme l'élimination d'une concrétion obstructive (obstruction par un calcul biliaire) ou le pontage d'un rétrécissement (sténose).

#### Utilisation d'Ultravist en association avec d'autres médicaments

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou utilisez d'autres médicaments, si vous avez pris ou utilisé d'autres médicaments récemment ou si vous avez l'intention de prendre ou d'utiliser d'autres médicaments. Indiquez également les médicaments que vous n'utilisez pas régulièrement mais que vous avez, le cas échéant, utilisés les jours précédents l'examen radiologique.

Veuillez informer votre médecin en particulier dans le cas des médicaments suivants :

- **Biguanides** (metformine, un médicament utilisé dans le traitement du diabète sucré) : si vous souffrez d'une insuffisance rénale aiguë ou d'une maladie rénale chronique grave, l'élimination des biguanides peut être retardée, ce qui peut entraîner leur accumulation dans le sang et le développement d'une acidose lactique (excès d'acide dans le sang).

L'utilisation d'Ultravist pouvant provoquer des problèmes rénaux ou aggraver des problèmes rénaux existants, vous pourriez être exposé à un risque plus élevé de développement d'une acidose lactique.

Ceci vaut en particulier si vous présentez des antécédents de troubles de la fonction rénale (voir la rubrique 2, chapitre « Utilisations intravasculaires »; « Troubles de la fonction rénale »). Après avoir contrôlé la fonction rénale, la nécessité d'interrompre le traitement par metformine devra être envisagée en fonction des résultats.

- **Interleukine 2** : un traitement antérieur (jusqu'à plusieurs semaines auparavant) par interleukine 2 (un médicament anticancéreux) est lié à un risque accru d'apparition retardée de réactions au produit de contraste Ultravist.

- **Radio-isotopes** : après l'administration intravasculaire (dans les vaisseaux sanguins) de produits de contraste iodés, la capacité du tissu thyroïdien à capturer les radio-isotopes est limitée. C'est pourquoi le diagnostic et le traitement de troubles de la fonction thyroïdienne par des radio-isotopes thyroïdiens peuvent être perturbés pendant plusieurs semaines, dans des cas isolés pendant une plus longue durée, après l'utilisation d'Ultravist.

#### Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, s'il est possible que vous soyez enceinte ou si vous envisagez une grossesse, demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

#### Grossesse

Aucune étude adéquate et bien contrôlée n'a été effectuée auprès de femmes enceintes. C'est pourquoi l'innocuité de l'utilisation d'Ultravist pendant la grossesse n'est pas suffisamment prouvée chez l'être humain. Les études expérimentales menées avec l'iopromide chez l'animal n'ont révélé aucun effet nocif sur la grossesse, sur le développement de l'embryon / du fœtus, sur l'accouchement ou sur le développement du nouveau-né suite à l'utilisation diagnostique d'iopromide chez l'être humain.

Lors d'un examen radiologique de la mère, l'enfant est aussi exposé aux rayons X. Étant donné qu'une exposition aux rayons X doit de toute façon être évitée autant que possible pendant une grossesse, votre médecin pèsera soigneusement le bénéfice d'un examen radiologique – pratiqué avec ou sans produit de contraste – par rapport aux risques éventuels. En plus d'éviter une exposition du fœtus aux rayons X, il convient de prendre en compte la sensibilité à l'iode de la glande thyroïde du fœtus lors de l'utilisation de produits de contraste iodés.

#### Allaitement