

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 0039954

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1855 Société : 44282

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : ACHOR ZYAD KEBIRA

Date de naissance : 01/01/1947

Adresse :

Tél. : 06.87.73.84.14 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 15 OCT 2020

Nom et prénom du malade : ACHOR ZYAD KEBIRA Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : HTA, Goutte, Diabète

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
15 OCT 2020	2	1	#15001	Docteur Sihem Beshir MEDECINE GENERALE Complexe Anassi Oued 1 Bordj 3 App. 34 RDC TEL: 05 22 73 60 87

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
--	------	-----------------------

PHARMACIE ANASSI
 CHRAÏBI Lotfi
 Gr. 2. Rés. Anassi
 Bernoussi - Casablanca
 05 22 73 73 85

17/10/20
 993.40

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
---	------	------------------------------	------------------------

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES


Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES

Dents Traitées Nature des Soins Coefficient



COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

O.D.F. PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553
B	

(Création, remont, adjonction)
 Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr Siham Benkirane

MEDECINE GENERALE

Complexe Anassi - Groupe 5

Entrée 3 - App. 34 RDC

Bernoussi - Casablanca

Tél.: 05 22 73 50 87

GSM : 07 77 04 79 40

الدكتورة سهام بنكيران

الطب العام

مركز أناسي - شطر 5

مدخل 3 - شقة 34

البرنوصي - الدار البيضاء

الهاتف : 05 22 73 50 87

المحمول : 07 77 04 79 40

Casablanca, le

15 OCT 2020

S

ACHOR ZYAD

10/10 KEBIRA

x3 Coversyl 5mg 3boute

1cp matin

3460 lasilex 40 2boute

1/2cp le matin

14000

oeds 20 1boute 56

x3 gel matin aut rep

Diamicom 60 3boute

1cp matin

etformine win 500mg 3boute

1cp a midi

1cp le soir

LOT: 191564
PER: 04-2022
PPV: 140,00DH

Dr Siham Benkirane
MEDECINE GENERALE
Complexe Anassi Groupe 5
Entrée 3 App. 34 RDC
Tél: 05 22 73 50 87

50.70 Diacee Suppo

1 Suppo le Sar

101,80

101,80

50.60 Prince-B. Ent 2bony

14

30.50

Fungilyse Crème

78,70

48.50

Perio Kim

1 AP x

Sm'g Beuvig

Docteur Sibane Zaidi
MEDECINE GENERALE
Complète Anatomique
Entrée 1 Avenue de la
Tél: 05 22 73 73 73

FONGILYSE® Crème

PPV 300H50
EXP 12/2022
LOT 90029 1

Total 993.40

PHARMACIE ANASSI
CHIRABI LOFI
1 Cr. - Res. Anassi
Idi Bernoulli - Casablanca
Tél.: 05 22 73 73 73

101,80

PPV
LO
PER

50,60

78,70

DE 19 10.22
LOT UFAV
SOKAPHARM PPC
COLOMBIA POR:
PROCLIN PHARMA S.A. CRA. 680
N° 98-73, BOGOTÁ - COLOMBIA
V.BR 192-8
):

50,70

78,70

Lasilix® 40 mg

Lasilix® 20 mg/2 ml

Furosémide

SANOFI 

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire à nouveau.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition

LASILIX 40 mg comprimés :

Furosémide 40 mg/comprimé.

Excipients : amidon de maïs, lactose, silice colloïdale, talc, stéarate de magnésium.

LASILIX 20 mg/2ml :

Furosémide 20 mg/2 ml.

Excipients : chlorure de sodium, hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.

Formes pharmaceutiques et présentations

LASILIX 40 mg : comprimés sécables dosés à 40 mg ; boîte de 20.

LASILIX 20 mg/2 ml : solution injectable,
ampoule de 2 ml ; boîte de 1.

DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Voie orale :

Ce médicament est indiqué dans le traitement :

- des œdèmes d'origine cardiaque ou rénale,
- des œdèmes d'origine hépatique, le plus souvent en association avec un diurétique épargneur de potassium,
- de l'hypertension artérielle.

Voie injectable :

Cette forme est indiquée dans les cas suivants :

- urgences cardiologiques : œdème aigu du poumon,
- poussées hypertensives sévères (*élévation importante*),
- rétentions sodées sévères d'origine cardiaque, rénale,
- radiologie du bas appareil urinaire et test de lavage,
- peut être utilisé en réanimation pédiatrique.

ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :



Lasilix[®] 40 mg

Lasilix[®] 20 mg/2 ml

Furosémide

SANOFI 

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire à nouveau.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition

LASILIX 40 mg comprimés :

Furosémide 40 mg/comprimé.

Excipients : amidon de maïs, lactose, silice colloïdale, talc, stéarate de magnésium.

LASILIX 20 mg/2ml :

Furosémide 20 mg/2 ml.

Excipients : chlorure de sodium, hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.

Formes pharmaceutiques et présentations

LASILIX 40 mg : comprimés sécables dosés à 40 mg ; boîte de 20.

LASILIX 20 mg/2 ml : solution injectable,
ampoule de 2 ml ; boîte de 1.

DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Voie orale :

Ce médicament est indiqué dans le traitement :

- des œdèmes d'origine cardiaque ou rénale,
- des œdèmes d'origine hépatique, le plus souvent en association avec un diurétique épargneur de potassium,
- de l'hypertension artérielle.

Voie injectable :

Cette forme est indiquée dans les cas suivants :

- urgences cardiologiques : œdème aigu du poumon,
- poussées hypertensives sévères (*élévation importante*),
- rétentions sodées sévères d'origine cardiaque, rénale,
- radiologie du bas appareil urinaire et test de lavage,
- peut être utilisé en réanimation pédiatrique.

ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :



ميتفورمين وين®

كلوريدات الميتفورمين

500 ملغ 850 ملغ 1000 ملغ

عن طريق الفم

قرص ملبس

يرجى الاطلاع على هذه النشرة بأكملها قبل تناول هذا الدواء
احتفظوا بهذه النشرة فقد تحتاجون إلى قراءتها مجدداً.

• لكل استفساراتكم أو في حالة ما إذا كانت لديكم شكوك، اطلبوا مزيداً من المعلومات من طبيكم أو من الصيدلي.
• هذا الدواء وصف لكم شخصياً لا تقدموه أبداً لغير حتى وإن ظننتم لديه نفس الأعراض، فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار به.
• إذا أصبحت بعض الآثار غير مرغوب فيها خطيرة أو إذا لاحظتم بعض الآثار غير مرغوب فيها التي لم يرد ذكرها في هذه النشرة، استشيروا طبيكم أو الصيدلي.

1. ما هو ميتفورمين وين، قرص ملبس، وما الحالات التي يستعمل فيها؟

الصف الصيدلي للعلاج

ميتفورمين وين يحتوي على الميتفورمين. هذا الدواء يستخدم لعلاج داء السكري. يتنمي إلى فئة الأدوية المسماة بـ"بيكوانايد".

بالإضافة للعلاجية
مخصصة بحالة داء السكري من صنف 2.
• عند البالغين، يمكن وصفه لوحده أو مع دواء آخر مضاد للسكري عن طريق الفم أو مع الأنسولين.

• عند الطفل الذي يتجاوز عمره 10 سنوات والمراهقين: يمكن وصفه لوحده أو مع الأنسولين.
يمكن استعمال ميتفورمين وين 1000 ملغ بدل قرصين من ميتفورمين وين 500 ملغ حينما يتطلب العلاج جرعة من 2 أو 3 غرامات يومياً من ميتفورمين.

2. ما المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول ميتفورمين وين، قرص ملبس؟

مضادات الاستعمال

يجب عدم تناول ميتفورمين وين: • إذا كانت لديكم حساسية (حساسية مغرطة) للميتفورمين، أو لأحد المكونات الأخرى المتوفرة في هذا الدواء. (انظر كما المكونات التي

يحتوي عليها ميتفورمين وين • في فترة 6 "معلومات إضافية") • إذا كانت لديكم مشاكل مغرطة بالكليتين أو الكبد. • إذا كان لديكم داء سكري غير منضبط، مصحوب مثلاً بارتفاع شديد لسكر الدم (نسبة السكر مرتفعة جداً في الدم)، غثيان، قيء، جفاف، فقدان سريع للوزن أو ارتفاع الأموية السيروزية. ارتفاع الأموية السيروزية هو مرض يعتمد على تراكم مواد في الدم تسمى "أحماض السيوز" التي يمكن أن تتسبب في مسبق غيبوبة

السكري. الأعراض هي بالخصوص ألم في المعدة، تنفس سريع وعميق، غثيان في النوم أو تنفس من راحة • غير عادية. • إذا كانت قد فقدت الكثير من الماء (جفاف)، على سبيل المثال بـ • أو حاد. أو إذا تقيأت عدة مرات على التوالي. الجفاف يمكن أن يؤدي • أن تضعف في خطر الإصابة بالحمض اللاكتوزي (انظر مع)

إذا كانت لديكم إصابة حادة، مثلاً إصابة • يمكن أن تتسبب في مشاكل خاصة مع ميتفورمين • بنوبة قلبية، إذا كانت لديكم • ميجن إلى الأنسجة، • عناية خاصة مع

عن ذلك إلى طبيكم قبل بدء



يرجى استشارة طبيكم إذا: • وجب عليكم القيام بفحص بالتصوير الإشعاعي أو فحص السكاكين الذي قد يتطلب حقن مادة تباين محتوية على اليود في البود في دورتك الدوائية. • وجب عليكم الخضوع لعملية جراحية كبرى.

يجب التوقف عن تناول ميتفورمين وين بعض الوقت قبل وبعد هذه الفحوصات أو العمليات الجراحية. سيقوم طبيكم بتحديد ما إذا كنت بحاجة أو لا إلى استبدال العلاج خلال هذه الفترة. من الضروري أن تتبع بدقة تعليمات طبيكم.

احتياطات الاستعمال: تحذيرات خاصة
يجب الانتباه قبل تناول ميتفورمين وين:

المرجو الأخذ بعين الاعتبار للخطر الخاص التالي للحمض اللاكتوزي

يمكن أن يتسبب الميتفورمين وين في مضاعفة نادرة جداً لكنها خطيرة تسمى الحمض اللاكتوزي، خاصة إذا كانت الكليتين لا تعملان بشكل صحيح. خطر الحمض اللاكتوزي يمكن أن يزيد في حالة داء سكري غير منضبط، صوم مطول أو شرب الكحول. أعراض الحمض اللاكتوزي هي القيء، آلام البطن مع تشنجات عضلية، شعور بآلام مع تعب شديد وصعوبات في التنفس. إذا وجدت نفسك في هذه الحالة، قد تحتاج إلى الاستشفاء على الفور لتلقي العلاج لأن الحمض اللاكتوزي يمكن أن يؤدي إلى غيبوبة. توقف فوراً عن تناول ميتفورمين وين والاتصال فوراً بالطبيب أو أقرب مستشفى.

ميتفورمين وين وحده لا يتسبب في نقص السكر في الدم (نسبة السكر في الدم منخفضة جداً). ومع ذلك، إذا كنت تتناول ميتفورمين وين في نفس الوقت مع أدوية أخرى لعلاج داء السكري والتي يمكن أن تتسبب في نقص السكر الدم (مثل السولفاميدات المخفضة لنسبة السكر الدم، الأنسولين، ميثيغليدين)، هناك خطر لنقص السكر الدم. إذا أحسست بأعراض نقص السكر مثل الضعف، الدوخة، زيادة التعرق، المسارع لإفلات القلب، عدم وضوح الرؤية أو صعوبات في التركيز، أكل أو شرب شيء يحتوي على سكر سيساعدك على التحسن.

الفاعلات مع أدوية أخرى

تناول أو استعمال أدوية أخرى
إذا وجب عليكم القيام بفحص مادة تباين تحتوي على اليود في دورتك الدوائية مثلاً للفحص

بالتصوير الإشعاعي أو فحص السكاكين يجب التوقف عن تناول ميتفورمين وين بعض الوقت قبل وبعد مثل هذا الفحص. (انظر "مقرفة" في قسم استعماله.)

يرجى منكم إخبار طبيكم إذا كنتم تتناولون ميتفورمين وين في نفس الوقت مع أحد الأدوية التالية. قد يكون أيضاً من الضروري مراقبة نسبة السكر في الدم لديكم باستمرار أو ضبط جرعة ميتفورمين وين: • مدرات البول (المستعملة لإزالة كمية من الماء من الجسم بزيادة كمية البول المنتجة)، • مثاللات مستقبلات بيتا 2 - الأدرينالية مثل الساليميتامول أو البروبيوتيك (المستعمل لعلاج الربو)، • الكورتيكوستيرويدات (المستعملة لعلاج أمراض مختلفة خاصة التهابات الحادة للجلد أو الربو)، • الأدوية الأخرى المستعملة لعلاج داء السكري.

إذا كنت تتناول أو سبق لك أن تناولت مؤخراً دواء آخر بما فيها دواء تم الحصول عليه دون وصفة طبية، تحدث عن ذلك إلى طبيكم أو الصيدلي.

الفاعلات مع المواد الغذائية والمشروبات

المواد الغذائية والمشروبات
يجب تجنب استهلاك المشروبات الكحولية في حين تتناول هذا الدواء. الكحول قد تزيد من خطر الحمض اللاكتوزي، خاصة إذا كنت تعاني من فشل الكبد أو إذا كنت تعاني من نقص في التغذية. هذا ينطبق أيضاً على الأدوية التي تحتوي على الكحول.

الاستعمال خلال الحمل والرضاعة

الحمل والرضاعة
خلال فترة الحمل، مستحاجين الأنسولين لعلاج داء السكري. إبليغي طبيكم إذا كنت حاملاً،

تظنين أنك قد تصبحين أو تخططين أن تكوني حاملاً حتى يتمكن من تغيير علاجك. لا ينصح بهذا الدواء إذا كنت ترضعين طفلك أو إذا كنت تتوین القيام به.

تأثير على القدرة على قيادة العربات أو استعمال الآلات
قيادة العربات أو استعمال الآلات

استعمال هذا الدواء لوحده لا يؤدي إلى نقص السكر في الدم وبالتالي ليس له أي تأثير على القدرة على قيادة العربات أو استعمال الآلات.

لكن عند تناوله مع مضادات أخرى للسكري مضاعفة لنسبة السكر في الدم (السولفاميد

الحمض اللاكتوزي، خاصة إذا كانت الكليتين لا تعملان بشكل صحيح. خطر الحمض اللاكتوزي يمكن أن يزيد في حالة داء سكري غير منضبط، صوم مطول أو شرب الكحول. أعراض الحمض اللاكتوزي هي القيء، آلام البطن مع تشنجات عضلية، شعور بآلام مع تعب شديد وصعوبات في التنفس. إذا وجدت نفسك في هذه الحالة، قد تحتاج إلى الاستشفاء على الفور لتلقي العلاج لأن الحمض اللاكتوزي يمكن أن يؤدي إلى غيبوبة. توقف فوراً عن تناول ميتفورمين وين والاتصال فوراً بالطبيب أو أقرب مستشفى.

ميتفورمين وين®

كلوريدات الميتفورمين

500 ملغ 850 ملغ 1000 ملغ

عن طريق الفم

قرص ملبس

يرجى الاطلاع على هذه النشرة بأكملها قبل تناول هذا الدواء
احتفظوا بهذه النشرة فقد تحتاجون إلى قراءتها مجدداً.

• لكل استفساراتكم أو في حالة ما إذا كانت لديكم شكوك، اطلبوا مزيداً من المعلومات من طبيكم أو من الصيدلي.
• هذا الدواء وصف لكم شخصياً لا تقدموه أبداً لغير حتى وإن ظننتم لديه نفس الأعراض، فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار به.
• إذا أصبحت بعض الآثار غير مرغوب فيها خطيرة أو إذا لاحظتم بعض الآثار غير مرغوب فيها التي لم يرد ذكرها في هذه النشرة، استشيروا طبيكم أو الصيدلي.

1. ما هو ميتفورمين وين، قرص ملبس، وما الحالات التي يستعمل فيها؟

الصف الصيدلي للعلاج

ميتفورمين وين يحتوي على الميتفورمين. هذا الدواء يستخدم لعلاج داء السكري. يتنمي إلى فئة الأدوية المسماة بـ"بيكوانايد".

بالإضافة إلى العلاجية المناسبة، هذا الدواء هو مضاد للسكري عن طريق الفم، مخصص لحماية داء السكري من صنف 2.

• عند البالغين، يمكن وصفه لوحده أو مع دواء آخر مضاد للسكري عن طريق الفم أو مع الأنسولين.
• عند الطفل الذي يتجاوز عمره 10 سنوات والمراهقين، يمكن وصفه لوحده أو مع الأنسولين.

يمكن استعمال ميتفورمين وين 1000 ملغ بدل قرصين من ميتفورمين وين 500 ملغ حينما يتطلب العلاج جرعة من 2 أو 3 غرامات يومياً من ميتفورمين.

2. ما المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول ميتفورمين وين، قرص ملبس؟

مضادات الاستعمال

يجب عدم تناول ميتفورمين وين؛ • إذا كانت لديكم حساسية (حساسية مغرطة) للميتفورمين، أو لأحد المكونات الأخرى المتوفرة في هذا الدواء. (انظر كما المكونات التي تحتوي عليها ميتفورمين وين) • في فترة 6 "معلومات إضافية". • إذا كانت لديكم مشاكل مغرطة بالكليتين أو الكبد. • إذا كان لديكم داء سكري غير منضبط، مصحوب مثلاً بارتفاع شديد لسكر الدم (نسبة السكر مرتفعة جداً في الدم)، غثيان، قيء، جفاف، فقدان سريع للوزن أو ارتفاع الحموضة السيئوية. ارتفاع الحموضة السيئوية هو مرض يعتمد على تراكم مواد في الدم تسمى "أحماض السيوز" التي يمكن أن تتسبب في مسبق غيبوبة السكري. الأعراض هي: الغثاسون ألم في المعدة، تنفس سريع وعميق، رغبة في التوم أو تنفس من راحة" غير عادية. • إذا كانت قد فقدت الكثير من الماء (جفاف)، على سبيل المثال بـ "• أو حاد، أو إذا تقيأت عدة مرات على التوالي. الجفاف يمكن أن يؤدي إلى تشنجات في خطر الإصابة بالحمض اللاكتوزي (انظر مع) • إذا كانت لديكم إصابة حادة، مثلاً إصابة الرئتين أو الكلى.

• وين® يمكن أن يؤذي (انظر مع) • إذا كانت لديكم إصابة حادة، مثلاً إصابة الرئتين أو الكلى.

• وين® يمكن أن يؤذي (انظر مع) • إذا كانت لديكم إصابة حادة، مثلاً إصابة الرئتين أو الكلى.



المرجو الأخذ بعين الاعتبار للخطر الخاص التالي للحمض اللاكتوزي

يمكن أن يتسبب الميتفورمين وين في مضاعفة نادرة جداً لكنها خطيرة تسمى الحمض اللاكتوزي، خاصة إذا كانت الكليتين لا تعملان بشكل صحيح. خطر الحمض اللاكتوزي يمكن أن يزيد في حالة داء سكري غير منضبط، صوم مطول أو شرب الكحول. أعراض الحمض اللاكتوزي هي القيء، آلام البطن مع تشنجات عضلية، شعور بقاء عام مع تعب شديد وصعوبات في التنفس. إذا وجدت نفسك في هذه الحالة، قد تحتاج إلى الاستشفاء على الفور لتلقي العلاج لأن الحمض اللاكتوزي يمكن أن يؤدي إلى غيبوبة. توقف فوراً عن تناول ميتفورمين وين والاتصال فوراً بالطبيب أو أقرب مستشفى.

ميتفورمين وين وحده لا يتسبب في نقص السكر في الدم (نسبة السكر في الدم منخفضة جداً). ومع ذلك، إذا كنت تتناول ميتفورمين وين في نفس الوقت مع أدوية أخرى لعلاج داء السكري والتي يمكن أن تتسبب في نقص السكر الدم (مثل السولفاميدات المنخفضة لنسبة السكر الدم، الأنسولين، ميثيغليدين)، هناك خطر لنقص السكر الدم. إذا أحسست بأعراض نقص السكر مثل الضعف، الدوخة، زيادة التعرق، المسارع لإزالة القلب، عدم وضوح الرؤية أو صعوبات في التركيز، أكل أو شرب شيء يحتوي على سكر سيساعدك على التحسن.

التفاعلات مع أدوية أخرى

تناول أو استعمال أدوية أخرى

إذا وجب عليك القيام بحقن مادة ثابينة تحتوي على اليود في دورتك الدوائية مثلاً للفحص بالتصوير الإشعاعي أو فحص السكر يجب إيقاف ميتفورمين وين تناول ميتفورمين وين بعض الوقت قبل وبعد مثل هذا الفحص (انظر "مقرفة" في قسم استعماله). يرجى منكم إخبار طبيكم إذا كنتم تتناولون ميتفورمين وين في نفس الوقت مع أحد الأدوية التالية. قد يكون أيضاً من الضروري مراقبة نسبة السكر في الدم لديكم باستمرار أو ضبط جرعة ميتفورمين وين؛ • مدربات البول (المستعملة لإزالة كمية من الماء من الجسم بزيادة كمية البول المنتج)، • مثالات مستقبلات بيتا 2 - الأدرينالية مثل السالبيتامول أو البروتيونين (المستعمل لعلاج الربو)، • الكورتيكوستيرويدات (المستعملة لعلاج أمراض مختلفة خاصة التهابات الحادة للجلد أو الربو)، • الأدوية الأخرى المستعملة لعلاج داء السكري.

إذا كنت تتناول أو سبق لك أن تناولت مؤخراً دواء آخر بما فيها دواء تم الحصول عليه دون وصفة طبية، تحدث عن ذلك إلى طبيكم أو الصيدلي.

التفاعلات مع المواد الغذائية والمشروبات

المواد الغذائية والمشروبات يجب تجنب استهلاك المشروبات الكحولية في حين تتناول هذا الدواء. الكحول قد تزيد من خطر الحمض اللاكتوزي، خاصة إذا كنت تعاني من فشل الكبد أو إذا كنت تعاني من نقص في التغذية. هذا أيضاً ينطبق أيضاً على الأدوية التي تحتوي على الكحول.

الاستعمال خلال الحمل والرضاعة

الحمل والرضاعة خلال فترة الحمل، مستحاجين الأنسولين لعلاج داء السكري. إبليغي طبيكم إذا كنت حاملاً، تظنين أنك قد تصبحين أو تخططين أن تكوني حاملاً حتى يتمكن من تغيير علاجك. لا ينصح بهذا الدواء إذا كنت ترضعين طفلك أو إذا كنت تتوین القيام به.

تأثير على القدرة على قيادة العربات أو استعمال الآلات قيادة العربات أو استعمال الآلات

استعمال هذا الدواء لوحده لا يؤدي إلى نقص السكر في الدم وبالتالي ليس له أي تأثير على القدرة على قيادة العربات أو استعمال الآلات.

لكن عند تناوله مع مضادات أخرى للسكري منخفضة لنسبة السكر في الدم (السولفاميد

ميتفورمين وين®

كلوريدات الميتفورمين

500 ملغ 850 ملغ 1000 ملغ

عن طريق الفم

قرص ملبس

يرجى الاطلاع على هذه النشرة بأكملها قبل تناول هذا الدواء
احتفظوا بهذه النشرة فقد تحتاجون إلى قراءتها مجدداً.

• لكل استفساراتكم أو في حالة ما إذا كانت لديكم شكوك، اطلبوا مزيداً من المعلومات من طبيبك أو من الصيدلي.
• هذا الدواء وصف لكم شخصياً لا تقدموه أبداً لغير حتى وإن ظننتم لديه نفس الأعراض، فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار به.
• إذا أصبحت بعض الآثار غير مرغوب فيها خطيرة أو إذا لاحظتم بعض الآثار غير مرغوب فيها التي لم يرد ذكرها في هذه النشرة، استشيروا طبيبكم أو الصيدلي.

1. ما هو ميتفورمين وين، قرص ملبس، وما الحالات التي يستعمل فيها؟

الصف الصيدلي للعلاج

ميتفورمين وين يحتوي على الميتفورمين. هذا الدواء يستخدم لعلاج داء السكري. يتنمي إلى فئة الأدوية المسماة بـ"بيكوانايد".

بالإضافة إلى العلاجية المناسبة، هذا الدواء هو مضاد للسكري عن طريق الفم، مخصص بحالة داء السكري من صنف 2.

• عند البالغين: يمكن وصفه لوحده أو مع دواء آخر مضاد للسكري عن طريق الفم أو مع الأنسولين.
• عند الطفل الذي يتجاوز عمره 10 سنوات والمراهقين: يمكن وصفه لوحده أو مع الأنسولين.

يمكن استعمال ميتفورمين وين 1000 ملغ بدل قرصين من ميتفورمين وين 500 ملغ حينما يتطلب العلاج جرعة من 2 أو 3 غرامات يومياً من ميتفورمين.

2. ما المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول ميتفورمين وين، قرص ملبس؟

مضادات الاستعمال

يجب عدم تناول ميتفورمين وين: • إذا كانت لديكم حساسية (حساسية مغرطة) للميتفورمين، أو لأحد المكونات الأخرى المتوفرة في هذا الدواء. (انظر كما المكونات التي تحتوي عليها ميتفورمين وين) • في فترة 6 "معلومات إضافية". • إذا كانت لديكم مشاكل تحتوي عليها ميتفورمين وين: • إذا كان لديكم داء سكري غير منضبط، مصحوب مثلاً بارتفاع شديد لسكر الدم (نسبة السكر مرتفعة جداً في الدم)، غثيان، قيء، جفاف، فقدان سريع للوزن أو ارتفاع الأموية السيروزية. ارتفاع الأموية السيروزية هو مرض يعتمد على تراكم مواد في الدم تسمى "أحماض السيوز" التي يمكن أن تتسبب في مسبق غيبوبة السكري. الأعراض هي: الغثاسون ألم في المعدة، تنفس سريع وعميق، رغبة في النوم أو تنفس من راحة" غير عادية. • إذا كانت قد فقدت الكثير من الماء (جفاف)، على سبيل المثال بـ "• أو حاد، أو إذا تقيأت عدة مرات على التوالي. الجفاف يمكن أن يؤدي إلى تشنجات في خطر الإصابة بالحمض اللاكتوزي (انظر مع) • إذا كانت لديكم إصابة حادة، مثلاً إصابة

الرئتين أو في الكلى • وين • يمكن أن يضعف • كثر • صعوبات في الس • الذي يمكن أن يضعف • ميتفورمين وين • إذا كانت • إذا كانت أي من الحالات المذكورة أعلاه تنسب • تناول هذا الدواء.



المرجو الأخذ بعين الاعتبار للخطر الخاص التالي للحمض اللاكتوزي

يمكن أن يتسبب الميتفورمين وين في مضاعفة نادرة جداً لكنها خطيرة تسمى الحمض اللاكتوزي، خاصة إذا كانت الكلبيثين لا تعملان بشكل صحيح. خطر الحمض اللاكتوزي يمكن أن يزيد في حالة داء سكري غير منضبط، صوم مطول أو شرب الكحول. أعراض الحمض اللاكتوزي هي القيء، آلام البطن مع تشنجات عضلية، شعور بقاء عام مع تعب شديد وصعوبات في التنفس. إذا وجدت نفسك في هذه الحالة، قد تحتاج إلى الإستشفاء على الفور لتلقي العلاج لأن الحمض اللاكتوزي يمكن أن يؤدي إلى غيبوبة. توقف فوراً عن تناول ميتفورمين وين والاتصال فوراً بالطبيب أو أقرب مستشفى.

ميتفورمين وين وحده لا يتسبب في نقص السكر في الدم (نسبة السكر في الدم منخفضة جداً). ومع ذلك، إذا كنت تتناول ميتفورمين وين في نفس الوقت مع أدوية أخرى لعلاج داء السكري والتي يمكن أن تتسبب في نقص السكر الدم (مثل السولفاميدات المنخفضة لنسبة السكر الدم، الأنسولين، ميثيغليدين)، هناك خطر لنقص السكر الدم. إذا أحسست بأعراض نقص السكر الدم مثل الضعف، الدوخة، زيادة التعرق، المسارع لإزالة القلب، عدم وضوح الرؤية أو صعوبات في التركيز، أكل أو شرب شيء يحتوي على سكر سيساعدك على التحسن.

التفاعلات مع أدوية أخرى

تناول أو استعمال أدوية أخرى

إذا وجب عليك القيام بحقن مادة ثابينة تحتوي على اليود في دورتك الدوائية مثلاً للفحص بالتصوير الإشعاعي أو فحص السكر يجب إيقاف ميتفورمين وين تناول ميتفورمين وين بعض الوقت قبل وبعد مثل هذا الفحص (انظر "مقرفة" في قسم استعماله). يرجى منكم إخبار طبيبك إذا كنتم تتناولون ميتفورمين وين في نفس الوقت مع أحد الأدوية التالية. قد يكون أيضاً من الضروري مراقبة نسبة السكر في الدم لديكم باستمرار أو ضبط جرعة ميتفورمين وين: • مدرات البول (المستعملة لإزالة كمية من الماء من الجسم بزيادة كمية البول المنتج)، • مثاللات مستقبلات بيتا 2 - الأدرينالية مثل الساليميتامول أو البروبيوتيك (المستعمل لعلاج الربو)، • الكورتيكوستيرويدات (المستعملة لعلاج أمراض مختلفة خاصة التهابات الحادة للجلد أو الربو)، • الأدوية الأخرى المستعملة لعلاج داء السكري.

إذا كنت تتناول أو سبق لك أن تناولت مؤخراً دواء آخر بما فيها دواء تم الحصول عليه دون وصفة طبية، تحدث عن ذلك إلى طبيبك أو الصيدلي.

التفاعلات مع المواد الغذائية والمشروبات

المواد الغذائية والمشروبات يجب تجنب استهلاك المشروبات الكحولية في حين تتناول هذا الدواء. الكحول قد تزيد من خطر الحمض اللاكتوزي، خاصة إذا كنت تعاني من فشل الكبد أو إذا كنت تعاني من نقص في التغذية. هذا أيضاً ينطبق أيضاً على الأدوية التي تحتوي على الكحول.

الاستعمال خلال الحمل والرضاعة

الحمل والرضاعة خلال فترة الحمل، مستحاجين الأنسولين لعلاج داء السكري. إبغني طبيبك إذا كنت حاملاً، تظنين أنك قد تصبحين أو تخططين أن تكوني حاملاً حتى يتمكن من تغيير علاجك. لا ينصح بهذا الدواء إذا كنت ترضعين طفلك أو إذا كنت تتوئين القيام به.

تأثير على القدرة على قيادة العربات أو استعمال الآلات قيادة العربات أو استعمال الآلات

إستعمال هذا الدواء لوحده لا يؤدي إلى نقص السكر في الدم وبالتالي ليس له أي تأثير على القدرة على قيادة العربات أو استعمال الآلات.

لكن عند تناوله مع مضادات أخرى للسكري منخفضة لنسبة السكر في الدم (السولفاميد

ميتفورمين وين®

كلوريدات الميتفورمين

500 ملغ 850 ملغ 1000 ملغ

عن طريق الفم

قرص ملبس

يرجى الاطلاع على هذه النشرة بأكملها قبل تناول هذا الدواء
احتفظوا بهذه النشرة فقد تحتاجون إلى قراءتها مجدداً.

• لكل استفساراتكم أو في حالة ما إذا كانت لديكم شكوك، اطلبوا مزيداً من المعلومات من طبيبك أو من الصيدلي.
• هذا الدواء وصف لكم شخصياً لا تقدموه أبداً لغير حتى وإن ظننتم لديه نفس الأعراض، فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار به.
• إذا أصبحت بعض الآثار غير مرغوب فيها خطيرة أو إذا لاحظتم بعض الآثار غير مرغوب فيها التي لم يرد ذكرها في هذه النشرة، استشيروا طبيبكم أو الصيدلي.

1. ما هو ميتفورمين وين، قرص ملبس، وما الحالات التي يستعمل فيها؟

الصف الصيدلي للعلاج

ميتفورمين وين يحتوي على الميتفورمين. هذا الدواء يستخدم لعلاج داء السكري. يتنمي إلى فئة الأدوية المسماة بـ"بيكوانايد".

بالإضافة إلى العلاجية المناسبة، هذا الدواء هو مضاد للسكري عن طريق الفم، مخصص بحالة داء السكري من صنف 2.

• عند البالغين: يمكن وصفه لوحده أو مع دواء آخر مضاد للسكري عن طريق الفم أو مع الأنسولين.
• عند الطفل الذي يتجاوز عمره 10 سنوات والمراهقين: يمكن وصفه لوحده أو مع الأنسولين.

يمكن استعمال ميتفورمين وين 1000 ملغ بدل قرصين من ميتفورمين وين 500 ملغ حينما يتطلب العلاج جرعة من 2 أو 3 غرامات يومياً من ميتفورمين.

2. ما المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول ميتفورمين وين، قرص ملبس؟

مضادات الاستعمال

يجب عدم تناول ميتفورمين وين: • إذا كانت لديكم حساسية (حساسية مغرطة) للميتفورمين، أو لأحد المكونات الأخرى المتوفرة في هذا الدواء. (انظر كما المكونات التي تحتوي عليها ميتفورمين وين). • في فترة 6 "معلومات إضافية". • إذا كانت لديكم مشاكل تحتوي عليها ميتفورمين وين: • إذا كان لديكم داء سكري غير منضبط، مصحوب مثلاً بارتفاع شديد لسكر الدم (نسبة السكر مرتفعة جداً في الدم)، غثبان، قي، جفاف، فقدان سريع للوزن أو ارتفاع الأموية السيروزية. ارتفاع الأموية السيروزية هو مرض يعتمد على تراكم مواد في الدم تسمى "أحماض السيوز" التي يمكن أن تتسبب في مسبق غيبوبة السكري. الأعراض هي: الغثاسون ألم في المعدة، تنفس سريع وعميق، رغبة في النوم أو تنفس من راحة" غير عادية. • إذا كانت قد فقدت الكثير من الماء (جفاف)، على سبيل المثال بـ "• أو حاد، أو إذا تقيأت عدة مرات على التوالي. الجفاف يمكن أن يؤدي إلى تشنجات في خطر الإصابة بالحمض اللاكتوزي (انظر مع) • إذا كانت لديكم إصابة حادة، مثلاً إصابة

الرئتين أو في الكلى • وين • يمكن أن يضعف • كثر • صعوبات في الس • الذي يمكن أن يضعف • ميتفورمين وين • إذا كانت • إذا كانت أي من الحالات المذكورة أعلاه تنسب • تناول هذا الدواء.



يرجى استشارة طبيبكم إذا: • وجب عليكم القيام بفحص بالتصوير الإشعاعي أو فحص السكاكين التي قد تتطلب حقن مادة تباين محتوية على اليود في البود في دورتك الدوائية. • وجب عليكم الخضوع لعملية جراحية كبرى.

يجب التوقف عن تناول ميتفورمين وين بعض الوقت قبل وبعد هذه الفحوصات أو العمليات الجراحية. سيقوم طبيبكم بتحديد ما إذا كنت بحاجة أو لا إلى استبدال العلاج خلال هذه الفترة. من الضروري أن تتبع بدقة تعليمات طبيبكم.

احتياطات الاستعمال: تحذيرات خاصة

يجب الانتباه قبل تناول ميتفورمين وين:

المرجو الأخذ بعين الاعتبار للخطر الخاص التالي للحمض اللاكتوزي

يمكن أن يتسبب الميتفورمين وين في مضاعفة نادرة جداً لكنها خطيرة تسمى الحمض اللاكتوزي، خاصة إذا كانت الكلينين لا تعملان بشكل صحيح. خطر الحمض اللاكتوزي يمكن أن يزيد في حالة داء سكري غير منضبط، صوم مطول أو شرب الكحول. أعراض الحمض اللاكتوزي هي القي، آلام البطن مع تشنجات عضلية، شعور بقاء عام مع تعب شديد وصعوبات في التنفس. إذا وجدت نفسك في هذه الحالة، قد تحتاج إلى الإستشفاء على الفور لتلقي العلاج لأن الحمض اللاكتوزي يمكن أن يؤدي إلى غيبوبة. توقف فوراً عن تناول ميتفورمين وين والاتصال فوراً بالطبيب أو أقرب مستشفى.

ميتفورمين وين وحده لا يتسبب في نقص السكر في الدم (نسبة السكر في الدم منخفضة جداً). ومع ذلك، إذا كنت تتناول ميتفورمين وين في نفس الوقت مع أدوية أخرى لعلاج داء السكري والتي يمكن أن تتسبب في نقص السكر الدم (مثل السولفاميدات المنخفضة لنسبة السكر الدم، الأنسولين، ميثيدين، هناك خطر لنقص السكر الدم. إذا أحسست بأعراض نقص السكر الدم مثل الضعف، الدوخة، زيادة التعرق، المسارع لإزالة القلب، عدم وضوح الرؤية أو صعوبات في التركيز، أكل أو شرب شيء يحتوي على سكر سيساعدك على التحسن.

التفاعلات مع أدوية أخرى

تناول أو استعمال أدوية أخرى

إذا وجب عليكم القيام بفحص مادة تباين تحتوي على اليود في دورتك الدوائية مثلاً للفحص بالتصوير الإشعاعي أو فحص السكاكين يجب التوقف عن تناول ميتفورمين وين بعض الوقت قبل وبعد مثل هذا الفحص. (انظر "فترة توقف عن استعمال ميتفورمين"). يرجى منكم إخبار طبيبكم إذا كنتم تتناولون ميتفورمين وين في نفس الوقت مع أحد الأدوية التالية. قد يكون أيضاً من الضروري مراقبة نسبة السكر في الدم لديكم باستمرار أو ضبط جرعة ميتفورمين وين: • مدرات البول (المستعملة لإزالة كمية من الماء من الجسم بزيادة كمية البول المنتجة)، • مثاللات مستقبلات بيتا 2 - الأدرينالية مثل الساليميتامول أو البروبيوتيك (المستعمل لعلاج الربو)، • الكورتيكوستيرويدات (المستعملة لعلاج أمراض مختلفة خاصة التهابات الحادة للجلد أو الربو)، • الأدوية الأخرى المستعملة لعلاج داء السكري.

إذا كنت تتناول أو سبق لك أن تناولت مؤخراً دواء آخر بما فيها دواء تم الحصول عليه دون وصفة طبية، تحدث عن ذلك إلى طبيبكم أو الصيدلي.

التفاعلات مع المواد الغذائية والمشروبات

المواد الغذائية والمشروبات يجب تجنب استهلاك المشروبات الكحولية في حين تتناول هذا الدواء. الكحول قد تزيد من خطر الحمض اللاكتوزي، خاصة إذا كنت تعاني من فشل الكبد أو إذا كنت تعاني من نقص في التغذية. هذا ينطبق أيضاً على الأدوية التي تحتوي على الكحول.

الاستعمال خلال الحمل والرضاعة

الحمل والرضاعة خلال فترة الحمل، مستحاجين الأنسولين لعلاج داء السكري. إبغني طبيبكم إذا كنت حاملاً، تظنين أنك قد تصبحين أو تخططين أن تكوني حاملاً حتى يتمكن من تغيير علاجك. لا ينصح بهذا الدواء إذا كنت ترضعين طفلك أو إذا كنت تتوین القيام به.

تأثير على القدرة على قيادة العربات أو استعمال الآلات قيادة العربات أو استعمال الآلات

استعمال هذا الدواء لوحده لا يؤدي إلى نقص السكر في الدم وبالتالي ليس له أي تأثير على القدرة على قيادة العربات أو استعمال الآلات.

لكن عند تناوله مع مضادات أخرى للسكري منخفضة لنسبة السكر في الدم (السولفاميد