

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
12 13 SEPT 2020			1200 Dhs	INP : 091162414391 Dr. KABLY Amal E.P. DRIS Gynécologue Obstétricien 183 Bd Oum Rabii, Rés. Oum R Assurance TEL 05 22 88 77

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	26/09	349185

ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

	COEFFICIENT DES TRAVAUX
	MONTANTS DES SOINS
	DEBUT D'EXECUTION
	FIN D'EXECUTION
	COEFFICIENT DES TRAVAUX
	MONTANTS DES SOINS
	DATE DU DEVIS
	DATE DE L'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
	H 25533412 21433552 00000000 00000000 D 00000000 00000000 35533411 11433553 G B
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession
	VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS
	VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



Suivi de grossesse - Accouchement
Stérilité du Couple - Maladies des seins
Chirurgie gynécologique - Echographie
- Ménopause

مراقبة الحمل - التوليد
عقم الزوجين - أمراض الشדי
جراحة أمراض النساء - الفحص بالصدى
- سن اليأس

الدار البيضاء في Casablanca le **SEPT 20**

26 SEPT 2020

193، شارع أم الريـع، إقـامة أم الـريع، الطـابق الأول (ـبـجانـب مـختـبر أـربـيوـ) - الدـار البيـضاـءـ

193, Boulevard Oum Rabiaa, Résidence Oum Rabiaa, 1er étage (à côté du laboratoire ORBIO) - Casablanca

البريد الإلكتروني : E-mail : amalkably@hotmail.com - الهاتف : 05 22 89 77 72 - 07 62 75 05 75 - Tél. : 05 22 89 77 72 - 07 62 75 05 75

51- 79.9r
oxanthine (n° 1).
100 + 216 mg 100



Dr. KABLY Anesth. DRISSI
Gynécologue Obstétricienne
153 Bd Oum Rabih Rés. Oum Rabih
Assurance Tel 05 22 69 17 72



Mynazol® 150 mg

Lot N° :

Exp :

PPV :

24,00

ce
ites pour

otre

onnez pas

maladie sont identiques aux vôtres.

- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

- 1 - Qu'est-ce que Mynazol 150 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
- 2 - Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Mynazol 150 mg, gélule ?
- 3 - Comment prendre Mynazol 150 mg, gélule ?
- 4 - Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5 - Comment conserver Mynazol 150 mg, gélule ?
- 6 - Contenu de l'emballage et autres informations.

1 - Qu'est-ce que Mynazol 150 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?

Classe pharmacothérapeutique : Antimycosiques à usage systémique, dérivé triazole - code ATC : J02AC01.

Mynazol fait partie d'un groupe de médicaments appelés « antifongiques ». La substance active est le fluconazole.

Mynazol est utilisé chez l'adulte pour traiter les infections dues à des champignons. La cause la plus fréquente des infections fongiques est une levure appelée *Candida*.

Votre médecin pourra vous prescrire ce médicament pour traiter une myose génitale, une infection du vagin ou du pénis.

2 - Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Mynazol 150 mg, gélule ?

Ne prenez jamais Mynazol 150 mg, gélule :

- Si vous êtes allergique au fluconazole, aux autres médicaments que vous avez pris pour traiter des infections fongiques ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6. Les symptômes peuvent être de type démangeaisons, rougeur de la peau ou difficultés à respirer
 - Si vous prenez de l'astémizole, de la terfénadine (médicaments antihistaminiques utilisés pour traiter les allergies)
 - Si vous prenez du cisapride (utilisé pour les maux d'estomac)
 - Si vous prenez du pimozide (utilisé pour traiter des troubles mentaux)
 - Si vous prenez de la quinidine (utilisée pour traiter les troubles du rythme cardiaque)
 - Si vous prenez de l'érythromycine (antibiotique pour traiter les infections).
- Avertissements et précautions :**
- Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Mynazol
- Si vous avez des problèmes de foie ou de rein
 - Si vous souffrez d'une maladie du cœur, y compris des troubles du rythme cardiaque
 - Si vous avez des taux anormaux de potassium, de calcium ou de magnésium dans le sang
 - Si vous développez des réactions cutanées graves (démangeaisons, rougeurs de la peau ou des difficultés à respirer)

• Si vous développez des signes d'insuffisance surrenale, un trouble dans lequel les glandes surrenales produisent des quantités insuffisantes de certaines hormones stéroïdiennes comme le cortisol (fatigue chronique ou prolongée, faiblesse musculaire, perte d'appétit, perte de poids, douleurs abdominales).

Enfants et adolescents :

Bien que ce médicament soit destiné à l'adulte, il peut être utilisé chez l'adolescent (entre 12 et 17 ans) lorsqu'il est essentiel et qu'il n'existe aucune alternative thérapeutique adéquate. Il doit être pris de la même façon que chez l'adulte.

Autres médicaments et Mynazol 150 mg, gélule :

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

Prévenez immédiatement votre médecin si vous prenez de l'astémizole, de la terfénadine (un antihistaminique pour traiter les allergies) ou du cisapride (utilisé pour les maux d'estomac) ou du pimozide (utilisé pour traiter les troubles mentaux) ou la quinidine (utilisée pour traiter les arythmies cardiaques) ou de l'érythromycine (un antibiotique pour traiter les infections) car ces produits ne doivent pas être pris avec Mynazol (voir la rubrique « Ne prenez jamais Mynazol »).

Certains médicaments peuvent interagir avec Mynazol. Veillez à prévenir votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- Rifampicine ou rifabutine (antibiotiques destinés à traiter les infections)
 - Alfentanil, fentanyl (utilisés comme anesthésiques)
 - Amitriptyline, nortriptyline (utilisés comme antidépresseurs)
 - Amphotéricine B, voriconazole (antifongiques)
 - Médicaments qui fluidifient le sang afin d'éviter la formation de caillots sanguins (warfarine ou médicaments similaires)
 - Benzodiazépines (midazolam, triazolam ou médicaments similaires) utilisées pour vous aider à dormir ou pour soulager une anxiété
 - Carbamazépine, phénytoïne (utilisées pour traiter les crises d'épilepsie)
 - Nifédipine, isradipine, amlodipine, vérapamil, fédipine et losartan (contre l'hypertension artérielle)
 - Olaparib (utilisé pour traiter le cancer ovarien)
 - Ciclosporine, évrémolimus, sirolimus ou tacrolimus (pour prévenir le rejet du greffon)
 - Cyclophosphamide, vinca-alcaloïdes (vincristine, vinblastine ou médicaments similaires) utilisés pour traiter le cancer
 - Halofantrine (utilisée pour traiter le paludisme)
 - Statines (atorvastatine, simvastatine et fluvastatine ou médicaments similaires) utilisées pour réduire l'hypercholestérolémie
 - Méthadone (utilisé contre les douleurs)
 - Cétoépoxine, flurbiprofène, naproxène, ibuprofène, lornoxicam, méloxicam, diclofénac (anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS))
 - Contraceptifs oraux
 - Prednisone (corticoïde)
 - Zidovudine, également connue sous le nom d'AZT ; saquinavir (utilisé chez les patients infectés par le VIH)
 - Médicaments contre le diabète tels que le chloropropamide, le glibenclamide, le glipizide ou le tolbutamide
 - Théophylline (utilisée pour contrôler l'asthme)
 - Tofacitinib (utilisé pour traiter la polyarthrite rhumatoïde)
 - Vitamine A (complément nutritionnel)
 - Ivacafor (utilisé pour traiter la mucoviscidose)
 - Amiodarone (utilisée pour traiter les battements cardiaques irréguliers ou arythmies)
 - Hydrochlorothiazide (un diurétique).
- Mynazol 150 mg, gélule avec des aliments et boissons :**
- Vous pouvez prendre votre médicament au cours ou en dehors des repas.
- Grossesse, allaitement et fertilité :**
- Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou

Mynazol® 150 mg

Lot N° :

Exp :

PPV :

24,00

ce
ites pour

otre

onnez pas

maladie sont identiques aux vôtres.

- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

- 1 - Qu'est-ce que Mynazol 150 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
- 2 - Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Mynazol 150 mg, gélule ?
- 3 - Comment prendre Mynazol 150 mg, gélule ?
- 4 - Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5 - Comment conserver Mynazol 150 mg, gélule ?
- 6 - Contenu de l'emballage et autres informations.

1 - Qu'est-ce que Mynazol 150 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?

Classe pharmacothérapeutique : Antimycosiques à usage systémique, dérivé triazole - code ATC : J02AC01.

Mynazol fait partie d'un groupe de médicaments appelés « antifongiques ». La substance active est le fluconazole.

Mynazol est utilisé chez l'adulte pour traiter les infections dues à des champignons. La cause la plus fréquente des infections fongiques est une levure appelée *Candida*.

Votre médecin pourra vous prescrire ce médicament pour traiter une myose génitale, une infection du vagin ou du pénis.

2 - Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Mynazol 150 mg, gélule ?

Ne prenez jamais Mynazol 150 mg, gélule :

- Si vous êtes allergique au fluconazole, aux autres médicaments que vous avez pris pour traiter des infections fongiques ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6. Les symptômes peuvent être de type démangeaisons, rougeur de la peau ou difficultés à respirer
 - Si vous prenez de l'astémizole, de la terfénadine (médicaments antihistaminiques utilisés pour traiter les allergies)
 - Si vous prenez du cisapride (utilisé pour les maux d'estomac)
 - Si vous prenez du pimozide (utilisé pour traiter des troubles mentaux)
 - Si vous prenez de la quinidine (utilisée pour traiter les troubles du rythme cardiaque)
 - Si vous prenez de l'érythromycine (antibiotique pour traiter les infections).
- Avertissements et précautions :**
- Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Mynazol
- Si vous avez des problèmes de foie ou de rein
 - Si vous souffrez d'une maladie du cœur, y compris des troubles du rythme cardiaque
 - Si vous avez des taux anormaux de potassium, de calcium ou de magnésium dans le sang
 - Si vous développez des réactions cutanées graves (démangeaisons, rougeurs de la peau ou des difficultés à respirer)

• Si vous développez des signes d'insuffisance surrenale, un trouble dans lequel les glandes surrenales produisent des quantités insuffisantes de certaines hormones stéroïdiennes comme le cortisol (fatigue chronique ou prolongée, faiblesse musculaire, perte d'appétit, perte de poids, douleurs abdominales).

Enfants et adolescents :

Bien que ce médicament soit destiné à l'adulte, il peut être utilisé chez l'adolescent (entre 12 et 17 ans) lorsqu'il est essentiel et qu'il n'existe aucune alternative thérapeutique adéquate. Il doit être pris de la même façon que chez l'adulte.

Autres médicaments et Mynazol 150 mg, gélule :

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

Prévenez immédiatement votre médecin si vous prenez de l'astémizole, de la terfénadine (un antihistaminique pour traiter les allergies) ou du cisapride (utilisé pour les maux d'estomac) ou du pimozide (utilisé pour traiter les troubles mentaux) ou la quinidine (utilisée pour traiter les arythmies cardiaques) ou de l'érythromycine (un antibiotique pour traiter les infections) car ces produits ne doivent pas être pris avec Mynazol (voir la rubrique « Ne prenez jamais Mynazol »).

Certains médicaments peuvent interagir avec Mynazol. Veillez à prévenir votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- Rifampicine ou rifabutine (antibiotiques destinés à traiter les infections)
- Alfentanil, fentanyl (utilisés comme anesthésiques)
- Amitriptyline, nortriptyline (utilisés comme antidépresseurs)
- Amphotéricine B, voriconazole (antifongiques)
- Médicaments qui fluidifient le sang afin d'éviter la formation de caillots sanguins (warfarine ou médicaments similaires)
- Benzodiazépines (midazolam, triazolam ou médicaments similaires) utilisées pour vous aider à dormir ou pour soulager une anxiété
- Carbamazépine, phénytoïne (utilisées pour traiter les crises d'épilepsie)
- Nifédipine, isradipine, amlodipine, vérapamil, fédipine et losartan (contre l'hypertension artérielle)
- Olaparib (utilisé pour traiter le cancer ovarien)
- Ciclosporine, évrémolimus, sirolimus ou tacrolimus (pour prévenir le rejet du greffon)
- Cyclophosphamide, vinca-alcaloïdes (vincristine, vinblastine ou médicaments similaires) utilisés pour traiter le cancer
- Halofantrine (utilisée pour traiter le paludisme)
- Statines (atorvastatine, simvastatine et fluvastatine ou médicaments similaires) utilisées pour réduire l'hypercholestérolémie
- Méthadone (utilisé contre les douleurs)
- Cétoépoxine, flurbiprofène, naproxène, ibuprofène, lornoxicam, méloxicam, diclofénac (anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS))
- Contraceptifs oraux
- Prednisone (corticoïde)
- Zidovudine, également connue sous le nom d'AZT ; saquinavir (utilisé chez les patients infectés par le VIH)
- Médicaments contre le diabète tels que le chloropropamide, le glibenclamide, le glipizide ou le tolbutamide
- Théophylline (utilisée pour contrôler l'asthme)
- Tofacitinib (utilisé pour traiter la polyarthrite rhumatoïde)
- Vitamine A (complément nutritionnel)
- Ivacafor (utilisé pour traiter la mucoviscidose)
- Amiodarone (utilisée pour traiter les battements cardiaques irréguliers ou arythmies)
- Hydrochlorothiazide (un diurétique).

Mynazol 150 mg, gélule avec des aliments et boissons :

Vous pouvez prendre votre médicament au cours ou en dehors des repas.

Grossesse, allaitement et fertilité :

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou

DERMOFIX® Crème

Sertaconazole

Composition :

Sertaconazole nitrate
Excipients (dont E218 & Acide sorbique)

LIST 11004
FERR 04/23
POV 070820

87,30

Propriétés :

Le Sertaconazole est un anti-mycosique à usage topique. Son spectre d'activité s' étend sur :
- levures pathogènes (*Candida albicans*, *C. tropicalis*, *C. spp.*, *Pityrosporum orbiculare*),
- dermatopigments (*Trichophyton*, *Epidermophyton* et *Microsporum*)
- champignons opportunistes filamentueux (*Aspergillus*)
- germes résistants à d'autres anti-mycosiques
- bactéries gram+ (*Staphylocoques* et *Streptocoques*)

Indications thérapeutiques :

Traitements topiques des mycoses superficielles de la peau telles que dermatophytoses : *Tinea pedis* (pied d'athlète), *Tinea cruris* (Eczéma marginé de Hebra), *Tinea corporis* (Herpès circiné), *Tinea barbae* (Sycosis), et *Tinea manus*, *Candidoses* (Minilose) et *Pityriasis versicolor* (*Pityrosporum orbiculare*).

Effets indésirables :

Le Sertaconazole présente une innocuité totale et une excellente tolérance : aucun cas de toxicité ou de réaction de photosensibilité n'a été relevé. Seul un érythème léger peut survenir lors des premières applications n'entraînant jamais la suspension du traitement.

Conditions particulières d'emploi :

Dermofix ne convient pas à l'usage ophthalmique.

Après l'application dermique de grandes quantités, on ne détecte pas de niveaux plasmatiques. Malgré cela, son innocuité n'a pas été démontrée chez le nouveau-né et chez la femme enceinte ou allaitante.

Posologie usuelle, voie et mode d'administration :

Voie topique.

Appliquer la crème une fois par jour (de préférence le soir) ou deux fois (matin et soir), doucement et uniformément, en essayant de couvrir 1 cm de peau saine (environ) autour de la zone à traiter.

La durée du traitement varie d'un patient à l'autre en fonction de l'agent étiologique et de la localisation de l'infection.

En général, on recommande quatre semaines de traitement afin d'assurer une guérison clinique et microbiologique complète et d'éviter ainsi toute récidive, cette guérison clinico-microbiologique peut apparaître entre deux et quatre semaines de traitement.

Pityriasis versicolor : 2 semaines

Dermatophytose : 2 à 4 semaines

Candidose : 2 à 4 semaines

Formes et autres présentations :

Dermofix® crème 2% tube de 30 g

Dermofix® poudre flacon de 30 g

Dermofix® Solution 2% flacon de 30 ml

Dermofix® Gel 2% flacon de 50 g

Dermofix® Gel 2% flacon de 100 g

Gyno-dermofix® 300 mg boîte de 1 ovule.

Liste I (Tableau A)

PROMOPHARM S.A.
Z.I. du Sahel, Had Soualem - Maroc
S/L FERRER INTERNATIONAL

أولاً كملغ

Deva
Pharmaceutique

سلوراتادين

LOT : M0346
PER : 04/2022
PPU : 51,90DH

من سرير

الرجاء فراغة النشرة كاملة ويعتبر قيل البدع بتناول الدواء

- احتفظ بهذه النشرة قيد الحتاج إلى فراغتها من جديد

- إذا كان لديك إيسبراس أو شوك اطلب الريه من المعلومات إلى طبيبك أو الصيدلاني

- يوصي هذا الدواء لك شخصياً لعدمه إلزامي شخص آخر حتى ولو كان لديه نفس الأعراض التي لديك لأنك من الممكن أن يضر به

- إذا أصبحت بعض الآثار الجانبية خطيرة أو ألحظت آثار جانبية لم يتم ذكرها في هذه النشرة فالرجو إيجار الطبيب أو الصيدلاني

في هذه النشرة

1- ماهو أولاًورا وما هي حالات استعماله

2- المعلومات التي يجب معرفتها قبل البدع بتناول الدواء

3- كيفية تناول أولاًورا

4- ماهي التأثيرات غير المرغوبية المحتملة

5- طريقة حفظ أولاًورا

6- معلومات إضافية

1- ماهو أولاًورا وما هي حالات استعماله؟

أولاًورا دواء مضاد للحساسية لا يسبب لك التهاب. يساعد على ضبط رد الفعل الاستهابية لديك

وأعراضها

أولاًورا يخفف الأعراض المصاحبة للتهاب مخاطية الأنف الاستهدافي (التهاب أنفٍ ناجٍ عن الحساسية مثل الربو وحساسية القراديات) ومنها العطاس. سيلان الأنف وحكة الأنف. حكة سقف الفم. حكة العيون إحمارها وندعوها.

يستخدم أولاًورا أيضاً لتحفيظ الأعراض الناجمة عن طفح جلدي مثل الحكة والطفح الجلدي. يدوم مفعول الدواء في تخفيف الأعراض يوماً كاملاً ما يساعدك على منابعة أعمالك اليومية بشكل طبيعي. كما يحافظ على نومك.

2- المعلومات التي يجب أن تعرفها قبل البدع بتناول أولاًورا

لا تتناول أبداً أولاًورا :

• إذا كان لديك حساسية زائدة تجاه الديسلوراتادين أو إخاه إحدى مكونات أولاًورا الأخرى أو اللوراتادين. يوصي أولاًورا للبالغين والراهفين (12 سنة أو أكثر من العمر).

إثنين أبناء العلاج بأولاًورا

• إذا كنت تعاني من مرض كلوي

إذا كان الأمر يهمك أو لديك أي شك إستشر طبيبك

تناول أدوية أخرى

لا توجد تفاعلات معروفة بين أولاًورا وأدوية أخرى

الغذاء والمشروبات

يمكن تناول أولاًورا أثناء الوجبات أو خارجها

الحمل والرضاعة

يستشيري طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء أثناء فترة الحمل أو في فترة الرضاع

إذا كنت حاملاً لا ينصح بتناول أولاًورا

أثناء فترة الرضاع لا ينصح بتناول أولاًورا

قيادة السيارات واستخدام الآلات

تناول الكمية الموصوفة من أولاًورا لا تسبب بشكل عام التهاب. ولا نقلل من البقطة مع ذلك، سجلت حالات

نادرة جداً من التهاب قد تأثر على الكفاءات في القيادة واستخدام الآلات.

معلومة: هذه نشرة ملخص معلومات من المنشورة



Comprimé
Voie orale

Oxantin®

À base d'actifs naturels

Lot n°: 200192
À consommer de
préférence avant le : 04/2023
PPC : 79,95 DH

Oxantin®
À base d'actifs naturels

FORME ET PRESENTATION :

Comprimé, boite de 30.

COMPOSITION (par comprimé) :

Wakamé: (Undaria pinnatifida) poudre, Rhubarbe: racine (Rheum palmatum, Rheum officinale) extrait sec, cellulose, Pissenlit: racine (Taraxacum officinale) extrait sec, Fructo-oligosaccharides, Cerise: pédoncule (Prunus avium) extrait sec, anti-agglomérant: dioxyde de silice; magnésium stéarate.

PROPRIETES :

OXANTIN® est à base d'actifs naturels agissant en synergie pour lutter contre le ballonnement et la constipation et améliorer la digestion tout en reconstituant la flore intestinale.

UTILISATIONS :

OXANTIN® est recommandé en cas de ballonnement, de constipation et de Troubles Fonctionnels Intestinaux.

MODE D'UTILISATION :

- 1 à 2 comprimés 2 fois par jour, avec un verre d'eau avant les repas.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament .

- Respecter la dose journalière conseillée.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants.
- A conserver au sec et à l'abri de la lumière.

Fabriqué par PHARMALIFE RESEARCH Italie.

Importé et distribué au Maroc par MEDIPRO.

Autorisation ministère de santé n° : DA2012 090 6183 DMP/21/MA1

Autorisation sanitaire ONSSA n° : ES.5.229.16

