

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
11/11/2011	Visite de suivi	1	100	Prise en charge par le Professeur Dr. M. A. As-Sabri Rue des Martyrs 10, Bld d'Anfa - Casablanca Tél: 0522 94 61 61
12/11/2011				

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Punjab OUTLET Radhi Jira	05/11/2008	1724,00 DAIS

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 D 00000000 35533411	G 21433552 00000000 00000000 11433553	B	COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET GACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

PROFESSEUR DRISS JAMIL

Maladies de l'appareil Digestif

Foie - Estomac - Intestins

Endoscopie digestive - Echographie

Proctologie Medico-Chirurgicale

Membre de la société Française de coloproctologie

Membre de la société Française d'endoscopie Digestive

casablanca le,

5/11/20

SAIDI Abdelhafid

TEFOVIR 300

matin, penda

1 comprimé le matin, pendant 6 mois

289,00 x 6

1734, 00 DTH

أقى تأثير و انتشار
أشار على انتها . الدارالطباطبائية
26/1/1941 0:22:51

Pharmacie du Jura
TAHRI JOUTFI Rachid
129, BIS Rue Oussama Benyamin
Casablanca - TEL. 05 22 25 24 41

Tefovir® Pharma 5

Ténofovir Disoproxil Fumarate

300 mg

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable, non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que TEOFIVR Pharma 5 et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TEOFIVR Pharma 5 ?
3. Comment prendre TEOFIVR Pharma 5 ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TEOFIVR Pharma 5 ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

Si TEOFIVR Pharma 5 a été prescrit à votre enfant, veuillez considérer que les informations contenues dans cette notice concernant votre enfant (dans ce cas, veuillez lire « votre enfant » au lieu de « vous »).

1. QU'EST-CE QUE TEOFIVR Pharma 5 ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

TEFOIVR Pharma 5 contient une substance active appelée Ténofovir disoproxil fumarate. Cette substance est un médicament *antirétroviral* ou antiviral utilisé pour traiter l'infection par le VIH, par le VHB ou par les deux. Le ténofovir est un *inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse* généralement appelé INTI et agit en interférant avec le mécanisme d'action de certaines enzymes (dans le cas du VIH la *transcriptase inverse* ; dans le cas de l'hépatite B la *ADN polymérase*) essentielles à la reproduction des virus. Dans le cas du VIH, TEOFIVR Pharma 5 doit toujours être utilisé en association avec d'autres médicaments pour le traitement de l'infection par le VIH.

TEFOIVR Pharma 5 300 mg comprimés est utilisé pour traiter l'infection par le VIH (virus de l'immunodéficience humaine). Les comprimés conviennent :

- aux adultes
- aux adolescents âgés de 12 à moins de 18 ans ayant déjà été traités par d'autres médicaments contre le VIH qui ne sont plus totalement efficaces suite au développement d'une résistance ou ayant causé des effets indésirables.

TEFOIVR Pharma 5 300 mg comprimés est également utilisé pour traiter l'hépatite B dans les cas d'infection par le VHB chez les

- Veuillez informer votre médecin si vous avez des antécédents de maladie du foie, y compris une hépatite. Les patients ayant une hépatite chronique B ou C et traités par TEOFIVR Pharma 5 peuvent avoir un risque plus élevé de complications potentiellement fatales. Si vous prenez TEOFIVR Pharma 5 avec attention le traitement des antécédents de maladie du foie, votre médecin peut vous prescrire des médicaments pour prévenir les complications.

• **Faites attention aux infections.** Si vous présentez une infection par le VIH à un stade avancé (SIDA) et vous avez une infection, vous pouvez développer des symptômes d'inflammation ou d'infection ou aggraver des symptômes de l'infection existante dès que vous commencez à prendre TEOFIVR Pharma 5. Ces symptômes peuvent indiquer une amélioration de la réponse immunitaire permettant à l'organisme de combattre l'infection. Veuillez aux signes d'inflammation ou d'infection que vous commencez à prendre TEOFIVR Pharma 5. Si vous remarquez des symptômes d'inflammation ou d'infection, veuillez en informer votre médecin immédiatement.

En plus des infections opportunistes, des maladies auto-immunes (maladies qui surviennent lorsque le système immunitaire s'attaque aux cellules saines de l'organisme) peuvent également survenir après le début de votre traitement anti-VIH. Les maladies auto-immunes peuvent survenir plusieurs mois après le début du traitement. Si vous remarquez des symptômes d'infection ou tout autre symptôme comme une faiblesse musculaire, une faiblesse commençant dans les mains et les pieds et remontant vers le tronc, des palpitations, des tremblements ou une hyperactivité, veuillez en informer votre médecin immédiatement pour qu'il soit traité.

• Si vous avez plus de 65 ans, veuillez le dire à votre médecin ou pharmacien. Le Ténofovir disoproxil fumarate n'a pas été étudié chez les patients âgés de plus de 65 ans. Si vous avez plus de 65 ans et si TEOFIVR Pharma 5 vous a été prescrit, votre médecin vous surveillera étroitement.

Enfants et adolescents

TEFOIVR Pharma 5 comprimés convient :

- aux adolescents infectés par le VIH-1 âgés de 12 à moins de 18 ans, qui pèsent au moins 35 kg et qui ont déjà été traités par d'autres médicaments contre le VIH qui ne sont plus totalement efficaces suite au développement d'une résistance ou ayant causé des effets indésirables.
- aux adolescents infectés par le VHB âgés de 12 à moins de 18 ans, qui pèsent au moins 35 kg.

TEFOIVR Pharma 5 comprimés ne convient pas aux groupes de patients suivants :

- ne convient pas aux enfants infectés par le VIH-1 âgés de moins de 12 ans
- ne convient pas aux enfants infectés par le VHB âgés de moins de 12 ans.

Pour la posologie, voir la rubrique 3, Comment prendre TEOFIVR Pharma 5.

Autres médicaments et TEOFIVR Pharma 5

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Tefovir® Pharma 5

Ténofovir Disoproxil Fumarate

300 mg

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable, non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que TEOFIVR Pharma 5 et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TEOFIVR Pharma 5 ?
3. Comment prendre TEOFIVR Pharma 5 ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TEOFIVR Pharma 5 ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

Si TEOFIVR Pharma 5 a été prescrit à votre enfant, veuillez considérer que les informations contenues dans cette notice concernant votre enfant (dans ce cas, veuillez lire « votre enfant » au lieu de « vous »).

1. QU'EST-CE QUE TEOFIVR Pharma 5 ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

TEFOIVR Pharma 5 contient une substance active appelée Ténofovir disoproxil fumarate. Cette substance est un médicament *antirétroviral* ou antiviral utilisé pour traiter l'infection par le VIH, par le VHB ou par les deux. Le ténofovir est un *inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse* généralement appelé INTI et agit en interférant avec le mécanisme d'action de certaines enzymes (dans le cas du VIH la *transcriptase inverse* ; dans le cas de l'hépatite B la *ADN polymérase*) essentielles à la reproduction des virus. Dans le cas du VIH, TEOFIVR Pharma 5 doit toujours être utilisé en association avec d'autres médicaments pour le traitement de l'infection par le VIH.

TEFOIVR Pharma 5 300 mg comprimés est utilisé pour traiter l'infection par le VIH (virus de l'immunodéficience humaine). Les comprimés conviennent :

- aux adultes
- aux adolescents âgés de 12 à moins de 18 ans ayant déjà été traités par d'autres médicaments contre le VIH qui ne sont plus totalement efficaces suite au développement d'une résistance ou ayant causé des effets indésirables.

TEFOIVR Pharma 5 300 mg comprimés est également utilisé pour traiter l'hépatite B dans les cas d'infection par le VHB chez les

- Veuillez informer votre médecin si vous avez des antécédents de maladie du foie, y compris une hépatite. Les patients ayant une hépatite chronique B ou C et traités par TEOFIVR Pharma 5 peuvent avoir un risque plus élevé de complications potentiellement fatales. Si vous prenez TEOFIVR Pharma 5 avec attention le traitement des antécédents de maladie du foie, votre médecin peut vous prescrire des médicaments pour prévenir les complications.

• **Faites attention aux infections.** Si vous présentez une infection par le VIH à un stade avancé (SIDA) et vous avez une infection, vous pouvez développer des symptômes d'inflammation ou d'infection ou aggraver des symptômes de l'infection existante dès que vous commencez à prendre TEOFIVR Pharma 5. Ces symptômes peuvent indiquer une amélioration de la réponse immunitaire permettant à l'organisme de combattre l'infection. Veuillez aux signes d'inflammation ou d'infection que vous commencez à prendre TEOFIVR Pharma 5. Si vous remarquez des symptômes d'inflammation ou d'infection, veuillez en informer votre médecin immédiatement.

En plus des infections opportunistes, des maladies auto-immunes (maladies qui surviennent lorsque le système immunitaire s'attaque aux cellules saines de l'organisme) peuvent également survenir après le début de votre traitement anti-VIH. Les maladies auto-immunes peuvent survenir plusieurs mois après le début du traitement. Si vous remarquez des symptômes d'infection ou tout autre symptôme comme une faiblesse musculaire, une faiblesse commençant dans les mains et les pieds et remontant vers le tronc, des palpitations, des tremblements ou une hyperactivité, veuillez en informer votre médecin immédiatement pour qu'il soit traité.

• Si vous avez plus de 65 ans, veuillez le dire à votre médecin ou pharmacien. Le Ténofovir disoproxil fumarate n'a pas été étudié chez les patients âgés de plus de 65 ans. Si vous avez plus de 65 ans et si TEOFIVR Pharma 5 vous a été prescrit, votre médecin vous surveillera étroitement.

Enfants et adolescents

TEFOIVR Pharma 5 comprimés convient :

- aux adolescents infectés par le VIH-1 âgés de 12 à moins de 18 ans, qui pèsent au moins 35 kg et qui ont déjà été traités par d'autres médicaments contre le VIH qui ne sont plus totalement efficaces suite au développement d'une résistance ou ayant causé des effets indésirables.
- aux adolescents infectés par le VHB âgés de 12 à moins de 18 ans, qui pèsent au moins 35 kg.

TEFOIVR Pharma 5 comprimés ne convient pas aux groupes de patients suivants :

- ne convient pas aux enfants infectés par le VIH-1 âgés de moins de 12 ans
- ne convient pas aux enfants infectés par le VHB âgés de moins de 12 ans.

Pour la posologie, voir la rubrique 3, Comment prendre TEOFIVR Pharma 5.

Autres médicaments et TEOFIVR Pharma 5

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Tefovir® Pharma 5

Ténofovir Disoproxil Fumarate

300 mg

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable, non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que TEOFIVR Pharma 5 et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TEOFIVR Pharma 5 ?
3. Comment prendre TEOFIVR Pharma 5 ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TEOFIVR Pharma 5 ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

Si TEOFIVR Pharma 5 a été prescrit à votre enfant, veuillez considérer que les informations contenues dans cette notice concernant votre enfant (dans ce cas, veuillez lire « votre enfant » au lieu de « vous »).

1. QU'EST-CE QUE TEOFIVR Pharma 5 ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

TEFOIVR Pharma 5 contient une substance active appelée Ténofovir disoproxil fumarate. Cette substance est un médicament *antirétroviral* ou antiviral utilisé pour traiter l'infection par le VIH, par le VHB ou par les deux. Le ténofovir est un *inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse* généralement appelé INTI et agit en interférant avec le mécanisme d'action de certaines enzymes (dans le cas du VIH la *transcriptase inverse* ; dans le cas de l'hépatite B la *ADN polymérase*) essentielles à la reproduction des virus. Dans le cas du VIH, TEOFIVR Pharma 5 doit toujours être utilisé en association avec d'autres médicaments pour le traitement de l'infection par le VIH.

TEFOIVR Pharma 5 300 mg comprimés est utilisé pour traiter l'infection par le VIH (virus de l'immunodéficience humaine). Les comprimés conviennent :

- aux adultes
- aux adolescents âgés de 12 à moins de 18 ans ayant déjà été traités par d'autres médicaments contre le VIH qui ne sont plus totalement efficaces suite au développement d'une résistance ou ayant causé des effets indésirables.

TEFOIVR Pharma 5 300 mg comprimés est également utilisé pour traiter l'hépatite B dans les cas d'infection par le VHB chez les

- Veuillez informer votre médecin si vous avez des antécédents de maladie du foie, y compris une hépatite. Les patients ayant une hépatite chronique B ou C et traités par TEOFIVR Pharma 5 peuvent avoir un risque plus élevé de complications potentiellement fatales. Si vous prenez TEOFIVR Pharma 5 avec attention le traitement des antécédents de maladie du foie, votre médecin peut vous prescrire des médicaments pour prévenir les complications.

• **Faites attention aux infections.** Si vous présentez une infection par le VIH à un stade avancé (SIDA) et vous avez une infection, vous pouvez développer des symptômes d'inflammation ou d'infection ou aggraver des symptômes de l'infection existante dès que vous commencez à prendre TEOFIVR Pharma 5. Ces symptômes peuvent indiquer une amélioration de la réponse immunitaire permettant à l'organisme de combattre l'infection. Veuillez aux signes d'inflammation ou d'infection que vous commencez à prendre TEOFIVR Pharma 5. Si vous remarquez des symptômes d'inflammation ou d'infection, veuillez en informer votre médecin immédiatement.

En plus des infections opportunistes, des maladies auto-immunes (maladies qui surviennent lorsque le système immunitaire s'attaque aux cellules saines de l'organisme) peuvent également survenir après le début de votre traitement anti-VIH. Les maladies auto-immunes peuvent survenir plusieurs mois après le début du traitement. Si vous remarquez des symptômes d'infection ou tout autre symptôme comme une faiblesse musculaire, une faiblesse commençant dans les mains et les pieds et remontant vers le tronc, des palpitations, des tremblements ou une hyperactivité, veuillez en informer votre médecin immédiatement pour qu'il soit traité.

• Si vous avez plus de 65 ans, veuillez le dire à votre médecin ou pharmacien. Le Ténofovir disoproxil fumarate n'a pas été étudié chez les patients âgés de plus de 65 ans. Si vous avez plus de 65 ans et si TEOFIVR Pharma 5 vous a été prescrit, votre médecin vous surveillera étroitement.

Enfants et adolescents

TEFOIVR Pharma 5 comprimés convient :

- aux adolescents infectés par le VIH-1 âgés de 12 à moins de 18 ans, qui pèsent au moins 35 kg et qui ont déjà été traités par d'autres médicaments contre le VIH qui ne sont plus totalement efficaces suite au développement d'une résistance ou ayant causé des effets indésirables.
- aux adolescents infectés par le VHB âgés de 12 à moins de 18 ans, qui pèsent au moins 35 kg.

TEFOIVR Pharma 5 comprimés ne convient pas aux groupes de patients suivants :

- ne convient pas aux enfants infectés par le VIH-1 âgés de moins de 12 ans
- ne convient pas aux enfants infectés par le VHB âgés de moins de 12 ans.

Pour la posologie, voir la rubrique 3, Comment prendre TEOFIVR Pharma 5.

Autres médicaments et TEOFIVR Pharma 5

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Tefovir® Pharma 5

Ténofovir Disoproxil Fumarate

300 mg

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable, non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que TEOFIVR Pharma 5 et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TEOFIVR Pharma 5 ?
3. Comment prendre TEOFIVR Pharma 5 ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TEOFIVR Pharma 5 ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

Si TEOFIVR Pharma 5 a été prescrit à votre enfant, veuillez considérer que les informations contenues dans cette notice concernant votre enfant (dans ce cas, veuillez lire « votre enfant » au lieu de « vous »).

1. QU'EST-CE QUE TEOFIVR Pharma 5 ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

TEFOIVR Pharma 5 contient une substance active appelée Ténofovir disoproxil fumarate. Cette substance est un médicament *antirétroviral* ou antiviral utilisé pour traiter l'infection par le VIH, par le VHB ou par les deux. Le ténofovir est un *inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse* généralement appelé INTI et agit en interférant avec le mécanisme d'action de certaines enzymes (dans le cas du VIH la *transcriptase inverse* ; dans le cas de l'hépatite B la *ADN polymérase*) essentielles à la reproduction des virus. Dans le cas du VIH, TEOFIVR Pharma 5 doit toujours être utilisé en association avec d'autres médicaments pour le traitement de l'infection par le VIH.

TEFOIVR Pharma 5 300 mg comprimés est utilisé pour traiter l'infection par le VIH (virus de l'immunodéficience humaine). Les comprimés conviennent :

- aux adultes
- aux adolescents âgés de 12 à moins de 18 ans ayant déjà été traités par d'autres médicaments contre le VIH qui ne sont plus totalement efficaces suite au développement d'une résistance ou ayant causé des effets indésirables.

TEFOIVR Pharma 5 300 mg comprimés est également utilisé pour traiter l'hépatite B dans les cas d'infection par le VHB chez les

- Veuillez informer votre médecin si vous avez des antécédents de maladie du foie, y compris une hépatite. Les patients ayant une hépatite chronique B ou C et traités par TEOFIVR Pharma 5 peuvent avoir un risque plus élevé de complications potentiellement fatales. Si vous prenez TEOFIVR Pharma 5 avec attention le traitement des antécédents de maladie du foie, votre médecin peut vous prescrire des médicaments pour prévenir les complications.

• **Faites attention aux infections.** Si vous présentez une infection par le VIH à un stade avancé (SIDA) et vous avez une infection, vous pouvez développer des symptômes d'inflammation ou d'infection ou aggraver des symptômes de l'infection existante dès que vous commencez à prendre TEOFIVR Pharma 5. Ces symptômes peuvent indiquer une amélioration de la réponse immunitaire permettant à l'organisme de combattre l'infection. Veuillez aux signes d'inflammation ou d'infection que vous commencez à prendre TEOFIVR Pharma 5. Si vous remarquez des symptômes d'inflammation ou d'infection, veuillez en informer votre médecin immédiatement.

En plus des infections opportunistes, des maladies auto-immunes (maladies qui surviennent lorsque le système immunitaire s'attaque aux cellules saines de l'organisme) peuvent également survenir après le début de votre traitement anti-VIH. Les maladies auto-immunes peuvent survenir plusieurs mois après le début du traitement. Si vous remarquez des symptômes d'infection ou tout autre symptôme comme une faiblesse musculaire, une faiblesse commençant dans les mains et les pieds et remontant vers le tronc, des palpitations, des tremblements ou une hyperactivité, veuillez en informer votre médecin immédiatement pour qu'il soit traité.

• Si vous avez plus de 65 ans, veuillez le dire à votre médecin ou pharmacien. Le Ténofovir disoproxil fumarate n'a pas été étudié chez les patients âgés de plus de 65 ans. Si vous avez plus de 65 ans et si TEOFIVR Pharma 5 vous a été prescrit, votre médecin vous surveillera étroitement.

Enfants et adolescents

TEFOIVR Pharma 5 comprimés convient :

- aux adolescents infectés par le VIH-1 âgés de 12 à moins de 18 ans, qui pèsent au moins 35 kg et qui ont déjà été traités par d'autres médicaments contre le VIH qui ne sont plus totalement efficaces suite au développement d'une résistance ou ayant causé des effets indésirables.
- aux adolescents infectés par le VHB âgés de 12 à moins de 18 ans, qui pèsent au moins 35 kg.

TEFOIVR Pharma 5 comprimés ne convient pas aux groupes de patients suivants :

- ne convient pas aux enfants infectés par le VIH-1 âgés de moins de 12 ans
- ne convient pas aux enfants infectés par le VHB âgés de moins de 12 ans.

Pour la posologie, voir la rubrique 3, Comment prendre TEOFIVR Pharma 5.

Autres médicaments et TEOFIVR Pharma 5

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Tefovir® Pharma 5

Ténofovir Disoproxil Fumarate

300 mg

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable, non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que TEOFIVR Pharma 5 et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TEOFIVR Pharma 5 ?
3. Comment prendre TEOFIVR Pharma 5 ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TEOFIVR Pharma 5 ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

Si TEOFIVR Pharma 5 a été prescrit à votre enfant, veuillez considérer que les informations contenues dans cette notice concernant votre enfant (dans ce cas, veuillez lire « votre enfant » au lieu de « vous »).

1. QU'EST-CE QUE TEOFIVR Pharma 5 ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

TEFOIVR Pharma 5 contient une substance active appelée Ténofovir disoproxil fumarate. Cette substance est un médicament *antirétroviral* ou antiviral utilisé pour traiter l'infection par le VIH, par le VHB ou par les deux. Le ténofovir est un *inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse* généralement appelé INTI et agit en interférant avec le mécanisme d'action de certaines enzymes (dans le cas du VIH la *transcriptase inverse* ; dans le cas de l'hépatite B la *ADN polymérase*) essentielles à la reproduction des virus. Dans le cas du VIH, TEOFIVR Pharma 5 doit toujours être utilisé en association avec d'autres médicaments pour le traitement de l'infection par le VIH.

TEFOIVR Pharma 5 300 mg comprimés est utilisé pour traiter l'infection par le VIH (virus de l'immunodéficience humaine). Les comprimés conviennent :

- aux adultes
- aux adolescents âgés de 12 à moins de 18 ans ayant déjà été traités par d'autres médicaments contre le VIH qui ne sont plus totalement efficaces suite au développement d'une résistance ou ayant causé des effets indésirables.

TEFOIVR Pharma 5 300 mg comprimés est également utilisé pour traiter l'hépatite B dans les cas d'infection par le VHB chez les

- Veuillez informer votre médecin si vous avez des antécédents de maladie du foie, y compris une hépatite. Les patients ayant une hépatite chronique B ou C et traités par TEOFIVR Pharma 5 peuvent avoir un risque plus élevé de complications potentiellement fatales. Si vous prenez TEOFIVR Pharma 5 avec attention le traitement des antécédents de maladie du foie, votre médecin peut vous prescrire des médicaments pour prévenir les complications.

• **Faites attention aux infections.** Si vous présentez une infection par le VIH à un stade avancé (SIDA) et vous avez une infection, vous pouvez développer des symptômes d'inflammation ou d'infection ou aggraver des symptômes de l'infection existante dès que vous commencez à prendre TEOFIVR Pharma 5. Ces symptômes peuvent indiquer une amélioration de la réponse immunitaire permettant à l'organisme de combattre l'infection. Veuillez aux signes d'inflammation ou d'infection que vous commencez à prendre TEOFIVR Pharma 5. Si vous remarquez des symptômes d'inflammation ou d'infection, veuillez en informer votre médecin immédiatement.

En plus des infections opportunistes, des maladies auto-immunes (maladies qui surviennent lorsque le système immunitaire s'attaque aux cellules saines de l'organisme) peuvent également survenir après le début de votre traitement anti-VIH. Les maladies auto-immunes peuvent survenir plusieurs mois après le début du traitement. Si vous remarquez des symptômes d'infection ou tout autre symptôme comme une faiblesse musculaire, une faiblesse commençant dans les mains et les pieds et remontant vers le tronc, des palpitations, des tremblements ou une hyperactivité, veuillez en informer votre médecin immédiatement pour qu'il traite ces symptômes.

• **Si vous avez plus de 65 ans, veuillez le dire à votre médecin ou pharmacien.** Le Ténofovir disoproxil fumarate n'a pas été étudié chez les patients âgés de plus de 65 ans. Si vous avez plus de 65 ans et si TEOFIVR Pharma 5 vous a été prescrit, votre médecin vous surveillera étroitement.

Enfants et adolescents

TEFOIVR Pharma 5 comprimés convient :

- aux adolescents infectés par le VIH-1 âgés de 12 à moins de 18 ans, qui pèsent au moins 35 kg et qui ont déjà été traités par d'autres médicaments contre le VIH qui ne sont plus totalement efficaces suite au développement d'une résistance ou ayant causé des effets indésirables.
- aux adolescents infectés par le VHB âgés de 12 à moins de 18 ans, qui pèsent au moins 35 kg.

TEFOIVR Pharma 5 comprimés ne convient pas aux groupes de patients suivants :

- ne convient pas aux enfants infectés par le VIH-1 âgés de moins de 12 ans
- ne convient pas aux enfants infectés par le VHB âgés de moins de 12 ans.

Pour la posologie, voir la rubrique 3, *Comment prendre TEOFIVR Pharma 5*.

Autres médicaments et TEOFIVR Pharma 5

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

LOT 8424
PER 02-22
PPU 289 DH

Tefovir® Pharma 5

Ténofovir Disoproxil Fumarate

300 mg

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable, non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que TEOFIVR Pharma 5 et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TEOFIVR Pharma 5 ?
3. Comment prendre TEOFIVR Pharma 5 ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TEOFIVR Pharma 5 ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

Si TEOFIVR Pharma 5 a été prescrit à votre enfant, veuillez considérer que les informations contenues dans cette notice concernant votre enfant (dans ce cas, veuillez lire « votre enfant » au lieu de « vous »).

1. QU'EST-CE QUE TEOFIVR Pharma 5 ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

TEFOIVR Pharma 5 contient une substance active appelée Ténofovir disoproxil fumarate. Cette substance est un médicament *antirétroviral* ou antiviral utilisé pour traiter l'infection par le VIH, par le VHB ou par les deux. Le ténofovir est un *inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse* généralement appelé INTI et agit en interférant avec le mécanisme d'action de certaines enzymes (dans le cas du VIH la *transcriptase inverse* ; dans le cas de l'hépatite B la *ADN polymérase*) essentielles à la reproduction des virus. Dans le cas du VIH, TEOFIVR Pharma 5 doit toujours être utilisé en association avec d'autres médicaments pour le traitement de l'infection par le VIH.

TEFOIVR Pharma 5 300 mg comprimés est utilisé pour traiter l'infection par le VIH (virus de l'immunodéficience humaine). Les comprimés conviennent :

- aux adultes
- aux adolescents âgés de 12 à moins de 18 ans ayant déjà été traités par d'autres médicaments contre le VIH qui ne sont plus totalement efficaces suite au développement d'une résistance ou ayant causé des effets indésirables.

TEFOIVR Pharma 5 300 mg comprimés est également utilisé pour traiter l'hépatite B dans les cas d'infection par le VHB chez les

- Veuillez informer votre médecin si vous avez des antécédents de maladie du foie, y compris une hépatite. Les patients ayant une hépatite chronique B ou C et traités par TEOFIVR Pharma 5 peuvent avoir un risque plus élevé de complications potentiellement fatales. Si vous prenez TEOFIVR Pharma 5 avec attention le traitement des antécédents de maladie du foie, votre médecin peut vous prescrire des médicaments pour prévenir les complications.

• **Faites attention aux infections.** Si vous présentez une infection par le VIH à un stade avancé (SIDA) et vous avez une infection, vous pouvez développer des symptômes d'inflammation ou d'infection ou aggraver des symptômes de l'infection existante dès que vous commencez à prendre TEOFIVR Pharma 5. Ces symptômes peuvent indiquer une amélioration de la réponse immunitaire permettant à l'organisme de combattre l'infection. Veuillez aux signes d'inflammation ou d'infection que vous commencez à prendre TEOFIVR Pharma 5. Si vous remarquez des symptômes d'inflammation ou d'infection, veuillez en informer votre médecin immédiatement.

En plus des infections opportunistes, des maladies auto-immunes (maladies qui surviennent lorsque le système immunitaire s'attaque aux cellules saines de l'organisme) peuvent également survenir après le début de votre traitement anti-VIH. Les maladies auto-immunes peuvent survenir plusieurs mois après le début du traitement. Si vous remarquez des symptômes d'infection ou tout autre symptôme comme une faiblesse musculaire, une faiblesse commençant dans les mains et les pieds et remontant vers le tronc, des palpitations, des tremblements ou une hyperactivité, veuillez en informer votre médecin immédiatement pour qu'il soit traité.

• Si vous avez plus de 65 ans, veuillez le dire à votre médecin ou pharmacien. Le Ténofovir disoproxil fumarate n'a pas été étudié chez les patients âgés de plus de 65 ans. Si vous avez plus de 65 ans et si TEOFIVR Pharma 5 vous a été prescrit, votre médecin vous surveillera étroitement.

Enfants et adolescents

TEFOIVR Pharma 5 comprimés convient :

- aux adolescents infectés par le VIH-1 âgés de 12 à moins de 18 ans, qui pèsent au moins 35 kg et qui ont déjà été traités par d'autres médicaments contre le VIH qui ne sont plus totalement efficaces suite au développement d'une résistance ou ayant causé des effets indésirables.
- aux adolescents infectés par le VHB âgés de 12 à moins de 18 ans, qui pèsent au moins 35 kg.

TEFOIVR Pharma 5 comprimés ne convient pas aux groupes de patients suivants :

- ne convient pas aux enfants infectés par le VIH-1 âgés de moins de 12 ans
- ne convient pas aux enfants infectés par le VHB âgés de moins de 12 ans.

Pour la posologie, voir la rubrique 3, Comment prendre TEOFIVR Pharma 5.

Autres médicaments et TEOFIVR Pharma 5

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.