

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° P19- 0046215

ND: 47754

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 10 260

Société : RAM

☐ Actif

☒ Pensionné(e)

☐ Autre

Nom & Prénom : HARCHACHE Abdellah

Date de naissance : 02/05/1960

Adresse : N° 19 Bloc 102 Derby d'Anal

403 HASSEM CAS

Tél. : 0662 468462

Total des frais engagés : 703,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Docteur Abdelali TLEMCAI
Médecine Générale
Echographie
155, Av. Alphonse Carré H.H.
7 NOV 2020

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : HARCHACHE Abdellah

Lien de parenté :

☐ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA

Le : 17/11/20

Signature de l'adhérent(e) :

MUPRAS
19 NOV 2020
ACCUEIL

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
7 NOV 2020			200,00	Docteur Abdelali TLEM Médecin Généraliste Echographie 155 Av. ... 2020

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur Date Montant de la Facture

VEAL SARL
PHARMACIE CHIFA
CHIRI LASSANI
Casablanca
Tél: 0522 90 46 04

07/11/20 503,20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue Date Désignation des Coefficients Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien Date des Soins Nombre des Honoraires

A M P C I M I V

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES


Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES

Dents Traitées Nature des Soins Coefficient



COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE


H
25533412 21433552
00000000 00000000
D G
00000000 00000000
35533411 11433553
B

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION



[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. ABDELALI TLEMÇANI

MEDECINE GENERALE

Echographie

155, Avenue Afghanistan

Hay El Hassani - Casablanca

Tél. : 05.22.90.33.90

الدكتور عبد الحلي التلمساني

الطب العام

أمراض النساء و الرجال و الأطفال

الفحص بالتفزة

155، شارع أفغانستان

حي الحسني - الدار البيضاء

الهاتف : 05.22.90.33.90

- 7 NOV. 2020

Casablanca, le

07 NOV 2020

287.20 = 143.60 x 2 HARCHACHE Adella h.
- Orken 2w (2)

4 x 1.5

- Bro clon

31,00 Luis 3 x 1

- Vantobase 3 AFM 210

185,00 1x 1/2 x 1

503,20

Docteur Abdelali TLEMÇANI
Médecine Générale
Echographie

155 Av. Afghanistan H.S.
Casablanca - Tél.: 05 22 90 33 90

Docteur Abdelali TLEMÇANI
Médecine Générale
Echographie

155, Av. Afghanistan H.S.
Casablanca - Tél.: 05 22 90 33 90

REVEAL SARL
PHARMACIE CHIFA
M. TAHIRI HASSANI
10 Ave. Afghanistan
Hay Hassani - Casablanca
Tél: 0522 90 32 63 - Fax: 05 22 90 16 04

LOT: GB00764
PER: 04/2023
PPV: 185 DH 00

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Orken 200 mg, cp, pel b 8
P.P.V: 143,60 DH

6 116000 061069

PPV
31DH00

المرجو إحضار الوصفة عند المراقبة

243

What is in this leaflet:

1. What Oroken is and what it is used for

2. What you need to know before you use Oroken

3. How to use Oroken

4. Possible side effects

5. How to store Oroken

6. Contents of the pack and other information

1. WHAT OROKEN IS AND WHAT IT IS USED FOR

Pharmacotherapeutic group - This medicine is a beta-lactam, an

antibiotic which belongs to the 3rd generation cephalosporin group

of medicines, which are similar to penicillins.

This medicine is used to treat certain infections of the:

- urinary system and genitals;

- ears (otitis) and sinuses (sinusitis);

- chest and lung infections.

2. WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU USE OROKEN

Contraindications:

You are allergic to cefixime or to any of the other ingredients of

Oroken listed in Section 6;

you are allergic to another antibiotic from the same group of

medicines as Oroken, i.e. beta-lactams

the medicine is for a child under 12 years of age.

Warnings and precautions

You must talk to your doctor or pharmacist before using Oroken if :

you have ever had an allergic reaction to an antibiotic treatment, as

you could also be allergic to this treatment.

you have kidney disease, as your doctor will have to adjust the daily

dose of Oroken.

you have ever had hemolytic anemia (decreases in the number of

red blood cells, which can lead to pallor, weakness or

breathlessness) after taking an antibiotic from the cephalosporin

group of medicines, including Oroken.

During or after treatment, you must immediately tell your doctor if:

you have diarrhea. Do not use a treatment for diarrhea without first

talking to your doctor.

you have spots or itching.

you have a severe skin reaction, such as a blistering rash with

peeling of the skin which can rapidly spread to the whole body and

can put your life at risk (toxic epidermal necrolysis, Stevens-Johnson

syndrome), or a drug hypersensitivity syndrome (known as DRESS).

As with all medicines belonging to this group of antibiotics

(beta-lactams), use of this medicine can cause encephalopathy, which

give you appropriate treatment (see Section 4 'Possible side effects').

As with all medicines belonging to this group of antibiotics

(beta-lactams), use of this medicine can cause encephalopathy, which

give you appropriate treatment (see Section 4 'Possible side effects').

As with all medicines belonging to this group of antibiotics

(beta-lactams), use of this medicine can cause encephalopathy, which

give you appropriate treatment (see Section 4 'Possible side effects').

As with all medicines belonging to this group of antibiotics

(beta-lactams), use of this medicine can cause encephalopathy, which

give you appropriate treatment (see Section 4 'Possible side effects').

As with all medicines belonging to this group of antibiotics

(beta-lactams), use of this medicine can cause encephalopathy, which

give you appropriate treatment (see Section 4 'Possible side effects').

As with all medicines belonging to this group of antibiotics

(beta-lactams), use of this medicine can cause encephalopathy, which

give you appropriate treatment (see Section 4 'Possible side effects').

As with all medicines belonging to this group of antibiotics

(beta-lactams), use of this medicine can cause encephalopathy, which

give you appropriate treatment (see Section 4 'Possible side effects').

As with all medicines belonging to this group of antibiotics

(beta-lactams), use of this medicine can cause encephalopathy, which

3. HOW TO USE OROKEN

Dosage

This medicine is recommended for use in children from 12 years of

age and adults.

The usual daily dose is two 200 mg tablets.

To be effective, this antibiotic must be used regularly at the prescribed

dose and for as long as your doctor has told you to.

If your fever or any other symptoms disappear, this does not mean

that you have completely recovered. If you feel tired, this is not due to

the antibiotic treatment but to the infection itself. Reducing or

stopping the treatment would have no effect on this and would only

delay your recovery.

Method of administration

Oral route.

If you take more Oroken 200 mg film-coated tablets than you

should

As with all medicines belonging to this group of antibiotics

(beta-lactams), use of this medicine can cause encephalopathy, which

give you appropriate treatment (see Section 4 'Possible side effects').

As with all medicines belonging to this group of antibiotics

(beta-lactams), use of this medicine can cause encephalopathy, which

give you appropriate treatment (see Section 4 'Possible side effects').

As with all medicines belonging to this group of antibiotics

(beta-lactams), use of this medicine can cause encephalopathy, which

give you appropriate treatment (see Section 4 'Possible side effects').

As with all medicines belonging to this group of antibiotics

(beta-lactams), use of this medicine can cause encephalopathy, which

give you appropriate treatment (see Section 4 'Possible side effects').

As with all medicines belonging to this group of antibiotics

4. OTHER MEDICINES AND OROKEN

Tell your doctor or pharmacist if your child is using, has recently use

or may use any other medicines.

Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.

Do not use this medicine during pregnancy unless you are advised to

do so by your doctor.

If you discover that you are pregnant during treatment, talk to your

doctor. Only your doctor can decide whether it is necessary to

continue treatment.

Breast-feeding

Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.

You may breast-feed during treatment with this medicine.

However, if your child experiences digestive disorders (diarrhea, a

funeral infection) or spots, stop breast-feeding or taking this medicine

and consult your doctor quickly.

Driving and using machines

This medicine may have a strong effect on the ability to drive vehicles

or use machines particularly since there is a possibility of dizziness or

encephalopathy (which can lead to seizures, confusion, consciousness

disorders or abnormal movements) (see sections 3 and 4).

3. HOW TO USE OROKEN

Dosage

This medicine is recommended for use in children from 12 years of

age and adults.

The usual daily dose is two 200 mg tablets.

To be effective, this antibiotic must be used regularly at the prescribed

dose and for as long as your doctor has told you to.

If your fever or any other symptoms disappear, this does not mean

that you have completely recovered. If you feel tired, this is not due to



مركز النقديات

07/11/20

12:40:46

9900552945

95529401

PHARMACIE CHIFA

Casablanca

A00000000031010

APP : VISA

M HARCHACHE ABDELLAH

xxxxxxxxxxxxx2497

10/23 CARTE NATIONALE

8AA0ADB03F2A6051

201-0-9999-1-44

MONTANT: 503,20 MAD

NUM TRANSACTION : 002

NUM AUTORISATION: 184449

STAN : 001233

DEBIT

Le CMI vous remercie

TICKET A CONSERVER
COPIE CLIENT