

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR

ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Prothèse dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



ND: 47 800

Déclaration de Maladie : N° P19- 0003950

Maladie Dentaire Optique Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 6887 Société : RAM

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : MARI KARMA Date de naissance :

Adresse : a.m.s.s. sultani DER sultani AL FIDA

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 10 / 11 / 2022

Nom et prénom du malade : KARMA KARMA Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : ANCIENNE MALADIE

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquez les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : 19 NOV. 2020

Signature de l'adhérent(e) : ACCUEIL

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
10/11/20	C810		2.500	 Dr. HADDAD Cardio - 708 N°3, Residence Elvatan, H. 7 ElWajda Sidi Moumen - Casablanca Tél: 65 22 71 66 30

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	10/11/20	 Dr. Fatima SAHNOUJ Med 21st Mar Al... AP: 20205302

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	


RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'...

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>




O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553
B	

(Création, remont, adjonction)

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession



COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

Dr HAFDI Karim

CARDIOLOGUE

Maladies du Coeur et des Vaisseaux

- Ex praticien à l'Hôpital Cochin Saint Vincent de Paul (Paris)
- Ex praticien au CHU Ibn Rochd



الدكتور حفذي كريم

اختصاصي في أمراض القلب و الشرايين

- طبيب سابق بمستشفى كوشان بباريس
- طبيب سابق بمستشفى ابن رشد

- Diplôme d'Echocardiographie de la Faculté de Bordeaux - SEGALIN
- Diplôme d'Ultrasonographie Vasculaire de l'Université la Sorbonne
- Diplôme de Cardiologie Pédiatrique de l'Université Paris - Descartes

Casablanca, 10/11/2020

Mr KARMA EL ARBI

185, 20 x 3
SULIAT 160/10/12.5 mg
1cp le matin pendant 3 mois

KARDEGIC 160 MG Poudre en sachet Boîte de 30
1 sachet à midi pendant 3 mois

TORVA 20 MG COMPRIMÉ ENROBÉ Boîte de 30
1cp le soir pendant 3 mois

LIORESAL 10 MG COMPRIMÉ Boîte de 50
1cp x 3/j pendant 3 mois

79, 50
FITOPOLIS SIROP
1cas x 3/j pendant 10 jours

87, 10
BIOVANIC 500 MG Boîte de 7CP
1CP/J LE soir pendant 7 jours

140, 10
OEDES 20 MG GÉLULE Boîte de 28
1CP LE matin pendant 3 mois

862910

Pharmacie SAINOUN
Dr. Hafdi Karim
Hay El Walaa
Sidi Moumen - Casablanca
Tél: 05 22 71 66 36

Dr HAFDI Karim

CARDIOLOGUE

Maladies du Coeur et des Vaisseaux

- Ex praticien à l'Hôpital Cochin Saint Vincent de Paul (Paris)
- Ex praticien au CHU Ibn Rochd



الدكتور حفدي كريم

اختصاصي في أمراض القلب و الشرايين

- طبيب سابق بمستشفى كوشان بباريس
- طبيب سابق بمستشفى ابن رشد

- Diplôme d'Echocardiographie de la Faculté de Bordeaux - SEGALEN
- Diplôme d'Ultrasonographie Vasculaire de l'Université la Sorbonne
- Diplôme de Cardiologie Pédiatrique de l'Université Paris - Descartes

Casablanca, le 20/01/2022

KARIMA EL ARBI

أختي

أختي Ancien

DL Bobine + Défense depuis

1 semaine

→ Eto Bobine

Dr. HAFDI Karim
Cardiologue

N°3, Résidence Haytani, Hay El Walaa
Sidi Moumen - Casablanca
Tél.: 09 22 71 66 38

FITOPOLIS®

Adultes **Solution buvable** - Enfants **Solution buvable** - **Comprimé**

FORMES ET PRESENTATIONS : **FITOPOLIS® Adultes** Solution buvable - flacons de 150 ml et 250 ml. **FITOPOLIS® Enfants** Solution buvable - flacons de 150 ml et 250 ml. **FITOPOLIS®** comprimé - Boîte de 30.

COMPOSITION :

FITOPOLIS® Adultes Solution buvable : Extrait de Propolis (10% de Flavonoïdes), extrait de racine d'échinacée (Echinacea purpurea) (4% de Polyphénols), extrait de feuilles de thym (*Thymus vulgaris*), Miel d'Eucalyptus, acide ascorbique (vitamine C), eau, fructose, agent de végétale), conservateurs (sorbate de potassium, benzoate de sodium) et

Adultes Solution buvable : Extrait de Propolis (10 % de Flavonoïdes), extrait de (Echinacea purpurea) (4% de Polyphénols), extrait de fleurs et de feuilles de vesiris) (0,5 % de Polyphénols), Miel d'Eucalyptus, acide ascorbique (vitamine C), gent de charge (glycérine végétale), conservateurs (sorbate de potassium, um), arôme, colorant (caramel), acidifiant (acide citrique).

Primé : Agent de charge (sorbitol, cellulose microcristalline), extrait sec de propolis des), extrait sec de racine d'échinacée (Echinacea sp.) (5:1), extrait de feuilles algaris) (5:1), extrait sec de cerises des Antilles (Malpighia emarginata) (25 % - lactate ascorbique «vitamine C»), arômes, fructose, glycyrrhizinate monoammoniacal, anti-agglomérant (stéarate de magnésium).

Contenu net: 150 ml

Lot:
A consommer
de préférence avant le:

200405
04-2023

PPC: 79,50 DH

Diu de ces trois médicaments, les vaisseaux sanguins se relâchent et la tension artérielle diminue.

Indications thérapeutiques :

SULIAT HCT est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle chez les patients adultes dont la pression artérielle est déjà contrôlée par la prise d'Amlodipine, de Valsartan et d'Hydrochlorothiazide et qui peuvent bénéficier de la prise d'un seul comprimé contenant les trois substances.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SULIAT HCT ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Contre - indications :

Ne prenez jamais SULIAT HCT, comprimés pelliculés, en cas de :

- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. (Il est également recommandé d'éviter de prendre SULIAT HCT en début de grossesse).
- Si vous êtes allergique à l'Amlodipine ou à tout autre inhibiteur calcique, au Valsartan, à l'Hydrochlorothiazide, aux dérivés sulfamidés (des médicaments utilisés pour traiter les infections pulmonaires ou urinaires) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous êtes diabétique ou vous avez une insuffisance rénale (DFG < 60 ml/min/1,73 m²) et vous prenez SULIAT HCT® en association avec des médicaments contenant de l'alisirkén.
- Si vous pensez que vous pouvez être allergique, ne prenez pas SULIAT HCT et parlez-en à votre médecin.
- Si vous avez une maladie du foie, une destruction des petits canaux biliaires dans le foie (cirrhose biliaire) entraînant une accumulation de bile dans le foie (cholestase).
- Si vous avez de graves problèmes rénaux ou si vous êtes sous dialyse.
- Si vous êtes incapable d'uriner (anurie).
- Si votre taux sanguin de potassium ou de sodium est trop bas malgré un traitement pour augmenter les taux sanguins de potassium ou de sodium.
- Si votre taux sanguin de calcium est trop élevé malgré un traitement pour réduire les taux sanguins de calcium.
- Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations).
- Si vous présentez une baisse sévère de la pression artérielle (hypotension).
- Si vous présentez un rétrécissement de la valve aortique (sténose aortique) ou un choc cardiogénique (une affection dans laquelle votre cœur est incapable d'apporter suffisamment de sang à l'organisme).
- Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque après une crise cardiaque.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :
Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi : par un médicament contenant d'alisirkén pour diminuer la pression artérielle.

Faites attention avec SULIAT HCT :

- Si votre taux sanguin de potassium ou magnésium est bas (avec ou sans symptômes tels que faiblesse musculaire, spasmes musculaires, rythme cardiaque normal).
- Si votre taux sanguin de sodium est bas (avec ou sans symptômes tels que fatigue, confusion, contractions musculaires, convulsions).
- Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que nausées, vomissements, constipation, maux d'estomac, mictions fréquentes, soif, faiblesse et contractions musculaires).
- Si vous avez des problèmes rénaux, si vous avez eu une greffe de rein ou si vous étiez informé que vous avez un rétrécissement de vos artères rénales.
- Si vous avez eu ou si vous avez eu une insuffisance cardiaque ou une maladie coronarienne, en particulier s'il vous a été prescrit la dose maximale d'Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide (10 mg/320 mg/25 mg).
- Si vous avez présenté une crise cardiaque. Suivez attentivement les instructions de votre médecin pour la dose initiale. Votre médecin peut aussi vérifier votre fonction rénale.
- Si votre médecin vous a informé que vous avez un rétrécissement des valves du cœur (appelé « sténose aortique ou mitrale ») ou que l'épaisseur de votre muscle cardiaque est augmentée de manière anormale (ce que l'on appelle une « cardiomyopathie hypertrophique obstructive »).
- Si vous souffrez d'hypéraldostéronisme. Il s'agit d'une maladie dans laquelle les glandes surrénales fabriquent une quantité trop importante d'hormone aldostérone. L'utilisation de SULIAT HCT est déconseillée si vous êtes dans cette situation.
- Si vous souffrez d'une maladie appelée lupus érythémateux disséminé (appelée également « lupus » ou « LED »).
- Si vous êtes diabétique (taux de sucre élevé dans le sang).
- Si votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé.
- Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.
- Si vous avez développé une réaction allergique à d'autres médicaments antihypertenseurs.
- Si vous avez développé une réaction allergique à d'autres médicaments antihypertenseurs (la quantité d'urine produite), en particulier si vous souffrez d'asthme et d'allergies.
- Si vous êtes malade (vomissements ou diarrhée).
- Si vous avez présenté des gonflements, en particulier du visage et de la gorge, lors de la conversion de l'angiotensine).
- Si ces symptômes surviennent, arrêtez de prendre SULIAT HCT et contactez votre médecin.
- En cas de sensations vertigineuses et/ou d'évanouissements pendant le traitement par SULIAT HCT, arrêtez de prendre le médicament et contactez votre médecin.
- Si vous ressentez une baisse de la vision ou une douleur dans l'œil. Ce pourrait être le signe d'un problème de la vue. Consultez votre médecin si vous ressentez ces symptômes pendant le traitement.
- Si vous prenez l'un des médicaments suivants pour traiter une hypertension :
 - Un « inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC) » (par exemple Enalapril, Lisinopril, Ramapril).
 - Aliskiren.
- Votre médecin pourra surveiller régulièrement le fonctionnement de vos reins, votre pression sanguine et votre taux de potassium.
- Risque accru de cancer de la peau non-mélanome (carcinome basocellulaire, carcinome épidermoïde) suite à l'exposition à des doses cumulatives croissantes d'hydrochlorothiazide (HCTZ).
- Les patients qui prennent l'HCTZ seul ou en association avec d'autres médicaments doivent être informés de ce risque et de la nécessité de vérifier régulièrement l'état de leur peau afin de détecter toute nouvelle lésion ou modification de lésion existante et de signaler toute lésion cutanée suspecte.

SULIAT HCT

LOT : 203849 EXP : 02/22
PPV : 185DH20

Diu de ces trois médicaments, les vaisseaux sanguins se relâchent et la tension artérielle diminue.

Indications thérapeutiques :

SULIAT HCT est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle chez les patients adultes dont la pression artérielle est déjà contrôlée par la prise d'Amlodipine, de Valsartan et d'Hydrochlorothiazide et qui peuvent bénéficier de la prise d'un seul comprimé contenant les trois substances.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SULIAT HCT ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Contre - indications :

Ne prenez jamais SULIAT HCT, comprimés pelliculés, en cas de :

- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. (Il est également recommandé d'éviter de prendre SULIAT HCT en début de grossesse).
- Si vous êtes allergique à l'Amlodipine ou à tout autre inhibiteur calcique, au Valsartan, à l'Hydrochlorothiazide, aux dérivés sulfamidés (des médicaments utilisés pour traiter les infections pulmonaires ou urinaires) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous êtes diabétique ou vous avez une insuffisance rénale (DFG < 60 ml/min/1,73 m²) et vous prenez SULIAT HCT® en association avec des médicaments contenant de l'alisirkén.
- Si vous pensez que vous pouvez être allergique, ne prenez pas SULIAT HCT et parlez-en à votre médecin.
- Si vous avez une maladie du foie, une destruction des petits canaux biliaires dans le foie (cirrhose biliaire) entraînant une accumulation de bile dans le foie (cholestase).
- Si vous avez de graves problèmes rénaux ou si vous êtes sous dialyse.
- Si vous êtes incapable d'uriner (anurie).
- Si votre taux sanguin de potassium ou de sodium est trop bas malgré un traitement pour augmenter les taux sanguins de potassium ou de sodium.
- Si votre taux sanguin de calcium est trop élevé malgré un traitement pour réduire les taux sanguins de calcium.
- Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations).
- Si vous présentez une baisse sévère de la pression artérielle (hypotension).
- Si vous présentez un rétrécissement de la valve aortique (sténose aortique) ou un choc cardiogénique (une affection dans laquelle votre cœur est incapable d'apporter suffisamment de sang à l'organisme).
- Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque après une crise cardiaque.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :
Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi : par un médicament contenant d'alisirkén pour diminuer la pression artérielle.

Faites attention avec SULIAT HCT :

- Si votre taux sanguin de potassium ou magnésium est bas (avec ou sans symptômes tels que faiblesse musculaire, spasmes musculaires, rythme cardiaque normal).
- Si votre taux sanguin de sodium est bas (avec ou sans symptômes tels que fatigue, confusion, contractions musculaires, convulsions).
- Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que nausées, vomissements, constipation, maux d'estomac, mictions fréquentes, soif, faiblesse et contractions musculaires).
- Si vous avez des problèmes rénaux, si vous avez eu une greffe de rein ou si vous étiez informé que vous avez un rétrécissement de vos artères rénales.
- Si vous avez eu ou si vous avez eu une insuffisance cardiaque ou une maladie coronarienne, en particulier s'il vous a été prescrit la dose maximale d'Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide (10 mg/320 mg/25 mg).
- Si vous avez présenté une crise cardiaque. Suivez attentivement les instructions de votre médecin pour la dose initiale. Votre médecin peut aussi vérifier votre fonction rénale.
- Si votre médecin vous a informé que vous avez un rétrécissement des valves du cœur (appelé « sténose aortique ou mitrale ») ou que l'épaisseur de votre muscle cardiaque est augmentée de manière anormale (ce que l'on appelle une « cardiomyopathie hypertrophique obstructive »).
- Si vous souffrez d'hypéraldostéronisme. Il s'agit d'une maladie dans laquelle les glandes surrénales fabriquent une quantité trop importante d'hormone aldostérone. L'utilisation de SULIAT HCT est déconseillée si vous êtes dans cette situation.
- Si vous souffrez d'une maladie appelée lupus érythémateux disséminé (appelée également « lupus » ou « LED »).
- Si vous êtes diabétique (taux de sucre élevé dans le sang).
- Si votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé.
- Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.
- Si vous avez développé une réaction allergique à d'autres médicaments antihypertenseurs.
- Si vous avez développé une réaction allergique à d'autres médicaments antihypertenseurs (la quantité d'urine produite), en particulier si vous souffrez d'asthme et d'allergies.
- Si vous êtes malade (vomissements ou diarrhée).
- Si vous avez présenté des gonflements, en particulier du visage et de la gorge, lors de la conversion de l'angiotensine).
- Si ces symptômes surviennent, arrêtez de prendre SULIAT HCT et contactez votre médecin.
- En cas de sensations vertigineuses et/ou d'évanouissements pendant le traitement par SULIAT HCT, arrêtez de prendre le médicament et contactez votre médecin.
- Si vous ressentez une baisse de la vision ou une douleur dans l'œil. Ce pourrait être les symptômes d'une affection de l'œil. Consultez votre médecin.
- Si vous ressentez une baisse de la vision ou une douleur dans l'œil. Ce pourrait être les symptômes d'une affection de l'œil. Consultez votre médecin.
- Si vous prenez l'un des médicaments suivants pour traiter une hypertension :
 - Un « inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC) » (par exemple Enalapril, Lisinopril, Ramapril).
 - Aliskiren.
- Votre médecin pourra surveiller régulièrement le fonctionnement de vos reins, votre pression sanguine et votre taux de potassium.
- Risque accru de cancer de la peau non-mélanome (carcinome basocellulaire, carcinome épidermoïde) suite à l'exposition à des doses cumulatives croissantes d'hydrochlorothiazide (HCTZ).
- Les patients qui prennent l'HCTZ seul ou en association avec d'autres médicaments doivent être informés de ce risque et de la nécessité de vérifier régulièrement l'état de leur peau afin de détecter toute nouvelle lésion ou modification de lésion existante et de signaler toute lésion cutanée.

SULIAT HCT

LOT: 203849 EXP: 02/22
PPV: 185DH20

Diap de ces trois mécanismes, les vaisseaux sanguins se relâchent et la tension artérielle diminue.

Indications thérapeutiques :

SULIAT HCT est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle chez les patients adultes dont la pression artérielle est déjà contrôlée par la prise d'Amlodipine, de Valsartan et d'Hydrochlorothiazide et qui peuvent bénéficier de la prise d'un seul comprimé contenant les trois substances.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SULIAT HCT ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Contre - indications :

Ne prenez jamais SULIAT HCT, comprimés pelliculés, en cas de :

- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. (Il est également recommandé d'éviter de prendre SULIAT HCT en début de grossesse).
- Si vous êtes allergique à l'Amlodipine ou à tout autre inhibiteur calcique, au Valsartan, à l'Hydrochlorothiazide, aux dérivés sulfamidés (des médicaments utilisés pour traiter les infections pulmonaires ou urinaires) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous êtes diabétique ou vous avez une insuffisance rénale (DFG < 60 ml/min/1,73 m²) et vous prenez SULIAT HCT® en association avec des médicaments contenant de l'alisirkren.
- Si vous pensez que vous pouvez être allergique, ne prenez pas SULIAT HCT et parlez-en à votre médecin.
- Si vous avez une maladie du foie, une destruction des petits canaux biliaires dans le foie (cirrhose biliaire) entraînant une accumulation de bile dans le foie (cholestase).
- Si vous avez de graves problèmes rénaux ou si vous êtes sous dialyse.
- Si vous êtes incapable d'uriner (anurie).
- Si votre taux sanguin de potassium ou de sodium est trop bas malgré un traitement pour augmenter les taux sanguins de potassium ou de sodium.
- Si votre taux sanguin de calcium est trop élevé malgré un traitement pour réduire les taux sanguins de calcium.
- Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations).
- Si vous présentez une baisse sévère de la pression artérielle (hypotension).
- Si vous présentez un rétrécissement de la valve aortique (sténose aortique) ou un choc cardiogénique (une affection dans laquelle votre cœur est incapable d'apporter suffisamment de sang à l'organisme).
- Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque après une crise cardiaque.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :
Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi : par un médicament contenant d'alisirkren pour diminuer la pression artérielle.

Faites attention avec SULIAT HCT :

- Si votre taux sanguin de potassium ou magnésium est bas (avec ou sans symptômes tels que faiblesse musculaire, spasmes musculaires, rythme cardiaque normal).
- Si votre taux sanguin de sodium est bas (avec ou sans symptômes tels que fatigue, confusion, contractions musculaires, convulsions).
- Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que nausées, vomissements, constipation, maux d'estomac, mictions fréquentes, soif, faiblesse et contractions musculaires).
- Si vous avez des problèmes rénaux, si vous avez eu une greffe de rein ou si vous étiez informé que vous avez un rétrécissement de vos artères rénales.
- Si vous avez eu ou si vous avez eu une insuffisance cardiaque ou une maladie coronarienne, en particulier s'il vous a été prescrit la dose maximale d'Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide (10 mg/320 mg/25 mg).
- Si vous avez présenté une crise cardiaque. Suivez attentivement les instructions de votre médecin pour la dose initiale. Votre médecin peut aussi vérifier votre fonction rénale.
- Si votre médecin vous a informé que vous avez un rétrécissement des valves du cœur (appelé « sténose aortique ou mitrale ») ou que l'épaisseur de votre muscle cardiaque est augmentée de manière anormale (ce que l'on appelle une « cardiomyopathie hypertrophique obstructive »).
- Si vous souffrez d'hypéraldostéronisme. Il s'agit d'une maladie dans laquelle les glandes surrénales fabriquent une quantité trop importante d'hormone aldostérone. L'utilisation de SULIAT HCT est déconseillée si vous êtes dans cette situation.
- Si vous souffrez d'une maladie appelée lupus érythémateux disséminé (appelée également « lupus » ou « LED »).
- Si vous êtes diabétique (taux de sucre élevé dans le sang).
- Si votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé.
- Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.
- Si vous avez développé une réaction allergique à d'autres médicaments antihypertenseurs (la quantité d'urine produite), en particulier si vous souffrez d'asthme et d'allergies.
- Si vous êtes malade (vomissements ou diarrhée).
- Si vous avez présenté des gonflements, en particulier du visage et de la gorge, lors de la conversion de l'angiotensine).
- Si ces symptômes surviennent, arrêtez de prendre SULIAT HCT et contactez votre médecin.
- En cas de sensations vertigineuses et/ou d'évanouissements pendant le traitement par SULIAT HCT, arrêtez de prendre le médicament et contactez votre médecin.
- Si vous ressentez une baisse de la vision ou une douleur dans l'œil. Ce pourrait être les symptômes d'une affection de l'œil. Consultez votre médecin.
- Si vous prenez l'un des médicaments suivants pour traiter une hypertension :
 - Un « inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC) » (par exemple Enalapril, Lisinopril, Ramapril).
 - Aliskiren.
- Votre médecin pourra surveiller régulièrement le fonctionnement de vos reins, votre pression sanguine et votre taux de potassium.
- Risque accru de cancer de la peau non-mélanome (carcinome basocellulaire, carcinome épidermoïde) suite à l'exposition à des doses cumulatives croissantes d'hydrochlorothiazide (HCTZ).
- Les patients qui prennent l'HCTZ seul ou en association avec d'autres médicaments doivent être informés de ce risque et de la nécessité de vérifier régulièrement l'état de leur peau afin de détecter toute nouvelle lésion ou modification de lésion existante et de signaler toute lésion cutanée.

SULIAT HCT

LOT : 203849 EXP : 02/22
PPV : 185DH20



alAmana
MICROFINANCE

Reçu



N° 013U3FMN

Agence : ZS

Date d'Encaissement : 20/10/2020

Nom client: MAMOUN fouzia

à 15:38:56

Montant reçu : 466,80

Signature et Cachet Agence

Réf. P/S : Réf. client

PID 00004714662 / 00005926064

Copie client

40, Charii El Fadillah, Quartier Industriel, CYM, Rabat - Tél: 0537 29 39 49 - Fax : 0537 29 38 92



Reçu



N° 013UDATN

Agence : ZS

Date d'Encaissement : 17/11/2020
à 10:48:42

Nom client: MAMOUN fouzia

Montant reçu : 391,00

Signature et Cachet Agence

Réf. P/S : Réf. client

PID 00004714662 / 00005926064

Copie client

40, Charii El Fadillah, Quartier Industriel, CYM, Rabat - Tél: 0537 29 39 49 - Fax : 0537 29 38 92

A.T: 15.4 / 9.7 (77)

Name: KARMA ELARBI

Cli No.:

Sex: Male

Age: 57Y

SN: 0005153

Section:

CaseNo.:

BedNo.:

Date: 10/11/2020 14:09:44

bpm	80	80	80	78	80	77	77	79	77	76
ms	751	746	752	768	751	784	778	758	783	785



00:06 AC+DFT+EMG 25mm/s 10mm/mV

Frequency:	1000Hz	QT Interval:	413ms
Sample Time:	19s	QTc Interval:	472ms
HR:	78bpm	P Axis:	67.40;ã
P Interval:	99ms	QRS Axis:	170.10;ã
QRS Interval:	158ms	T Axis:	38.80;ã
T Interval:	182ms	RV5/SV1	0.39/-mV
PR Interval:	170ms	RV5+SV1	--

Prompt:

Total Beats 24 ,Normal Beats 23 ,VE 1 .
in gear Sinus mode Target rate;Middling Right axis deviation;Completeness Right Bundle branch block;old inferior MI;Abnormal T wave;

Dr. HAFDI Karim
Cardiologue
N°3, Residence Haytam, H.v El Walaa
Sidi Moumen - Casablanca
Tel.: 05 22 71 00 36

Doctor: HAFDI KARIM

الوكالة المتشاور

الهاتف 0662784539

اسم الزبون ناموس فوزين

رقم الزبون 00005926064



الأمانة
للتحويل الأصغر

FICHE EMI

40 شارع الفضيلة، حي يعقوب المنصور، 10 000 الرباط، المغرب
الهاتف: 05 37 29 39 49 (+212) الفاكس: 05 37 29 38 92 (+212)

www.alamana.org - alamana@alamana.org.ma

تاريخ الاستحقاق 37	تاريخ الاستحقاق 38	تاريخ الاستحقاق 39
تاريخ الاستحقاق 40	تاريخ الاستحقاق 41	تاريخ الاستحقاق 42
تاريخ الاستحقاق 43	تاريخ الاستحقاق 44	تاريخ الاستحقاق 45
تاريخ الاستحقاق 46	تاريخ الاستحقاق 47	تاريخ الاستحقاق 48
تاريخ الاستحقاق 49	تاريخ الاستحقاق 50	تاريخ الاستحقاق 51
تاريخ الاستحقاق 52	تاريخ الاستحقاق 53	تاريخ الاستحقاق 54
تاريخ الاستحقاق 55	تاريخ الاستحقاق 56	تاريخ الاستحقاق 57
تاريخ الاستحقاق 58	تاريخ الاستحقاق 59	تاريخ الاستحقاق 60
تاريخ الاستحقاق 61	تاريخ الاستحقاق 62	تاريخ الاستحقاق 63
تاريخ الاستحقاق 64	تاريخ الاستحقاق 65	تاريخ الاستحقاق 66
تاريخ الاستحقاق 67	تاريخ الاستحقاق 68	تاريخ الاستحقاق 69
تاريخ الاستحقاق 70	تاريخ الاستحقاق 71	تاريخ الاستحقاق 72

3 تاريخ الاستحقاق	2 تاريخ الاستحقاق	1 تاريخ الاستحقاق
6 تاريخ الاستحقاق	5 تاريخ الاستحقاق	4 تاريخ الاستحقاق
9 تاريخ الاستحقاق	8 تاريخ الاستحقاق	7 تاريخ الاستحقاق
12 تاريخ الاستحقاق	11 تاريخ الاستحقاق	10 تاريخ الاستحقاق
15 تاريخ الاستحقاق	14 تاريخ الاستحقاق	13 تاريخ الاستحقاق
18 تاريخ الاستحقاق	17 تاريخ الاستحقاق	16 تاريخ الاستحقاق
21 تاريخ الاستحقاق	20 تاريخ الاستحقاق	19 تاريخ الاستحقاق
24 تاريخ الاستحقاق	23 تاريخ الاستحقاق	22 تاريخ الاستحقاق
27 تاريخ الاستحقاق	26 تاريخ الاستحقاق	25 تاريخ الاستحقاق
30 تاريخ الاستحقاق	29 تاريخ الاستحقاق	28 تاريخ الاستحقاق
33 تاريخ الاستحقاق	32 تاريخ الاستحقاق	31 تاريخ الاستحقاق
36 تاريخ الاستحقاق	35 تاريخ الاستحقاق	34 تاريخ الاستحقاق

جدول الاستحقاقات

نوع القرض الفردي 161 عدد 2

نوعية التسديد 18 شهر

تاريخ منح القرض 2020 | 10 | 20

الاستحقاق الاول 466,80

مبلغ القرض 5606

عدد الاستحقاقات المتبقية 18

مبلغ 391

تم التسديدات قبل 9 صباحا 30
 واذا تزامن يوم التسديد مع عطلة ما، فان التسديد يتم 30
 يضع الوكيل توقيعه وخاتمه اعترافا بتسديد كل استحقاق