

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1748 Société : R.A.M. (48716)

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : ADIONBAN ATMAN

Date de naissance : 1947

Adresse : 75 Rue Hassan II Fès 2ème Etage N°4

CASA 02 ANCA

Tél. : 0661950911 Total des frais engagés : 573,90 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. ABDELKrim TOUGANI
Medecine Generale
06 63 00 51 07 / 05 39 96 36 38
19. Rue Moukaouama Tétouan
شارع المقاومة تطوان 19

Cachet du médecin : Dr. ABDELKrim TOUGANI

Date de consultation : 05/10/2020 Nom et prénom du malade : BAVANAN ZOUBAIDA Age: 75

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : HTA

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration et je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : TETOUAN Le : 05/10/2020

Signature de l'adhérent(e) : O. ADIONBAN



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
05/10/2020	C	1	Dr. ABDELRAMAN TOUGANI Medecine Generale 06 63 00 31 07 / 05 39 96 36 38 19, Rue Moukaouama Tétouan ش.م.ع. المقاومات Signature : Dr. ABDELRAMAN TOUGANI	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 Dr Attoubaen Henna Chemin Belarbi EL ALAOUI N°384 Twissat DETUAN Tel 0538 97 46 44 162065421	5/10/20	573,90 DH

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F		DETERMINATION DU COEFFICIENT		

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
00000000	00000000
35533411	11433553

The diagram shows a circle divided into eight equal segments by a horizontal and a vertical axis intersecting at the center. Each segment contains a circle with a number from 1 to 8. The numbers are arranged as follows: top (H): 1, 2; right (G): 6, 7, 8; bottom (B): 1, 2, 3; left (D): 8, 7, 6, 5. Arrows on the segments indicate a clockwise direction of movement.

(Création, remont, adjonction)

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr, Abdelkrim Tougani

MEDECINE GENERALE

19, Rue Moukaouama
Tétouan

T.: 05 39 96 36 38
P.: 06 63 00 01 07



الدكتور عبد الكريم التوکاني

الطب العام

شارع المقاومة
تطوان

النيلاد: 05 39 96 36 38
أقال: 06 63 00 01 07

BENANAN

Tétouan, le : 05/10/2020 تطوان، في:

ZOUBAIDA

402,90

3x 134,30 = co-spiravel 15-2 112,-
17/11 00 3 mes

3x 14,00 = 42,00

Dalypine 1000x 13,-

3x 43,00 = 129,00

INIKAL 5-

17/11 00 3 mes

T. 573,90 DH

Dr. ABDELKRAM TOUGANI
Medecine Generale
06 63 00 01 07 / 05 39 96 36 38
19, Rue Moukaouama Tétouan
شارع المقاومة تطوان 19

Pharmacie
Dr. Abdellah
Chakir Boujelbene
N° 304, Tétouan
Tel: 05 39 96 36 38
LALAOUI
TETOUAN
07 48 44

NPE
205541

COAPROVEL®

150 mg/12,5 mg

comprimé pelliculé
irbésartan/hydrochlorothiazide

sanofi aventis

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables s'aggrave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. Qu'est-ce que CoAprovel et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoAprovel
3. Comment prendre CoAprovel
 - dont les effets indésirables éventuels
4. Comment se débarrasser des effets indésirables
5. Comment empêcher les effets indésirables
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE COAPROVEL ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

CoAprovel est une association de deux substances actives, l'irbésartan

CoAprovel ne doit pas être donné aux enfants et aux adolescents (de moins de 18 ans).

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec CoAprovel

Prévenez votre médecin si une des situations suivantes se présentent:

- si vous souffrez de vomissements ou de diarrhées importantes ;
• si vous avez une greffe de rein ;
• si vous souffrez de lupus ou
• si vous souffrez d'une forte rétention du sodium et par conséquent une augmentation de la pression artérielle).
Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1
Ain seba Casablanca
Co-aprovel 150mg/12,5mg
b28
P.P.V : 134,30 DH

6 118001 081028

(connu aussi sous le nom

limaire (une condition liée à une stérone, qui provoque une rétention du sodium et par conséquent une augmentation de la pression artérielle).

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. CoAprovel est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes à plus de 3 mois de grossesse, car il peut entraîner de graves problèmes de santé chez l'enfant à naître s'il est utilisé au cours de cette période (voir la rubrique grossesse).

Vous devrez également prévenir votre médecin:

- si vous suivez un régime hyposodé (peu riche en sel) ;
- si vous avez des signes, tels que soif anormale, bouche sèche, faiblesse générale, somnolence, douleurs musculaires ou crampes, nausées, vomissements ou battements du cœur anormalement rapides qui pourraient indiquer un effet excessif de l'hydrochlorothiazide (contenu dans CoAprovel) ;
- si vous ressentez une sensibilité accrue de votre peau au soleil avec sensation de coup de soleil plus rapidement que la normale (symptômes : rougeur, démangeaison, gonflement, cloquage) ;
- si vous devez subir une opération chirurgicale) ou une

COAPROVEL®

150 mg/12,5 mg

comprimé pelliculé
irbésartan/hydrochlorothiazide

sanofi aventis

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables s'aggrave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. Qu'est-ce que CoAprovel et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoAprovel
3. Comment prendre CoAprovel
 - dont les effets indésirables éventuels
4. Comment se débarrasser des effets indésirables
5. Comment empêcher les effets indésirables
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE COAPROVEL ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

CoAprovel est une association de deux substances actives, l'irbésartan

CoAprovel ne doit pas être donné aux enfants et aux adolescents (de moins de 18 ans).

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec CoAprovel

Prévenez votre médecin si une des situations suivantes se présentent:

- si vous souffrez de vomissements ou de diarrhées importantes ;
• si vous avez une greffe de rein ;
• si vous souffrez de lupus ou
• si vous souffrez d'une forte rétention du sodium et par conséquent une augmentation de la pression artérielle).
Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1
Ain seba Casablanca
Co-aprovel 150mg/12,5mg
b28
P.P.V : 134,30 DH

6 118001 081028

(connu aussi sous le nom

limaire (une condition liée à une stérone, qui provoque une rétention du sodium et par conséquent une augmentation de la pression artérielle).

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. CoAprovel est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes à plus de 3 mois de grossesse, car il peut entraîner de graves problèmes de santé chez l'enfant à naître s'il est utilisé au cours de cette période (voir la rubrique grossesse).

Vous devrez également prévenir votre médecin:

- si vous suivez un régime hyposodé (peu riche en sel) ;
- si vous avez des signes, tels que soif anormale, bouche sèche, faiblesse générale, somnolence, douleurs musculaires ou crampes, nausées, vomissements ou battements du cœur anormalement rapides qui pourraient indiquer un effet excessif de l'hydrochlorothiazide (contenu dans CoAprovel) ;
- si vous ressentez une sensibilité accrue de votre peau au soleil avec sensation de coup de soleil plus rapidement que la normale (symptômes : rougeur, démangeaison, gonflement, cloquage) ;
- si vous devez subir une opération chirurgicale) ou une

COAPROVEL®

150 mg/12,5 mg

comprimé pelliculé
irbésartan/hydrochlorothiazide

sanofi aventis

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables s'aggrave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. Qu'est-ce que CoAprovel et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoAprovel
3. Comment prendre CoAprovel
 - dont les effets indésirables éventuels
4. Comment prendre CoAprovel
5. Informations supplémentaires
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE COAPROVEL ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

CoAprovel est une association de deux substances actives, l'irbésartan

CoAprovel ne doit pas être donné aux enfants et aux adolescents (de moins de 18 ans).

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec CoAprovel

Prévenez votre médecin si une des situations suivantes se présentent:

- si vous souffrez de vomissements ou de diarrhées importantes ;
• si vous avez une greffe de rein ;
• si vous souffrez de lupus ou
• si vous souffrez d'une forte rétention du sodium et par conséquent une augmentation de la pression artérielle).
Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1
Ain seba Casablanca
Co-aprovel 150mg/12,5mg
b28
P.P.V : 134,30 DH

6 118001 081028

(connu aussi sous le nom

maire (une condition liée à une stérone, qui provoque une rétention du sodium et par conséquent une augmentation de la pression artérielle).

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. CoAprovel est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes à plus de 3 mois de grossesse, car il peut entraîner de graves problèmes de santé chez l'enfant à naître s'il est utilisé au cours de cette période (voir la rubrique grossesse).

Vous devrez également prévenir votre médecin:

- si vous suivez un régime hyposodé (peu riche en sel) ;
- si vous avez des signes, tels que soif anormale, bouche sèche, faiblesse générale, somnolence, douleurs musculaires ou crampes, nausées, vomissements ou battements du cœur anormalement rapides qui pourraient indiquer un effet excessif de l'hydrochlorothiazide (contenu dans CoAprovel) ;
- si vous ressentez une sensibilité accrue de votre peau au soleil avec réaction de coup de soleil plus rapidement que la normale (symptômes : rougeur, démangeaison, gonflement, cloquage) ;
- si vous devez subir une opération chirurgicale) ou une

INIKAL® 5mg boites de 14, 30, 60

INIKAL10 mg boites de 14, 30

Comprimé
(Amlodipine)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice.

ce médicament.

Gardez cette notice pourriez-vous avoir des questions.

Si vous avez autre question, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Ce médicament va être prescrit par votre pharmacien ou votre médecin.

Même en cas de symptômes identiques à ceux de la maladie.

Si l'un des effets indésirables déclarés n'a pas été mentionné dans ce notice, parlez-en à votre pharmacien ou à votre médecin.

LOT : 190545

UT AV : 03/2022

PPV : 43,000H

LOT : (HQ Add)

d'information à votre

s à quelqu'un d'autre,

effet indésirable non

COMPOSITION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE :

Besylate d'amiodipine correspondant à 5 ou 10 mg d'amiodipine

Excipients q.s.p. 1 comprimé.

Excipients à effets nuls : sans objet

CLASSE PHARMAO-THERAPEUTIQUE :

Inhibiteur calcique sélectif à effet vasculaire (dérivé de la dihydropyridine).

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Ce médicament est recommandé dans le traitement de l'hypertension artérielle et dans le traitement préventif des crises cagigne de poitrine : angine de poitrine d'effort et angine de poitrine spontanée (angor de Prinzmetal).

POSÉOLOGIE, MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

Voie d'administration : Voie orale.

La posologie initiale est de 5 mg une fois par jour, elle peut être augmentée à 10 mg par jour si nécessaire à boire avec un verre d'eau, éviter de le prendre avec un jus de pamplemousse.

Il est préférable de prendre ce médicament à la même heure tous les jours.

Dans tous les cas se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

CONTRE-INDICATIONS :

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas :

-D'hypersensibilité connue à l'amiodipine ou un autre inhibiteur calcique de la classe des dihydropyridines

-hypotension sévère, rétrécissement de la valve aortique, choc cardiogénique ou en cas d'insuffisance cardiaque.

-ce médicament est généralement déconseillé en cas d'association au dantrolène.

EFFETS INDESIRABLES :

Comme tout médicament, ce produit peut ; chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants :

- le plus souvent, il s'agit de maux de tête, rougeurs ou sensation de chaleur du visage, œdèmes des chevilles ou de la face, qui surviennent en début de traitement.

- Rarement syncope :

- Réactions cutanées : alopecie, sudation, prurit

- Effets digestifs : douleurs abdominales, nausées, diarrhée, constipation, bouche sèche, dyspepsie

- Effets neuromusculaires : crampes musculaires, fatigue

- Effets pulmonaires et cardiaques : dyspnée, tachycardie ou palpitations.

Ces effets s'atténuent en général par la suite.

Pour tout événement indésirable, tel que douleurs angineuses dans la région thoracique, trouble du rythme cardiaque pouvant survenir, très rarement, après la prise du médicament, il convient de prévenir immédiatement votre médecin.

MISES EN GARDE SPÉCIALES :

L'UTILISATION CHEZ L'ENFANT ET L'ADOLESCENT JUSQU'A 17 ANS EST DÉCONSEILLÉE.

SI DES SIGNES CLINIQUES APPARAÎTENT (FATIGUE, MANQUE D'APPETIT, NAUSEES) UN DOSAGE SANGUIN DES ENZYME DU FOIE EST RECOMMANDÉ.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Les personnes âgées ou souffrant d'une insuffisance hépatique ou cardiaque se conformeront strictement à la prescription de leur médecin.

INIKAL® 5mg boites de 14, 30, 60

INIKAL10 mg boites de 14, 30

Comprimé
(Amlodipine)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice.

ce médicament.

Gardez cette notice pourriez-vous avoir des questions.

Si vous avez autre question, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Ce médicament va être prescrit par votre pharmacien ou votre médecin.

Même en cas de symptômes identiques à ceux de la maladie.

Si l'un des effets indésirables déclarés n'a pas été mentionné dans ce notice, parlez-en à votre pharmacien ou à votre médecin.

LOT : 190545

UT AV : 03/2022

PPV : 43,000H

LOT : (HQ Add)

d'information à votre

s à quelqu'un d'autre,

effet indésirable non

COMPOSITION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE :

Besylate d'amiodipine correspondant à 5 ou 10 mg d'amiodipine

Excipients q.s.p. 1 comprimé.

Excipients à effets nuls : sans objet

CLASSE PHARMAO-THERAPEUTIQUE :

Inhibiteur calcique sélectif à effet vasculaire (dérivé de la dihydropyridine).

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Ce médicament est recommandé dans le traitement de l'hypertension artérielle et dans le traitement préventif des crises cagigne de poitrine : angine de poitrine d'effort et angine de poitrine spontanée (angor de Prinzmetal).

POSÉOLOGIE, MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

Voie d'administration : Voie orale.

La posologie initiale est de 5 mg une fois par jour, elle peut être augmentée à 10 mg par jour si nécessaire à boire avec un verre d'eau, éviter de le prendre avec un jus de pamplemousse.

Il est préférable de prendre ce médicament à la même heure tous les jours.

Dans tous les cas se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

CONTRE-INDICATIONS :

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas :

-D'hypersensibilité connue à l'amiodipine ou un autre inhibiteur calcique de la classe des dihydropyridines

-hypotension sévère, rétrécissement de la valve aortique, choc cardiogénique ou en cas d'insuffisance cardiaque.

-ce médicament est généralement déconseillé en cas d'association au dantrolène.

EFFETS INDESIRABLES :

Comme tout médicament, ce produit peut ; chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants :

- le plus souvent, il s'agit de maux de tête, rougeurs ou sensation de chaleur du visage, œdèmes des chevilles ou de la face, qui surviennent en début de traitement.

- Rarement syncope :

- Réactions cutanées : alopecie, sudation, prurit

- Effets digestifs : douleurs abdominales, nausées, diarrhée, constipation, bouche sèche, dyspepsie

- Effets neuromusculaires : crampes musculaires, fatigue

- Effets pulmonaires et cardiaques : dyspnée, tachycardie ou palpitations.

Ces effets s'atténuent en général par la suite.

Pour tout événement indésirable, tel que douleurs angineuses dans la région thoracique, trouble du rythme cardiaque pouvant survenir, très rarement, après la prise du médicament, il convient de prévenir immédiatement votre médecin.

MISES EN GARDE SPÉCIALES :

L'UTILISATION CHEZ L'ENFANT ET L'ADOLESCENT JUSQU'A 17 ANS EST DÉCONSEILLÉE.

SI DES SIGNES CLINIQUES APPARAÎTENT (FATIGUE, MANQUE D'APPETIT, NAUSEES) UN DOSAGE SANGUIN DES ENZYME DU FOIE EST RECOMMANDÉ.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Les personnes âgées ou souffrant d'une insuffisance hépatique ou cardiaque se conformeront strictement à la prescription de leur médecin.

NIKAL® 5mg boites de 14, 30, 60

NIKAL10 mg boites de 14, 30

Comprimé
(Amlodipine)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice.

Prenez ce médicament.

Gardez cette notice pourriez-vous avoir une question.

Si vous avez autre question, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

Ce médicament vous a été prescrit pour vous.

Même en cas de symptômes identiques à ceux de la maladie.

Si l'un des effets indésirables déclarés n'a pas été mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien ou à votre médecin.

LOT : 190545

UT AV : 03/2022

PPV : 43,000H

LOT N° :

: (HQ Add)

d'information à votre

s à quelqu'un d'autre,

effet indésirable non

COMPOSITION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE :

Besylate d'amiodipine correspondant à 5 ou 10 mg d'amiodipine

Excipients q.s.p. 1 comprimé.

Excipients à effets nuls : sans objet

CLASSE PHARMAO-THERAPEUTIQUE :

Inhibiteur calcique sélectif à effet vasculaire (dérivé de la dihydropyridine).

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Ce médicament est recommandé dans le traitement de l'hypertension artérielle et dans le traitement préventif des crises cardiaques de poitrine : angine de poitrine d'effort et angine de poitrine spontanée (angor de Prinzmetal).

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

Voie d'administration : Voie orale.

La posologie initiale est de 5 mg une fois par jour, elle peut être augmentée à 10 mg par jour si nécessaire à boire avec un verre d'eau, éviter de le prendre avec un jus de pamplemousse.

Il est préférable de prendre ce médicament à la même heure tous les jours.

Dans tous les cas se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

CONTRE-INDICATIONS :

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas :

-D'hypersensibilité connue à l'amiodipine ou un autre inhibiteur calcique de la classe des dihydropyridines

-hypotension sévère, rétrécissement de la valve aortique, choc cardiogénique ou en cas d'insuffisance cardiaque.

-ce médicament est généralement déconseillé en cas d'association au dantrolène.

EFFETS INDESIRABLES :

Comme tout médicament, ce produit peut ; chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants :

- le plus souvent, il s'agit de maux de tête, rougeurs ou sensation de chaleur du visage, œdèmes des chevilles ou de la face, qui surviennent en début de traitement.

- Rarement syncope :

- Réactions cutanées : alopecie, sudation, prurit

- Effets digestifs : douleurs abdominales, nausées, diarrhée, constipation, bouche sèche, dyspepsie

- Effets neuromusculaires : crampes musculaires, fatigue

- Effets pulmonaires et cardiaques : dyspnée, tachycardie ou palpitations.

Ces effets s'atténuent en général par la suite.

Pour tout événement indésirable, tel que douleurs angineuses dans la région thoracique, trouble du rythme cardiaque pouvant survenir, très rarement, après la prise du médicament, il convient de prévenir immédiatement votre médecin.

MISES EN GARDE SPECIALES :

L'UTILISATION CHEZ L'ENFANT ET L'ADOLESCENT JUSQU'A 17 ANS EST DECONSEILLEE.

SI DES SIGNES CLINIQUES APPARAISSENT (FATIGUE, MANQUE D'APPETIT, NAUSEES) UN DOSAGE SANGUIN DES ENZYME DU FOIE EST RECOMMANDÉ.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Les personnes âgées ou souffrant d'une insuffisance hépatique ou cardiaque se conformeront strictement à la prescription de leur médecin.

Doliprane® 1000 mg

PARACÉTAMOL

Comprimé

14,00

DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé :

La substance active est : paracétamol 1000 mg, sous forme de paracétamol DC 90 (1111,11 mg), pour un comprimé.

Les autres composants sont cellesse sodique, povidone K30, amidon de maïs prégélatinisé (éthylcellulose végétale).

QU'EST-CE QU'UN COMPRIMÉ DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient du paracétamol et peut être prescrit pour la fièvre telles que maladie de grippe, rhume, grippe, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses. Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans) :

Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?

Contre-indications :

Ne pas prendre DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé dans les cas suivants : allergie connue au paracétamol, maladie grave du foie, enfant de moins de 15 ans.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIERES AVEC DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ :

Précautions Particulières :

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

Mises en garde :

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre "Posologie").

Grossesse et allaitement :

Le Paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.



Doliprane® 1000 mg

PARACÉTAMOL

Comprimé

14,00

DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé :

La substance active est : paracétamol 1000 mg, sous forme de paracétamol DC 90 (1111,11 mg), pour un comprimé.

Les autres composants sont cellesse sodique, povidone K30, amidon de maïs prégélatinisé (éthylcellulose végétale).

QU'EST-CE QU'UN COMPRIMÉ DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient du paracétamol et est indiqué en cas de douleur et/ou fièvre telles que mal de tête, grippe, rhume, grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses. Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans) :

Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?

Contre-indications :

Ne pas prendre DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé dans les cas suivants : allergie connue au paracétamol, maladie grave du foie, enfant de moins de 15 ans.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIERES AVEC DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ :

Précautions Particulières :

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

Mises en garde :

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre "Posologie").

Grossesse et allaitement :

Le Paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.



Doliprane® 1000 mg

PARACÉTAMOL

Comprimé

14,00

DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé :

La substance active est : paracétamol 1000 mg, sous forme de paracétamol DC 90 (1111,11 mg), pour un comprimé.

Les autres composants sont cellesse sodique, povidone K30, amidon de maïs prégélatinisé (éthylcellulose végétale).

QU'EST-CE QU'UN COMPRIMÉ DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient du paracétamol et peut être prescrit pour la fièvre telles que maladie de grippe, rhume, grippe, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses. Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans) :

Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?

Contre-indications :

Ne pas prendre DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé dans les cas suivants : allergie connue au paracétamol, maladie grave du foie, enfant de moins de 15 ans.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIERES AVEC DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ :

Précautions Particulières :

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

Mises en garde :

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre "Posologie").

Grossesse et allaitement :

Le Paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.

