

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## que :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Optique :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Autres :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

28-780

## Déclaration de Maladie : N° S19-0004700

### Maladie

### Dentaire

### Optique

### Autres

#### Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 3105 Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : HOURRI Mohamed Date de naissance : 01-07-1959

Adresse : Cite 3 Jouras, Jamila, I Rue 2 N° 3 Casablanca

Tél. : 0661208603 Total des frais engagés : 1168,90 Dhs

#### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

**Dr JARDANEH Hassan**  
**CARDIOLOGUE**  
386, Av Idriss El Harti  
Tél 022 55 12 12 Casablanca

**Dr. JARDANEH HASSAN**  
**CARDIOLOGUE**  
INP: 091080481

Date de consultation : 25/11/2020

Nom et prénom du malade : Houari Mohamed Age : 69

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration de déclare

Fait à : ASSOCIATION

Signature de l'adhérent(e) : S. Hourri

Le : 28/11/2020

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	28.11.2020	868,90

#### **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX





Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### **Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 00000000 35533411	G 21433552 00000000 00000000 11433553	B	COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXÉCUTION

# عيادة أمراض القلب والشرايين والظفر الدموي

Docteur JARDANEH Hassan  
CARDIOLOGUE

Spécialiste des Maladies du Coeur  
des Vaisseaux et de l'Hypertension Artérielle

Diplomé de la Faculté de Médecine de Caen - France  
et de Bruxelles - Belgique

Ancien Attaché des Hôpitaux de Bruxelles  
Echo - Doppler Couleur Cardiaque



الدكتور حسن جردانه  
اختصاصي

أمراض القلب والشرايين والظفر الدموي  
خريج كلية الطب بن - فرنسا

بروكسيل بيكا

طبيب ملحق سابق بمستشفيات بروكسيل  
فحص القلب بالصدى، بالألوان

Cardioaspirine 100 mg/30cps -  
Acide acétysalicylique  
P.P.V. : 27,70 DH  
Bayer S.A.

Cardioaspirine 100 mg/30cps -  
Acide acétysalicylique  
P.P.V. : 27,70 DH  
Bayer S.A.

Cardioaspirine 100 mg/30cps -  
Acide acétysalicylique  
P.P.V. : 27,70 DH  
Bayer S.A.

Cardioaspirine 100 mg/30cps -  
Acide acétysalicylique  
P.P.V. : 27,70 DH  
Bayer S.A.

Cardioaspirine 100 mg/30cps -  
Acide acétysalicylique  
P.P.V. : 27,70 DH  
Bayer S.A.

Cardioaspirine 100 mg/30cps -  
Acide acétysalicylique  
P.P.V. : 27,70 DH  
Bayer S.A.

Casablanca, le :

25/11/2020

1) Hourri Mohamed 15  
Cardioaspirine 100 mg/30cps -  
Acide acétysalicylique  
P.P.V. : 27,70 DH  
Bayer S.A.  
1 g / jour 15 = 150 mg  
Calcium 500 mg le matin 150 mg  
Wool 20 mg 150 mg  
1 g / jour 150 mg  
Zolam 10 mg 150 mg  
Iphelde 200 mg 150 mg  
Total 868.90 DH 150 mg

Dr JARDANEH  
CARDIOLOGUE  
386, Av I  
Tel 022 55  
El Harti  
Casablanca

386, Avenue Idriss El Harti - Derb Douam - Cité Djemaa - (Ben M'rik) - 1er étage

CASABLANCA - Tél. & Fax : 0522 55 12 12

une fois par jour si la pression artérielle souhaitée n'est pas atteinte après quelques semaines.

#### **Particularités :**

CALCINIB® utilisé à des doses similaires montre une bonne tolérance équivalente chez les patients âgés et les patients plus jeunes.

#### **hépatique :**

Il doit être débuté à la dose la plus faible et augmentée lentement chez les patients atteints d'insuffisance rénale.

**rénale :** Les changements des concentrations plasmatiques d'amiodipine ne sont pas corrélés avec le déclin de la fonction rénale, une posologie usuelle est donc recommandée. L'amiodipine n'est pas dialysable.

**IS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION DE VOTRE MEDECIN.**

#### **5. Contre-indications :**

Ne pas prendre CALCINIB® en cas de :

- Hypertension artérielle aux dérivés de la dihydropyridine, à l'amiodipine ou à l'un des excipients;
- Hypotension sévère;
- Choc (y compris choc cardiogénique);
- Obstruction de la voie d'éjection du ventricule gauche (par exemple, sténose aortique de degré élevé);
- Insuffisance cardiaque hémodynamiquement instable après un infarctus aigu du myocarde.

#### **6. Effet indésirable :**

Comme tous les médicaments, CALCINIB® est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit sujet. Ces phénomènes s'atténuent en général par la suite. Le plus souvent, il s'agit de maux de tête, de sensation de chaleur du visage, œdèmes des chevilles ou de la face, qui surviennent en début de traitement.

#### **Rarement :**

- Effets cardiovasculaires: sensations d'accélération du rythme cardiaque, palpitations, syncopes;
- Effets cutanéo-muqueux: chute des cheveux ou des poils, augmentation de la sudation, réactions allergiques (mangeaisons, éruption et œdèmes des vaisseaux);
- Effets digestifs: douleurs abdominales, trouble du goût, digestion difficile, perte de poids, bouche sèche;
- Effets musculosquelettiques: crampes musculaires, douleurs des muscles, douleurs articulaires; patologiques: hépatite, jaunisse, modification biologique d'origine hépatique (augmentation de la transaminase, du bilirubin, du cholestérol, de la triglycéride), anomalies de la coagulation, augmentation de la bilirubine dans le sang; ces anomalies sont réversibles à l'arrêt du traitement;
- Effets urinaires: augmentation de la fréquence des urinations, diminution de la force de l'urine, infections urinaires; i
- Effets sous-cutanés: réactions anti-hypertenseurs, développement d'œdème pulmonaire;
- Effets psychiques: fatigues, sensation de malaise, étourdissements, troubles visuels, troubles dépressifs, dépression, i
- Effets généraux: malaise;
- Effets sur le système circulatoire: taux anormalement bas de plaquettes.

**CALCINIB 5 mg 28 comprimés**



6 1118000 050506

LOT : 082  
PER : SEP 2023  
PPV : 49 DH 40

une fois par jour si la pression artérielle souhaitée n'est pas atteinte après quelques semaines.

#### **Particularités :**

CALCINIB® utilisé à des doses similaires montre une bonne tolérance équivalente chez les patients âgés et les patients plus jeunes.

#### **hépatique :**

Il doit être débuté à la dose la plus faible et augmentée lentement chez les patients atteints d'insuffisance rénale.

**rénale :** Les changements des concentrations plasmatiques d'amiodipine ne sont pas corrélés avec le déclin de la fonction rénale, une posologie usuelle est donc recommandée. L'amiodipine n'est pas dialysable.

**IS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION DE VOTRE MEDECIN.**

#### **5. Contre-indications :**

Ne pas prendre CALCINIB® en cas de :

- Hypertension artérielle aux dérivés de la dihydropyridine, à l'amiodipine ou à l'un des excipients;
- Hypotension sévère;
- Choc (y compris choc cardiogénique);
- Obstruction de la voie d'éjection du ventricule gauche (par exemple, sténose aortique de degré élevé);
- Insuffisance cardiaque hémodynamiquement instable après un infarctus aigu du myocarde.

#### **6. Effet indésirable :**

Comme tous les médicaments, CALCINIB® est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit sujet. Ces phénomènes s'atténuent en général par la suite. Le plus souvent, il s'agit de maux de tête, de sensation de chaleur du visage, œdèmes des chevilles ou de la face, qui surviennent en début de traitement.

#### **Rarement :**

- Effets cardiovasculaires: sensations d'accélération du rythme cardiaque, palpitations, syncopes;
- Effets cutanéo-muqueux: chute des cheveux ou des poils, augmentation de la sudation, réactions allergiques (mangeaisons, éruption et œdèmes des vaisseaux);
- Effets digestifs: douleurs abdominales, trouble du goût, digestion difficile, perte de poids, bouche sèche;
- Effets musculosquelettiques: crampes musculaires, douleurs des muscles, douleurs articulaires; patologiques: hépatite, jaunisse, modification biologique d'origine hépatique (augmentation de la transaminase, du taux de bilirubine dans le sang); ces anomalies sont réversibles à l'arrêt du traitement;
- Effets urinaires: augmentation de la fréquence des urinations, troubles de la miction, infections urinaires; i-
- Effets sous-cutanés: réactions anti-hypertenseurs, développement d'œdème pulmonaire;
- Effets psychiques: fatigued, sensation de malaise, étourdissements, troubles visuels, troubles dépressifs, dépression; i-
- Effets généraux: malaise;
- Effets sur le système circulatoire: taux anormalement bas de plaquettes.

**CALCINIB 5 mg 28 comprimés**



6 1118000 050506

LOT : 082  
PER : SEP 2023  
PPV : 49 DH 40

une fois par jour si la pression artérielle souhaitée n'est pas atteinte après quelques semaines.

#### **Particularités :**

CALCINIB® utilisé à des doses similaires montre une bonne tolérance équivalente chez les patients âgés et les patients plus jeunes.

#### **hépatique :**

Il doit être débuté à la dose la plus faible et augmentée lentement chez les patients atteints d'insuffisance rénale.

**rénale :** Les changements des concentrations plasmatiques d'amiodipine ne sont pas corrélés avec le déclin de la fonction rénale, une posologie usuelle est donc recommandée. L'amiodipine n'est pas dialysable.

**IS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION DE VOTRE MEDECIN.**

#### **5. Contre-indications :**

Ne pas prendre CALCINIB® en cas de :

- Hypertension artérielle aux dérivés de la dihydropyridine, à l'amiodipine ou à l'un des excipients;
- Hypotension sévère;
- Choc (y compris choc cardiogénique);
- Obstruction de la voie d'éjection du ventricule gauche (par exemple, sténose aortique de degré élevé);
- Insuffisance cardiaque hémodynamiquement instable après un infarctus aigu du myocarde.

#### **6. Effet indésirable :**

Comme tous les médicaments, CALCINIB® est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit sujet. Ces phénomènes s'atténuent en général par la suite. Le plus souvent, il s'agit de maux de tête, de sensation de chaleur du visage, œdèmes des chevilles ou de la face, qui surviennent en début de traitement.

#### **Rarement :**

- Effets cardiovasculaires: sensations d'accélération du rythme cardiaque, palpitations, syncopes;
- Effets cutanéo-muqueux: chute des cheveux ou des poils, augmentation de la sudation, réactions allergiques (mangeaisons, éruption et œdèmes des vaisseaux);
- Effets digestifs: douleurs abdominales, trouble du goût, digestion difficile, perte de poids, bouche sèche;
- Effets musculosquelettiques: crampes musculaires, douleurs des muscles, douleurs articulaires; patologiques: hépatite, jaunisse, modification biologique d'origine hépatique (augmentation de la transaminase, du taux de bilirubine dans le sang); ces anomalies sont réversibles à l'arrêt du traitement;
- Effets urinaires: augmentation de la fréquence des urinations, troubles de la miction, infections urinaires; i-
- Effets sous-cutanés: réactions anti-hypertenseurs, développement d'œdème pulmonaire;
- Effets psychiques: fatigued, sensation de malaise, étourdissements, troubles visuels, troubles dépressifs, dépression, i-
- Effets généraux: malaise;
- Effets sur le système circulatoire: taux anormalement bas de plaquettes.

**CALCINIB 5 mg 28 comprimés**



6 1118000 050506

LOT : 082  
PER : SEP 2023  
PPV : 49 DH 40

une fois par jour si la pression artérielle souhaitée n'est pas atteinte après quelques semaines.

#### **Particularités :**

CALCINIB® utilisé à des doses similaires montre une bonne tolérance équivalente chez les patients âgés et les patients plus jeunes.

#### **hépatique :**

Il doit être débuté à la dose la plus faible et augmentée lentement chez les patients atteints d'insuffisance rénale.

**rénale :** Les changements des concentrations plasmatiques d'amiodipine ne sont pas corrélés avec le déclin de la fonction rénale, une posologie usuelle est donc recommandée. L'amiodipine n'est pas dialysable.

**IS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION DE VOTRE MEDECIN.**

#### **5. Contre-indications :**

Ne pas prendre CALCINIB® en cas de :

- Hypertension artérielle aux dérivés de la dihydropyridine, à l'amiodipine ou à l'un des excipients;
- Hypotension sévère;
- Choc (y compris choc cardiogénique);
- Obstruction de la voie d'éjection du ventricule gauche (par exemple, sténose aortique de degré élevé);
- Insuffisance cardiaque hémodynamiquement instable après un infarctus aigu du myocarde.

#### **6. Effet indésirable :**

Comme tous les médicaments, CALCINIB® est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit sujet. Ces phénomènes s'atténuent en général par la suite. Le plus souvent, il s'agit de maux de tête, de sensation de chaleur du visage, œdèmes des chevilles ou de la face, qui surviennent en début de traitement.

#### **Rarement :**

- Effets cardiovasculaires: sensations d'accélération du rythme cardiaque, palpitations, syncopes;
- Effets cutanéo-muqueux: chute des cheveux ou des poils, augmentation de la sudation, réactions allergiques (mangeaisons, éruption et œdèmes des vaisseaux);
- Effets digestifs: douleurs abdominales, trouble du goût, digestion difficile, perte de poids, bouche sèche;
- Effets musculosquelettiques: crampes musculaires, douleurs des muscles, douleurs articulaires; patologiques: hépatite, jaunisse, modification biologique d'origine hépatique (augmentation de la transaminase, du taux de bilirubine dans le sang); ces anomalies sont réversibles à l'arrêt du traitement;
- Effets urinaires: augmentation de la fréquence des urinations, troubles de la miction, infections urinaires; i-
- Effets sous-cutanés: réactions anti-hypertenseurs, développement d'œdème pulmonaire;
- Effets psychiques: fatigued, sensation de malaise, étourdissements, troubles visuels, troubles dépressifs, dépression, i-
- Effets généraux: malaise;
- Effets sur le système circulatoire: taux anormalement bas de plaquettes.

**CALCINIB 5 mg 28 comprimés**



6 1118000 050506

LOT : 082  
PER : SEP 2023  
PPV : 49 DH 40

une fois par jour si la pression artérielle souhaitée n'est pas atteinte après quelques semaines.

#### **Particularités :**

CALCINIB® utilisé à des doses similaires montre une bonne tolérance équivalente chez les patients âgés et les patients plus jeunes.

#### **hépatique :**

Il doit être débuté à la dose la plus faible et augmentée lentement chez les patients atteints d'insuffisance rénale.

**rénale :** Les changements des concentrations plasmatiques d'amiodipine ne sont pas corrélés avec le déclin de la fonction rénale, une posologie usuelle est donc recommandée. L'amiodipine n'est pas dialysable.

**IS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION DE VOTRE MEDECIN.**

#### **5. Contre-indications :**

Ne pas prendre CALCINIB® en cas de :

- Hypertension artérielle aux dérivés de la dihydropyridine, à l'amiodipine ou à l'un des excipients;
- Hypotension sévère;
- Choc (y compris choc cardiogénique);
- Obstruction de la voie d'éjection du ventricule gauche (par exemple, sténose aortique de degré élevé);
- Insuffisance cardiaque hémodynamiquement instable après un infarctus aigu du myocarde.

#### **6. Effet indésirable :**

Comme tous les médicaments, CALCINIB® est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit sujet. Ces phénomènes s'atténuent en général par la suite. Le plus souvent, il s'agit de maux de tête, de sensation de chaleur du visage, œdèmes des chevilles ou de la face, qui surviennent en début de traitement.

#### **Rarement :**

- Effets cardiovasculaires: sensations d'accélération du rythme cardiaque, palpitations, syncopes;
- Effets cutanéo-muqueux: chute des cheveux ou des poils, augmentation de la sudation, réactions allergiques (mangeaisons, éruption et œdèmes des vaisseaux);
- Effets digestifs: douleurs abdominales, trouble du goût, digestion difficile, perte de poids, bouche sèche;
- Effets musculosquelettiques: crampes musculaires, douleurs des muscles, douleurs articulaires; patologiques: hépatite, jaunisse, modification biologique d'origine hépatique (augmentation de la transaminase, du bilirubin, du cholestérol, du triglycéride); ces anomalies sont réversibles à l'arrêt du traitement;
- Effets urinaires: augmentation de la fréquence des urinations, troubles de la miction, infections urinaires; i-
- Effets sous-cutanés: réactions anti-hypertenseurs, développement d'œdème pulmonaire;
- Effets psychiques: fatigues, sensation de malaise, étourdissements, troubles visuels, troubles dépressifs, dépression; i-
- Effets généraux: malaise;
- Effets sur le système circulatoire: taux anormalement bas de plaquettes.

**CALCINIB 5 mg 28 comprimés**




6 1118000 050506

LOT : 082  
PER : SEP 2023  
PPV : 49 DH 40

Print by: 2020-11-25, 13:58:16

10mm/mV

10mm/mV



Patient Name:

ID: 201125014

Sex:

Age:

D.O.B.:

Height: cm

Weight: kg

BP.: mmHg

Medication history:

Illness symptom:

Application:

Illness history:

Department:

HR Rate

64 bpm

PR Interval

174 ms

QRS Duration

101 ms

QT/QTC Interval

386/398 ms

P/QRS/T Axis

55/-46/1 °

RV5/SV1 Voltage

0.30/0.98 mV

RV5+SV1 Voltage

1.28 mV

+++++ Analyse result +++++

8110 Sinus rhythm

8970 With occasional ectopic premature complexes

1434 Septal myocardial infarction, age undetermined

1634 Inferior myocardial infarction, age undetermined

22 Abnormal left axis deviation

1014 \*\*Abnormal ECG \*\*