

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS :Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W19-567793

48848

<input type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent(e)			
Matricule : <u>12008</u>	Société : <u>CPAM</u>		
<input checked="" type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	<u>HAJAR</u>
Nom & Prénom : <u>KABLY</u>			
Date de naissance : <u>28/11/1977</u>			
Adresse : <u>81, Bd du 11 Janvier Casa</u>			
Tél. : <u>0661388687</u>	Total des frais engagés : Dhs		

Cadre réservé au Médecin	
Cachet du médecin :	
Date de consultation :	<u>23 NOV. 2020</u>
Nom et prénom du malade :	<u>KABLY Hajjar</u>
Lien de parenté :	<input checked="" type="checkbox"/> Lui-même <input type="checkbox"/> Compagnon <input type="checkbox"/> Enfant
Nature de la maladie :	<u>Gynécologique</u>
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :	
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.	

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
23 NOV 2020	C	G		INP : 0911122911 Dr. Abdelouahab SAÏLI Gynécologue Accoucheur 20, Rue Oumaima-Sayah - Casablanca Tel. : 0522 36 38 25

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
16/11/2020 BON/101/15/2521 BON/101/15/2521 BON/101/15/2521	23/11/2020	502.87

ANALYSES - RADIOPHGRAPHIES


Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Mme KABLY Hajar Dossier : e1117023 / Date 17.11.2020 Total B: 348 / Dossier : 309,72DH B 80B 250B 18	19/11/2020	1000 Dhs	1000 Dhs

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A	M	P	C	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F PROTHESES DENTAIRES



DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
	00000000	00000000
B	35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT DES TRAVAUX

--

MONTANTS DES SOINS

--

DEBUT D'EXECUTION

--

FIN D'EXECUTION

--

COEFFICIENT DES TRAVAUX

--

MONTANTS DES SOINS

--

DATE DU DEVIS

--

DATE DE L'EXECUTION

--

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Gynécologue-Obstétricien

Diplômé d'Etudes Spéciales de l'Université de Bordeaux.
Ancien Attaché des Hôpitaux de Paris.

Stérilité du Couple - Accouchements
Maladies du sein - Colposcopie
Echographie - Cœliochirurgie
Chirurgie Gynécologique

Sur rendez-vous

Casablanca, le الدار البيضاء في :

23 NOV. 2020



الدكتور عبد الوهاب الصايل

اختصاصي في أمراض النساء والولادة

د. على الشهادة العليا من كلية الطب ببوردو
طبيب ملحق سابق بمستشفيات باريس

راض الثدي - الجراحة بالنظر الباطني
الشخص بالصدى والمجهر - العقم
الجراحة التسوية

بالموعود

111th Itay. KABLY
89.00^{x2} 14 AS ALIBILA 2w g
132.00 3 A CLAV Sact 1g
96.60^{x2} 1400^{x2} 1400^{x2}
502.781 AS FLUONIZIUM 9g 500g
Dr. Abdelouahab SAILE
Gynécologue Accoucheur
20, Rue Oumaima Sayah - Casablanca
Tél: 05 22 36 38 21 - Fax: 05 22 36 38 25
E-mail: abdelouahab_saile@yahoo.fr

ACLAV®

Amoxicilline + Acide clavulanique

COMPOSITION ET PRESENTATIONS :

COMPOSITION :	PRODUIT :	Aclav		Ac	Aclav
		1g/125mg	500mg/		
	-Boîte de 12 sachets		-Boîte de 12		Nourrisson
	-Boîte de 14 sachets		-Boîte de 14		1mg/12,5mg/1ml
	-Boîte de 16 sachets		-Boîte de 16		lacon de 30 ml
	-Boîte de 24 sachets		-Boîte de 24		
Amoxicilline trihydratée : quantité correspondant à l'amoxicilline anhydre	1g	500 mg		6 g	3 g
Clavulanate de potassium : quantité correspondant à l'acide clavulanique	125 mg	62,5 mg		750 mg	375 mg
Excipients	q.s.p 1 sachet	q.s.p 1 sachet		q.s.p 10,30 g de poudre	q.s.p 5,15 g de poudre

LOT : 701

PER : 01-22

P.P.V : 132DH00

PROPRIETES :

Antibiotiques antibactériens de la famille des bétalactamines, du groupe des aminopénicillines.

Aclav est une formulation associant l'amoxicilline et l'acide clavulanique puissant inhibiteur de bétalactamases.

INDICATIONS :

Elles sont limitées aux infections dues aux germes reconnus sensibles, notamment dans :

Les otites moyennes aiguës, otites récidivantes.

Les sinusites maxillaires aiguës et autres formes de sinusites.

Les angines récidivantes, amygdalites chroniques.

Les surinfections de bronchites aiguës du patient à risque.

Les exacerbations de bronchopneumopathies chroniques.

Les pneumopathies aiguës du patient à risque.

Les cystites aiguës récidivantes, cystites non compliquées de la femme et pyélonéphrites aiguës non compliquées dues à des germes sensibles.

Les infections gynécologiques hautes, en association à un autre antibiotique actif sur les chlamydiae.

Les parodontites.

Les infections stomatologiques sévères : abcès, phlegmons, cellulites.

Traitements de relais de la voie injectable.

Infections respiratoires basses chez le nourrisson et l'enfant de moins de 5 ans.

Infections urinaires chez le nourrisson.

CONTRE INDICATIONS :

-Absolues :

- Allergie aux antibiotiques du groupe des bétalactamines (pénicillines, céphalosporines)
- Mononucléose infectieuse.
- Antécédent d'atteinte hépatique liée à l'association amoxicilline -acide clavulanique.
- Phénylcétonurie (en raison de la présence de l'aspartam)

-Relatives :

Le méthotrexate

POSOLOGIE :

Les Posologies sont exprimées en Amoxicilline

Adulte normorénal (poids ≥ 40 kg)

2 à 3g/jour en 2 à 3 prises selon la prescription médicale et l'infection concernée.

Adulte insuffisant rénal (poids ≥ 40 kg)

Clairance de la créatinine	Schéma posologique
Supérieur à 30 ml / min	pas d'adaptation nécessaire
Entre 10 et 30 ml / min	1 g /125 mg toute les 12 à 24h
Inférieur à 10 ml / min	Pour les patients traités ou non par hémodialyse les conditions d'utilisation n'ont pas été établies.

Chez les patients âgés : pas d'adaptation posologique sauf si la clairance de la créatinine est ≤ 30 ml / min (même posologie chez l'insuffisant rénal)



Vibramycine® 100 mg

Vibra® 200 mg

Comprimé sécable
Doxycycline monohydrate

NOTICE

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage avant de prendre le médicament.

Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale, remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles se présenteront les mêmes symptômes que vous. En effet, le médicament pourra nuire à leur santé. Conservez cette d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Qu'est-ce que Vibramycine/Vibra et quand est-il utilisé? Vibramycine/Vibra est un antibiotique du groupe des tétracyclines qui agit contre des agents pathogènes, des bactéries qui provoquent des infections.

Vibramycine/Vibra est utilisé pour le traitement d'infections telles que :

- les infections des voies respiratoires
- les infections du nez, de la gorge et des oreilles (infections ORL ou ototo-rhino-laryngologiques)
- les infections des voies urinaires
- les infections des organes génitaux
- les infections de la peau et des tissus mous
- les infections gastro-intestinales
- les infections obstétricales et gynécologiques
- les infections de la bouche (infections buccales)
- les infections des yeux (infections oculaires)
- certaines infections transmises par les tiques

Vibramycine/Vibra est indiqué pour la prévention des infections suivantes :

- diarrhée des voyageurs
- paludisme dans certaines régions du globe.

Vibramycine/Vibra ne peut être pris que sur prescription médicale. **De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?**

N'oubliez pas que ce médicament vous a été prescrit par votre médecin en traitement de la maladie dont vous souffrez actuellement. Il ne doit pas être utilisé pour soigner d'autres affections ou d'autres personnes.

L'antibiotique qui contient Vibramycine/Vibra n'est pas efficace contre tous les micro-organismes à l'origine de maladies infectieuses. La prise d'un antibiotique mal choisi ou mal dosé peut entraîner des complications. Ne l'utilisez par conséquent pas de votre propre initiative pour traiter d'autres maladies ou d'autres personnes. En cas de nouvelle infection ultérieure, vous ne devrez pas non plus utiliser Vibramycine/Vibra sans une nouvelle prescription médicale.

Quand Vibramycine/Vibra ne doit-il pas être utilisé ?

Vous ne devrez pas prendre Vibramycine/Vibra si vous êtes allergique au principe actif de Vibramycine/Vibra, la doxycycline, à un autre composant du médicament ou à d'autres antibiotiques de la famille des tétracyclines. Prévenez votre médecin si vous avez déjà connu des effets secondaires avec des antibiotiques ou si vous n'avez pas bien supporté un traitement antérieur par Vibramycine/Vibra.

Une hypersensibilité se manifeste notamment par une dyspnée, une difficulté à respirer (asthme), des problèmes de circulation, des tuméfactions, des enflures ou un gonflement de la peau (par ex. urticaire) et des muqueuses, des démangeaisons ou des éruptions cutanées.

Vibramycine/Vibra ne doit pas être pris en cas de maladies hépatiques graves.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Vibramycine/Vibra ?

L'administration de tétracyclines à des femmes enceintes de plus de quatre mois (au cours de la deuxième moitié de la grossesse), à des petits enfants et à des enfants de moins de 12 ans, peut entraîner une coloration (jaune-gris-brun) permanente des dents ou une formation impарfite de l'email dentaire (hypoplasie de l'email). Ces patientes et patients ne prendront donc Vibramycine/Vibra que si le médecin l'ordonne expressément.

Si vous souffrez d'une affection hépatique, vous ne devriez prendre Vibramycine/Vibra que si votre médecin vous l'a prescrit expressément et si vous restez sous strict contrôle médical.

En cas d'apparition d'une réaction de la peau (telle qu'une éruption cutanée ou des démangeaisons), vous devrez arrêter de

prendre le médicament et en informer immédiatement votre médecin.

Evitez l'exposition directe au soleil ou aux rayons ultraviolets, car Vibramycine/Vibra peut provoquer des réactions d'hypersensibilité à la lumière. Si l'exposition directe au soleil ou aux rayons ultraviolets provoque l'apparition de rougeurs cutanées, vous devez interrompre le traitement et consulter le médecin immédiatement.

Afin de limiter le risque d'une irritation ou d'un ulcère délayer les comprimés 50 ml d'eau et les avaler avec

P.P.V 8 9 0 0

89,00

les mouvements qui inhibent le péristaltisme intestinal (mouvements de l'intestin) ne doivent pas être pris en cas de diarrhée.

Les patients qui utilisent des médicaments antiacides ou des sels de bismuth en raison de troubles gastriques, ou les patients qui prennent des préparations contenant du fer, ne devraient pas prendre ces médicaments en même temps que Vibramycine/Vibra, car ils ont un effet défavorable sur la résorption de Vibramycine/Vibra (c'est-à-dire sur son passage dans le sang). Ceci est également valable pour le charbon activé et les médicaments à base de colestyramine. C'est pourquoi il faudra prendre Vibramycine/Vibra soit 2 heures avant, soit 4 heures après la prise de ces préparations.

Combinaisons d'antibiotiques : la prise d'un autre antibiotique en plus de Vibramycine/Vibra ne devra se faire que si le médecin le prescrit expressément.

Si vous prenez un anticoagulant (médicament pour liquéfier le sang), un antidiabétique oral (médicament pour abaisser la glycémie, c'est à dire le taux de sucre dans le sang), un médicament pour réduire la fréquence des crises d'épilepsie (un anti-convulsivant), un somnifère ou un contraceptif oral (« pilule contraceptive »), vous devrez en informer votre médecin. Si vous prenez un contraceptif oral (« pilule contraceptive »), notez que son efficacité peut être réduite pendant un traitement par des antibiotiques. Votre médecin ou votre pharmacien peut alors vous conseiller d'autres méthodes de contraception.

Informez votre médecin si vous devez prochainement subir une anesthésie. En effet, l'utilisation simultanée d'un anesthésiant particulier (le méthoxyflurane) peut entraîner une lésion rénale fatale.

Ne consommez pas d'alcool pendant un traitement par Vibramycine/Vibra.

L'utilisation concomitante de doxycycline et de ciclosporine A peut augmenter l'effet毒ique de l'immunosupresseur (la ciclosporine A).

L'utilisation concomitante de théophylline et de tétracyclines peut augmenter le risque d'effets indésirables au niveau du système gastro-intestinal.

L'utilisation de tétracyclines, y compris la doxycycline, peut entraîner une augmentation bénigne de la pression à l'intérieur de la boîte crânienne qui est normalement réversible. On a toutefois rapporté des cas de céphalée permanente survenus suite à une augmentation de la pression à l'intérieur de la boîte crânienne sous traitement avec des tétracyclines, y compris la doxycycline. Contactez votre médecin dans les plus brefs délais si vous constatez l'apparition de troubles de la vue au cours du traitement. Il est établi que l'isotétrinoïne, un principe actif utilisé dans le traitement de l'acné, peut elle aussi entraîner, dans de rares cas, une augmentation bénigne de la pression à l'intérieur de la boîte crânienne; il convient donc d'éviter toute utilisation concomitante d'isotétrinoïne et de doxycycline.

La concentration de méthotrexate peut être augmentée par l'administration simultanée de méthotrexate et de doxycycline. Si vous contrôlez vous-même votre taux de sucre dans les urines (glycosurie), veuillez en informer votre médecin.

Ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à la conduite automobile et la capacité à utiliser des outils ou des machines. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie (comme p. ex. une maladie du foie)
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou en utilisez déjà en



Vibramycine® 100 mg

Vibra® 200 mg

Comprimé sécable
Doxycycline monohydrate

NOTICE

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage avant de prendre le médicament.

Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale, remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles se présenteront les mêmes symptômes que vous. En effet, le médicament pourra nuire à leur santé. Conservez cette d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Qu'est-ce que Vibramycine/Vibra et quand est-il utilisé? Vibramycine/Vibra est un antibiotique du groupe des tétracyclines qui agit contre des agents pathogènes, des bactéries qui provoquent des infections.

Vibramycine/Vibra est utilisé pour le traitement d'infections telles que :

- les infections des voies respiratoires
- les infections du nez, de la gorge et des oreilles (infections ORL ou ototo-rhino-laryngologiques)
- les infections des voies urinaires
- les infections des organes génitaux
- les infections de la peau et des tissus mous
- les infections gastro-intestinales
- les infections obstétricales et gynécologiques
- les infections de la bouche (infections buccales)
- les infections des yeux (infections oculaires)
- certaines infections transmises par les tiques

Vibramycine/Vibra est indiqué pour la prévention des infections suivantes :

- diarrhée des voyageurs
- paludisme dans certaines régions du globe.

Vibramycine/Vibra ne peut être pris que sur prescription médicale. **De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?**

N'oubliez pas que ce médicament vous a été prescrit par votre médecin en traitement de la maladie dont vous souffrez actuellement. Il ne doit pas être utilisé pour soigner d'autres affections ou d'autres personnes.

L'antibiotique qui contient Vibramycine/Vibra n'est pas efficace contre tous les micro-organismes à l'origine de maladies infectieuses. La prise d'un antibiotique mal choisi ou mal dosé peut entraîner des complications. Ne l'utilisez par conséquent pas de votre propre initiative pour traiter d'autres maladies ou d'autres personnes. En cas de nouvelle infection ultérieure, vous ne devrez pas non plus utiliser Vibramycine/Vibra sans une nouvelle prescription médicale.

Quand Vibramycine/Vibra ne doit-il pas être utilisé ?

Vous ne devrez pas prendre Vibramycine/Vibra si vous êtes allergique au principe actif de Vibramycine/Vibra, la doxycycline, à un autre composant du médicament ou à d'autres antibiotiques de la famille des tétracyclines. Prévenez votre médecin si vous avez déjà connu des effets secondaires avec des antibiotiques ou si vous n'avez pas bien supporté un traitement antérieur par Vibramycine/Vibra.

Une hypersensibilité se manifeste notamment par une dyspnée, une difficulté à respirer (asthme), des problèmes de circulation, des tuméfactions, des enflures ou un gonflement de la peau (par ex. urticaire) et des muqueuses, des démangeaisons ou des éruptions cutanées.

Vibramycine/Vibra ne doit pas être pris en cas de maladies hépatiques graves.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Vibramycine/Vibra ?

L'administration de tétracyclines à des femmes enceintes de plus de quatre mois (au cours de la deuxième moitié de la grossesse), à des petits enfants et à des enfants de moins de 12 ans, peut entraîner une coloration (jaune-gris-brun) permanente des dents ou une formation impарfite de l'email dentaire (hypoplasie de l'email). Ces patientes et patients ne prendront donc Vibramycine/Vibra que si le médecin l'ordonne expressément.

Si vous souffrez d'une affection hépatique, vous ne devriez prendre Vibramycine/Vibra que si votre médecin vous l'a prescrit expressément et si vous restez sous strict contrôle médical.

En cas d'apparition d'une réaction de la peau (telle qu'une éruption cutanée ou des démangeaisons), vous devrez arrêter de

prendre le médicament et en informer immédiatement votre médecin.

Evitez l'exposition directe au soleil ou aux rayons ultraviolets, car Vibramycine/Vibra peut provoquer des réactions d'hypersensibilité à la lumière. Si l'exposition directe au soleil ou aux rayons ultraviolets provoque l'apparition de rougeurs cutanées, vous devez interrompre le traitement et consulter le médecin immédiatement.

Afin de limiter le risque d'une irritation ou d'un ulcère délayer les comprimés 50 ml d'eau et les avaler avec

P.P.V 8 9 0 0

89,00

les mouvements qui inhibent le péristaltisme intestinal (mouvements de l'intestin) ne doivent pas être pris en cas de diarrhée.

Les patients qui utilisent des médicaments antiacides ou des sels de bismuth en raison de troubles gastriques, ou les patients qui prennent des préparations contenant du fer, ne devraient pas prendre ces médicaments en même temps que Vibramycine/Vibra, car ils ont un effet défavorable sur la résorption de Vibramycine/Vibra (c'est-à-dire sur son passage dans le sang). Ceci est également valable pour le charbon activé et les médicaments à base de colestyramine. C'est pourquoi il faudra prendre Vibramycine/Vibra soit 2 heures avant, soit 4 heures après la prise de ces préparations.

Combinaisons d'antibiotiques : la prise d'un autre antibiotique en plus de Vibramycine/Vibra ne devra se faire que si le médecin le prescrit expressément.

Si vous prenez un anticoagulant (médicament pour liquéfier le sang), un antidiabétique oral (médicament pour abaisser la glycémie, c'est à dire le taux de sucre dans le sang), un médicament pour réduire la fréquence des crises d'épilepsie (un anti-convulsivant), un somnifère ou un contraceptif oral (« pilule contraceptive »), vous devrez en informer votre médecin. Si vous prenez un contraceptif oral (« pilule contraceptive »), notez que son efficacité peut être réduite pendant un traitement par des antibiotiques. Votre médecin ou votre pharmacien peut alors vous conseiller d'autres méthodes de contraception.

Informez votre médecin si vous devez prochainement subir une anesthésie. En effet, l'utilisation simultanée d'un anesthésiant particulier (le méthoxyflurane) peut entraîner une lésion rénale fatale.

Ne consommez pas d'alcool pendant un traitement par Vibramycine/Vibra.

L'utilisation concomitante de doxycycline et de ciclosporine A peut augmenter l'effet毒ique de l'immunosupresseur (la ciclosporine A).

L'utilisation concomitante de théophylline et de tétracyclines peut augmenter le risque d'effets indésirables au niveau du système gastro-intestinal.

L'utilisation de tétracyclines, y compris la doxycycline, peut entraîner une augmentation bénigne de la pression à l'intérieur de la boîte crânienne qui est normalement réversible. On a toutefois rapporté des cas de céphalée permanente survenus suite à une augmentation de la pression à l'intérieur de la boîte crânienne sous traitement avec des tétracyclines, y compris la doxycycline. Contactez votre médecin dans les plus brefs délais si vous constatez l'apparition de troubles de la vue au cours du traitement. Il est établi que l'isotrétiinoïne, un principe actif utilisé dans le traitement de l'acné, peut elle aussi entraîner, dans de rares cas, une augmentation bénigne de la pression à l'intérieur de la boîte crânienne; il convient donc d'éviter toute utilisation concomitante d'isotrétiinoïne et de doxycycline.

La concentration de méthotrexate peut être augmentée par l'administration simultanée de méthotrexate et de doxycycline. Si vous contrôlez vous-même votre taux de sucre dans les urines (glycosurie), veuillez en informer votre médecin.

Ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à la conduite automobile et la capacité à utiliser des outils ou des machines. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie (comme p. ex. une maladie du foie)
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou en utilisez déjà en

Docteur Abdelouahab SAILE

Gynéco-Obstétricien

Diplômé d'Etudes Spéciales de l'Université de Bordeaux.
Ancien Attaché des Hôpitaux de Paris.

Stérilité du Couple - Accouchements
Maladies du sein - Colposcopie
Echographie - Cœliochirurgie
Chirurgie Gynécologique

Sur rendez-vous

Casablanca, le 22 OCT. 2020 الدار البيضاء في :



الدكتور عبد الوهاب الصايل

اختصاصي في أمراض النساء والولادة

حاصل على الشهادة العليا من كلية الطب ببوردو
طبيب ملحق سابق بمستشفيات باريس

أمراض الثدي - الجراحة بالنظر الباطني
الشخص بالصدى والمجهر - العقم
الجراحة النسوية

بالموعد

ملخص السيرة الذاتية:
 - مولود في 1977، بCasablanca
 ولد في مصحة بوليفيل
 في مستشفى (الطب الباطني)
 (جراحة العظام)
 مولود في 1977، بCasablanca
 - مولود في 1977، بCasablanca
 ولد في مصحة بوليفيل
 (جراحة العظام)
 مولود في 1977، بCasablanca
 - مولود في 1977، بCasablanca
 ولد في مصحة بوليفيل
 (جراحة العظام)

Dr. Abdelouahab SAILE
Gynécologue Accoucheur
20, Rue Oumaima Sayah - Casablanca
Tél. 05 22 36 38 25 - Fax 05 22 36 38 25

البريد الإلكتروني: Dr_abdelouahab_saille@yahoo.fr

Résidence Star Youness 20, Rue Oumaima Sayah (ex. Mme Rolland) 1er étage appt. 1 شقة 1
بار. الزيضاء. الهاتف: 05 22 36 38 25 - الفاكس: 05 22 36 38 25

إقامة ستار يونس
حي رسين

في حالات الإستعجال اتصلوا بالرقم 06 64 00 58 88

Docteur Abdelouahab SAILE

Gynécologue-Obstétricien

Diplômé d'Etudes Spéciales de l'Université de Bordeaux.
Ancien Attaché des Hôpitaux de Paris.

Stérilité du Couple - Accouchements
Maladies du sein - Colposcopie
Echographie - Cœliochirurgie
Chirurgie Gynécologique

Sur rendez-vous

Casablanca, le 22 OCT. 2020 الدار البيضاء في :



الدكتور عبد الوهاب الصايل

اختصاصي في أمراض النساء والولادة

حاائز على الشهادة العليا من كلية الطب ببوردو
طبيب ملحق سابق بمستشفيات باريس

أمراض الثدي - الجراحة بالنظر الباطني
الشخص بالصدى و المجهر - العقم
الجراحة النسوية

بالموعد

M Hajar KABLY

11 NFS

27 Février 2020

Mme KABLY Hajar
Ddn 28.10.1977 / F
Nr dossier : e1117023 /



pour scan en flot ordonnance

Dr. Abdelouahab SAILE
Gynécologue Aceoucheur
20, Rue Oumaima Sayah - Casablanca
Tél. 05 22 36 38 25 - Fax: 05 22 36 38 25

LABORATOIRES D'APPLICATION
SCIENTIFIQUES
11 - 13, Rue Houcine BEN ALI
CASABLANCA - Tél. 05 22 27 64 87

Email : abdelouahab_saille@yahoo.fr البريد الإلكتروني:

20. زنقة أميمة صباح الطابق 1 شقة 1
Résidence Star Youness 20, Rue Oumaima Sayah (ex. Mme Rolland) 1er étage appt. 1 شقة 1
الدار البيضاء . الهاتف : 05 22 36 38 21/36 38 25 - الفاكس: 05 22 36 38 25
Quartier Racine - Casa 20000 - Fax : 05 22 36 38 25 - Tél. : 05 22 36 38 25

En Cas d'urgence appeler le N° : 06 64 00 58 88 في حالات الإستعجال إتصلوا بالرقم

إقامة ستار يو
جي رس



Nom & prénom : **KABLY HAJAR**

FACTURE N° : 20/020156

Date : 19/11/2020

Examen	Montant
MAMMO TOMOSYNTHÈSE+ECHO MAMMAIRE	1 000,00
	Total Montant
	1 000,00

Arrêtée la présente Facture à la somme de:

MILLE DIRHAMS

REGLEMENT : TPE Le 19/11/2020

Relevé d'identité bancaire
Banque Centrale Populaire
Agence Massira
88, bd massira el khadra Casablanca
Compte n°: 190 780 21211 9307191 000 7 73

RADIOLOGIE Abou Madi
27, Rue Ilya Abou Madi
Appt N°3 - Casablanca
Té : 0522.20.34.57/58 Fax: 0522.47.40.09
E-mail: contact@radiologie-aboumadi.com
RC : 395253 Casablanca - TP : 35509523 - IF : 01086163 - CNSS : 2623/14 - ICE : 002036624000064



Casablanca le 19/11/2020

PATIENT : KABLY HAJAR
MEDECIN TRAITANT : DR. SAILE ABDELOUAI AB
H.

MAMMOGRAPHIE : TOMOSYNTHÈSE

Technique :

Examen réalisé par un mammographe Prestina 2019 avec tomosynthèse et mammographie classique standard.

Les incidences réalisées :

- Cliché de face bidimensionnel.
- Tomosynthèse en incidence oblique.

MAMMOGRAPHIE :

Seins en involution graisseuse avec des résidus glandulaires et de répartition harmonieuse au niveau des différents quadrants

la tomosynthèse nous révèle l'existence d'une opacité dense homogène à cheval sur les quadrants externes du sein gauche.

Opacité ronde bien limitée ne comportant pas de micro-calcification.

Par ailleurs, le tissu glandulaire est parfaitement homogène sans lésion suspecte.

Revêtement cutané et creux axillaires libres.

ECHOGRAPHIE MAMMAIRE :

L'analyse échographique confirme la présence d'une formation kystique du sein gauche, kyste de 21 mm de diamètre à paroi et régulière.

D'autres micro-kystes sont épargnés au niveau des quadrants externes des deux seins sans caractère suspect.

Par ailleurs, absence de lésion tissulaire individualisable lors de cet examen.

Revêtement cutané fin et régulier.

Absence d'adénopathies axillaires .

Conclusion :

Nodule régulier du sein gauche en rapport avec une formation kystique associée par ailleurs à d'autres kystes de plus petite taille, l'ensemble évoque une mastose kystique sans lésion suspecte.

Ce bilan peut être classé ACR3.

Confraternement

DR. AKIKI M.
INPE : 09 004234

ACR0 : Des investigations complémentaires sont nécessaires.

ACR1 : Mammographie normale.

ACR2 : Anomalies bénignes ne nécessitant ni surveillance ni examen complémentaire.

ACR3 : Anomalie probablement bénigne pour laquelle une surveillance à court terme est conseillée.

ACR4 : Anomalie indéterminée ou suspecte qui indique une vérification histologique.

ACR5 : Très évocateur de malignité (supérieur à 90 % de risque de malignité) chirurgie

- IRM Haut champ
- Scanner Spirale Multi-barettes
- Imagerie Cardio-Vasculaire
- Radiologie Générale Numérique
- Mammographie/Tomosynthèse
- Echographie-Doppler Couleur
- Echo-Doppler 3D, 4D
- Echographie Morphologique
- Cone Beam
- Panoramique Dentaire Numérique
- Denta-scanner
- Téléradiologie 4 mètres Numérique
- Ostéo-densitométrie Biphotonique
- Radiologie Interventionnelle
- Diagnostic et Thérapeutique

COUPON

LABORATOIRES D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES

A. TOUIMI BENJELLOUN

Docteur J. TAZI SIDQU

Y. TOUIMI BENJELLOUN

Ep. TAHIRI

Pharmacien Biologiste
Docteur d'Etat en Pharmacie
Professeur Agrégé de Biochimie
de la Faculté de Nancy

Anatomo-cytopathologiste
de la Faculté de Paris VI
Ancien Maître-Assistant
C.H.U. de Rabat

Pharmacien Biologiste
de l'Université Libre
de Bruxelles

Membres  International

Dossier N°e1117023

Docteur SAILE Abdelouahab
RES. STAR YOUNES 20 QUAR. RACINE
CASABLANCA

Madame KABL Hajar
81 BD DU 11 JUVIER
CASABLANCA
RAM MUPRAS

Patient née le 28.10.1977 43 ans

Enregistré le 17.11.2020 à 10h53

Édition du 17 Novembre 2020

HEMATOLOGIE

Valeurs de référence

Antériorités

HEMOGRAMME

(Sysmex XT1800i)

04.08.18			
Globules rouges	*	5.320.000/mm³	(4.0 - 5.0 Mill) 5.260.000
Hémoglobine		13,0 g/100ml	(12,5 - 15,0) 14,0
Hématocrite		40,9 %	(36,5 - 44,0) 42,9
Volume globulaire (VGM)	*	76,9 μ^3	(83-98) 81,6
Teneur globulaire (TCMH)	*	24,4 pg	(27-32) 26,6
Conc. globulaire (CCMH)	*	31,8 %	(32-36) 32,6
Leucocytes		7.020 /mm³	(4000-10000) 5.310
Polynucléaires neutrophiles		54,1 % 3798 /mm ³	(210 - 8890) 3298
Polynucléaires éosinophiles		4,0 % 281 /mm ³	(30 - 30) 473
Polynucléaires basophiles		0,3 % 21 /mm ³	(10 - 0) 11
Lymphocytes		31,8 % 2232 /mm ³	(126 - 3350) 961
Monocytes		9,8 % 688 /mm ³	(250 - 850) 568
Plaquettes		375.000 /mm³	(150.000-400.000) 269.000
Volume plaquettaire moyen (VPM)		9,8 fL	(9,0 - 11,9) 10,0
 Microcytose légére			

BIOCHIMIE

(Technique ROCHE Cobas 6000)

Valeu de référence

Antériorités

Ferritin * 4.5 ng/ml (15-150)

Dr Y. TOUIMI BENJELLOUN

COUDON

LABORATOIRE D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES

A.TOUIMI BENJELLOUN

Docteur J. TAZI SIDQUI

Y.TOUIMI BENJELLOUN
El AHIRI

Pharmacien Biologiste
Docteur d'Etat en Pharmacie
Professeur Agrégé de Biochimie
de la Faculté de Nancy

Anatomo-cytopathologiste
de la Faculté de Paris VI
Ancien Maître-Assistant
C.H.U de Rabat

Pharmacien Biologiste
de l'Université Libre
de Bruxelles

Membres  International

FACTURE

Numéro e1117023

N° Matricule: 12008 A

Analyses du 17.11.2020

Prescrit par : Dr SAILLE Abdelouahab

Madame KABLY Hajar
81 BD DU 11 JANVIE
CASABLANCA
RAM MUPRAS

Le 17 Novembre 2020

NF FERT PDS1

TOTAL des B : 348 (Tarif RAM)
TOTAL Facture : 309,72 DH

Part à la charge du patient : 100% 309,72 DH

Net à payer : 309,72 DH

PAYE

