

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Déclaration de Maladie

N° W19-567809

ND: 48868



Maladie

Dentaire
Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 12008 Société :

Actif

Pensionné(e)

Nom & Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Tél. :

Total des frais engagés : Dhs

Optique

Autres

0661388687

Dr. Abdelouahab SAILE

Gynécologue Accoucheur

20, Rue Oumaima Sayah - Casablanca

Tél. : 0522 30 33 21 - Fax. : 0522 36 38 25

22 OCT 2020

Nom et prénom du malade : HME Kably H. Age :

Lien de parenté : Lui-même

Nature de la maladie : Gynécologique

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous olfonditiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare

avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Signature de l'adhérent(e) :

Le : 25 NOV. 2020

ACCUEIL

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
22/01/2020	C	220,00	INP : 091122911 Dr. Abdelouahab SAILE LSD, Gynécologue Accoucheur 20, Rue Oumaima Sayah - Casablanca Tél. : 0522 36 38 21 - Fax : 0522 36 38 25	<i>Dr. Abdelouahab SAILE</i> <i>LSD, Gynécologue Accoucheur</i> <i>20, Rue Oumaima Sayah - Casablanca</i> <i>Tél. : 0522 36 38 21 - Fax : 0522 36 38 25</i>

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE MODERNE 1 Dr. A. Zakaria Hassan Docteur en Chimie Doctorat d'Etat en Pharmacie 8, avenue Bd du 11 Janvier et Mustapha 1. N. à n. - CASABLANCA tel : 02224915 - Fax : 0522 20 96 87 mail:ahmedzakariahasan@gmail.com	22/01/2020	477,00

ANALYSES - RADIGRAPHIES


Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
LABORATOIRE SCHLEIER ZAD 4, Boulevard Zerktouni Seme Ettage 20140 - Casablanca Matente : 34206518 - I.F. : 41807041 INSS : 2294015 - ICE : 00150241900087	23/01/2020	P2ns	270,00

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	
.....	
.....	
.....	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F PROTHESES DENTAIRES



DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	2553412	21433552
D	00000000	00000000
B	00000000	35533411
G	11433553	

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

Docteur Abdelouahab SAILE

Gynécologue-Obstétricien

Diplômé d'Etudes Spéciales de
l'Université de Bordeaux.
Ancien Attaché des Hôpitaux de Paris.

Stérilité du Couple - Accouchements
Maladies du sein - Colposcopie
Echographie - Cœliochirurgie
Chirurgie Gynécologique

Sur rendez-vous

الدار البيضاء في : Casablanca, le
22 OCT. 2020



الدكتور عبد الوهاب الصايل


الاختصاصي في أمراض النساء والولادة

حاائز على الشهادة العليا من كلية الطب ببوردو
طبيب ملحق سابقًا بمستشفيات باريس

أمراض الثدي - الجراحة بالنظر الباطني
الفحص بالصدى و المجهر - العقم
الجراحة النسوية

الموعد

W^u Heyal KABU

1961.10	1	SEPIONE SW 9	
	2	9 gr. a 1 mal pous.	
110,00 D	3	9 gr. Dernier i.e. 9.22	
		1 cale a 1 mal pous,	
		a rebouler a la che secoue	
24,00	3	MYNAZOL 100 mg. 66	
		1 gelée a 1 cale	
		lire .../...	
		PHARMACIE MODERNE	
1	Dr. A. Zakaria Hassan		
	Docteur en Chimie		
	Doctorat d'Etat en Pharmacie		
	25, angle Bd du 11 Novembre et Rue Moulay		
	CASABLANCA		
	02-26-87		

PHARMACIE MODERNE
1 Dr. A. Zakaria Hassan
Docteur en Chimie
Docteur d'état en Pharmacie
68, angle Bd du 11 Novembre et Bd de la Kasbah
CASABLANCA
Tél. 5522.20.96.87

البريد الإلكتروني: abdelouahab_saile@yahoo.fr

إقامة ستار يونس 20، زنقة أممية صباح الطابق 1 شقة 10522 22 49 15 Résidence Star Youssef 20, Znقة أممية صباح الطابق 1 شقة 10522 22 49 15

حي رسين الدار البيضاء . الهاتف : 05 22 36 38 25 - الفاكس: 05 22 36 38 21/36 38 25 - Tél. : 05 22 36 38 21/36 38 25
En Cas d'urgence appeler le N° 06 64 00 58 88 . في حالات الطوارئ تواصل اتصالاً بالرقم

حي ريسين الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 36 38 25 - الفاكس: 05 22 36 38 25 - Tél : 05 22 36 38 25 - Email: ahmed@quatre-racine.com

41 BAY COTON Jumaco
8780 w DERMOTEX

oplate x 2g



DUPHATRUM q 10g

2g ec 1 ule jui
le suu x 10 psc



Dr. Abdelouahab SAILE
Gynécologue Accoucheur
20, Rue Oumaima Sayah - Casablanca
Tél.: 05 22 36 38 24 Fax: 05 22 36 38 25

PHARMACIE MODERNE

1 Dr. A. Zakaria Hassan
Docteur en Chimie

Doctorat d'état en Pharmacie

68, angle Bd du 11 Janvier et Muslapha
CASA BLANCA
Tél. : 0522.22.49.15 - Fax: 0522.20.96.87

E-mail: ahmedzakariahasan@gmail.com

PHARMACIE MODERNE

1 Dr. A. Zakaria Hassan
Docteur en Chimie

Doctorat d'état en Pharmacie

68, angle Bd du 11 Janvier et Muslapha
CASA BLANCA
Tél. : 0522.22.49.15 - Fax: 0522.20.96.87

E-mail: ahmedzakariahasan@gmail.com

SEPCEN® 250 mg, SEPCEN® 500 et SEPCEN® 750 mg

Boîte de 10 comprimés pelliculés
, D.C.I : ciprofloxacine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir la rubrique 4.

- Que contient cette notice ?
- 1. Qu'est-ce que SEPCEN® ?
- 2. Quelles sont les indications ?
- 3. Comment prendre SEPCEN® ?
- 4. Quels sont les effets indésirables ?
- 5. Comment conseiller l'utilisation de SEPCEN® ?
- 6. Informations supplémentaires

LUT : 63320008
PER : 04/2023
PPV : 196.500H

SEPCEN® ?

1. QU'EST-CE QUE SEPCEN® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Fluoroquinolone - code ATC : J01MA02.

SEPCEN® contient une substance active, la ciprofloxacine.

La ciprofloxacine est un antibiotique appartenant à la famille des fluoroquinolones. Elle agit en tuant les bactéries responsables des infections. Elle est active uniquement sur certaines souches spécifiques de bactéries.

Adultes :

Chez l'adulte, SEPCEN® est utilisé pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des voies respiratoires.
- Infections persistantes ou récurrentes de l'oreille ou des sinus.
- Infections urinaires.
- Infections des testicules.
- Infections des organes génitaux chez la femme.
- Infections gastro-intestinales et infections intra-abdominales.
- Infections de la peau et des tissus mous.
- Infections des os et des articulations.
- Prévention des infections dues à la bactérie *neisseria meningitidis*.
- Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut être utilisé dans le traitement de patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause.

Si vous présentez une infection sévère ou une infection due à différents types de bactéries, un traitement antibiotique additionnel pourra vous être prescrit en complément de SEPCEN®.

Chez l'enfant et l'adolescent :

SEPCEN® est utilisé chez l'enfant et l'adolescent, sous le contrôle d'un spécialiste, pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des poumons et des bronches chez l'enfant et l'adolescent atteint de mucoviscidose.
- Infections urinaires compliquées, y compris les infections ayant atteint les reins (pyélonéphrite).

- Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut également être utilisé pour traiter d'autres infections sévères spécifiques de l'enfant et de l'adolescent si votre médecin le juge nécessaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SEPCEN® ?

- Ne prenez jamais SEPCEN® dans les cas suivants :

• Vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active, aux autres quinolones ou à l'un des autres composants contenus dans SEPCEN® (voir rubrique 6).

• Vous prenez de la tizanidine (voir rubrique 2 : Prise d'autres médicaments).

- Mise en garde et précaution d'emploi :

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre SEPCEN®.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre SEPCEN® si :

• Vous avez déjà présenté des problèmes rénaux car il pourra être nécessaire d'adapter votre traitement.

• Vous souffrez d'épilepsie ou d'une autre affection neurologique.

• Vous avez déjà eu des problèmes aux tendons avec des antibiotiques de la même famille que SEPCEN®.

• Si vous êtes diabétique parce que la ciprofloxacine risque de vous occasionner une hypoglycémie.

• Vous souffrez de myasthénie (maladie rare qui entraîne une faiblesse musculaire) en raison du risque d'aggravation des symptômes.

• Si vous savez que vous présentez, ou un membre de votre famille présente un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD), car la ciprofloxacine peut vous occasionner une anémie.

• Si vous avez des problèmes cardiaques.

• Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertrophie ou de "renflement" d'un gros vaisseau sanguin (anévrisme aortique ou anévrisme périphérique d'un gros vaisseau).

• Si vous avez déjà eu un épisode antérieur de dissection aortique (une déchirure

de la paroi aortique).

• Si vous présentez une dissection aortique (par exemple, des symptômes d'Ébler, l'artérite de Takayasu, l'hypertension artérielle). Ce type de médicament a été observé à l'ECG, vous présentez une faible concentration d'un rythme cardiaque (insuffisance cardiaque, myocarde), si vous prenez d'autres médicaments dans la rubrique Prise d'autre médicament. Pour le traitement de l'angioedème, peut vous prescrire une amélioration des symptômes. Consultez votre médecin. Pendant la prise de SEPCEN®, prévenez immédiatement votre médecin si vous présentez des symptômes d'angioedème.

• Réaction allergique (angioedème). Dès que vous présentez une réaction allergique, une oppression dans la poitrine, lors du passage des symptômes, pendant que vous prenez SEPCEN®, arrêtez immédiatement le médicament.

• Si vous avez des symptômes d'angioedème, consultez votre médecin. Des douleurs abdominales peuvent également entraîner une oppression dans la poitrine, des tendons peuvent être douloureux au toucher ou au traitement ou jusqu'à la mort. Au premier signe de SEPCEN®, et même si cela pourraient être des symptômes d'angioedème, arrêtez immédiatement le médicament.

• Si vous souffrez d'ischémie cérébrale, y compris une crise d'angioedème, affectant le système nerveux central, arrêtez immédiatement le médicament.

• Des réactions allergiques peuvent se produire. Si vous présentez des symptômes d'angioedème, arrêtez immédiatement le médicament. Si vous souffrez d'ischémie cérébrale, arrêtez immédiatement le médicament.

• Des réactions allergiques peuvent se produire. Si vous présentez des symptômes d'angioedème, arrêtez immédiatement le médicament.

• Vous pouvez prendre SEPCEN® sans sensation de brûlure. Si vous présentez des symptômes d'angioedème, arrêtez immédiatement le médicament. Si vous présentez des symptômes d'angioedème, arrêtez immédiatement le médicament.

• Si vous avez déjà eu une réaction allergique à SEPCEN®, ne prenez pas SEPCEN®.

• Si vous avez déjà eu une réaction allergique à SEPCEN®, ne prenez pas SEPCEN®. Si vous présentez des symptômes d'angioedème, arrêtez immédiatement le médicament.

• SEPCEN® peut réduire votre état de santé. Si vous présentez des symptômes d'angioedème, arrêtez immédiatement le médicament. Si vous présentez des symptômes d'angioedème, arrêtez immédiatement le médicament.

• Si vous avez déjà eu une réaction allergique à SEPCEN®, ne prenez pas SEPCEN®. Si vous présentez des symptômes d'angioedème, arrêtez immédiatement le médicament.

• Votre peau peut se décolorer lorsque vous prenez SEPCEN®. Si vous présentez des symptômes d'angioedème, arrêtez immédiatement le médicament.

• Si vous ressentez des symptômes d'angioedème, arrêtez immédiatement le médicament.

MYNAZOL® 150 mg

boîte de 1, 4 et 8 gélules
Fluconazole

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT :

MYNAZOL 150 mg, boîte de 1, 4 et 8 gélules

2. COMPOSITION DU MEDICAMENT :

Fluconazole (DCI) 150 mg pour une gélule

Excipients : Lactose monohydraté, amidon prégalatinisé, laurilsulfate de sodium, stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre.

Excipients à effet notoire : Lactose monohydraté

3. CLASSE PHARMACO THERAPEUTIQUE :

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : J02AC01

Mynazol fait partie d'un groupe de médicaments appelés « antifongiques ». La substance active est le fluconazole.

Mynazol 150 mg est utilisé pour traiter les infections dues à des champignons et peut également être utilisé pour vous empêcher de développer une infection à Candida. La cause la plus fréquente des infections fongiques est une levure appelée Candida.

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Mynazol 150 mg est utilisé pour traiter les infections dues à des champignons et peut également être utilisé pour vous empêcher de développer une infection à Candida. La cause la plus fréquente des infections fongiques est une levure appelée Candida.

Adultes

Votre médecin pourra vous prescrire ce médicament pour traiter les infections fongiques suivantes :

- Méningite à cryptococciques - infection fongique du cerveau,
- Convalescence d'une maladie du système bronchopulmonaire,
- Infections à Candida, retrouvées dans le sang, infections des organes (ex. cœur, poumons) ou des voies urinaires,
- Mycose de la muqueuse - infection de la muqueuse buccale, de la gorge et de plaies dues à une prothèse dentaire,
- Mycose génitale - infection du vagin ou du pénis,
- Infections cutanées - ex. pied d'athlète, herpès circiné, eczéma marginé de Hebra, infection des ongles.

Vous pourrez aussi recevoir du Mynazol 150 mg pour :

- Éviter la récidive d'une méningite à cryptococciques,
- Éviter la récidive d'une mycose de la muqueuse,
- Diminuer le risque de récidive de mycose vaginale,
- Éviter de développer une infection à Candida (si votre système immunitaire est affaibli et ne fonctionne pas correctement).

Enfants et adolescents (0 à 17 ans)

Votre médecin pourra vous prescrire ce médicament pour traiter les types suivants d'infections fongiques :

- Mycose de la muqueuse - infection de la muqueuse buccale, de la gorge, ou des voies urinaires,
 - Infections à Candida, retrouvées dans le sang, infections des organes (p.ex. cœur, poumons) ou des voies urinaires,
 - Méningite à cryptococciques - infection fongique du cerveau.
- Vous pourrez aussi recevoir du Mynazol 150 mg pour :
- Vous empêcher de développer une infection à Candida (si votre système immunitaire est affaibli et ne fonctionne pas correctement),
 - Éviter la récidive d'une méningite à cryptococciques.

5. POSOLOGIE :

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les gélules ne sont pas indiquées chez l'enfant de moins de 6 ans, en raison de la forme pharmaceutique.

Avez la gélule entière avec un verre d'eau. Il est préférable de prendre la même heure chaque jour.

Ajoutés

Affection	Dose
Pour traiter une méningite à cryptococciques	400 mg le premier jour, puis 200 fois par jour pendant 6 à 8 semaines nécessaire. Les doses sont partagées en 2 ou 3 fois par jour jusqu'à ce que le patient soit stable.
Pour éviter la récidive d'une infection à la muqueuse buccale, de la gorge et de plaies dues à une prothèse dentaire	200 mg à 400 mg le premier jour, puis 200 mg jusqu'à ce que l'on vous dise de cesser de prendre ce médicament.
Pour traiter une mycose de la muqueuse - la dose dépendant de la localisation de l'infection	50 à 400 mg une fois par jour pendant 6 à 8 semaines.
Pour éviter une infection de la muqueuse buccale et de la gorge	100 mg à 200 mg une fois par jour, 3 fois par semaine tant que vous avez un risque de développer une infection.
Pour traiter une mycose génitale	150 mg en dose unique.
Pour diminuer le risque de récidive de mycose vaginale	150 mg tous les 3 jours à raison d'un seul jour (Jour 1, 4 et Jour 7), pendant 6 mois puis 1 fois par semaine pendant 6 mois tant que vous avez un risque de développer une infection.
Pour traiter une infection fongique de la peau et des ongles	Selon la site de l'infection, 50 mg à 150 mg une fois par semaine pendant 6 à 8 semaines (jusqu'à 6 semaines pour un pied d'athlète) ; pour le traitement des ongles, traitement jusqu'au remplacement de l'ongle infecté.
Pour éviter de développer une infection à Candida (si votre système immunitaire est affaibli et ne fonctionne pas correctement)	200 à 400 mg une fois par jour tant que vous avez un risque de développer une infection.
Adolescents âgés de 12 à 17 ans	Respectez la posologie indiquée par votre médecin (soit la posologie pour l'enfant).
Enfants jusqu'à 11 ans	La posologie maximale chez l'enfant est de 400 mg par jour. La posologie sera basée sur le poids de l'enfant en kilogrammes.
Enfants âgés de 0 à 12 mois	3 mg par kg de poids corporel (une fois par jour).
Enfants âgés de 1 à 3 ans	3 mg par kg de poids corporel toutes les 24 heures.
Enfants âgés de moins de 2 semaines	6 mg à 12 mg par kg de poids corporel toutes les 24 heures.
Enfants âgés de 0 à 4 semaines	3 mg à 12 mg par kg de poids corporel toutes les 24 heures.

Même posologie que ci-dessus mais à une fréquence de tous les 2 jours.

La posologie maximale est de 12 mg par kg de poids corporel toutes les 48 heures.

Enfants âgés de moins de 2 semaines :

Même posologie que ci-dessus mais à une fréquence de tous les 3 jours.

La posologie maximale est de 12 mg par kg de poids corporel toutes les 48 heures.

les gélules à la

10 mg une ou plus si augmentées

ue l'on vous

une durée

saire. Les

à 800 mg

une fois par

mois

à 10 mg à

d'arrêter

à 7 à 30

arrêter

100 mg

tenant un

doses au

ne fois par

se présentez

à 100 mg

par jour

ant 1 à

4 semaines

à 6 semaines

d'athlète ; pour le traitement des

ongles, traitement jusqu'au remplacement de l'ongle infecté)

que vous

la infection

l'adulte soit la

de l'enfant

que vous

la infection

GYNO-DERMOFIX® ovules

Sertaconazole

Composition :

Sertaconazole nitrale 300 m
Excipients q.s.p 1 ovul

Propriétés :

Antifongique de la classe des imidazolés dont l'activité in vitro a été démontrée sur les levures du genre Candida. Le sertaconazole manifeste un effet antibiotique sur les germes gram+.

Indications thérapeutiques :

- Traitement local des infections à Candida de la muqueuse vaginale ; en l'absence d'une symptomatologie clinique évocatrice, la seule constatation d'une levure (candida...) sur la muqueuse vaginale ne peut constituer en soi une indication.
- Candidose génitale

Contre-indications :

- Hypersensibilité aux nitro-imidazolés.
- Hypersensibilité à l'un des constituants.

Effets indésirables :

- Sensation de brûlure ou de prurit disparaissant généralement avec la poursuite du traitement.
- Réactions allergiques.

↓ 40,00

Précautions d'emploi :

- Il est souhaitable de traiter simultanément tout foyer à candida, reconnu pathogène, associé.
- En cas d'intolérance locale ou de réaction allergique, le traitement sera interrompu.
- Il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (pH favorisant la multiplication des candidoses).
- L'utilisation du sertaconazole ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.
- En raison d'un passage systémique extrêmement faible, l'allaitement est possible.

Mode d'emploi et posologie :

- Un ovule le soir au coucher, introduit profondément dans le vagin, de préférence en position allongée.
- En cas de persistance des signes cliniques, un deuxième ovule sera appliqué après sept jours.

Conseils pratiques :

- toilette génitale externe avec un savon à pH neutre ou alcalin ;
- porter de sous-vêtements en coton, éviter les douches vaginales ;
- traiter les extensions vulvaires ou périanales de la mycose en associant une crème antifongique appliquée localement ;
- traiter le partenaire selon les cas et ne pas interrompre le traitement pendant les règles ;
- éviter l'utilisation des préservatifs et des diaphragmes en latex.

Forme et présentation :

Boîte de 1 ovule

Liste I (tableau A)

PROMOPHARM S.A.

Z.I. du Sahel, Had Soualem - Maroc

GYNO-DERMOFIX® ovules

Sertaconazole

Composition :

Sertaconazole nitrale 300 m
Excipients q.s.p 1 ovul

Propriétés :

Antifongique de la classe des imidazolés dont l'activité in vitro a été démontrée sur les levures du genre Candida. Le sertaconazole manifeste un effet antibiotique sur les germes gram+.

Indications thérapeutiques :

- Traitement local des infections à Candida de la muqueuse vaginale ; en l'absence d'une symptomatologie clinique évocatrice, la seule constatation d'une levure (candida...) sur la muqueuse vaginale ne peut constituer en soi une indication.
- Candidose génitale

Contre-indications :

- Hypersensibilité aux nitro-imidazolés.
- Hypersensibilité à l'un des constituants.

Effets indésirables :

- Sensation de brûlure ou de prurit disparaissant généralement avec la poursuite du traitement.
- Réactions allergiques.

↓ 40,00

Précautions d'emploi :

- Il est souhaitable de traiter simultanément tout foyer à candida, reconnu pathogène, associé.
- En cas d'intolérance locale ou de réaction allergique, le traitement sera interrompu.
- Il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (pH favorisant la multiplication des candidoses).
- L'utilisation du sertaconazole ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.
- En raison d'un passage systémique extrêmement faible, l'allaitement est possible.

Mode d'emploi et posologie :

- Un ovule le soir au coucher, introduit profondément dans le vagin, de préférence en position allongée.
- En cas de persistance des signes cliniques, un deuxième ovule sera appliqué après sept jours.

Conseils pratiques :

- toilette génitale externe avec un savon à pH neutre ou alcalin ;
- porter de sous-vêtements en coton, éviter les douches vaginales ;
- traiter les extensions vulvaires ou périanales de la mycose en associant une crème antifongique appliquée localement ;
- traiter le partenaire selon les cas et ne pas interrompre le traitement pendant les règles ;
- éviter l'utilisation des préservatifs et des diaphragmes en latex.

Forme et présentation :

Boîte de 1 ovule

Liste I (tableau A)

PROMOPHARM S.A.

Z.I. du Sahel, Had Soualem - Maroc

DERMOFIX® Crème

Sertaconazole

Composition :

Sertaconazole nitrate

Excipients (dont E218 & Acide sorbique)

2 g

100 g

87/30

Propriétés :

Le Sertaconazole est un anti-mycosique à usage topique. Son spectre d'activité s'avère très large :
- levures pathogènes (*Candida albicans*, *C. tropicalis*, *C. parapsilosis*)
- dermatopigments (*Trichophyton*, *Epidermophyton* et *Microsporum*)
- champignons opportunistes filamentés (*Aspergillus*)
- germes résistants à d'autres anti-mycosiques
- bactéries gram+ (*Staphylococcus* et *Streptococcus*)

LOT 20004
PER 04/23
PPV 87DH30

Indications thérapeutiques :

Traitements topiques des mycoses superficielles de la peau d'athlète, *Tinea cruris* (Eczéma marginé de Hebra), *Tinea corporis* (mycoses circinées), *Tinea barbae* (Sycosis), *Tinea manus*, Candidoses (Minillose) et *Pityriasis versicolor* (*Pityrosporum orbiculare*).

Effets indésirables :

Le Sertaconazole présente une innocuité totale et une excellente tolérance : aucun cas de toxicité ou de réaction de photosensibilité n'a été relevé. Seul un érythème léger peut survenir lors des premières applications n'entrant jamais la suspension du traitement.

Conditions particulières d'emploi :

Dermofix ne convient pas à l'usage ophtalmique.

Après l'application dermique de grandes quantités, on ne détecte pas de niveaux plasmatiques. Malgré cela, son innocuité n'a pas été démontrée chez le nouveau-né et chez la femme enceinte ou allaitante.

Posologie usuelle, voie et mode d'administration :

Voie topique.

Appliquer la crème une fois par jour (de préférence le soir) ou deux fois (matin et soir), doucement et uniformément, en essayant de couvrir 1 cm de peau saine (environ) autour de la zone à traiter.

La durée du traitement varie d'un patient à l'autre en fonction de l'agent étiologique et de la localisation de l'infection.

En général, on recommande quatre semaines de traitement afin d'assurer une guérison clinique et microbiologique complète et d'éviter ainsi toute récidive, cette guérison clinico-microbiologique peut apparaître entre deux et quatre semaines de traitement.

Pityriasis versicolor : 2 semaines

Dermatophytose : 2 à 4 semaines

Candidose : 2 à 4 semaines

Formes et autres présentations :

Dermofix® crème 2% tube de 30 g

Dermofix® poudre flacon de 30 g

Dermofix® Solution 2% flacon de 30 ml

Dermofix® Gel 2% flacon de 50 g

Dermofix® Gel 2% flacon de 100 g

Gyno-dermofix® 300 mg boîte de 1 ovule.

Liste I (Tableau A)

PROMOPHARM S.A.
Z.I. du Sahel, Had Soualem - Maroc
S/L FERRER INTERNATIONAL

Duphaston®

10 mg, comprimé pelliculé

Dydrogestérone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que Duphaston 10 mg comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ce médicament ?
3. Comment prendre ce médicament ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ce médicament ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que Duphaston 10 mg comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?

Duphaston contient l'ingrédient actif hydrogestérone. La hydrogestérone est une hormone progestagène féminine. Les hormones progestagénines ont le même effet que la progestérone naturelle. Elle régule avec les hormones oestrogénées le cycle menstruel.

Duphaston 10 mg comprimé pelliculé est utilisé : - Pour les problèmes que vous pourriez avoir lorsque votre corps ne produit pas suffisamment de progestérone :

- contrôler le cycle menstruel irrégulier ;
- croissance de la muqueuse utérine en dehors de l'utérus (endométriose) ;
- menstruations douloureuses ;
- infertilité due à un faible niveau de progestérone ;
- soutien de la phase lutéale dans le cadre des cycles induits pendant les traitements de fertilité.
- limiter le risque d'une menace de fausse couche ou si vous avez eu des fausses couches à répétition.

Thérapie hormonale de substitution (THS)

Duphaston 10 mg comprimé pelliculé est également utilisé en combinaison avec des oestrogénies :

- afin d'éviter des anomalies de la muqueuse de l'utérus pendant le traitement des symptômes de la ménopause ;
- si vous avez cessé d'avoir des périodes avant la ménopause ;
- pour des périodes exceptionnellement abondantes et / ou irrégulières.

Votre corps équilibre normalement la quantité d'hormones naturelles de

Fertilité, grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous planifiez une grossesse, demandez conseil pharmacien avant de prendre ce médicament. Un risque accru d'une anomalie congénitale du urinaire (hypospadias) chez les enfants dont le père a pris Duphaston 10 mg comprimé pelliculé.

Plus tard, lorsque le père aura pris Duphaston 10 mg comprimé pelliculé, il peut y avoir un risque d'effets nocifs pour l'enfant. Les quantités passent dans le lait maternel.

Duphaston 10 mg comprimé pelliculé peut être pris par votre pharmacien.

Conduire ou utiliser des machines

Vous pouvez vous sentir un peu somnolent ou avoir des sensations vertigineuses après la prise de Duphaston 10 mg comprimé pelliculé, avant de conduire ou d'utiliser des machines. Attendez de voir comment vous affecte Duphaston 10 mg comprimé pelliculé, avant de conduire ou d'utiliser des machines.

Duphaston 10 mg comprimé pelliculé contient

Si vous avez une intolérance à certains sucres, parlez-en à votre pharmacien. Cela inclut les problèmes qui affectent la façon dont le corps utilise le lactose de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose -galactose.

3. Comment prendre ce médicament ?

Veillez à toujours prendre ce médicament dans les indications de votre médecin ou pharmacien. Votre pharmacien en cas de doute.

Prendre ce médicament

- Avalez le comprimé avec de l'eau. - Vous pouvez le prendre avec ou sans nourriture. - Si vous devez prendre plusieurs comprimés, répartissez sur la journée. Par exemple, prenez deux comprimés au matin et deux comprimés le soir.
- Essayez de prendre les comprimés au matin, lorsque vous serez éveillés et pourrez vous aider aussi à ne pas oublier de prendre ce comprimé.
- La ligne de sécabilité du comprimé n'est pas nécessairement dans le milieu de la tablette. Pour faciliter la division, elle ne le est pas en deux demi-doses.

Combien de quantité faut-il de Duphaston 10 mg comprimé pelliculé

Le nombre de comprimés que vous prenez dépendra de ce que vous traitez. Si vous avez des menstruations naturelles, le jour 1 de votre cycle c'est quand vous commencez à saigner. Si vous n'avez pas de périodes naturelles, vous devrez prendre le comprimé le matin et le soir.

Cycle et quand commencer à prendre vos comprimés.

Pour réguler votre cycle menstruel :

- Prenez 1 comprimé par jour.
- Faites ceci, à partir de la deuxième moitié de votre prochain cycle.
- La journée de début et le nombre de jours

que vous prenez dépendra de ce que vous traitez. Si vous avez des menstruations naturelles, le jour 1 de votre cycle c'est quand vous commencez à saigner. Si vous n'avez pas de périodes naturelles, vous devrez prendre le comprimé le matin et le soir.

Il peut y avoir un risque d'effets nocifs pour l'enfant. Les quantités passent dans le lait maternel.

10 mg comprimé pelliculé peut être pris par votre pharmacien.

ou avoir des sensations vertigineuses après la prise de Duphaston 10 mg comprimé pelliculé, avant de conduire ou d'utiliser des machines.

lu lactose

Si vous avez une intolérance à certains sucres, parlez-en à votre pharmacien. Cela inclut les problèmes qui affectent la façon dont le corps utilise le lactose de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose -galactose.

en suivant exactement les instructions de votre pharmacien.

ivez prendre les comprimés le matin et le soir.

Le moment chaque jour afin de prendre les comprimés dans votre corps. Cela vous aidera à ne pas oublier de prendre ce comprimé.

que pour faciliter la prise du comprimé le matin et le soir.

ng comprimé pelliculé le matin et le soir.

que pour faciliter la prise du comprimé le matin et le soir.

otre cycle jusqu'au premier

endant lesquels vous prenez

Docteur Abdelouahab SAILE

Gynécologue-Obstétricien

Diplômé d'Etudes Spéciales de l'Université de Bordeaux.
Ancien Attaché des Hôpitaux de Paris.

Stérilité du Couple - Accouchements
Maladies du sein - Colposcopie
Echographie - Cœliochirurgie
Chirurgie Gynécologique

Sur rendez-vous

Casablanca, le 22.06.2009 الدار البيضاء في :



الدكتور عبد الوهاب الصايل

اختصاصي في أمراض النساء والولادة

حاصل على الشهادة العليا من كلية الطب ببوردو
طبيب ملحق سابق بمستشفيات باريس

أمراض الثدي - الجراحة بالنظر الباطني
الشخص بالصدى والمجهر - العقم
الجراحة النسوية

بالموعد

Mme KABL y Hôpital
Dr. Abdelouahab SAILE
Gynécologue Accoucheur
20, Rue Oumaima Sayah - Casablanca
Tél. : 0522 36 38 21 - Fax : 0522 36 38 25

Echographie 450.000

Visite 250.00

Dr. Abdelouahab SAILE
Gynécologue Accoucheur
20, Rue Oumaima Sayah - Casablanca
Tél. : 0522 36 38 21 - Fax : 0522 36 38 25

البريد الإلكتروني: Email : abdelouahab_saile@yahoo.fr

إقامة ستار يونس 20، زنقة أميمة صياح الطابق 1 شقة 1
حي رسين الدار البيضاء، الهاتف : 05 22 36 38 25 - الفاكس: 05 22 36 21/36 38 25
En Cas d'urgence appeler le N° : 06 64 00 58 88
في حالات الإستعجال إتصلوا بالرقم



LABORATOIRE SCHEHERAZAD

4, Bd Zerkouni - Casablanca 01

Tél. : 022.22.69.88/89 fax : 022.47.55.73

Casablanca le : 23/10/2020

Facture N° 339033

N° D'ANA-PATH 1DJE4F5

NOM PRENOM KABLY HAJAR

ADRESSE PAR : DR SAILE

ORGANE UTERUS-COL.

COTATION B 245

COTATION K:

TOTAL DH : 270

Cachet et signature :

LABORATOIRE SCHEHERAZAD
4, Boulevard Zerkouni - Casablanca 01
Patent n° 31206518 - N° d'immatriculation : 41807041
Class : 2294015 - N° d'immatriculation : 0015201900008



مختبر شهزاد

LABORATOIRE SCHEHERAZAD

CABINET MEDICAL D'EXAMENS HISTO - CYTOPATHOLOGIQUES

4, شارع الزرقطوني الطابق 5 - الدار البيضاء -
4, Bd. Zerkouni 5^{ème} étage - CASABLANCA 01 - Tél. : 0522.22.69.88/89 - Fax : 05 22.47.55.73
E-mail : labocasa2@gmail.com

Docteur Schéhérazad HACHCHADI - AGHZADI
C.E.S. d'ANATOMIE PATHOLOGIQUE
Diplômée de la Faculté de Médecine de DIJON

Ex. Enseignante à la Faculté de Médecine de BESANÇON
Membre Actif de l'Academie Internationale de Pathologie

DEMANDE D'EXAMEN HISTO - CYTOPATHOLOGIQUE

22 OCT. 2020
LL 001
Date du prélèvement : Référence N° :
Médecin prescripteur : N° Tél :
Nom du patient : Prénom :
Nom de jeune fille : Date de naissance :
Adresse : N° Tél :
IDSEGFS
m

Type de Prélèvement : Cytologie Biopsie Curetage Exérèse Extemporané

Siège, organe ou tissus:

Examens antérieurs : Dr.
Renseignements cliniques & paracliniques :
.....

Frottis de dépistage : Vagin Exocol Endocol Endomètre

- Date des dernières règles : 5/28

- Parité : 1

- Traitement hormonal :
.....

> - Test au Lugol :
.....

LABORATOIRE SCHEHERAZAD
4, Boulevard Zerkouni 5^{ème} Etage
20140 - Casablanca
Patente : 41206518 - I.F. : 41807041
CNSS : 229-4015 - ICE : 001502419000087

Dr. Abdelouahab SAÏL
Gynécologue Accoucheur
20, Rue Dumarais, Casablanca
Signature & Cachet
Tél. : 05 22 36 38 21 - Fax : 05 22 36 38 25



LABORATOIRE SCHEHERAZAD

CABINET MEDICAL D'EXAMENS HISTO - CYTOPATHOLOGIQUES

4, Bd Zerkouni 5^{ème} étage - 20140 Casablanca - Tél.: 05.22.22.69.88/89 - Fax : 05.22.47.55.73 - E-mail: labocasa2@mail.com - ICE : 001502419000087

Docteur Schéherazad HACHCHADI - AGHZADI
C.E.S. d'ANATOMIE PATHOLOGIQUE
Diplômée de la Faculté de Médecine de DIJON
Ex. Enseignante à la Faculté de Médecine de BESANÇON
Membre Actif de l'Academie Internationale de Pathologie

DR SAILE
Pour
Mme KAB Y HAJAR

Age : 43 ANS
Référence : 1DJE4F5
Parvenu : Le 23/10/2020
Répondu : Le 24/10/2020
Organe : UTERUS-COL.
Antériorité réf : 8D8G2F ;
J 28 du cycle ;
2P ;
Mycose vulvo-vaginale ;
Frottis du col .

- FROTTIS CERVICAL EN MILIEU LIQUIDE -

MATERIEL EXAMINÉ

Frottis cervical utérin parvenu effectué en phase liquide et qui a été analysé en mono-couche .

QUALITE DU FROTTIS.

Prélèvement est microscopiquement hémorragique.

CLASSE DU FROTTIS SELON LE SYSTEME DE BETHESDA : ASC-US

Présence de cellules malpighiennes intermédiaires dotées d'un noyau hypertrophique et hyperchromatique entouré d'un cytoplasme plus foncé pour lesquelles un contrôle est souhaitable .

CYTROLOGIE DESCRIPTIVE

Richesse : peu élevée
Type de cellules retrouvées :
* cellules malpighiennes exocervicales, intermédiaires et parabasales et
* cellules endocervicales d'aspect normal ou en métaplasie malpighienne complète

FLORE MICROBIENNE

Flore mixte

CONCLUSION:

- Frottis sub-atrophique et hémorragique avec présence de légères dystrophies nucléaires malpighiennes dont l'origine ne peut être précisée (lésions de type ASCUS)
- Ectropion en métaplasie malpighienne complète;
- Un contrôle après traitement est nécessaire .

E
Très confraternellement
DR HACHCHADI-AGHZADI Sc.

LABORATOIRE SCHEHERAZAD
4, Boulevard Zerkouni 5^{ème} Etage
Casablanca
Tél.: 05.22.22.69.88/89 - Fax : 05.22.47.55.73
ICE : 001502419000087
S.I.F. : 41807041
E-mail: labocasa2@mail.com

DOCTEUR ABDELOUAHAB SAILE
GYNECOLOGUE ACCOUCHEUR

Ancien Attaché des Hôpitaux de Paris
Diplômé d'Etat de la Faculté De Médecine De
Bordeaux.

Diplômé d'Echographie De l'université RENE DESCARTE PARIS V
Diplômé de Colposcopie, Hystéroskopie et Cœlioscopie de

l'Université RENE DESCARTES PARIS V

Diplômé de stérilité de l'Université RENE DESCARTES PARIS V.

Diplômé des Maladies du Sein de l'Université
LOUIS PASTEUR DE STRASBOURG.

Diplômé de l'Université PIERRE et MARIE CURIE
de Médecine et Biologie de la Reproduction

CASABLANCA LE : 22/10/2020

Echographie Pelvienne réalisée avec un appareil GENERAL
ELECTRIC modèle VOLUSON P8 mis en service le 13/09/ 013

Madame KABLY HAJAR

L'utérus est en position normale.

Il est augmenté de volume.

Le corps utérin est déformé par 3 fibromes intra-muraux non
compliqués dont le diamètre moyen est de 13 , 17 et 34 mm et dont
l'échostructure est dense, peu transsonique, homogène, sans signe
échographique de nécrobiose ni de remaniement.

La muqueuse utérine est normalement épaisse pour la période du
cycle.

Les deux ovaires sont bien vus.

L'ovaire gauche est de volume normal (longueur 28,2 mm) et son
échostructure est normale.

L'ovaire droit est de volume normal (longueur 28,2 mm) et son
échostructure est normale.

Il n'y a pas de masse pelvienne suspecte.

Il n'y a pas d'ascite ni d'épanchement liquidiens dans le cul de sac de
Douglas.

CONCLUSION : Utérus myomateux.

Dr. Abdellouahab SAILE
Gynécologue Accoucheur
20, Rue Oumaima Sayah - Casablanca
Tél. : 0522.36.38.21 - Fax : 0522.36.38.25

RESIDENCE STAR YOUNESS
20, RUE OUMAIMA SAYAH (EX MME ROLLAND)
1^{er} ETAGE APPT 1 QUARTIER RACINE CASABLANCA
TÉL : 022.36.38.21 - FAX : 022.36.38.25