

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

## Déclaration de Maladie

N° W19-463419



### Maladie

### Dentaire

### Optique

### Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 03074

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Tél. 06.22.049629

Total des frais engagés :

Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

طبب مخالف، خبير لدى المعاشر

60، طريق مولاي التهامي

(قرب مستشفى الحسني الدارالبيضاء)

ماروك - الحسني - الدارالبيضاء

240 22 56 - 022 90 70 88

Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :


Signature de l'adhérent(e) :

Le : 08 SEP 2020

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
10/01/2016	Consultation	1	100 DA	<p>دكتور خير لدى التحاليف</p> <p>طبيب ماهر، خير لدى التحاليف</p> <p>دكتور طريف مولوي</p> <p>دكتور مسند في الحقن الدهنية</p> <p>دكتور مسند في الحقن الدهنية</p> <p>(دكتور مسند في الحقن الدهنية)</p> <p>مازن ع - البحري الحسيني</p> <p>022 90 30 88</p>

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	08 09 20/20	1120,80

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRE																													
Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.																													
<b>Important :</b> Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.																													
<b>SOINS DENTAIRES</b> 	<b>Dents Traitées</b> (List of teeth to be treated)	<b>Nature des Soins</b> (Nature of treatments)	<b>Coefficient</b> (Coefficient)	INP : <input type="text"/>																									
				CŒFFICIENT DES TRAVAUX																									
				MONTANTS DES SOINS																									
				DEBUT D'EXECUTION																									
				FIN D'EXECUTION																									
				<b>O.D.F PROTHÈSES DENTAIRES</b> 	<b>DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE</b> <table border="1" data-bbox="1504 913 1704 1027"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">D</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> <tr> <td colspan="2">G</td> </tr> </table>	H		25533412	21433552	00000000	00000000	D		00000000	00000000	35533411	11433553	B		G		CŒFFICIENT DES TRAVAUX							
						H																							
						25533412	21433552																						
						00000000	00000000																						
						D																							
00000000	00000000																												
35533411	11433553																												
B																													
G																													
MONTANTS DES SOINS																													
DATE DU DEVIS																													
DATE DE L'EXECUTION																													
<b>[Création, remont, adjonction]</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession																													
																													
																													
																													
																													
																													

Docteur Saïd GZOULI

Médecin Assermenté  
Expert près les Tribunaux

الدكتور سعيد الكزوولي

بيب محلف  
ولجدى المحاكم

98,90 x 3

Casablanca, le :

08 SEP 2020

الدار البيضاء، في :

1. Rhubarb 10 3 mois  
72,00 x 3 1 g de racine
2. Detoxifol 10 3 mois  
36,00 x 3 1 g /
3. Fuxiolo 5 3 mois  
85,00 x 3 1/4 - 1/2
4. Mazola 5 3 mois  
27,00 x 9 1 g /
5. Librax ou Alivax 3 mois  
1120,80 1 g x 2 /

الدكتور سعيد الكزوولي  
بيب محلف ولجدى المحاكم  
التهامى (قرب مصحة الضمان الاجتماعي) مازولا - الحي الحسني - الدار البيضاء

60, Route Moulay Thami (à côté de la Polyclinique Hay Hassani), Mazola - Hay Hassani - Casablanca

Tél. : 05 22.90.70.88 - E-mail : drgzsa@gmail.com

## 1. Dénomination du médicament :

ANXIOL 6 mg, comprimé quadrisécable  
(Bromazepam)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire. Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

LOT 190901  
EXP 05/2021  
PPV 3670DH

## 2. Composition du médicament

### Composition :

Bromazepam.....6mg

Excipients : Lactose, Cellulose microcristalline, Talc, Stéarate de magnésium.

Liste des Excipients à effet notoire : Lactose.

## 3. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

ANXIOLYTIQUES/DERIVES DE LA BENZODIAZEPINE

## 4. Indications thérapeutiques

Ce médicament est recommandé dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gênants, ou en prévention et/ou traitement des manifestations liées à un sevrage alcoolique.

## 5. Posologie

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La posologie est strictement individuelle et il n'est pas possible de définir une dose usuelle.

- Mode et voies d'administration :

Voie orale.

Avez ce médicament avec un verre d'eau.

- Durée du traitement :

La durée du traitement doit être aussi brève que possible et ne devrait pas dépasser 8 à 12 semaines (voir Mises en garde).

## 6. Contre-indications

Ne prenez jamais ANXIOL, comprimé quadrisécable dans les cas suivants :

- allergie connue à cette classe de produits ou à l'un des composants du médicament,
- insuffisance respiratoire grave,
- syndrome d'apnée du sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil),
- maladie grave du foie,
- myasthénie (maladie caractérisée par une tendance excessive à la fatigue musculaire).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## 7. Effets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Ils sont en rapport avec la dose ingérée et la sensibilité individuelle du patient.

### Effets indésirables neuro-psychiatriques

(voir Mises en garde) : Fréquence indéterminée

• troubles de mémoire, qui peuvent survenir aux doses thérapeutiques, le risque augmentant proportionnellement à la dose,

• dépression

• troubles du comportement, modifications de la conscience, irritabilité, agressivité, agitation,

• dépendance physique et psychique, même à doses thérapeutiques avec syndrome de sevrage ou de rebond à l'arrêt du traitement,

• sensations de vertiges, maux de tête, difficulté à coordonner certains mouvements,

• confusion, baisse de vigilance voire somnolence (particulièrement chez le sujet âgé),

insomnie, cauchemars, tension,

• modifications de la libido.

### Effets indésirables cutanés

• éruptions cutanées, avec ou sans démangeaisons, urticaire.

### Effets indésirables cardiaques

• insuffisance cardiaque, y compris arrêt cardiaque

### Effets indésirables respiratoires

• diminution des capacités respiratoires

### Effets indésirables digestifs

• nausées, vomissements, constipation.

### Effets indésirables du rein et des voies urinaires

• incapacité à uriner

### Effets indésirables oculaires

• vision double.

### Effets indésirables du système immunitaire

• allergies (réactions telles que gonflement, rougeur de la peau, ...), y compris réactions allergiques graves (choc anaphylactique, œdème de Quincke)

### Effets indésirables généraux

• faiblesse musculaire, fatigue.

### Complications liées au traitement

(voir Mises en garde) : Fréquence indéterminée

• chutes, fractures.

jeu de rôle  
du traitement,

6,

antécédents d'autres dépendances :

La dépendance peut survenir même en

Pour plus d'information, parlez-en à vot

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement p

SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par

de signes tels que anxiété extrême, ins

musculaires, diarrhée, mais on peut obse

maux de tête, un engourdissement ou d

anormale au bruit, à la lumière ou aux c

de sens de la réalité, modification de la

Les modalités de l'arrêt du traitement d

La diminution très PROGRESSIVE des

melleure prévention de ce phénomène

que le traitement aura été prolongé.

Malgré la diminution progressive des d

produire, avec réapparition TRANSITOIR

justifié la mise en route du traitement.

Des troubles de mémoire ainsi que des

susceptibles d'apparaître dans les heu

la mémoire peuvent être associés à un

Chez certains sujets, ce médicament p

recherché : insomnie, cauchemars, agit

désinhibition, amnésie, hallucinations,

des comportements potentiellement dan

entourage, ainsi que des troubles de co

réactions sont plus susceptibles de sur

Si une ou plusieurs de ces réactions su

médecin.

Les benzodiazépines et produits appa

âgé, en raison du risque de somnolence

favoriser les chutes, avec des conséqu

L'utilisation simultanée de bromazép

central (ralentissant votre activité) doit é

et une diminution des capacités respira

### Précautions d'emploi

La durée du traitement doit être aussi c

semaines.

Ce traitement médicamenteux ne peut

convient de demander conseil à votre

otre anxiété.

La prise de ce médicament nécessite u

d'insuffisance rénale, de maladie chron

ainsi que chez les enfants et les sujets

Ce médicament ne traite pas la dépres

anxiété associée à la dépression, il ne do

évoluer pour son propre compte avec p

La prise d'alcool est formellement déco

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENS

MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

- Mentions relatives aux excipients à eff

Si votre médecin vous a informé(e) d'u

prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déco

au galactose, un déficit en lactase de L

du galactose (maladies héréditaires rare

9. Interactions

- Interactions avec d'autres médicame

Autres médicaments et ANXIOL, com

Associations déconseillées

• Alcool (boissons alcoolisées et médic

Associations à prendre en compte

• dérivés morphiniques (analgésiques, a

buropénone)

• antipsychotiques (médicaments du sy

• barbituriques (médicaments du syst

## 1. Dénomination du médicament :

ANXIOL 6 mg, comprimé quadrisécable  
(Bromazepam)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire. Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

LOT 190901  
EXP 05/2021  
PPV 3670DH

## 2. Composition du médicament

### Composition :

Bromazepam.....6mg

Excipients : Lactose, Cellulose microcristalline, Talc, Stéarate de magnésium.

Liste des Excipients à effet notoire : Lactose.

## 3. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

ANXIOLYTIQUES/DERIVES DE LA BENZODIAZEPINE

## 4. Indications thérapeutiques

Ce médicament est recommandé dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gênants, ou en prévention et/ou traitement des manifestations liées à un sevrage alcoolique.

## 5. Posologie

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La posologie est strictement individuelle et il n'est pas possible de définir une dose usuelle.

- Mode et voies d'administration :

Voie orale.

Avez ce médicament avec un verre d'eau.

- Durée du traitement :

La durée du traitement doit être aussi brève que possible et ne devrait pas dépasser 8 à 12 semaines (voir Mises en garde).

## 6. Contre-indications

Ne prenez jamais ANXIOL, comprimé quadrisécable dans les cas suivants :

- allergie connue à cette classe de produits ou à l'un des composants du médicament,
- insuffisance respiratoire grave,
- syndrome d'apnée du sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil),
- maladie grave du foie,
- myasthénie (maladie caractérisée par une tendance excessive à la fatigue musculaire).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## 7. Effets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Ils sont en rapport avec la dose ingérée et la sensibilité individuelle du patient.

### Effets indésirables neuro-psychiatriques

(voir Mises en garde) : Fréquence indéterminée

• troubles de mémoire, qui peuvent survenir aux doses thérapeutiques, le risque augmentant proportionnellement à la dose,

• dépression

• troubles du comportement, modifications de la conscience, irritabilité, agressivité, agitation,

• dépendance physique et psychique, même à doses thérapeutiques avec syndrome de sevrage ou de rebond à l'arrêt du traitement,

• sensations de vertiges, maux de tête, difficulté à coordonner certains mouvements,

• confusion, baisse de vigilance voire somnolence (particulièrement chez le sujet âgé),

insomnie, cauchemars, tension,

• modifications de la libido.

### Effets indésirables cutanés

• éruptions cutanées, avec ou sans démangeaisons, urticaire.

### Effets indésirables cardiaques

• insuffisance cardiaque, y compris arrêt cardiaque

### Effets indésirables respiratoires

• diminution des capacités respiratoires

### Effets indésirables digestifs

• nausées, vomissements, constipation.

### Effets indésirables du rein et des voies urinaires

• incapacité à uriner

### Effets indésirables oculaires

• vision double.

### Effets indésirables du système immunitaire

• allergies (réactions telles que gonflement, rougeur de la peau, ...), y compris réactions allergiques graves (choc anaphylactique, œdème de Quincke)

### Effets indésirables généraux

• faiblesse musculaire, fatigue.

### Complications liées au traitement

(voir Mises en garde) : Fréquence indéterminée

• chutes, fractures.

jeu de rôle  
du traitement,

6,

antécédents d'autres dépendances :

La dépendance peut survenir même en

Pour plus d'information, parlez-en à vot

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement p

SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par

de signes tels que anxiété extrême, ins

musculaires, diarrhée, mais on peut obse

maux de tête, un engourdissement ou d

anormale au bruit, à la lumière ou aux c

de sens de la réalité, modification de la

Les modalités de l'arrêt du traitement d

La diminution très PROGRESSIVE des

melleure prévention de ce phénomène

que le traitement aura été prolongé.

Malgré la diminution progressive des d

produire, avec réapparition TRANSITOIR

justifié la mise en route du traitement.

Des troubles de mémoire ainsi que des

susceptibles d'apparaître dans les heu

la mémoire peuvent être associés à un

Chez certains sujets, ce médicament p

recherché : insomnie, cauchemars, agit

désinhibition, amnésie, hallucinations,

des comportements potentiellement dan

entourage, ainsi que des troubles de co

réactions sont plus susceptibles de sur

Si une ou plusieurs de ces réactions su

médecin.

Les benzodiazépines et produits appa

âgé, en raison du risque de somnolence

favoriser les chutes, avec des conséqu

L'utilisation simultanée de bromazép

central (ralentissant votre activité) doit é

et une diminution des capacités respira

### Précautions d'emploi

La durée du traitement doit être aussi court

semaines.

Ce traitement médicamenteux ne peut

convenir de demander conseil à votre

otre anxiété.

La prise de ce médicament nécessite u

d'insuffisance rénale, de maladie chron

ainsi que chez les enfants et les sujets

Ce médicament ne traite pas la dépres

anxiété associée à la dépression, il ne do

évoluer pour son propre compte avec p

La prise d'alcool est formellement déco

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENS

MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

- Mentions relatives aux excipients à eff

Si votre médecin vous a informé(e) d'u

prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déco

au galactose, un déficit en lactase de L

du galactose (maladies héréditaires rare

9. Interactions

- Interactions avec d'autres médicame

Autres médicaments et ANXIOL, com

Associations déconseillées

• Alcool (boissons alcoolisées et médic

Associations à prendre en compte

• dérivés morphiniques (analgésiques, a

buropénone)

• antipsychotiques (médicaments du sy

• barbituriques (médicaments du syst

## 1. Dénomination du médicament :

ANXIOL 6 mg, comprimé quadrisécable  
(Bromazepam)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire. Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

LOT 190901  
EXP 05/2021  
PPV 3670DH

## 2. Composition du médicament

### Composition :

Bromazepam.....6mg

Excipients : Lactose, Cellulose microcristalline, Talc, Stéarate de magnésium.

Liste des Excipients à effet notoire : Lactose.

## 3. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

ANXIOLYTIQUES/DERIVES DE LA BENZODIAZEPINE

## 4. Indications thérapeutiques

Ce médicament est recommandé dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gênants, ou en prévention et/ou traitement des manifestations liées à un sevrage alcoolique.

## 5. Posologie

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La posologie est strictement individuelle et il n'est pas possible de définir une dose usuelle.

- Mode et voies d'administration :

Voie orale.

Avez ce médicament avec un verre d'eau.

- Durée du traitement :

La durée du traitement doit être aussi brève que possible et ne devrait pas dépasser 8 à 12 semaines (voir Mises en garde).

## 6. Contre-indications

Ne prenez jamais ANXIOL, comprimé quadrisécable dans les cas suivants :

- allergie connue à cette classe de produits ou à l'un des composants du médicament,
- insuffisance respiratoire grave,
- syndrome d'apnée du sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil),
- maladie grave du foie,
- myasthénie (maladie caractérisée par une tendance excessive à la fatigue musculaire).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## 7. Effets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Ils sont en rapport avec la dose ingérée et la sensibilité individuelle du patient.

### Effets indésirables neuro-psychiatriques

(voir Mises en garde) : Fréquence indéterminée

• troubles de mémoire, qui peuvent survenir aux doses thérapeutiques, le risque augmentant proportionnellement à la dose,

• dépression

• troubles du comportement, modifications de la conscience, irritabilité, agressivité, agitation,

• dépendance physique et psychique, même à doses thérapeutiques avec syndrome de sevrage ou de rebond à l'arrêt du traitement,

• sensations de vertiges, maux de tête, difficulté à coordonner certains mouvements,

• confusion, baisse de vigilance voire somnolence (particulièrement chez le sujet âgé),

insomnie, cauchemars, tension,

• modifications de la libido.

### Effets indésirables cutanés

• éruptions cutanées, avec ou sans démangeaisons, urticaire.

### Effets indésirables cardiaques

• insuffisance cardiaque, y compris arrêt cardiaque

### Effets indésirables respiratoires

• diminution des capacités respiratoires

### Effets indésirables digestifs

• nausées, vomissements, constipation.

### Effets indésirables du rein et des voies urinaires

• incapacité à uriner

### Effets indésirables oculaires

• vision double.

### Effets indésirables du système immunitaire

• allergies (réactions telles que gonflement, rougeur de la peau, ...), y compris réactions allergiques graves (choc anaphylactique, œdème de Quincke)

### Effets indésirables généraux

• faiblesse musculaire, fatigue.

### Complications liées au traitement

(voir Mises en garde) : Fréquence indéterminée

• chutes, fractures.

jeu de rôle  
du traitement,

6,

antécédents d'autres dépendances :

La dépendance peut survenir même en

Pour plus d'information, parlez-en à vot

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement p

SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par

de signes tels que anxiété extrême, ins

musculaires, diarrhée, mais on peut obse

maux de tête, un engourdissement ou d

anormale au bruit, à la lumière ou aux c

de sens de la réalité, modification de la

Les modalités de l'arrêt du traitement d

La diminution très PROGRESSIVE des

melleure prévention de ce phénomène

que le traitement aura été prolongé.

Malgré la diminution progressive des d

produire, avec réapparition TRANSITOIR

justifié la mise en route du traitement.

Des troubles de mémoire ainsi que des

susceptibles d'apparaître dans les heu

la mémoire peuvent être associés à un

Chez certains sujets, ce médicament p

recherché : insomnie, cauchemars, agit

désinhibition, amnésie, hallucinations,

des comportements potentiellement da

entourage, ainsi que des troubles de c

réactions sont plus susceptibles de sur

Si une ou plusieurs de ces réactions su

médecin.

Les benzodiazépines et produits appa

âgé, en raison du risque de somnolence

favoriser les chutes, avec des conséqu

L'utilisation simultanée de bromazép

central (ralentissant votre activité) doit

et une diminution des capacités respira

### Précautions d'emploi

La durée du traitement doit être aussi c

semaines.

Ce traitement médicamenteux ne peut

conviennent de demander conseil à votre

otre anxiété.

La prise de ce médicament nécessite u

d'insuffisance rénale, de maladie chron

ainsi que chez les enfants et les sujets

Ce médicament ne traite pas la dépres

anxiété associée à la dépression, il ne do

évoluer pour son propre compte avec p

La prise d'alcool est formellement déco

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENS

MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

- Mentions relatives aux excipients à eff

Si votre médecin vous a informé(e) d'u

prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déco

au galactose, un déficit en lactase de L

du galactose (maladies héréditaires rare

9. Interactions

- Interactions avec d'autres médicame

Autres médicaments et ANXIOL, com

Associations déconseillées

• Alcool (boissons alcoolisées et médic

Associations à prendre en compte

• dérivés morphiniques (analgésiques, a

buropénone)

• antipsychotiques (médicaments du sy

• barbituriques (médicaments du syst





P.P.V.

09626039

106 SN

LOT N°

06 86 92 1

Boîte de 14 comprimés doses à 10 mg d'amlopipine

- AMLOP® 10 mg

Boîte de 28 comprimés doses à 5 mg d'amlopipine

Boîte de 56 comprimés doses à 5 mg d'amlopipine

- AMLOP® 5 mg

Boîte de 14 comprimés doses à 5 mg d'amlopipine

PRESSENTATIONS

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Survient, très rarement, 15 à 20 minutes après la prise du médicament, il convient de prévenir le médecin.

Pour toute autre maladie stable, telles que douleurs angineuses dans la région thoracique pouvant

Causes phénomènes s'atténuent en général par la suite.

- Ralentit, nausées, étourdissements, fatigue, réactions cutanées : tachycardies ou palpitations.

- le plus souvent, on peut noter mal à l'usage, rougeurs du visage, œdèmes des jambes.

- Des effets plus ou moins importants, en début de traitement :

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAÎNER

DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS, EN DÉBUT DE TRAITEMENT.

NE JAMAIS LASSEZ A LA PORTÉE DES ENFANTS.

PHARMACIEN, patient dépendant de vos prescriptions contre l'hypertension artérielle ou contre

les personnes âgées et les personnes souffrant d'une insuffisance hépatique se conformeront strictement à

la prescription de leur médecin.

Les personnes âgées et les personnes souffrant d'une insuffisance hépatique se conformeront strictement à

la prescription de leur médecin.

PHARMACIEN.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER

SYSTEMATOQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE

PHARMACIEN, patient dépendant de vos prescriptions contre l'hypertension artérielle ou contre

les personnes âgées et les personnes souffrant d'une insuffisance hépatique se conformeront strictement à

la prescription de leur médecin.

PHARMACIEN.

EN CAS DE DOULEUR, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER LA VISITE D'UN MEDECIN OU DE VOTRE

PHARMACIEN.

- chez la femme enceinte ou susceptible de l'être.

CONTRE INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- chez la femme enceinte ou susceptible de l'être.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Ce médicament est appartenant à la classe des antagonistes du calcium.

Il agit sur le système nerveux dans le traitement préventif de

l'angine.

Amlopipine

Pfizer

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR



7870801017

MERCK

# DETENSIEL® 10 mg, comprimé pelliculé sécable

Bisoprolol fumarate

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
3. Comment prendre Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?

La posologie doit être adaptée individuellement. La dose habituelle pour les adultes est de un comprimé de Détensiel 10 mg, une fois par jour.

Dans les cas sévères, la dose peut être augmentée à 20 mg une fois par jour.

Dans tous les cas, la posologie doit être adaptée individuellement et progressivement, en fonction notamment de la fréquence cardiaque et de la réponse au traitement.

### Durée du traitement

Le traitement par Détensiel est généralement un traitement au long cours.

### Posologie chez les patients présentant une insuffisance hépatique et/ou rénale

Aucune adaptation posologique n'est généralement nécessaire chez les patients présentant des troubles de la fonction hépatique ou rénale de sévérité légère à modérée.

Chez les patients atteints d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 20 ml/min) et chez les patients présentant des troubles sévères de la fonction hépatique, la dose maximale est de 10 mg par jour.

### Posologie chez les personnes âgées

Chez les personnes âgées, la posologie doit être adaptée (5 mg) et sous surveillance étroite.

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR



7870801017

MERCK

# DETENSIEL® 10 mg, comprimé pelliculé sécable

Bisoprolol fumarate

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
3. Comment prendre Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?

La posologie doit être adaptée individuellement. La dose habituelle pour les adultes est de un comprimé de Détensiel 10 mg, une fois par jour.

Dans les cas sévères, la dose peut être augmentée à 20 mg une fois par jour.

Dans tous les cas, la posologie doit être adaptée individuellement et progressivement, en fonction notamment de la fréquence cardiaque et de la réponse au traitement.

### Durée du traitement

Le traitement par Détensiel est généralement un traitement au long cours.

### Posologie chez les patients présentant une insuffisance hépatique et/ou rénale

Aucune adaptation posologique n'est généralement nécessaire chez les patients présentant des troubles de la fonction hépatique ou rénale de sévérité légère à modérée.

Chez les patients atteints d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 20 ml/min) et chez les patients présentant des troubles sévères de la fonction hépatique, la dose maximale est de 10 mg par jour.

### Posologie chez les personnes âgées

Chez les personnes âgées, la posologie doit être adaptée (5 mg) et sous surveillance étroite.

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR



7870801017

MERCK

# DETENSIEL® 10 mg, comprimé pelliculé sécable

Bisoprolol fumarate

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
3. Comment prendre Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?

La posologie doit être adaptée individuellement. La dose habituelle pour les adultes est de un comprimé de Détensiel 10 mg, une fois par jour.

Dans les cas sévères, la dose peut être augmentée à 20 mg une fois par jour.

Dans tous les cas, la posologie doit être adaptée individuellement et progressivement, en fonction notamment de la fréquence cardiaque et de la réponse au traitement.

### Durée du traitement

Le traitement par Détensiel est généralement un traitement au long cours.

### Posologie chez les patients présentant une insuffisance hépatique et/ou rénale

Aucune adaptation posologique n'est généralement nécessaire chez les patients présentant des troubles de la fonction hépatique ou rénale de sévérité légère à modérée.

Chez les patients atteints d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 20 ml/min) et chez les patients présentant des troubles sévères de la fonction hépatique, la dose maximale est de 10 mg par jour.

### Posologie chez les personnes âgées

Chez les personnes âgées, la posologie doit être adaptée (5 mg) et sous surveillance étroite.

# ALZOLE® 20 mg

Oméprazole

LOT : 184  
PER : SEP 2021  
PPV : 85 DH 00

## **COMPOSITION :**

Oméprazole (DCI)..... 20 mg par gélule.  
Excipients qsp..... 1 gélule

## **FORMES ET PRESENTATIONS :**

Gélules contenant des microgranules gastrorésistants : boîte de 7, 14 et 28 gélules.

## **CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :**

Anti-sécrétoré gastrique.

Inhibiteur de la pompe à protons (A : appareil digestif et métabolisme).

## **INDICATIONS THERAPEUTIQUES :**

**Adulte :**

- En association à une bithérapie antibiotique, éradication de *Helicobacter pylori* en cas de maladie ulcéreuse gastroduodénale.
- Ulcère duodénal évolutif.
- Ulcère gastrique évolutif.
- Oesophagite érosive ou ulcéreuse symptomatique par reflux gastro-oesophagien.
- Traitement symptomatique du reflux gastro-oesophagien associé ou non à une oesophagite.
- Traitement d'entretien des ulcères duodénaux chez les patients non infectés par *Helicobacter pylori* ou chez qui l'éradication n'a pas été possible.
- Traitement d'entretien des oesophagites par reflux gastro-oesophagien.
- Syndrome de Zollinger-Ellison.
- Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens lorsque la poursuite des anti-inflammatoires est indispensable.
- Traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients à risque (notamment âge supérieur à 65 ans, antécédents d'ulcère gastroduodénal) pour lesquels un traitement anti-inflammatoire est indispensable

## **POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :**

Les gélules peuvent être prises au cours d'un repas ou à jeun.

**Adulte :**

- Eradication de *Helicobacter pylori* en cas de maladie ulcéreuse gastroduodénale : sont recommandés les schémas posologiques suivants :
  - Soit 1 gélule d'Alzole 20 mg matin et soir associée à clarithromycine 500 mg matin et soir et à amoxicilline 1000 mg matin et soir, pendant 7 jours ;
  - Soit 1 gélule d'Alzole 20 mg matin et soir associée à clarithromycine 500 mg matin et soir et à métronidazole ou tinidazole 500 mg matin et soir, pendant 7 jours

Cette trithérapie sera suivie par 1 gélule d'Alzole 20 mg par jour pendant 3 semaines supplémentaires en cas d'ulcère duodénal évolutif ou 3 à 5 semaines supplémentaires en cas d'ulcère gastrique évolutif.

L'efficacité du traitement dépend du respect du schéma posologique, notamment de la prise de la trithérapie durant les 7 jours.

**Ulcère duodénal évolutif :**

- 1 gélule d'Alzole 20 mg par jour pendant 4 semaines.

**Ulcère gastrique évolutif :**

- 1 gélule d'Alzole 20 mg par jour pendant 4 à 6 semaines.

**Oesophagite par reflux gastro-oesophagien :**

- 1 gélule d'Alzole 20 mg par jour pendant 4 semaines avec une

# ALZOLE® 20 mg

Oméprazole

LOT : 184  
PER : SEP 2021  
PPV : 85 DH 00

## **COMPOSITION :**

Oméprazole (DCI)..... 20 mg par gélule.  
Excipients qsp..... 1 gélule

## **FORMES ET PRESENTATIONS :**

Gélules contenant des microgranules gastrorésistants : boîte de 7, 14 et 28 gélules.

## **CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :**

Anti-sécrétoré gastrique.

Inhibiteur de la pompe à protons (A : appareil digestif et métabolisme).

## **INDICATIONS THERAPEUTIQUES :**

**Adulte :**

- En association à une bithérapie antibiotique, éradication de *Helicobacter pylori* en cas de maladie ulcéreuse gastroduodénale.
- Ulcère duodénal évolutif.
- Ulcère gastrique évolutif.
- Oesophagite érosive ou ulcéreuse symptomatique par reflux gastro-oesophagien.
- Traitement symptomatique du reflux gastro-oesophagien associé ou non à une oesophagite.
- Traitement d'entretien des ulcères duodénaux chez les patients non infectés par *Helicobacter pylori* ou chez qui l'éradication n'a pas été possible.
- Traitement d'entretien des oesophagites par reflux gastro-oesophagien.
- Syndrome de Zollinger-Ellison.
- Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens lorsque la poursuite des anti-inflammatoires est indispensable.
- Traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients à risque (notamment âge supérieur à 65 ans, antécédents d'ulcère gastroduodénal) pour lesquels un traitement anti-inflammatoire est indispensable

## **POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :**

Les gélules peuvent être prises au cours d'un repas ou à jeun.

**Adulte :**

- Eradication de *Helicobacter pylori* en cas de maladie ulcéreuse gastroduodénale : sont recommandés les schémas posologiques suivants :
  - Soit 1 gélule d'Alzole 20 mg matin et soir associée à clarithromycine 500 mg matin et soir et à amoxicilline 1000 mg matin et soir, pendant 7 jours ;
  - Soit 1 gélule d'Alzole 20 mg matin et soir associée à clarithromycine 500 mg matin et soir et à métronidazole ou tinidazole 500 mg matin et soir, pendant 7 jours

Cette trithérapie sera suivie par 1 gélule d'Alzole 20 mg par jour pendant 3 semaines supplémentaires en cas d'ulcère duodénal évolutif ou 3 à 5 semaines supplémentaires en cas d'ulcère gastrique évolutif.

L'efficacité du traitement dépend du respect du schéma posologique, notamment de la prise de la trithérapie durant les 7 jours.

**Ulcère duodénal évolutif :**

- 1 gélule d'Alzole 20 mg par jour pendant 4 semaines.

**Ulcère gastrique évolutif :**

- 1 gélule d'Alzole 20 mg par jour pendant 4 à 6 semaines.

**Oesophagite par reflux gastro-oesophagien :**

- 1 gélule d'Alzole 20 mg par jour pendant 4 semaines avec une

# ALZOLE® 20 mg

Oméprazole

LOT : 184  
PER : SEP 2021  
PPV : 85 DH 00

## **COMPOSITION :**

Oméprazole (DCI)..... 20 mg par gélule.  
Excipients qsp..... 1 gélule

## **FORMES ET PRESENTATIONS :**

Gélules contenant des microgranules gastrorésistants : boîte de 7, 14 et 28 gélules.

## **CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :**

Anti-sécrétoré gastrique.

Inhibiteur de la pompe à protons (A : appareil digestif et métabolisme).

## **INDICATIONS THERAPEUTIQUES :**

**Adulte :**

- En association à une bithérapie antibiotique, éradication de *Helicobacter pylori* en cas de maladie ulcéreuse gastroduodénale.
- Ulcère duodénal évolutif.
- Ulcère gastrique évolutif.
- Oesophagite érosive ou ulcéreuse symptomatique par reflux gastro-oesophagien.
- Traitement symptomatique du reflux gastro-oesophagien associé ou non à une oesophagite.
- Traitement d'entretien des ulcères duodénaux chez les patients non infectés par *Helicobacter pylori* ou chez qui l'éradication n'a pas été possible.
- Traitement d'entretien des oesophagites par reflux gastro-oesophagien.
- Syndrome de Zollinger-Ellison.
- Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens lorsque la poursuite des anti-inflammatoires est indispensable.
- Traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients à risque (notamment âge supérieur à 65 ans, antécédents d'ulcère gastroduodénal) pour lesquels un traitement anti-inflammatoire est indispensable

## **POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :**

Les gélules peuvent être prises au cours d'un repas ou à jeun.

**Adulte :**

- Eradication de *Helicobacter pylori* en cas de maladie ulcéreuse gastroduodénale : sont recommandés les schémas posologiques suivants :
  - Soit 1 gélule d'Alzole 20 mg matin et soir associée à clarithromycine 500 mg matin et soir et à amoxicilline 1000 mg matin et soir, pendant 7 jours ;
  - Soit 1 gélule d'Alzole 20 mg matin et soir associée à clarithromycine 500 mg matin et soir et à métronidazole ou tinidazole 500 mg matin et soir, pendant 7 jours

Cette trithérapie sera suivie par 1 gélule d'Alzole 20 mg par jour pendant 3 semaines supplémentaires en cas d'ulcère duodénal évolutif ou 3 à 5 semaines supplémentaires en cas d'ulcère gastrique évolutif.

L'efficacité du traitement dépend du respect du schéma posologique, notamment de la prise de la trithérapie durant les 7 jours.

**Ulcère duodénal évolutif :**

- 1 gélule d'Alzole 20 mg par jour pendant 4 semaines.

**Ulcère gastrique évolutif :**

- 1 gélule d'Alzole 20 mg par jour pendant 4 à 6 semaines.

**Oesophagite par reflux gastro-oesophagien :**

• 1 gélule d'Alzole 20 mg par jour pendant 4 semaines avec une

NOTICE: INFORMATION POUR

Dénomination du  
ALIVIAR® 50 mg  
DCI : Sulpiride

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autres, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
  - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ALIVIAR® 50 mg, gélules et dans quel cas est-il utilisé ?
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules?
  3. Comment prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules?
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  5. Comment conserver ALIVIAR® 50 mg, gélules?
  6. Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QU'ALIVIAR® 50 MG. GELULES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- **Classe pharmaco-thérapeutique** : Antipsychotique neuroleptique, benzamide code ATC : N05AL01

Il appartient à la famille des benzamides. C'est un antipsychotique neuroleptique.

### ations:

- traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété en cas d'échec des thérapies habituelles.

Le 6 ans) : Troubles graves du comportement (agitation, automutilations, notamment dans le cadre des syndromes autistiques.

LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALIVIAR®

démence.

-Ce médicament de formation de caillots de formation de caillots.

- La prise de ce médicament alcoolisées ou des médicaments dopaminergiques pointe (troubles graves) de formation de caillots.

-Ce médicament doit être pris principalement de la matinée.

-Chez l'enfant, un surdosage peut entraîner une mort subite.

-La prise de comprimés peut entraîner une mort subite.

-En raison de la présence de galactose dans les comprimés, il est recommandé aux personnes atteintes de galactose-1-phosphate uridyl transferase déficit en lactase.

• **Précautions d'emploi**

Afin que votre médecin vous prescrive ce médicament, il est nécessaire de lui faire part de vos antécédents et de vos maladies. Il est également nécessaire de lui faire part de vos antécédents familiaux et de vos maladies familiales.

-En cas de maladie cardiaque, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-En cas de diabète, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-En cas de maladie de l'œil, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-En cas d'insuffisance rénale, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-En cas d'antécédents de maladie de l'œil, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-Chez les sujets à risque orthostatique, à la sédation, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

**EN CAS DE DOUTE, VOTRE PHARMACIE**

- **Enfants et adolescents**

Sans objet.

- **Usage des autres médicaments**

Veuillez consulter votre pharmacien.

**NOTICE: INFORMATION PUBLISHING**

Dénomination du  
ALIVIAR® 50 mg  
DCI : Sulpiride

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autres, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
  - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ALIVIAR® 50 mg, gélules et dans quel cas est-il utilisé ?
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules?
  3. Comment prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules?
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  5. Comment conserver ALIVIAR® 50 mg, gélules?
  6. Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QU'ALIVIAR® 50 MG. GELULES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- **Classe pharmaco-thérapeutique** : Antipsychotique neuroleptique, benzamide code ATC : N05AL01

Il appartient à la famille des benzamides. C'est un antipsychotique neuroleptique.

### ations:

- traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété en cas d'échec des habituels.

Le 6 ans) : Troubles graves du comportement (agitation, automutilations, notamment dans le cadre des syndromes autistiques.

LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALIVIAR®

démence.

-Ce médicament de formation de caillots de formation de caillots.

- La prise de ce médicament alcoolisées ou des médicaments dopaminergiques pointe (troubles graves) de formation de caillots.

-Ce médicament doit être pris principalement de la matinée.

-Chez l'enfant, un surdosage peut entraîner une mort subite.

-La prise de comprimés peut entraîner une mort subite.

-En raison de la présence de galactose dans les comprimés, il est recommandé aux personnes atteintes de galactose-1-phosphate uridyl transferase déficit en lactase.

• **Précautions d'emploi**

Afin que votre médecin vous prescrive ce médicament, il est nécessaire de lui faire part de vos antécédents et de vos maladies. Il est également nécessaire de lui faire part de vos antécédents familiaux et de vos maladies familiales.

-En cas de maladie cardiaque, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-En cas de diabète, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-En cas de maladie de l'œil, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-En cas d'insuffisance rénale, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-En cas d'antécédents de maladie de l'œil, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-Chez les sujets à risque orthostatique, à la sédation, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

**EN CAS DE DOUTE, VOTRE PHARMACIE**

- **Enfants et adolescents**

Sans objet.

- **Usage des autres médicaments**

Veuillez consulter votre pharmacien.

NOTICE: INFORMATION CONTAINED

Dénomination du  
ALIVIAR® 50 mg  
DCI : Sulpiride

25.00

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autres, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
  - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ALIVIAR® 50 mg, gélules et dans quel cas est-il utilisé ?
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules?
  3. Comment prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules?
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  5. Comment conserver ALIVIAR® 50 mg, gélules?
  6. Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QU'ALIVIAR® 50 MG. GELULES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- **Classe pharmaco-thérapeutique** : Antipsychotique neuroleptique, benzamide code ATC: N05AL01

Il appartient à la famille des benzamides. C'est un antipsychotique neuroleptique.

### ations:

- traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété en cas d'échec des habituels.

Le 6 ans) : Troubles graves du comportement (agitation, automutilations, notamment dans le cadre des syndromes autistiques.

LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALIVIAR®

démence.

-Ce médicament de formation de caillots de formation de caillots.

- La prise de ce médicament alcoolisées ou des médicaments dopaminergiques pointe (troubles graves) de formation de caillots.

-Ce médicament doit être pris principalement de la matinée.

-Chez l'enfant, un surdosage peut entraîner une mort subite.

-La prise de comprimés peut entraîner une mort subite.

-En raison de la présence de galactose dans les comprimés, il est recommandé aux personnes atteintes de galactose-1-phosphate uridyl transferase déficit en lactase.

• **Précautions d'emploi**

Afin que votre médecin vous prescrive ce médicament, il est nécessaire de lui faire part de vos antécédents et de vos maladies. Il est également nécessaire de lui faire part de vos antécédents familiaux et de vos maladies familiales.

-En cas de maladie cardiaque, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-En cas de diabète, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-En cas de maladie de l'œil, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-En cas d'insuffisance rénale, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-En cas d'antécédents de maladie de l'œil, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-Chez les sujets à risque orthostatique, à la sédation, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

**EN CAS DE DOUTE, VOTRE PHARMACIE**

- **Enfants et adolescents**

Sans objet.

- **Usage des autres médicaments**

Veuillez consulter votre pharmacien.

NOTICE: INFORMATION CONTAINED

Dénomination du  
ALIVIAR® 50 mg  
DCI : Sulpiride

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autres, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
  - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ALIVIAR® 50 mg, gélules et dans quel cas est-il utilisé ?
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules?
  3. Comment prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules?
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  5. Comment conserver ALIVIAR® 50 mg, gélules?
  6. Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QU'ALIVIAR® 50 MG, GELULES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- **Classe pharmaco-thérapeutique** : Antipsychotique neuroleptique, benzamide code ATC : N05AL01

Il appartient à la famille des benzamides. C'est un antipsychotique neuroleptique.

### ations:

- traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété en cas d'échec des habitudes.

Le 6 ans) : Troubles graves du comportement (agitation, automutilations, notamment dans le cadre des syndromes autistiques.

LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALIVIAR®

démence.

-Ce médicament de formation de caillots de formation de caillots.

- La prise de ce médicament alcoolisées ou des médicaments dopaminergiques pointe (troubles graves) de formation de caillots.

-Ce médicament doit être pris principalement de la matinée.

-Chez l'enfant, un surdosage peut entraîner un risque d'apparition de troubles graves.

-La prise de comprimés peut entraîner un risque d'apparition de troubles graves.

-En raison de la présence de galactose dans le médicament, il est contre-indiqué pour les personnes atteintes de galactose-1-phosphate uridyl transferase déficit en lactase.

• **Précautions d'emploi**

Afin que votre médecin vous prescrive ce médicament, il est nécessaire de lui faire part de vos antécédents et de vos maladies. Il est également nécessaire de lui faire part de vos antécédents familiaux et de vos maladies familiales.

-En cas de maladie cardiaque, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-En cas de diabète, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-En cas de maladie de l'œil, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-En cas d'insuffisance rénale, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-En cas d'antécédents de maladie de l'œil, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-Chez les sujets à risque orthostatique, à la sédentarité, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

**EN CAS DE DOUTE, CONSULTEZ VOTRE PHARMACIEN.**

- **Enfants et adolescents**

Sans objet.

- **Usage des autres médicaments**

Veuillez consulter votre pharmacien.

NOTICE: INFORMATION CONTAINED

Dénomination du  
ALIVIAR® 50 mg  
DCI : Sulpiride

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autres, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
  - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ALIVIAR® 50 mg, gélules et dans quel cas est-il utilisé ?
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules?
  3. Comment prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules?
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  5. Comment conserver ALIVIAR® 50 mg, gélules?
  6. Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QU'ALIVIAR® 50 MG. GELULES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- **Classe pharmaco-thérapeutique** : Antipsychotique neuroleptique, benzamide code ATC : N05AL01

Il appartient à la famille des benzamides. C'est un antipsychotique neuroleptique.

### ations:

- traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété en cas d'échec des habituels.

Le 6 ans) : Troubles graves du comportement (agitation, automutilations, notamment dans le cadre des syndromes autistiques.

LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALIVIAR®

démence.

-Ce médicament de formation de caillots de formation de caillots.

- La prise de ce médicament alcoolisées ou des médicaments dopaminergiques pointe (troubles graves) de formation de caillots.

-Ce médicament doit être pris principalement de la matinée.

-Chez l'enfant, un surdosage peut entraîner une mort subite.

-La prise de comprimés peut entraîner une mort subite.

-En raison de la présence de galactose dans les comprimés, il est recommandé aux personnes atteintes de galactose-1-phosphate uridyl transferase déficit en lactase.

• **Précautions d'emploi**

Afin que votre médecin vous prescrive ce médicament, il est nécessaire de lui faire part de vos antécédents et de vos maladies. Il est également nécessaire de lui faire part de vos antécédents familiaux et de vos maladies familiales.

-En cas de maladie cardiaque, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-En cas de diabète, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-En cas de maladie de l'œil, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-En cas d'insuffisance rénale, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-En cas d'antécédents de maladie de l'œil, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-Chez les sujets à risque orthostatique, à la sédation, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

**EN CAS DE DOUTE, VOTRE PHARMACIE**

- **Enfants et adolescents**

Sans objet.

- **Usage des autres médicaments**

Veuillez consulter votre pharmacien.

NOTICE: INFORMATION CONTAINED

Dénomination du  
ALIVIAR® 50 mg  
DCI : Sulpiride

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autres, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
  - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ALIVIAR® 50 mg, gélules et dans quel cas est-il utilisé ?
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules?
  3. Comment prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules?
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  5. Comment conserver ALIVIAR® 50 mg, gélules?
  6. Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QU'ALIVIAR® 50 MG. GELULES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- **Classe pharmaco-thérapeutique** : Antipsychotique neuroleptique, benzamide code ATC : N05AL01

Il appartient à la famille des benzamides. C'est un antipsychotique neuroleptique.

### ations:

- traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété en cas d'échec des thérapies habituelles.

Le 6 ans) : Troubles graves du comportement (agitation, automutilations, notamment dans le cadre des syndromes autistiques.

LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALIVIAR®

démence.

-Ce médicament de formation de caillots de formation de caillots.

- La prise de ce médicament alcoolisées ou des médicaments dopaminergiques pointe (troubles graves) de formation de caillots.

-Ce médicament doit être pris principalement de la matinée.

-Chez l'enfant, un surdosage peut entraîner une mort subite.

-La prise de comprimés peut entraîner une mort subite.

-En raison de la présence de galactose dans les comprimés, il est recommandé aux personnes atteintes de galactose-1-phosphate uridyl transferase déficit en lactase.

• **Précautions d'emploi**

Afin que votre médecin vous prescrive ce médicament, il est nécessaire de lui faire part de vos antécédents et de vos maladies. Il est également nécessaire de lui faire part de vos antécédents familiaux et de vos maladies familiales.

-En cas de maladie cardiaque, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-En cas de diabète, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-En cas de maladie de l'œil, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-En cas d'insuffisance rénale, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-En cas d'antécédents de maladie de l'œil, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-Chez les sujets à risque orthostatique, à la sédation, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

**EN CAS DE DOUTE, VOTRE PHARMACIE**

- **Enfants et adolescents**

Sans objet.

- **Usage des autres médicaments**

Veuillez consulter votre pharmacien.

NOTICE: INFORMATION CONTAINED

Dénomination du  
ALIVIAR® 50 mg  
DCI : Sulpiride

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autres, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
  - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ALIVIAR® 50 mg, gélules et dans quel cas est-il utilisé ?
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules?
  3. Comment prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules?
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  5. Comment conserver ALIVIAR® 50 mg, gélules?
  6. Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QU'ALIVIAR® 50 MG. GELULES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- **Classe pharmaco-thérapeutique** : Antipsychotique neuroleptique, benzamide code ATC : N05AL01

Il appartient à la famille des benzamides. C'est un antipsychotique neuroleptique.

### ations:

- traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété en cas d'échec des habituels.

Le 6 ans) : Troubles graves du comportement (agitation, automutilations, notamment dans le cadre des syndromes autistiques.

LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALIVIAR®

démence.  
-Ce médicament de formation de caillots de formation de caillots.  
- La prise de ce médicament alcoolisées ou des médicaments dopaminergiques pointe (troubles graves) de formation de caillots.  
-Ce médicament doit être pris principalement de la matinée.  
-Chez l'enfant, un surdosage peut entraîner une mort.  
-La prise de comprimés peut entraîner une mort.  
-En raison de la présence de galactose dans les comprimés, il est recommandé aux personnes atteintes de galactose-1-phosphate uridyl transferase déficit en lactase.  
• **Précautions d'emploi**  
Afin que votre médicament soit efficace et sûr, il est nécessaire de prendre les précautions suivantes :  
-En cas de maladie grave, il est recommandé de prendre le médicament à la dose recommandée.  
-En cas de diabète, il est recommandé de prendre le médicament à la dose recommandée.  
-En cas de maladie de l'œil, il est recommandé de prendre le médicament à la dose recommandée.  
-En cas d'insuffisance rénale, il est recommandé de prendre le médicament à la dose recommandée.  
-En cas d'antécédents de maladie de l'œil, il est recommandé de prendre le médicament à la dose recommandée.  
-Chez les sujets présentant une maladie orthostatique, à la dose recommandée.  
**EN CAS DE DOUTE, CONSULTEZ VOTRE PHARMACIEN.**  
- **Enfants et adolescents**  
Sans objet.  
- **Usage des autres médicaments**  
Veuillez consulter votre pharmacien.

NOTICE: INFORMATION CONTAINED

Dénomination du  
ALIVIAR® 50 mg  
DCI : Sulpiride

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autres, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
  - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ALIVIAR® 50 mg, gélules et dans quel cas est-il utilisé ?
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules?
  3. Comment prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules?
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  5. Comment conserver ALIVIAR® 50 mg, gélules?
  6. Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QU'ALIVIAR® 50 MG. GELULES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- **Classe pharmaco-thérapeutique** : Antipsychotique neuroleptique, benzamide code ATC : N05AL01

Il appartient à la famille des benzamides. C'est un antipsychotique neuroleptique.

ations:

- traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété en cas d'échec des habituels.

Le 6 ans) : Troubles graves du comportement (agitation, automutilations, notamment dans le cadre des syndromes autistiques.

LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALIVIAR®

démence.

-Ce médicament de formation de caillots de formation de caillots.

- La prise de ce médicament alcoolisées ou des médicaments dopaminergiques pointe (troubles graves) de formation de caillots.

-Ce médicament doit être pris principalement de la matinée.

-Chez l'enfant, un surdosage peut entraîner une mort subite.

-La prise de comprimés peut entraîner une mort subite.

-En raison de la présence de galactose dans les comprimés, il est recommandé aux personnes atteintes de galactose-1-phosphate uridyl transferase déficit en lactase.

• **Précautions d'emploi**

Afin que votre médecin vous prescrive ce médicament, il est nécessaire de lui faire part de vos antécédents et de vos maladies. Il est également nécessaire de lui faire part de vos antécédents familiaux et de vos maladies familiales.

-En cas de maladie cardiaque, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-En cas de diabète, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-En cas de maladie de l'œil, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-En cas d'insuffisance rénale, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-En cas d'antécédents de maladie de l'œil, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

-Chez les sujets à risque orthostatique, à la sédation, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention.

**EN CAS DE DOUTE, VOTRE PHARMACIE**

- **Enfants et adolescents**

Sans objet.

- **Usage des autres médicaments**

Veuillez consulter votre pharmacien.