

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## **Conditions générales :**

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## **Pharmacie :**

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## **Pathologie et Biologie :**

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## **Optique :**

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## **Éducation :**

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## **Dentaire :**

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## **Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :**

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6



# MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

## **Déclaration de Maladie**

N° P19- 060596

ND: 49916

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 2136 Société : RAM

Actif  Pensionné(e)  Autre :

Nom & Prénom : C.H.E W.T.O.U.F. A.B.S E.L H.A.I.K

Date de naissance : 1955

Adresse : TANGER

Tél. : 06 66 28 2954 Total des frais engagés : 2.985,20 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 12/10/2020

Nom et prénom du malade : C.H.E W.T.O.U.F. A.B.S E.L H.A.I.K Age: 19 J.

Lien de parenté :

Lui-même  Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :



En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel communiqué, les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) :

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
02/10/20	G	1	Gratuit	<i>Dr. Mohammed A. Al-Omari Spécialiste en Ophtalmologie Date : 10-10-2020</i>

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien- ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>ARMERIA ALAIN Dr. Razzouk Jassim BOULEVARD MOHAMED V 05 39 94 69 10 AGADIR</i>	12/10/2020	0385.12

#### **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
AFI SPÉCIALE Opticien - Optométriste Rue Alphonse Targé Tél: 05 39 32 18 7 06 65 20 10 7	28.11.2020					2020.0.14

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS**

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION**

# Dr. Mohamed AAMRAN

Spécialiste En Ophtalmologie  
Maladies et Chirurgie des Yeux  
Chirurgie de la Cataracte par Phacoémulsification  
Chirurgie Refractive  
Angiographie, Laser  
Diplômé de la Faculté de Médecine  
d'Amiens (France)  
Ex. Ophtalmologiste de L'hôpital Militaire  
Moulay Ismail Meknes



# الدك محمد عمران

أخصاصي ( اختصاصي )  
أمراض وجراحة العيون  
تصو الأوعية - الليزر  
تفو الرؤية بالليزر  
خريج كلية طب باميان (فرنسا)  
اختصاص سابق بالمستشفى  
ال العسكري ، دلي اسماعيل مكناس

Tanger, le : 12-10-2020

M. CHENTOUF ABDELHAK

\*VERRES CORRECTEURS PROGRESSIFS

OD : +2,50 (-0,75) 60°

OG : +2,50

Add +3,00

+ Monture

**AFI OPTIQUE**  
Opticien - Optométriste  
9, Rue Aïda  
Tél: 05 39 32 17 76  
06 65 72 64 67



# Dr. Mohamed AAMRAN

Spécialiste En Ophtalmologie  
Maladies et Chirurgie des Yeux  
Chirurgie de la Cataracte par Phacoémulsification  
Chirurgie Refractive  
Angiographie, Laser  
Diplômé de la Faculté de Médecine  
d'Amiens (France)  
Ex. Ophtalmologiste de L'hôpital Militaire  
Moulay Ismail Meknes



الدكتور محمد عمران

اختصاصي في أمراض وجراحة العيون  
صوير الأوعية - الليزر  
تقويم الرؤية بالليزر  
خريج كلية طب باميان (فرنسا)  
أخصاصي سابق بالمستشفى  
العمالي مولاي إسماعيل مكناس

Tanger, le : 12-10-2020

L 5029887  
E 06 2021  
P 164.20 DH

Titulaire de l'AMM tributeur :

M. CHENTOUF ABDELHAK




164,20 X 6  
985,20

\*COSOPT

1 goutte matin et soir

صيدلية الأنداز  
PHARMACIE AL ANDAZ  
Dr. Abdellah Saoufi  
18, BOULEVARD MOHAMED V  
TEL: 05 39 94 69 10  
TANGER

x 06 mois



# COSOPT® 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution

le 5 ml

mlol

LOT S016240 1  
EXP 02 2021  
PPV 164.20 DH

Veuillez à

- Gardez ce flacon à portée de main.
- Si vous avez des questions, contactez votre pharmacien ou votre centre anti-poison.
- Ce médicament ne doit pas être donné à un enfant ou à une personne qui n'a pas reçu l'autorisation de prendre ce médicament.
- Si l'un de ces cas se présente, contactez immédiatement votre pharmacien ou votre centre anti-poison.

Dans cette

- QUEST  
EST-IL UTILISÉ.

2. QUELLES SON

mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

3. COMMENT UTILISER COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

COSOPT est utilisé pour diminuer une pression oculaire accrue et soigner le glaucome. Le glaucome est une maladie qui entraîne une pression potentiellement élevée du liquide présent dans l'œil. Toutefois, certaines personnes atteintes peuvent présenter une pression oculaire normale. D'autre part, une pression accrue dans l'œil n'induit pas nécessairement un glaucome.

Le glaucome est généralement causé par une accumulation du liquide qui circule dans l'œil. Cette accumulation est due à une élimination trop lente du liquide oculaire par rapport à sa sécrétion : du liquide continué à rejoindre le liquide déjà présent dans l'œil et la pression ne cesse d'augmenter. Cette hausse de pression peut endommager la partie arrière de l'œil et réduire ainsi progressivement la vue. Cette baisse progressive de la vue peut se faire si lentement que la personne ne s'en rend pas compte. Il arrive même parfois qu'une pression oculaire normale soit liée à des dommages dans la partie arrière de l'œil.

Généralement, le glaucome n'occasionne aucun symptôme. Le seul moyen de détecter un glaucome est de procéder à un examen de la pression oculaire, du nerf optique et du champ visuel auprès d'un ophtalmologue. Un glaucome non soigné peut entraîner des problèmes graves. Vous pouvez ne présenter aucun symptôme, mais le glaucome peut finir par provoquer la cécité. En réalité, c'est l'une des causes les plus fréquentes de la cécité.

Bien que COSOPT aide à lutter contre le glaucome, il ne s'agit pas d'un traitement curatif.

COSOPT contient deux substances actives : le chlorhydrate de dorzolamide et le maléate de timolol. Ces deux substances actives réduisent la pression intraoculaire en diminuant la production de liquide, chacune de manière différente.

Le chlorhydrate de dorzolamide appartient à un groupe de médicaments appelé inhibiteurs de l'anhydrase carbonique. Le maléate de timolol appartient à un groupe de médicaments appelé bêta-bloquants.

COSOPT ne crée pas de dépendance.

4. Dans une main, tenez le flacon à l'envers, en plaçant votre pouce ou votre index sur le poussoir.



5. Avec l'autre main, tirez doucement la paupière inférieure vers le bas pour former une cuvette.



6. Penchez la tête en arrière et regardez vers le haut.



7. Placez l'embout du flacon près de la paupière inférieure. Évitez tout contact avec l'œil.

8. Laissez une goutte tomber dans la cuvette formée entre l'œil et la paupière en pressant légèrement le flacon.

9. Fermez l'œil pendant quelques instants. Ne clignez pas des yeux, ne vous frottez pas les yeux.  
10. En gardant l'œil fermé, placez l'index dans le coin interne de l'œil et appuyez contre le nez pendant deux minutes environ. Cela empêche le médicament de couler par le canal lacrymal vers le nez et la gorge, où il pourrait être absorbé par d'autres parties du corps. Consultez votre médecin pour obtenir plus d'informations sur cette méthode.

11. Replacez le bouchon pour fermer le flacon hermétiquement. Ne serrez pas trop le bouchon.  
12. Lavez-vous à nouveau les mains à l'eau et au savon pour éliminer les éventuels résidus.

**Attendez au moins 15 minutes avant de remettre vos lentilles de contact.**  
**Veuillez à éviter tout contact de l'embout compte-gouttes avec l'œil, la paupière ou toute autre partie pour ne pas contaminer le collyre.**

La contamination du collyre peut donner lieu à une infection oculaire.

Après l'instillation du collyre, il est possible de ressentir une sensation de brûlure dans l'œil. Consultez votre médecin ou votre pharmacien si cette sensation persiste ou est réellement gênante.

## Durée d'utilisation

COSOPT aide à contrôler la maladie, mais ne la guérit pas. COSOPT doit donc être utilisé tous les jours. Continuez d'utiliser COSOPT tant que votre médecin vous le prescrit.

**Si vous avez utilisé plus de COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution que vous n'auriez dû :**  
Si vous pensez que vous, ou une autre personne, avez avalé le contenu d'un flacon de COSOPT, entièrement ou partiellement, ou avez utilisé plus de gouttes qu'il ne le fallait, contactez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison, même en l'absence de malaise ou de symptômes d'empoisonnement.

En cas d'ingestion accidentelle de COSOPT ou de surdosage, il se peut que vous ayez des étourdissements ou des vertiges, une perte de connaissance, un pouls très lent, une respiration sifflante ou des difficultés à respirer.

**Veuillez**

- Gardez
- Si vous  
votre n
- Ce mé
- d'aut
- Si l'i
- mer
- Dans
- 1. QU
- EST-IL
- 2. QU
- mg/ml
- 3. CO
- 4. QUI
- 5. CO
- 6. INF

E14218C00

**ml, collyre en solution****de 5 ml****timolol****notice avant d'utiliser ce médicament.****la relire.****Si vous avez des doutes, demandez plus d'informations à**

**vit. Ne le donnez jamais à quelqu'un qui pourraient lui être nocif.  
Si vous remarquez un effet indésirable non connu ou à votre pharmacien.**

**re en solution ET DANS QUELS CAS****AVANT D'UTILISER COSOPT 20****ml, collyre en solution ?****QUELS ?****mg/ml, collyre en solution ?****LOT T020107 1****EXP 02 2022****PPV 164.20 DH****1. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER COSOPT 20****ml, collyre en solution ?**

**COSOPT est utilisé pour diminuer la pression intraoculaire accrue et soigner le glaucome. Le glaucome est une maladie qui entraîne une pression potentiellement élevée du liquide présent dans l'œil. Toutefois, certaines personnes atteintes peuvent présenter une pression oculaire normale. D'autre part, une pression accrue dans l'œil n'induit pas nécessairement un glaucome.**

**Le glaucome est généralement causé par une accumulation du liquide qui circule dans l'œil. Cette accumulation est due à une élimination trop lente du liquide oculaire par rapport à sa sécrétion : du liquide continue à rejoindre le liquide déjà présent dans l'œil et la pression ne cesse d'augmenter. Cette hausse de pression peut endommager la partie arrière de l'œil et réduire ainsi progressivement la vue. Cette baisse progressive de la vue peut se faire si lentement que la personne ne s'en rend pas compte. Il arrive même parfois qu'une pression oculaire normale soit liée à des dommages dans la partie arrière de l'œil.**

**Généralement, le glaucome n'occasionne aucun symptôme. Le seul moyen de détecter un glaucome est de procéder à un examen de la pression oculaire, du nerf optique et du champ visuel auprès d'un ophtalmologue. Un glaucome non soigné peut entraîner des problèmes graves. Vous pouvez ne présenter aucun symptôme, mais le glaucome peut finir par provoquer la cécité. En réalité, c'est l'une des causes les plus fréquentes de la cécité.**

**Bien que COSOPT aide à lutter contre le glaucome, il ne s'agit pas d'un traitement curatif. COSOPT contient deux substances actives : le chlorhydrate de dorzolamide et le malate de timolol. Ces deux substances actives réduisent la pression intraoculaire en diminuant la production de liquide, chacune de manière différente.**

**Le chlorhydrate de dorzolamide appartient à un groupe de médicaments appelé inhibiteurs de l'anhydrase carbonique. Le malate de timolol appartient à un groupe de médicaments appelé bêta-bloquants.**

**COSOPT ne crée pas de dépendance.****2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER COSOPT 20****mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?****N'utilisez jamais COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution dans les cas suivants :****Si vous êtes allergique à COSOPT ou à l'un des autres composants mentionnés à la fin de cette notice ;****Si vous souffrez ou avez souffert de problèmes respiratoires graves comme l'asthme, la**

**4. Dans une main, tenez le flacon à l'envers, en plaçant votre pouce ou votre index sur le poussoir.**



**5. Avec l'autre main, tirez doucement la paupière inférieure vers le bas pour former une cuvette.**



**6. Penchez la tête en arrière et regardez vers le haut.**



**7. Placez l'embout du flacon près de la paupière inférieure. Évitez tout contact avec l'œil.**

**8. Laissez une goutte tomber dans la cuvette formée entre l'œil et la paupière en pressant légèrement le flacon.**

**9. Fermez l'œil pendant quelques instants. Ne clignez pas des yeux, ne vous frottez pas les yeux. 10. En gardant l'œil fermé, placez l'index dans le coin interne de l'œil et appuyez contre le nez pendant deux minutes environ. Cela empêche le médicament de couler par le canal lacrymal vers le nez et la gorge, où il pourrait être absorbé par d'autres parties du corps. Consultez votre médecin pour obtenir plus d'informations sur cette méthode.**

**11. Replacez le bouchon pour fermer le flacon hermétiquement. Ne serrez pas trop le bouchon. 12. Lavez-vous à nouveau les mains à l'eau et au savon pour éliminer les éventuels résidus. Attendez au moins 15 minutes avant de remettre vos lentilles de contact.**

**Veillez à éviter tout contact de l'embout compte-gouttes avec l'œil, la paupière ou toute autre partie pour ne pas contaminer le collyre.**

**La contamination du collyre peut donner lieu à une infection oculaire.**

**Après l'instillation du collyre, il est possible de ressentir une sensation de brûlure dans l'œil. Consultez votre médecin ou votre pharmacien si cette sensation persiste ou est réellement gênante.**

**Durée d'utilisation**

**COSOPT aide à contrôler la maladie, mais ne la guérit pas. COSOPT doit donc être utilisé tous les jours. Continuez d'utiliser COSOPT tant que votre médecin vous le prescrit.**

**Si vous avez utilisé plus de COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution que vous n'auriez dû :**

**Si vous pensez que vous, ou une autre personne, avez avalé le contenu d'un flacon de COSOPT, entièrement ou partiellement, ou avez utilisé plus de gouttes qu'il ne le fallait, contactez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison, même en l'absence de malaise ou de symptômes d'époisonnement.**

**En cas d'ingestion accidentelle de COSOPT ou de surdosage, il se peut que vous ayez des étourdissements ou des vertiges, une perte de connaissance, un pouls très lent, une respiration sifflante ou des difficultés à respirer.**

**Si vous oubliez d'utiliser COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution :**

**Si le moment de la prochaine administration est proche, sautez la dose oubliée et prenez la dose suivante comme prévu. Sinon, utilisez le collyre dès que vous vous en rendez compte, puis reprenez votre schéma d'administration habituel.**

**Si vous ignorez si la dose doit être sautée, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien.**

**Ne doublez pas la dose pour compenser la dose que vous avez oublié.**

**Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces**

**AFI OPTIQUE**

RC 61394

9 Rue Algeciras

Patente 5042 31

Tanger

IF 81338580

Tel 0539321876

ICE 001264290000022

**Opticien-optométrie**

INPE 55006867

**FACTURE : 190-2020**

Tanger le : 28-11-2020

*Nom : CHENTOUF ABDELHAK*

Vision de LOIN	Sph	cyl	axe	verres	Pri	TTC
ŒIL DROIT	+2.50	-0.75	60°	PROGRESSIF ORGANIQUE ANTIREFLET	700	
ŒIL GAUCHE	+2.50			PROGRESSIF ORGANIQUE ANTIREFLET	700	
ODG : Add	+3.00					
Monture	Pour vision	De LOIN			600	

Prix total TTC	2000 DH
Arrêter la présente facture a la somme de : <b>DEUX MILLE DIRHAMS</b>	

