

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W19-589803

ND: 50280

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule :

Société :

☐ Actif

☐ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Tél. :

Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Age :

Lien de parenté :

☒ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le :

Signature de l'adhérent(e) :

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
3/12/20	C		300 D.H	INP : 112110d66194

Dr. NAZHA FAHEM
Psychiatre
264, Rue Mustapha El Mousli, Casablanca
Appt. 2 - Casablanca
Tél: 05 22 27 20 03

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
REVEAL SARL PHARMACIE CHIFA M. EL ANASSANI Lab. 10, Avenue 1079 Hay Hassani - Casablanca Tél: 0522 90 22 63 - Fax: 0522 90 16 41	3/12/20	733,20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :														
				COEFFICIENT DES TRAVAUX														
				MONTANTS DES SOINS														
				DEBUT D'EXECUTION														
				FIN D'EXECUTION														
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																	
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412 21433552</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000 00000000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000 00000000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>35533411 11433553</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table>			H		25533412 21433552		00000000 00000000		D	G	00000000 00000000		35533411 11433553		B		COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H																	
	25533412 21433552																	
	00000000 00000000																	
	D	G																
	00000000 00000000																	
	35533411 11433553																	
	B																	
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS														
				DATE DU DEVIS														

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Nazha Fahem

Psychiatre
Psychothérapeute

Thérapie Cognito Comportementale

Addictologue

Sexologue

الدكتورة نزهة فاهم

إخصائية في الطب النفسي

معالجة نفسانية

العلاج السلوكي المعرفي

أخصائية في علاج الإدمان

أخصائية في علاج المشاكل الجنسية

PPV: 156DH20

Casablanca, le : 3/12/2020 في : دار البيضاء

PPV: 80DH80

REVEAL SARL
PHARMACIE CHIFA
Date : 03/12/2020

SAHBANE Mustapha

624.80 156,20 + 4

1/ Rem 34p 5 - 2
2/ Rem 100p 13.80 x 2 = 27.60

REVEAL SARL
PHARMACIE CHIFA
M. TAHIRI EL ASSANI
10 Ave. Afghanistan
Hay Hassani - Casablanca
Tél: 0522 90 32 63 - Fax: 0522 90 46 04

Ht de 15 jours 50817
Pr Dule lundi
18 janvier à midi

Dr. NAZHA FAHEM
Psychiatre
App: 3 - Casablanca
364, Rue Mustapha El Maani 1er étage N°3

PPV: 156DH20

CODE No: HPIDRUGS/MNB/952

PPV: 156 DH 20

CODE No: HPIDRUGS/MNB/952

RIES LIMITED
our,
Inde.
CCO LLC
Casablanca

PPV: 156 DH 20

CODE No: HPIDRUGS/MNB/952

364, شارع مصطفى المعاني الطابق الاول الرقم 3, الدار البيضاء أنفا - الهاتف: 05 22 27 20 99
364, Rue Mustapha El Maani 1er étage N°3 - Casablanca Anfa - Tél.: 05 22 27 20 99

الرضاعة

لا ينصح بالرضاعة خلال فترة العلاج بهذا الدواء. استشير الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

قيادة السيارات واستعمال الآلات
يتأثر خاصة انتباه سائقي السيارات ومستعملي الآلات إلى مخاطر النعاس المرتبطة باستعمال هذا الدواء.

ساعات ذات فعالية معروفة : ساكاروز، نشا القمح (غلوتين)، لاكتوز، أصفر برتقالي S(E110).

3. كيف يجب استعمال ليرغاكسيل، أقراص مغلفة قابلة للكسر؟
الجراحات

خاص بالبالغين والأطفال ما فوق سن 6

تتفاوت الجرعات ويتم تكيفها لكل حالة.

في جميع الأحوال، يجب الاحترام التام لوصفة الطبيب.

طريقة الاستعمال

عن طريق الفم.

إذا تناولت ليرغاكسيل، أقراص مغلفة قابلة للكسر أكثر مما يجب :

في حالة تناول جرعة مفرطة من هذا الدواء، ابذل الطبيب أو مصلحة الاستعجالات على الفور بسبب خطر حدوث اضطرابات قلبية خطيرة.

4. ما هي التأثيرات غير المرغوب فيها المحتملة؟

كمثل كافة الأدوية، من المحتمل أن يكون لدواء ليرغاكسيل ، أقراص مغلفة قابلة للكسر، تأثيرات غير مرغوب فيها، رغم أن ذلك لا يخص جميع الأشخاص.

• شعور بالدوار عند الانتقال من وضعية الاسترخاء أو الجلوس إلى وضعية الوقوف، • جفاف الفم، صعوبات التبول، إسك أو حتى انسداد معوي (انظر فقرة "انتبه عند استعمال ليرغاكسيل ، أقراص مغلفة قابلة للكسر")،

• اضطرابات الرؤية بما فيها تكيف العين (قدرة العين على التأقلم للرؤية من قريب أو بعيد)، • نعاس، قلق، • اضطرابات المزاج، • ارتفاع، تصلب /أو حركات غير عادية، • عجز، برود، • زيادة الوزن، • غياب دم الحيض، ارتفاع حجم الثديين، تدفق الحليب من الحلمة خارج فترات الرضاعة العادية، • تغير نسبة السكر في الدم (انظر فقرة "انتبه عند استعمال ليرغاكسيل، أقراص مغلفة قابلة للكسر، فقرة احتياطات الاستعمال")، • تغير درجة حرارة الجسم، • جلط

دموية وريدية، خاصة في الساقين (أعراض تضم انتفاخ، ألم واحمرار الساقين) قد تنتقل عن طريق الأوعية الدموية حتى الرئتين وتسبب في ألم في الصدر وصعوبة في التنفس، إذا شعرت بأحد هذه الأعراض، استشر الطبيب على الفور.

نادراً قد تحدث :

• اضطرابات النظم القلبي قد تؤدي استثنائياً إلى الوفاة (انظر فقرة "انتبه عند استعمال ليرغاكسيل ، أقراص مغلفة قابلة للكسر")، • شذوذ بعض الفحوصات المخبرية (إنجابية بعض مضادات الأجسام المضادة النووية)، • حساسية جلدية، تفاعل جلدي يتفاقم تحت الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية، • البرقان، التهاب الكبد، • حمى، تعرق كثيف، شحوب : حدوث إحدى هذه العلامات يستوجب إبلاغ الطبيب أو مصلحة الاستعجالات على الفور.

واستثنائياً قد يحدث :

• دأب حماسي جهاز (مرض التهابي)، • انخفاض هام في عدد الكريات البيضاء (الخلايا البيضاء) في الدم، • انتصاب مؤلم ومطول، • رواشب بنية في العين، عامة دون تأثير على الرؤية.

لا تتردد في استشارة الطبيب أو الصيدلي والإبلاغ عن أية تأثيرات غير مرغوب

فيها أو مزعجة، خاصة إذا لم تذكر في هذه النشرة.

5. كيف يجب حفظ ليرغاكسيل، أقراص مغلفة قابلة للكسر؟

يحفظ بعيداً عن مرأى ومتناول الأطفال.

لا تستعمل ليرغاكسيل ، أقراص مغلفة قابلة للكسر بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العبوة.

يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم في الشهر.

يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 25 درجة مئوية.

6. معلومات إضافية

على ماذا يحتوي ليرغاكسيل ، أقراص مغلفة قابلة للكسر؟

المادة النشطة هي

ليرغاكسيل 25 ملغ

كلورهدرات كلور

الكمية المطابقة لكل

ليرغاكسيل 100 مل

كلورهدرات كلور

الكمية المطابقة لكلوروزامين قاعدة

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

Largactil 25 mg
50 Cp pel séc

P.P.V : 13DH80



6 118000 012382

LOT : 20E002
PER : 04 2023

ملغ
ملغ

ملغ
ملغ

المنغنسيوم. ساكاروز مسحوق نشوي، نشا القمح، لاكتوز، سيليكات غير ميه، ستيرات

التغليف : ميكل هيدروكسي بروبيل سيليلوز، بولي أوكسي الإثيل غليكول 20000، ثاني أكسيد التيتان، أصفر برتقالي S(E110).

ما هو ليرغاكسيل، أقراص مغلفة قابلة للكسر ومحتوى العبوة الخارجية؟ ليرغاكسيل 25 ملغ، أقراص مغلفة قابلة للكسر: هذا الدواء عبارة عن أقراص

مغلفة قابلة للكسر، علب 50 قرص. ليرغاكسيل 100 ملغ، أقراص مغلفة قابلة للكسر: هذا الدواء عبارة عن أقراص

مغلفة قابلة للكسر، علب 30 قرص. آخر تاريخ تمت الموافقة فيه على هذه النشرة : 2011/06/15.

الرضاعة

لا ينصح بالرضاعة خلال فترة العلاج بهذا الدواء. استشير الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

قيادة السيارات واستعمال الآلات
يتأثر خاصة انتباه سائقي السيارات ومستعملي الآلات إلى مخاطر النعاس المرتبطة باستعمال هذا الدواء.

ساعات ذات فعالية معروفة : ساكاروز، نشا القمح (غلوتين)، لاكتوز، أصفر برتقالي S(E110).

3. كيف يجب استعمال ليرغاكسيل، أقراص مغلفة قابلة للكسر؟
الجراحات

خاص بالبالغين والأطفال ما فوق سن 6

تتفاوت الجرعات ويتم تكيفها لكل حالة.

في جميع الأحوال، يجب الاحترام التام لوصفة الطبيب.

طريقة الاستعمال

عن طريق الفم.

إذا تناولت ليرغاكسيل، أقراص مغلفة قابلة للكسر أكثر مما يجب :

في حالة تناول جرعة مفرطة من هذا الدواء، ابلي الطبيب أو مصلحة الاستجالات على الفور بسبب خطر حدوث اضطرابات قلبية خطيرة.

4. ما هي التأثيرات غير المرغوب فيها المحتملة؟

كمثل كافة الأدوية، من المحتمل أن يكون لدواء ليرغاكسيل ، أقراص مغلفة قابلة للكسر، تأثيرات غير مرغوب فيها، رغم أن ذلك لا يخص جميع الأشخاص.

• شعور بالدوار عند الانتقال من وضعية الاسترخاء أو الجلوس إلى وضعية الوقوف، • جفاف الفم، صعوبات التبول، إسك أو حتى انسداد معوي (انظر فقرة "انتبه عند استعمال ليرغاكسيل ، أقراص مغلفة قابلة للكسر")،

• اضطرابات الرؤية بما فيها تكيف العين (قدرة العين على التأقلم للرؤية من قريب أو بعيد)، • نعاس، قلق، • اضطرابات المزاج، • ارتفاع، تصلب /أو حركات غير عادية، • عجز، برود، • زيادة الوزن، • غياب دم الحيض، ارتفاع حجم الثديين، تدفق الحليب من الحلمة خارج فترات الرضاعة العادية، • تغير نسبة السكر في الدم (انظر فقرة "انتبه عند استعمال ليرغاكسيل، أقراص مغلفة قابلة للكسر، فقرة احتياطات الاستعمال")، • تغير درجة حرارة الجسم، • جلط دموية ورديدية، خاصة في الساقين (أعراض تضم انتفاخ، ألم واحمرار الساقين) قد تنتقل عن طريق الأوعية الدموية حتى الرئتين وتسبب في ألم في الصدر وصعوبة في التنفس، إذا شعرت بأحد هذه الأعراض، استشر الطبيب على الفور.

نادرا قد تحدث :

• اضطرابات النظم القلبي قد تؤدي استثنائيا إلى الوفاة (انظر فقرة "انتبه عند استعمال ليرغاكسيل ، أقراص مغلفة قابلة للكسر")، • شذوذ بعض الفحوصات المخبرية (إنجابية بعض مضادات الأجسام المضادة النووية)، • حساسية جلدية، تفاعل جلدي يتفاقم تحت الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية، • البرقان، التهاب الكبد، • حمى، تعرق كثيف، شحوب : حدوث إحدى هذه العلامات يستوجب إبلاغ الطبيب أو مصلحة الاستجالات على الفور.

واستثنائيا قد يحدث :

• دأب حماسي جهازي (مرض التهابي)، • انخفاض هام في عدد الكريات البيضاء (الخلايا البيضاء) في الدم، • انتصاب مؤلم ومطول، • رواشب بنية في العين، عامة دون تأثير على الرؤية.

لا تتردد في استشارة الطبيب أو الصيدلي والإبلاغ عن أية تأثيرات غير مرغوب

فيها أو مزعجة، خاصة إذا لم تذكر في هذه النشرة.

5. كيف يجب حفظ ليرغاكسيل، أقراص مغلفة قابلة للكسر؟

يحفظ بعيدا عن مرأى ومتناول الأطفال.

لا تستعمل ليرغاكسيل ، أقراص مغلفة قابلة للكسر بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العبوة.

يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم في الشهر.

يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 25 درجة مئوية.

6. معلومات إضافية

على ماذا يحتوي ليرغاكسيل ، أقراص مغلفة قابلة للكسر؟

المادة النشطة هي

ليرغاكسيل 25 ملغ

كلورهدرات كلور

الكمية المطابقة لكل

ليرغاكسيل 100 مل

كلورهدرات كلور

الكمية المطابقة لكلوربرومازين قاعدة

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

ليرغاكسيل 100 مل

Largactil 25 mg
50 Cp pel séc

P.P.V : 13DH80



6 118000 012382

LOT : 20E002
PER : 04 2023

ملغ
ملغ

ملغ
ملغ

المنغنسيوم. ساكاروز مسحوق نشوي، نشا القمح، لاكتوز، سيليكات غير ميه، ستيرات

التغليف : ميبل هيدروكسي بروبيل سيليلوز، بولي أوكسي الإثيل غليكول 20000، ثاني أكسيد التيتان، أصفر برتقالي S(E110).

ما هو ليرغاكسيل، أقراص مغلفة قابلة للكسر ومحتوى العبوة الخارجية؟ ليرغاكسيل 25 ملغ، أقراص مغلفة قابلة للكسر: هذا الدواء عبارة عن أقراص

مغلفة قابلة للكسر، عبوة 50 قرص. ليرغاكسيل 100 ملغ، أقراص مغلفة قابلة للكسر: هذا الدواء عبارة عن أقراص

مغلفة قابلة للكسر، عبوة 30 قرص. آخر تاريخ تمت الموافقة فيه على هذه النشرة : 2011/06/15.