

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Maladie chronique :

En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19-0049277

☒ Maladie ☐ Dentaire ☒ 1320 Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1215 Société : RAM
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : ZIKRI AZIZA
Date de naissance : 22.02.71
Adresse : Sdeu
Tél. : 067194838 Total des frais engagés : 300 + 326,20 = 626,20 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :
Date de consultation : 11/12/2020
Nom et prénom du malade : ZIKRI AZIZA
Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie : HTA
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : 14/12/2020
Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
11/12/20	Sn		300,00	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur

Date

Montant de la Facture

11/12/20

326,20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue

Date

Désignation des Coefficients

Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien

Date des Soins

AM

PC

IM

IV

Montant détaillé des Honoraires

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES

Dents
Traitées

Nature des
Soins

Coefficient

COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DEBUT
D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT
MASTICATOIRE


H
25533412 21433552
00000000 00000000
D 00000000 00000000 G
35533411 11433553
B

COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DATE DU
DEVIS

DATE DE
L'EXECUTION



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Ahmed SETTI

Cardiologue

Diplômé de la Faculté de Médecine de Lille

Ancien Médecin des Hôpitaux de France

الدكتور أحمد السطي
اختصاصي في أمراض القلب والشرابيين

مدير كلية الطب ببليل
طبيب سابقا بمستشفيات فرنسا



Cabinet de Consultations

et d'Explorations Cardio-Vasculaires

KARDECIG 75MG
SACHETS B30
P.P.V : 30DH70
LOT : 9MA047
PER : 08 2020
6 118000 061847

11/12/2020


Mr Zikri ALI

30,70 x 6 = 184,20

Rosiglitazone 75 1/2

21,00 x 2 = 42,00

Atenolol 100



Généraliste

KARDECIG 75MG
SACHETS B30
P.P.V : 30DH70
LOT : 19E003
PER : 04 2021
6 118000 061847

KARDECIG 75MG
SACHETS B30
P.P.V : 30DH70
LOT : 8MA042
PER : 02 2020
6 118000 061847

KARDECIG 75MG
SACHETS B30
P.P.V : 30DH70
LOT : 20E007
PER : 06 2021
6 118000 061847

326,20

SAID BOUJABE WARTING
LABORATOIRE
Tél : 022 20 35 84/88
GSM : 061 11 80 00 061 847

KARDECIG 75MG
SACHETS B30
P.P.V : 30DH70
LOT : 20E011
PER : 11 2021
6 118000 061847

KARDECIG 75MG
SACHETS B30
P.P.V : 30DH70
LOT : 9MA045
PER : 08 2020
6 118000 061847

Docteur Ahmed SETTI
Cardiologue

ATENOR® 100 mg

Comprimés sécables

Aténolol

Boîtes de 14 ; 28 ou 56

1. Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour vous. Vous n'avez pas besoin de la relire. Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

ment prescrit. Ne le donnez pas à un enfant ou à une femme enceinte ou allaitante, car il peut être nocif, même si les effets ne sont pas connus. Si vous ressentez des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Un effet indésirable qui ne serait pas

ATENOR® 100 mg

56 comprimés



En quels cas est-il utilisé ?

Il est utilisé pour connaître avant de prendre ATENOR,

Comprimés ?
Effets éventuels ?
Comprimés ?

Comprimés ET DANS QUELS CAS

BETA-BLOQUANT/SELECTIF.

«Bêta-bloquant». Il diminue certains effets, (dits «effets bêta»). Il agit sur le système de régulation cardiovasculaire.

Ce médicament est préconisé dans les cas suivants:

- Hypertension artérielle,
- Prévention des crises douloureuses de l'angine de poitrine,
- Après un infarctus du myocarde,
- Certains troubles du rythme.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ATENOR?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

Ne prenez jamais ATENOR :

- Asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives dans leurs formes sévères (formes sévères d'asthme et de maladie des bronches et des poumons avec encombrement),

- Insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement (défaillance des fonctions du cœur non contrôlées par le traitement),

- Choc cardiogénique (choc d'origine cardiaque),

- Bloc auriculo-ventriculaire des second et troisième degrés non appareillés (certains cas de troubles de la conduction cardiaque),

- Angor de Prinzmetal (dans les formes pures et en monothérapie) (variété de crises d'angine de poitrine),

- Maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire),

- Bradycardie importante (< 45 - 50 battements par minute) (ralentissement du rythme cardiaque),

- Phénomène de Raynaud et troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères (troubles circulatoires symétriques des doigts avec engourdissements et troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères),

- Phéochromocytome non traité (excroissance de la glande médullosurrénale sécrétant des substances provoquant une hypertension artérielle sévère),

- Hypotension (diminution de la pression artérielle),

- Hypersensibilité à l'Aténolol
- Antécédent de réaction allergique),
- Allaitement,
- Association à la floctafénine (médicament du système nerveux central) ou à d'autres médicaments).

Avertissements et précautions

Miser en garde spéciales

NE JAMAIS ARRÊTER BRUTALEMENT VOTRE MÉDECIN.

La prise de ce médicament est contre-indiquée avec le verapamil (médicament du système nerveux central) ou d'autres médicaments).

Précautions d'emploi

Prévenir le médecin en cas d'insuffisance rénale, certaines

Raynaud).

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez votre médecin que vous prenez ce médicament.

Autres médicaments et ATENOR

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Ce médicament NE DOIT PAS être pris avec la floctafénine (médicament du système nerveux central) (voir Contre-indications).

Ce médicament DOIT ÊTRE EVITÉ avec le diltiazem ou le verapamil (médicaments de garde spéciales).

Si vous prenez ou avez pris récemment un médicament obtenu sans ordonnance, informez votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits naturels

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse

En cas de besoin, ce médicament peut être utilisé.

Si ce traitement est pris en fin de grossesse, le nouveau-né est nécessairement exposé à certains effets du traitement.

Ce traitement est contre-indiqué pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin avant de prendre tout médicament.

Sportifs

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que ce médicament agit sur le système cardiovasculaire et peut entraîner une baisse de la fréquence cardiaque lors des contrôles antidopage.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE ATENOR

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie

La posologie est variable en fonction de la maladie et de la réponse à chaque patient.

Mode d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés entiers.

Fréquence d'administration

DANS TOUS LES CAS, SEULEMENT LA PRESCRIPTION MÉDICALE.

Précautions d'emploi

Durée de traitement

Dans la majorité des affections, la durée de traitement est de quelques mois ou années.

ATENOR® 100 mg

Comprimés sécables

Aténolol

Boîtes de 14 ; 28 ou 56

1. Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour vous. Vous n'avez pas besoin de la relire. Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

ment prescrit. Ne le donnez pas à un enfant ou à une femme enceinte ou allaitante, car il peut être nocif, même si les effets ne sont pas connus. Si vous ressentez des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Un effet indésirable qui ne serait pas

ATENOR® 100 mg

56 comprimés



En quels cas est-il utilisé ?

Il est utilisé pour connaître avant de prendre ATENOR,

Comprimés ?
Effets éventuels ?
Comprimés ?

Comprimés ET DANS QUELS CAS

BETA-BLOQUANT/SELECTIF.

«bêta-bloquant». Il diminue certains effets, (dits «effets bêta-bloquants») de régulation cardiovasculaire.

Ce médicament est préconisé dans les cas suivants:

- Hypertension artérielle,
- Prévention des crises douloureuses de l'angine de poitrine,
- Après un infarctus du myocarde,
- Certains troubles du rythme.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ATENOR?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

Ne prenez jamais ATENOR :

- Asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives dans leurs formes sévères (formes sévères d'asthme et de maladie des bronches et des poumons avec encombrement),
- Insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement (défaillance des fonctions du cœur non contrôlées par le traitement),
- Choc cardiogénique (choc d'origine cardiaque),
- Bloc auriculo-ventriculaire des second et troisième degrés non appareillés (certains cas de troubles de la conduction cardiaque),
- Angor de Prinzmetal (dans les formes pures et en monothérapie) (variété de crises d'angine de poitrine),
- Maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire),
- Bradycardie importante (< 45 - 50 battements par minute) (ralentissement du rythme cardiaque),
- Phénomène de Raynaud et troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères (troubles circulatoires symétriques des doigts avec engourdissements et troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères),
- Phéochromocytome non traité (excroissance de la glande médullo-surrénale sécrétant des substances provoquant une hypertension artérielle sévère),
- Hypotension (diminution de la pression artérielle),

- Hypersensibilité à l'Aténolol
- Antécédent de réaction allergique),
- Allaitement,
- Association à la floctafène sultopride (médicament du système nerveux) ou à d'autres médicaments).

Avertissements et précautions
Miser en garde spéciales
NE JAMAIS ARRÊTER BRUTALEMENT VOTRE MÉDECIN.

La prise de ce médicament est contre-indiquée avec le verapamil (médicament du système nerveux) ou d'autres médicaments).

Précautions d'emploi

Prévenir le médecin en cas d'insuffisance rénale, certaines maladies (Raynaud).

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez votre médecin. Il existe des interactions avec d'autres médicaments et ATENOR.

Autres médicaments et ATENOR

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Ce médicament NE DOIT PAS être pris avec la floctafène (médicament du système nerveux) (voir Contre-indications). Ce médicament DOIT ÊTRE EVITÉ avec le diltiazem ou le verapamil (médicaments de garde spéciales).

Si vous prenez ou avez pris récemment un médicament obtenu sans ordonnance, informez votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits naturels

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse

En cas de besoin, ce médicament peut être utilisé. Si ce traitement est pris en fin de grossesse, le nouveau-né est nécessairement exposé à certains effets du traitement. Ce traitement est contre-indiqué pendant l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin avant de prendre tout médicament.

Sportifs

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que ce médicament est un principe actif pouvant induire un résultat positif lors des contrôles antidopage.

Effets sur l'aptitude à conduire de véhicules et à utiliser des machines

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE ATENOR

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie

La posologie est variable en fonction de la maladie et adaptée à chaque patient.

Mode d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés entiers.

Fréquence d'administration

DANS TOUS LES CAS, SEULEMENT SUR PRESCRIPTION MÉDICALE.

Durée de traitement

Dans la majorité des affections, la durée de traitement est prolongée de quelques mois ou années.