

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## armacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## type :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## entaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

Maladie

Dentaire

## Déclaration de Maladie

Nº P19- 066992

ND: 52262

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 4681

Société : ROYAL AIR MAROC

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : MOUHIB Mhammed

Date de naissance : 1952

Adresse : El/45 lot KHIZAMA LISAET Extension  
CASABLANCA

Tél. : 06636215-69

Total des frais engagés : 734.10 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

DR BENABDALLAH  
Urgentiste  
CENTRE AL KINDY  
2-4, rue Al Kindy - Tél. : 022.38.10  
CASABLANCA



Date de consultation : 11 DEC. 2020

Nom et prénom du malade : Tassine Zalina Age: 49.51

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Affection médicale respiratoire

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA

Le : 19/12/2020

Signature de l'adhérent(e) :

3

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
1 DEC 2020	15	~	<i>(Signature)</i>	<p><b>Dr BENABDALLAH A.</b> Urgentiste CENTRE AL KINDY 24, RUE AL KINDY - Tel.: 022.39.33.33 CASABLANCA</p>

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>PHARMACIE L'EXTENSION 24, Rue Al Lissasta Extention - Casablanca Tel: 05 23 93 48 40</i>	11/12/2020	<p>625,20 158,40 734,10</p>

### ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

### O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE		Coefficient	Coefficient	Coefficient				
H	25533412	21433552	D	00000000	00000000	G	35533411	11433553
B								
<b>[Création, remont, adjonction]</b>	Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession							

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUT



# ERAXIN® 500 mg

1- DENOMINATION :  
ERAXIN® 500 mg par comprimé pelliculé à 500 mg

PPV :

LOT :

PER :

13950

IVE :

512,46 mo

qsp 1 comprimé pelliculé

es, groupe fluoroquinolones.

caractéristiques pharmacocinétiques

es études cliniques auxquelles a donné lieu le médicament et de sa place  
ment disponibles.

ctions bactériennes dues aux germes sensibles à la lévofoxacine telles que :

- 
- 
- 
- pyo.
- infections biliaires,

## Eraxin® 500 mg

lévofoxacine

10 Comprimés pelliculés



6 118000 181057

lement curatif de la maladie du charbon.

ons officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

### MÉDICAMENT :

SE en cas de :

duit de la famille des quinolones, ou à l'un de excipients,

se (G6PD),

quinolone,

ce et adolescent, en raison de la toxicité articulaire démontrée chez l'animal,

ne pas utiliser la lévofoxacine pendant la grossesse.

animal n'aient pas mis en évidence d'effet tératogène, les données cliniques

Des atteintes articulaires ont été décrites chez des enfants traités par des quinolones, mais à ce jour, aucun cas d'arthropathie secondaire à une exposition in utero n'est rapporté.

Allaitement :

Les fluoroquinolones passent dans le lait maternel. En raison du risque d'atteinte articulaire chez l'enfant, l'allaitement est contre-indiqué au cours d'un traitement par fluoroquinolone.

### 7- MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Infections à Clostridium difficile :

Comme avec d'autres antibioticiens à large spectre, de rares cas de colite pseudomembraneuse ont été signalés pendant ou après un traitement par lévofoxacine. Il convient alors d'arrêter le traitement par lévofoxacine si celui-ci est en cours, de mettre en route une antibiothérapie adaptée. Dans ce cas, l'utilisation d'inhibiteurs du péristalisme est contre-indiquée

- Tendinites :

Les tendinites intéressent plus particulièrement le tendon d'Achille et peuvent conduire à une rupture. Elles peuvent survenir dès les premières 48 heures de traitement et devenir bilatérales.

Elles touchent préférentiellement les sujets à risque : sujets âgés de plus de 65 ans, sujets soumis à une corticothérapie (y compris inhalée). La présence de ces deux facteurs majeure très nettement le risque de tendinite. Il est nécessaire d'adapter la dose quotidienne chez le sujet âgé en fonction de la clairance de la créatinine.

L'apparition de signes de tendinite demande un arrêt du traitement, la mise au repos des deux tendons d'Achille par une contention appropriée ou des talonnettes et un avis en milieu spécialisé

- Myasthénie :

La lévofoxacine doit être utilisée avec prudence chez les sujets atteints de myasthénie

- Sujets prédisposés aux convulsions :

La lévofoxacine doit être utilisée avec prudence chez des sujets ayant des antécédents de convulsions ou des facteurs prédisposant à la survenue de convulsions.

- Insuffisants rénaux :

Du fait de l'excrétion essentiellement rénale de la lévofoxacine, une adaptation posologique est nécessaire chez les insuffisants rénaux.

- Photosensibilisation :

Eviter l'exposition au soleil ou aux rayonnements UV (lampe à bronzer, solarium,...) pendant la durée du traitement et pendant les 48 heures suivant l'arrêt de celui-ci en raison du risque de photosensibilisation.

# SAFLU® 50, 125 et 250

Suspension pour inhalation.

LOT: GB00559  
PER: 03/2023  
PPV: 185 DH 00



Bien agiter avant chaque utilisation

Salmétérol (DCI) xinafoate :	25 µg	25 µg	25 µg
quantité équivalente en salmétérol			

SAFLU® 250 microgrammes  
Suspension pour inhalation  
en flacon pressurisé  
120 doses



6 118001 101290

suffisamment. Il n'agit pas lorsque vous avez déjà un essoufflement ou un sifflement. Dans ces cas, vous devez utiliser votre médicament bronchodilatateur dit « de secours » d'action rapide et de courte durée, comme le salbutamol.

## 3. DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT : Contre-indications :

Ne prenez jamais SAFLU si:

• vous êtes allergique au xinafoate de salmétérol, au propionate de fluticasone ou à l'autre constituant de ce médicament le norflurane (HFA 134a).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales:

Votre médecin surveillera plus attentivement votre traitement si vous avez des problèmes médicaux tels que:

- Une maladie du cœur, y compris un rythme cardiaque irrégulier ou trop rapide,
- Une hyperactivité de la thyroïde,
- Une pression artérielle élevée,
- Diabète (SAFLU peut augmenter le taux de sucre dans

Si vous utilisez SAFLU pour le traitement de votre asthme, votre médecin souhaitera vérifier régulièrement votre état clinique.

## Si votre asthme ou votre essoufflement s'aggrave, consultez votre médecin immédiatement.

• Si vous entendez des sifflements bronchiques plus importants, si vous vous sentez plus souvent opprime au niveau de la poitrine ou si vous avez plus souvent besoin d'utiliser votre traitement bronchodilatateur de secours, continuez à utiliser SAFLU sans augmenter le nombre de bouffées de SAFLU. Votre état respiratoire pourrait s'aggraver et vous pourriez alors être davantage malade. Dans ce cas, consultez votre médecin, car il se peut que vous ayez besoin d'un traitement supplémentaire.

## Instructions d'utilisation

• Votre médecin, votre infirmier (ère) ou votre pharmacien devront vous montrer comment utiliser votre dispositif d'inhalation. Ils vérifieront comment vous l'utilisez à chaque visite. Ne pas utiliser SAFLU correctement ou comme vous l'a prescrit votre médecin pourrait limiter son efficacité pour traiter votre asthme.

• Le médicament est contenu dans une cartouche pressurisée insérée dans un applicateur en plastique munie d'un embout buccal.

## Vérification du fonctionnement du dispositif:

• Lorsque vous utilisez le dispositif pour la première fois, testez son bon fonctionnement. Retirez le capuchon de l'embout buccal en pressant doucement les côtés, entre le pouce et l'index et tirez-le.

• Afin de s'assurer qu'il fonctionne, agitez le bien, éloignez l'embout buccal de vous et appuyez sur la cartouche pour libérer une bouffée dans l'air. Répétez ces étapes, en agitant bien le dispositif avant de libérer chaque bouffée. Si vous n'avez pas utilisé votre dispositif depuis une semaine ou plus, libérez deux bouffées de produit dans l'air.

## Utilisation du dispositif:

Il est important de commencer à respirer le plus lentement possible juste avant d'utiliser le dispositif:  
1. Tenez-vous debout ou assis quand vous utilisez votre dispositif.

2. Retirez le capuchon de l'embout buccal. Vérifiez l'intérieur et l'extérieur de l'embout buccal afin de vous assurer que celui-ci est propre et ne contient pas de corps étranger.

3. Agitez l'appareil 4 à 5 fois afin d'éliminer tout corps étranger et d'assurer le mélange des composants de la suspension contenue dans le flacon.

4. Tenez l'appareil bien à la verticale en plaçant le pouce à la base, sous l'embout buccal. Expirez autant que vous le pouvez.

5. Placez l'embout buccal dans votre bouche entre les dents. Fermez les lèvres autour. Ne mordez pas l'embout buccal.

6. Inspirez par la bouche. Juste après avoir commencé à inspirer à travers le dispositif, appuyez fermement vers le bas sur le haut de l'appareil pour libérer une bouffée de médicament, tout en inspirant régulièrement et profondément.

7. Pendant que vous retenez votre respiration, retirez le dispositif de votre bouche et vos doigts du haut de l'appareil. Continuez à retenir votre respiration durant quelques secondes, autant que vous le pouvez.

8. Attendez environ 30 secondes avant une nouvelle inhalation puis répéter les étapes 3 à 7.

9. Ensuite, rincez votre bouche à l'eau en la recrachant. Ceci permettra d'éviter l'apparition d'une candidose.



# Solupred® 20 mg

Prednisolone

Comprimé effervescent

sanofi aventis

58,40

## Solupred® 20mg



M  
qu  
Exc  
anhy  
lithium, enfin d'une nature,  
so  
Ch

### Solupred® 20 mg

20 Comprimés  
effervescents



6 118000 060536

té de cette  
it.  
voir besoin  
us avez un  
ns à votre  
nellement  
un d'autre,  
ques, cela

de sodium  
ie à ... 20 mg  
cide citrique  
n, benzoate de  
saccharinate de  
usse.

ng de sodium.

itation  
(erre) de 20).

ÉMIQUE  
exuelles)

ÉDICAMENT

Il est indiqué dans certaines maladies, où il est  
utile comme effet anti-inflammatoire.

de tuberculose), d'insuffisance hépatique, d'insuffisance rénale, d'ostéoporose et de myasthénie grave (maladie des muscles avec fatigue musculaire).

Prévenir votre médecin en cas de séjour dans les régions tropicale, subtropicale ou le sud de l'Europe, en raison du risque de maladie parasitaire.

La prise de ce médicament en association avec le sultopride (un médicament agissant sur le système nerveux central) ou avec un vaccin vivant atténué est à éviter (voir rubrique "interactions médicamenteuses et autres interactions").

#### PENDANT ET APRES LE TRAITEMENT :

Eviter le contact avec les sujets atteints de varicelle ou de rougeole.

En cas de traitement prolongé, ne jamais arrêter brutalement le traitement mais suivre les recommandations de votre médecin pour la diminution des doses.

Sous traitement et au cours de l'année suivant l'arrêt du traitement, prévenir le médecin de la prise de corticoïde, en cas d'intervention chirurgicale ou de situation de stress (fièvre, maladie).

Les corticoïdes oraux ou injectables peuvent favoriser l'apparition de tendinopathie, voire de rupture tendineuse (exceptionnelle).

Prévenir votre médecin en cas d'apparition de douleur tendineuse.

#### Précautions d'emploi

Pendant le traitement, votre médecin pourra



# Solupred® 20 mg

Prednisolone

Comprimé effervescent

sanofi aventis

58,40

## Solupred® 20mg



M  
qu  
Exc  
anhy  
lithium, enfin d'une nature,  
so  
Ch

### Solupred® 20 mg

20 Comprimés  
effervescents



6 118000 060536

té de cette  
it.  
voir besoin  
us avez un  
ns à votre  
nellement  
un d'autre,  
ques, cela

de sodium  
ie à ... 20 mg  
cide citrique  
n, benzoate de  
saccharinate de  
usse.

ng de sodium.

itation  
(erre) de 20).

ÉMIQUE  
exuelles)

ÉDICAMENT

Il est indiqué dans certaines maladies, où il est  
utile comme effet anti-inflammatoire.

de tuberculose), d'insuffisance hépatique, d'insuffisance rénale, d'ostéoporose et de myasthénie grave (maladie des muscles avec fatigue musculaire).

Prévenir votre médecin en cas de séjour dans les régions tropicale, subtropicale ou le sud de l'Europe, en raison du risque de maladie parasitaire.

La prise de ce médicament en association avec le sultopride (un médicament agissant sur le système nerveux central) ou avec un vaccin vivant atténué est à éviter (voir rubrique "interactions médicamenteuses et autres interactions").

#### PENDANT ET APRES LE TRAITEMENT :

Eviter le contact avec les sujets atteints de varicelle ou de rougeole.

En cas de traitement prolongé, ne jamais arrêter brutalement le traitement mais suivre les recommandations de votre médecin pour la diminution des doses.

Sous traitement et au cours de l'année suivant l'arrêt du traitement, prévenir le médecin de la prise de corticoïde, en cas d'intervention chirurgicale ou de situation de stress (fièvre, maladie).

Les corticoïdes oraux ou injectables peuvent favoriser l'apparition de tendinopathie, voire de rupture tendineuse (exceptionnelle).

Prévenir votre médecin en cas d'apparition de douleur tendineuse.

#### Précautions d'emploi

Pendant le traitement, votre médecin pourra



# OFIKEN®

## Céfixime

LOT 201961  
EXP 08 22  
PPV 170.00 DH

int de prendre ce médicament.  
traitement.  
ute, demandez plus d'informations à votre médecin ou  
it. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en  
tre nocif.  
a relire.

**DESCRIPTION :**  
OFIKEN® 200 mg, comprimés pelliculés.

OFIKEN® 100 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable.

### COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :

O  
C  
Ex  
OF  
Céfixime  
Boîte de 16 comprimés  
Remboursable MCO



6 118000 022343

à céfixime anhydre.....	200 mg
pension buvable	q.s.p un comprimé pelliculé.

it à céfixime anhydre..... 100 mg  
q.s.p 5 ml de suspension reconstituée.

### INTENTION :

ites de 8 et 16.

### PRÉSENTATION :

n de 30 ml soit 150 doses/kg

Poudre pour suspension buvable en flacon de 60 ml soit 300 doses/kg

Poudre pour suspension buvable en flacon de 100 ml soit 500 doses/kg

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

### CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Antibiotiques de la famille des bêta-lactamines du groupe des céphalosporines de 3<sup>ème</sup> génération.

### DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

#### Comprimé pelliculé :

Ce médicament est indiqué dans le traitement des :

- Otites et sinusites aigües,
- Infections bronchiques et pulmonaires,
- Certaines infections urogénitales.

#### Poudre pour suspension buvable :

Ce médicament est indiqué chez l'enfant de plus de 6 mois, dans le traitement des :

- Infections bronchiques et pulmonaires,
- Otites moyennes aiguës,
- Certaines infections urinaires.

### ATTENTION !

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament ?

#### Poudre pour suspension buvable et comprimé pelliculé :

- Allergie connue aux antibiotiques du groupe des céphalosporines, ou à l'un des excipients de ces médicaments.

Comprimé pelliculé