

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Pathologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 8498

Société :

Actif Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 07/12/2008

Nom et prénom du malade : Dakkan Sakina Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Dr Mustapha NAJI, Omnipraticien, Ancien Médecin des Hôpitaux Militaires des Forces Armées, Casablanca, Extension n° 355, Tel: 052 65 07 04

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration, je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
09/12/20	c		15000 Dhs	Moustapha NAJI Informaticien Médecin 353 - Militaires 7-04

Dr Mustapha NAJI
Omnipraticien
Ancien Médecin
ébitaux Militaires
n° 353 - Casablanca
26 07 04

EXECUTION DES ORDONNANCES

Bachat du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>NABILAH ALI</i> <i>PHARMACIE FATIMA</i> <i>ROUTE DE SEDOUO</i> <i>BP 00217 - DOSSO</i>	07/02/20	200,40

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Dr MUSTAFA Omni Praticien Ancien Médecin Hôpital Militaire N° 53 - Casablanca Téléphon n° 0522 65 01 04	07/12/20	Rap. face	150,00 Dh



AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'IRM.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient des travaux
				Montants des soins
				Début d'exécution
				Fin d'exécution
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000	G 21433552 00000000	D 00000000 35533411	B 00000000 11433553
				Coefficient des travaux
				Montants des soins
				Date du devis
				Date de l'exécution

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

عيادة

- ٦- طب الأطفال
- ٧- داء السكري - الكوليسترونول
- ٨- إرتفاع الضغط الدموي - التخطيط الكهربائي للقلب
- ٩- أمراض الغدد / عقم الزوجين / أمراض المفاصل
- ١٠- الطب النفسي - أمراض الجهاز العصبي



الدكتور الناجي مصطفى

خريج المدرسة الملكية للصحة العسكرية بالرباط
خريج كلية الطب بالرباط
طبيب عسكري سابق بالمستشفى العسكري - الرباط
طبيب سابق بالمستشفى العسكري الفرنسي - باريس

Casablanca, le : 07.12.20


Nom et Prénom : Declan Sallina

~~1941.02~~ Ecre 20: 1 SV 11ij
~~Wol~~ Anteps 200: 2 SV 10rj
~~(G)~~ Females: 1 SV 11mj
2006 X Alivier 50: 1 - 1 12mm
be 43 Erylus Sy. SV 0 - 1 x 8mm

~~Dr. Mustapha NAJI
Oncopratricien
Ancien Médecin
des Hôpitaux Militaires
Lissasta Extension n° 333 Casablanca
Tel 0522 65 07 04~~

~~Docteur NABOUR ADYEL
Famille de FAMMA
D'origine Ouled Oulfa
d'Our Sebou Oulfa
Téléphone 0522 93 10 29
Fax 0522 22000043~~

CL) 14/12/12 .



NOTICE: INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament

ALIVIAR® 50 mg, gélules

ICI : Sulpiride

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice à médicament car elle contient des informations importantes

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autres, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ALIVIAR® 50 mg, gélules et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sortes d'informations à connaître avant de prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
3. Comment prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'ALIVIAR® 50 MG, GÉLULES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- **Classe pharmaco-thérapeutique :** Antipsychotique neuroleptique, benzamide code ATC : N05AL01

Il appartient à la famille des benzamides. C'est un antipsychotique neuroleptique.

- **Indications :**

Adultes : traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété en cas d'échec des thérapeutiques habituelles.

Enfant (de plus de 6 ans) : Troubles graves du comportement (agitation, automutilations, stéréotypies), notamment dans le cadre des syndromes autistiques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALIVIAR® 50 MG, GÉLULES ?

- **Ne prenez jamais ALIVIAR® 50 mg, gélules dans les cas suivants:**

- Hypersensibilité au sulpiride ou à l'un des autres constituants du produit,
- Tumeur connue dépendant de la prolactine, par exemple (adénome hypophysaire à prolactine ou cancer du sein).

- Phéochromocytome (atteinte de la glande médo-surrénale provoquant une hypertension artérielle sévère),

- En association avec les dopaminergiques non antiparkinsoniens cabergoline et quinagolide (médicaments utilisés dans les troubles de la lactation).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

- **Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :**

- **Mises en garde spéciales :**

Si vous présentez un des cas suivants, veuillez en informer votre médecin avant de commencer le traitement ~~par le NEUROLEPTIQUE~~ 50 mg, gélules :

- En cas d'apparition de fièvre inexplicable, de pâleur ou de forte transpiration, il est impératif d'interrompre le traitement et d'alerter immédiatement un médecin ou un service d'urgence.

- Avant la prise de ce traitement et afin de dépister un éventuel trouble cardiaque, votre médecin pourra être amené à vous faire pratiquer un électrocardiogramme. En effet, ce médicament peut provoquer des troubles du rythme cardiaque.

- Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant des facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral.

- Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients âgés atteints de

ALIVIAR® 50 mg

20 Gélules



27,00

principalement de la
-Chez l'enfant, un su
-La prise de comprim
peut avaler de travai
-En raison de prése
atteints de galactosé
de déficit en lactase

■ Précautions d'emploi

Afin que votre médicament soit efficace et sûr, il est nécessaire de prendre certaines précautions. Ces précautions sont destinées à protéger les personnes qui peuvent être sensibles au médicament ou qui ont des conditions médicales particulières. Elles sont également destinées à empêcher les interactions entre le médicament et d'autres médicaments ou substances.

■ Enfants et adolescents

Sans objet.

■ Usage des autres médicaments

Veuillez indiquer à votre pharmacien tous les médicaments que vous prenez actuellement, y compris ceux que vous prenez sans ordonnance. Il est important de ne pas prendre deux médicaments qui peuvent interagir.

■ Associations contre-indiquées

Dopaminergiques non antiparkinsoniens utilisés dans les troubles de la lactation.

■ Associations déconseillées

Certains médicaments cardiaques tels que :

- Antiparasitaires su...
Luméfantrine, pentam...
Antiarhythmiques de...
(amiodarone, sotalol,...
cisisapride, diphenylm...
spiramycine IV.

- Autres neuroleptiques...
halopéridol, levomé...
vérnilpride.

- Méthadone.

Certains médicamen...

- Antiparkinsonien...

NOTICE: INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament

ALIVIAR® 50 mg, gélules

ICI : Sulpiride

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice à médicament car elle contient des informations importantes

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autres, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ALIVIAR® 50 mg, gélules et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sortes d'informations à connaître avant de prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
3. Comment prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'ALIVIAR® 50 MG, GÉLULES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- **Classe pharmaco-thérapeutique :** Antipsychotique neuroleptique, benzamide code ATC : N05AL01

Il appartient à la famille des benzamides. C'est un antipsychotique neuroleptique.

- **Indications :**

Adultes : traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété en cas d'échec des thérapeutiques habituelles.

Enfant (de plus de 6 ans) : Troubles graves du comportement (agitation, automutilations, stéréotypies), notamment dans le cadre des syndromes autistiques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALIVIAR® 50 MG, GÉLULES ?

- **Ne prenez jamais ALIVIAR® 50 mg, gélules dans les cas suivants:**

- Hypersensibilité au sulpiride ou à l'un des autres constituants du produit,
- Tumeur connue dépendant de la prolactine, par exemple (adénome hypophysaire à prolactine ou cancer du sein).

- Phéochromocytome (atteinte de la glande médo-surrénale provoquant une hypertension artérielle sévère),

- En association avec les dopaminergiques non antiparkinsoniens cabergoline et quinagolide (médicaments utilisés dans les troubles de la lactation).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

- **Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :**

- **Mises en garde spéciales :**

Si vous présentez un des cas suivants, veuillez en informer votre médecin avant de commencer le traitement ~~par le NEUROLEPTIQUE~~ ALIVIAR® 50 mg, gélules :

- En cas d'apparition de fièvre inexplicable, de pâleur ou de forte transpiration, il est impératif d'interrompre le traitement et d'alerter immédiatement un médecin ou un service d'urgence.

- Avant la prise de ce traitement et afin de dépister un éventuel trouble cardiaque, votre médecin pourra être amené à vous faire pratiquer un électrocardiogramme. En effet, ce médicament peut provoquer des troubles du rythme cardiaque.

- Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant des facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral.

- Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients âgés atteints de

ALIVIAR® 50 mg

20 Gélules



27,00

principalement de la

-Chez l'enfant, un su

-La prise de comprim

peut avaler de travai

-En raison de prése

atteints de galactosé

de déficit en lactase

■ Précautions d'em

Afin que votre méd

traitement, il est néce

-En cas de maladie e

-En cas de diabète e

-En cas de maladie e

-En cas d'insuffisanc

-En cas d'antécéde

épileptiques,

-Chez les sujets âg

orthostatique, à la se

EN CAS DE DOUCE,

VOTRE PHARMACIEN

- **Enfants et adolesc**

Sans objet.

■ Usage des autres

Veuillez indiquer à

récemment pris ou

médicament obtenu

De plus, veuillez sign

pouvant interagir ave

■ Associations con

Dopaminergiques n

utilisés dans les trou

■ Associations déce

Certains médicame

cardiaque) tels que :

- Antiparasitaires su

Luméfantrine, penta

Antiarhythmiques de

(amiodarone, sotalol, cisapride, diphenhydramine, spiramycine IV).

- Autres neuroleptiq

halopéridol, levomé

véralipride.

- Méthadone.

Certains médicamen

- Antiparkinsonien

NOTICE: INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament

ALIVIAR® 50 mg, gélules

ICI : Sulpiride

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice à médicament car elle contient des informations importantes

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autres, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ALIVIAR® 50 mg, gélules et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sortes d'informations à connaître avant de prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
3. Comment prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'ALIVIAR® 50 MG, GÉLULES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- **Classe pharmaco-thérapeutique :** Antipsychotique neuroleptique, benzamide code ATC : N05AL01

Il appartient à la famille des benzamides. C'est un antipsychotique neuroleptique.

- **Indications :**

Adultes : traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété en cas d'échec des thérapeutiques habituelles.

Enfant (de plus de 6 ans) : Troubles graves du comportement (agitation, automutilations, stéréotypies), notamment dans le cadre des syndromes autistiques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALIVIAR® 50 MG, GÉLULES ?

- **Ne prenez jamais ALIVIAR® 50 mg, gélules dans les cas suivants:**

- Hypersensibilité au sulpiride ou à l'un des autres constituants du produit,
- Tumeur connue dépendant de la prolactine, par exemple (adénome hypophysaire à prolactine ou cancer du sein).

- Phéochromocytome (atteinte de la glande médo-surrénale provoquant une hypertension artérielle sévère),

- En association avec les dopaminergiques non antiparkinsoniens cabergoline et quinagolide (médicaments utilisés dans les troubles de la lactation).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

- **Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :**

- **Mises en garde spéciales :**

Si vous présentez un des cas suivants, veuillez en informer votre médecin avant de commencer le traitement ~~par le NEUROLEPTIQUE~~ 50 mg, gélules :

- En cas d'apparition de fièvre inexplicable, de pâleur ou de forte transpiration, il est impératif d'interrompre le traitement et d'alerter immédiatement un médecin ou un service d'urgence.

- Avant la prise de ce traitement et afin de dépister un éventuel trouble cardiaque, votre médecin pourra être amené à vous faire pratiquer un électrocardiogramme. En effet, ce médicament peut provoquer des troubles du rythme cardiaque.

- Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant des facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral.

- Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients âgés atteints de

ALIVIAR® 50 mg

20 Gélules



27,00

principalement de la
-Chez l'enfant, un su
-La prise de comprim
peut avaler de travai
-En raison de prése
atteints de galactosé
de déficit en lactase

■ Précautions d'emploi

Afin que votre médicament soit efficace et sûr, il est nécessaire de prendre certaines précautions. Ces précautions sont destinées à protéger les personnes qui peuvent être sensibles au médicament ou qui ont des conditions médicales spéciales. Elles sont également destinées à empêcher les interactions entre le médicament et d'autres médicaments ou substances.

EN CAS DE DOUCE,

VOTRE PHARMACIEN

- Enfants et adolescents

Sans objet.

- Usage des autres

Veuillez indiquer à votre pharmacien si vous avez récemment pris ou obtenu un autre médicament ou si vous avez des symptômes de maladie ou de blessure. De plus, veuillez signaler tout médicament ou substance pouvant interagir avec ce médicament.

• Associations contre-indiquées

Dopaminergiques ne doivent pas être utilisés dans les troubles de la lactation.

• Associations déconseillées

Certains médicaments peuvent provoquer des troubles cardiaques tels que :

- Antiparasitaires sucrés : Luméfantrine, pentamidine, antiarythmiques de classe III (amiodarone, sotalol, dofetilide, cisapride, diphéhydrorépinephrine, spiramycine IV).

- Autres neuroleptiques : halopéridol, levométryptophénidol, vésérapimidine.

- Méthadone.

Certains médicaments peuvent provoquer des troubles cardiaques tels que :

- Antiparkinsonien

NOTICE: INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament

ALIVIAR® 50 mg, gélules

ICI : Sulpiride

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice à médicament car elle contient des informations importantes

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autres, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ALIVIAR® 50 mg, gélules et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sortes d'informations à connaître avant de prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
3. Comment prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'ALIVIAR® 50 MG, GÉLULES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- **Classe pharmaco-thérapeutique :** Antipsychotique neuroleptique, benzamide code ATC : N05AL01

Il appartient à la famille des benzamides. C'est un antipsychotique neuroleptique.

- **Indications :**

Adultes : traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété en cas d'échec des thérapeutiques habituelles.

Enfant (de plus de 6 ans) : Troubles graves du comportement (agitation, automutilations, stéréotypies), notamment dans le cadre des syndromes autistiques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALIVIAR® 50 MG, GÉLULES ?

- **Ne prenez jamais ALIVIAR® 50 mg, gélules dans les cas suivants:**

- Hypersensibilité au sulpiride ou à l'un des autres constituants du produit,
- Tumeur connue dépendant de la prolactine, par exemple (adénome hypophysaire à prolactine ou cancer du sein),
- Phéochromocytome (atteinte de la glande médo-surrénale provoquant une hypertension artérielle sévère),
- En association avec les dopaminergiques non antiparkinsoniens cabergoline et quinagolide (médicaments utilisés dans les troubles de la lactation).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

- **Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :**

- **Mises en garde spéciales :**

Si vous présentez un des cas suivants, veuillez en informer votre médecin avant de commencer le traitement ~~par le NEUROLEPTIQUE~~ ALIVIAR® 50 mg, gélules :

- En cas d'apparition de fièvre inexplicable, de pâleur ou de forte transpiration, il est impératif d'interrompre le traitement et d'alerter immédiatement un médecin ou un service d'urgence.

- Avant la prise de ce traitement et afin de dépister un éventuel trouble cardiaque, votre médecin pourra être amené à vous faire pratiquer un électrocardiogramme. En effet, ce médicament peut provoquer des troubles du rythme cardiaque.

- Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant des facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral.

- Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients âgés atteints de

ALIVIAR® 50 mg

20 Gélules



27,00

principalement de la
-Chez l'enfant, un su
-La prise de comprim
peut avaler de travai
-En raison de prése
atteints de galactosé
de déficit en lactase

■ Précautions d'emploi

Afin que votre médicament soit efficace et sûr, il est nécessaire de prendre certaines précautions. Ces précautions sont destinées à protéger votre santé et celle des autres personnes. Elles sont basées sur les connaissances actuelles sur les effets secondaires et les interactions possibles avec d'autres médicaments.

■ En cas de maladie ou de chirurgie

Si vous avez une maladie ou une chirurgie, il est important de informer votre pharmacien ou votre médecin. Ils peuvent vous donner des conseils spécifiques pour votre traitement. Par exemple, si vous avez une maladie cardiaque, il est recommandé de prendre ce médicament avec prudence et de consulter votre médecin avant de le prendre.

■ En cas de diabète

Si vous avez un diabète, il est recommandé de prendre ce médicament avec prudence et de consulter votre médecin avant de le prendre.

■ En cas d'insuffisance rénale

Si vous avez une insuffisance rénale, il est recommandé de prendre ce médicament avec prudence et de consulter votre médecin avant de le prendre.

■ En cas d'antécédents d'épilepsie

Si vous avez une histoire d'épilepsie, il est recommandé de prendre ce médicament avec prudence et de consulter votre médecin avant de le prendre.

■ Chez les sujets âgés

Si vous êtes âgé(e), il est recommandé de prendre ce médicament avec prudence et de consulter votre médecin avant de le prendre.

■ Orthostatique, à la se

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN.

■ Enfants et adolescents

Sans objet.

■ Usage des autres

Veuillez indiquer à

récemment pris ou

médicament obtenu

De plus, veuillez sign

pouvant interagir ave

■ Associations contraindites

Dopaminergiques n

utilisés dans les trou

■ Associations déconseillées

Certains médicame

cardiaque) tels que :

- Antiparasitaires su

Luméfantrine, penta

Antiarhythmiques de

(amiodarone, sotalol)

cisapride, diphenida

spiramycine IV.

- Autres neuroleptiq

halopéridol, levomé

véralipride.

- Méthadone.

Certains médicamen

- Antiparkinsonien

NOTICE: INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament

ALIVIAR® 50 mg, gélules

ICI : Sulpiride

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice à médicament car elle contient des informations importantes

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autres, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ALIVIAR® 50 mg, gélules et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sortes d'informations à connaître avant de prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
3. Comment prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'ALIVIAR® 50 MG, GÉLULES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- **Classe pharmaco-thérapeutique :** Antipsychotique neuroleptique, benzamide code ATC : N05AL01

Il appartient à la famille des benzamides. C'est un antipsychotique neuroleptique.

- **Indications :**

Adultes : traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété en cas d'échec des thérapeutiques habituelles.

Enfant (de plus de 6 ans) : Troubles graves du comportement (agitation, automutilations, stéréotypies), notamment dans le cadre des syndromes autistiques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALIVIAR® 50 MG, GÉLULES ?

- **Ne prenez jamais ALIVIAR® 50 mg, gélules dans les cas suivants:**

- Hypersensibilité au sulpiride ou à l'un des autres constituants du produit,
- Tumeur connue dépendant de la prolactine, par exemple (adénome hypophysaire à prolactine ou cancer du sein),
- Phéochromocytome (atteinte de la glande médo-surrénale provoquant une hypertension artérielle sévère),
- En association avec les dopaminergiques non antiparkinsoniens cabergoline et quinagolide (médicaments utilisés dans les troubles de la lactation).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

- **Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :**

- **Mises en garde spéciales :**

Si vous présentez un des cas suivants, veuillez en informer votre médecin avant de commencer le traitement ~~par le NEUROLEPTIQUE~~ ALIVIAR® 50 mg, gélules :

- En cas d'apparition de fièvre inexplicable, de pâleur ou de forte transpiration, il est impératif d'interrompre le traitement et d'alerter immédiatement un médecin ou un service d'urgence.

- Avant la prise de ce traitement et afin de dépister un éventuel trouble cardiaque, votre médecin pourra être amené à vous faire pratiquer un électrocardiogramme. En effet, ce médicament peut provoquer des troubles du rythme cardiaque.

- Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant des facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral.

- Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients âgés atteints de

ALIVIAR® 50 mg

20 Gélules



27,00

principalement de la
-Chez l'enfant, un su
-La prise de comprim
peut avaler de travai
-En raison de prése
atteints de galactosé
de déficit en lactase

■ Précautions d'emploi

Afin que votre médicament soit efficace et sûr, il est nécessaire de prendre certaines précautions. Ces précautions sont destinées à protéger votre santé et celle des autres. Elles sont basées sur les connaissances actuelles sur les effets secondaires et les interactions possibles avec d'autres médicaments.

■ En cas de maladie ou de chirurgie

Si vous avez une maladie ou une chirurgie, il est important de informer votre pharmacien ou votre médecin. Ils peuvent vous donner des conseils spécifiques pour votre traitement. Par exemple, si vous avez une maladie cardiaque, il est recommandé de prendre ce médicament avec prudence.

■ En cas de diabète

Si vous avez un diabète, il est recommandé de prendre ce médicament avec prudence.

■ En cas d'insuffisance rénale

Si vous avez une insuffisance rénale, il est recommandé de prendre ce médicament avec prudence.

■ En cas d'antécédents d'épilepsie

Si vous avez une histoire d'épilepsie, il est recommandé de prendre ce médicament avec prudence.

■ Chez les sujets âgés

Si vous êtes âgé(e), il est recommandé de prendre ce médicament avec prudence.

■ Orthostatique, à la se

Si vous avez des difficultés à l'orthostatique, à la se

■ EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN

Sans objet.

■ Enfants et adolescents

Sans objet.

■ Usage des autres

Veuillez indiquer à

récemment pris ou

médicament obtenu

De plus, veuillez sign

pouvant interagir ave

■ Associations contraindites

Dopaminergiques n

utilisés dans les trou

■ Associations déconseillées

Certains médicame

cardiaque) tels que :

- Antiparasitaires su

Luméfantrine, penta

Antiarhythmiques de

(amiodarone, sotalol)

cisapride, diphenida

spiramycine IV.

- Autres neuroleptiq

halopéridol, levomé

véralipride.

- Méthadone.

Certains médicamen

- Antiparkinsonien

NOTICE: INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament

ALIVIAR® 50 mg, gélules

ICI : Sulpiride

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice à médicament car elle contient des informations importantes

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autres, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ALIVIAR® 50 mg, gélules et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sortes d'informations à connaître avant de prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
3. Comment prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'ALIVIAR® 50 MG, GÉLULES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- **Classe pharmaco-thérapeutique :** Antipsychotique neuroleptique, benzamide code ATC : N05AL01

Il appartient à la famille des benzamides. C'est un antipsychotique neuroleptique.

- **Indications :**

Adultes : traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété en cas d'échec des thérapeutiques habituelles.

Enfant (de plus de 6 ans) : Troubles graves du comportement (agitation, automutilations, stéréotypies), notamment dans le cadre des syndromes autistiques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALIVIAR® 50 MG, GÉLULES ?

- **Ne prenez jamais ALIVIAR® 50 mg, gélules dans les cas suivants:**

- Hypersensibilité au sulpiride ou à l'un des autres constituants du produit,
- Tumeur connue dépendant de la prolactine, par exemple (adénome hypophysaire à prolactine ou cancer du sein).

- Phéochromocytome (atteinte de la glande médo-surrénale provoquant une hypertension artérielle sévère),

- En association avec les dopaminergiques non antiparkinsoniens cabergoline et quinagolide (médicaments utilisés dans les troubles de la lactation).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

- **Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :**

- **Mises en garde spéciales :**

Si vous présentez un des cas suivants, veuillez en informer votre médecin avant de commencer le traitement ~~par le NEUROLEPTIQUE~~ 50 mg, gélules :

- En cas d'apparition de fièvre inexplicable, de pâleur ou de forte transpiration, il est impératif d'interrompre le traitement et d'alerter immédiatement un médecin ou un service d'urgence.

- Avant la prise de ce traitement et afin de dépister un éventuel trouble cardiaque, votre médecin pourra être amené à vous faire pratiquer un électrocardiogramme. En effet, ce médicament peut provoquer des troubles du rythme cardiaque.

- Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant des facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral.

- Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients âgés atteints de

ALIVIAR® 50 mg

20 Gélules



27,00

principalement de la
-Chez l'enfant, un su
-La prise de comprim
peut avaler de travai
-En raison de prése
atteints de galactosé
de déficit en lactase

■ Précautions d'emploi

Afin que votre médicament soit efficace et sûr, il est nécessaire de prendre certaines précautions. Ces précautions sont destinées à protéger les personnes qui peuvent être sensibles au médicament ou qui ont des conditions médicales spéciales. Elles sont également destinées à empêcher les interactions entre le médicament et d'autres médicaments ou substances.

EN CAS DE DOUCE,

VOTRE PHARMACIEN

- Enfants et adolescents

Sans objet.

- Usage des autres

Veuillez indiquer à votre pharmacien si vous avez récemment pris ou obtenu un autre médicament ou si vous avez des symptômes de maladie ou de blessure. De plus, veuillez signaler tout médicament ou substance pouvant interagir avec ce médicament.

• Associations contre-indiquées

Dopaminergiques ne doivent pas être utilisés dans les troubles de la lactation.

• Associations déconseillées

Certains médicaments peuvent provoquer des troubles cardiaques tels que :

- Antiparasitaires sucrés : Luméfantrine, pentamidine, antiarrhythmiques de classe III (amiodarone, sotalol, dofetilide, cisapride, diphéhydrorépinephrine, spiramycine IV).

- Autres neuroleptiques : halopéridol, levométryptophénidol, vésérapimidine.

- Méthadone.

Certains médicaments peuvent provoquer des troubles cardiaques tels que :

- Antiparkinsonien :

NOTICE: INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament

ALIVIAR® 50 mg, gélules

ICI : Sulpiride

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice à médicament car elle contient des informations importantes

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autres, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ALIVIAR® 50 mg, gélules et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sortes d'informations à connaître avant de prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
3. Comment prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'ALIVIAR® 50 MG, GÉLULES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- **Classe pharmaco-thérapeutique :** Antipsychotique neuroleptique, benzamide code ATC : N05AL01

Il appartient à la famille des benzamides. C'est un antipsychotique neuroleptique.

- **Indications :**

Adultes : traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété en cas d'échec des thérapeutiques habituelles.

Enfant (de plus de 6 ans) : Troubles graves du comportement (agitation, automutilations, stéréotypies), notamment dans le cadre des syndromes autistiques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALIVIAR® 50 MG, GÉLULES ?

- **Ne prenez jamais ALIVIAR® 50 mg, gélules dans les cas suivants:**

- Hypersensibilité au sulpiride ou à l'un des autres constituants du produit,
- Tumeur connue dépendant de la prolactine, par exemple (adénome hypophysaire à prolactine ou cancer du sein),
- Phéochromocytome (atteinte de la glande médo-surrénale provoquant une hypertension artérielle sévère),
- En association avec les dopaminergiques non antiparkinsoniens cabergoline et quinagolide (médicaments utilisés dans les troubles de la lactation).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

- **Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :**

- **Mises en garde spéciales :**

Si vous présentez un des cas suivants, veuillez en informer votre médecin avant de commencer le traitement ~~par le NEUROLEPTIQUE~~ ALIVIAR® 50 mg, gélules :

- En cas d'apparition de fièvre inexplicable, de pâleur ou de forte transpiration, il est impératif d'interrompre le traitement et d'alerter immédiatement un médecin ou un service d'urgence.

- Avant la prise de ce traitement et afin de dépister un éventuel trouble cardiaque, votre médecin pourra être amené à vous faire pratiquer un électrocardiogramme. En effet, ce médicament peut provoquer des troubles du rythme cardiaque.

- Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant des facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral.

- Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients âgés atteints de

ALIVIAR® 50 mg

20 Gélules



27,00

principalement de la
-Chez l'enfant, un su
-La prise de comprim
peut avaler de travai
-En raison de prése
atteints de galactosé
de déficit en lactase

■ Précautions d'emploi

Afin que votre médicament soit efficace et sûr, il est nécessaire de prendre certaines précautions. Ces précautions sont destinées à protéger les personnes qui peuvent être sensibles au médicament ou qui ont des conditions médicales spéciales. Elles sont également destinées à empêcher les interactions entre le médicament et d'autres médicaments ou substances.

■ EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN.

■ Enfants et adolescents

Sans objet.

■ Usage des autres médicaments

Veuillez indiquer à votre pharmacien tous les médicaments que vous prenez actuellement, y compris ceux que vous prenez sans ordonnance.

■ Associations contre-indiquées

Dopaminergiques ne doivent pas être utilisés dans les troubles de la lactation.

■ Associations déconseillées

Certains médicaments peuvent augmenter le risque de maladie cardiaque tels que :

- Antiparasitaires sucrés : Luméfantrine, pentamidine, amiodarone, sotalol, cisapride, diphenhydramine, spiramycine IV.

- Autres neuroleptiques : halopéridol, levométryptophénidol, vésérapimidine.

■ Méthadone

Certains médicaments peuvent augmenter le risque de maladie cardiaque tels que :

- Antiparkinsonien

NOTICE: INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament

ALIVIAR® 50 mg, gélules

ICI : Sulpiride

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice à médicament car elle contient des informations importantes

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autres, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ALIVIAR® 50 mg, gélules et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sortes d'informations à connaître avant de prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
3. Comment prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'ALIVIAR® 50 MG, GÉLULES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- **Classe pharmaco-thérapeutique :** Antipsychotique neuroleptique, benzamide code ATC : N05AL01

Il appartient à la famille des benzamides. C'est un antipsychotique neuroleptique.

- **Indications :**

Adultes : traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété en cas d'échec des thérapeutiques habituelles.

Enfant (de plus de 6 ans) : Troubles graves du comportement (agitation, automutilations, stéréotypies), notamment dans le cadre des syndromes autistiques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALIVIAR® 50 MG, GÉLULES ?

- **Ne prenez jamais ALIVIAR® 50 mg, gélules dans les cas suivants:**

- Hypersensibilité au sulpiride ou à l'un des autres constituants du produit,
- Tumeur connue dépendant de la prolactine, par exemple (adénome hypophysaire à prolactine ou cancer du sein).

- Phéochromocytome (atteinte de la glande médo-surrénale provoquant une hypertension artérielle sévère),

- En association avec les dopaminergiques non antiparkinsoniens cabergoline et quinagolide (médicaments utilisés dans les troubles de la lactation).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

- **Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :**

- **Mises en garde spéciales :**

Si vous présentez un des cas suivants, veuillez en informer votre médecin avant de commencer le traitement ~~par le NEUROLEPTIQUE~~ 50 mg, gélules :

- En cas d'apparition de fièvre inexplicable, de pâleur ou de forte transpiration, il est impératif d'interrompre le traitement et d'alerter immédiatement un médecin ou un service d'urgence.

- Avant la prise de ce traitement et afin de dépister un éventuel trouble cardiaque, votre médecin pourra être amené à vous faire pratiquer un électrocardiogramme. En effet, ce médicament peut provoquer des troubles du rythme cardiaque.

- Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant des facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral.

- Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients âgés atteints de

ALIVIAR® 50 mg

20 Gélules



27,00

principalement de la
-Chez l'enfant, un su
-La prise de comprim
peut avaler de travai
-En raison de prése
atteints de galactosé
de déficit en lactase

■ Précautions d'emploi

Afin que votre médicament soit efficace et sûr, il est nécessaire de prendre certaines précautions. Ces précautions sont destinées à protéger les personnes qui peuvent être sensibles au médicament ou qui ont des conditions médicales particulières. Elles sont également destinées à éviter les interactions avec d'autres médicaments ou substances.

■ EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN.

■ Enfants et adolescents

Sans objet.

■ Usage des autres médicaments

Veuillez indiquer à votre pharmacien tous les médicaments que vous prenez actuellement, y compris ceux que vous prenez sans ordonnance.

■ Associations contre-indiquées

Dopaminergiques non antiparkinsoniens utilisés dans les troubles de la lactation.

■ Associations déconseillées

Certains médicaments cardio-vasculaires tels que :

- Antiparasitaires su

Luméfantrine, pentam

Antiarhythmiques de

(amiodarone, sotalol, cisapride, diphenhydramine, spiramycine IV).

- Autres neuroleptiques halopéridol, levométryptophénidol, vésérapride.

- Méthadone.

Certains médicaments

- Antiparkinsonien

NOTICE: INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament

ALIVIAR® 50 mg, gélules

ICI : Sulpiride

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice à médicament car elle contient des informations importantes

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autres, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ALIVIAR® 50 mg, gélules et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sortes d'informations à connaître avant de prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
3. Comment prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'ALIVIAR® 50 MG, GÉLULES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- **Classe pharmaco-thérapeutique :** Antipsychotique neuroleptique, benzamide code ATC : N05AL01

Il appartient à la famille des benzamides. C'est un antipsychotique neuroleptique.

- **Indications :**

Adultes : traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété en cas d'échec des thérapeutiques habituelles.

Enfant (de plus de 6 ans) : Troubles graves du comportement (agitation, automutilations, stéréotypies), notamment dans le cadre des syndromes autistiques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALIVIAR® 50 MG, GÉLULES ?

- **Ne prenez jamais ALIVIAR® 50 mg, gélules dans les cas suivants:**

- Hypersensibilité au sulpiride ou à l'un des autres constituants du produit,
- Tumeur connue dépendant de la prolactine, par exemple (adénome hypophysaire à prolactine ou cancer du sein),
- Phéochromocytome (atteinte de la glande médo-surrénale provoquant une hypertension artérielle sévère),
- En association avec les dopaminergiques non antiparkinsoniens cabergoline et quinagolide (médicaments utilisés dans les troubles de la lactation).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

- **Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :**

- **Mises en garde spéciales :**

Si vous présentez un des cas suivants, veuillez en informer votre médecin avant de commencer le traitement ~~par le NEUROLEPTIQUE~~ ALIVIAR® 50 mg, gélules :

- En cas d'apparition de fièvre inexplicable, de pâleur ou de forte transpiration, il est impératif d'interrompre le traitement et d'alerter immédiatement un médecin ou un service d'urgence.

- Avant la prise de ce traitement et afin de dépister un éventuel trouble cardiaque, votre médecin pourra être amené à vous faire pratiquer un électrocardiogramme. En effet, ce médicament peut provoquer des troubles du rythme cardiaque.

- Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant des facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral.

- Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients âgés atteints de

ALIVIAR® 50 mg

20 Gélules



27,00

principalement de la
-Chez l'enfant, un su
-La prise de comprim
peut avaler de travai
-En raison de prése
atteints de galactosé
de déficit en lactase

■ Précautions d'emploi

Afin que votre médicament soit efficace et sûr, il est nécessaire de prendre certaines précautions. Ces précautions sont destinées à protéger les personnes qui peuvent être sensibles au médicament ou qui ont des conditions médicales spéciales. Elles sont également destinées à empêcher les interactions entre le médicament et d'autres médicaments ou substances.

■ EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN.

■ Enfants et adolescents

Sans objet.

■ Usage des autres médicaments

Veuillez indiquer à votre pharmacien tous les médicaments que vous prenez actuellement.

De plus, veuillez signaler tous les médicaments que vous prenez ou que vous avez pris récemment.

■ Associations contre-indiquées

Dopaminergiques ne doivent pas être utilisés dans les troubles de la lactation.

■ Associations déconseillées

Certains médicaments peuvent provoquer des troubles cardiaques.

- Antiparasitaires su-

Luméfantrine, pentam-

Antiarhythmiques de-

(amiodarone, sotalol, etc.)

cisapride, diphenhydramine,

spiramycine IV.

- Autres neuroleptiques

halopéridol, levomé-

véralipride.

- Méthadone.

Certains médicamen-

- Antiparkinsonien

NOTICE: INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament

ALIVIAR® 50 mg, gélules

ICI : Sulpiride

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice à médicament car elle contient des informations importantes

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autres, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ALIVIAR® 50 mg, gélules et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sortes d'informations à connaître avant de prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
3. Comment prendre ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ALIVIAR® 50 mg, gélules ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'ALIVIAR® 50 MG, GÉLULES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- **Classe pharmaco-thérapeutique :** Antipsychotique neuroleptique, benzamide code ATC : N05AL01

Il appartient à la famille des benzamides. C'est un antipsychotique neuroleptique.

- **Indications :**

Adultes : traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété en cas d'échec des thérapeutiques habituelles.

Enfant (de plus de 6 ans) : Troubles graves du comportement (agitation, automutilations, stéréotypies), notamment dans le cadre des syndromes autistiques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALIVIAR® 50 MG, GÉLULES ?

- **Ne prenez jamais ALIVIAR® 50 mg, gélules dans les cas suivants:**

- Hypersensibilité au sulpiride ou à l'un des autres constituants du produit,
- Tumeur connue dépendant de la prolactine, par exemple (adénome hypophysaire à prolactine ou cancer du sein).

- Phéochromocytome (atteinte de la glande médo-surrénale provoquant une hypertension artérielle sévère),

- En association avec les dopaminergiques non antiparkinsoniens cabergoline et quinagolide (médicaments utilisés dans les troubles de la lactation).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

- **Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :**

- **Mises en garde spéciales :**

Si vous présentez un des cas suivants, veuillez en informer votre médecin avant de commencer le traitement ~~par le NEUROLEPTIQUE~~ 50 mg, gélules :

- En cas d'apparition de fièvre inexplicable, de pâleur ou de forte transpiration, il est impératif d'interrompre le traitement et d'alerter immédiatement un médecin ou un service d'urgence.

- Avant la prise de ce traitement et afin de dépister un éventuel trouble cardiaque, votre médecin pourra être amené à vous faire pratiquer un électrocardiogramme. En effet, ce médicament peut provoquer des troubles du rythme cardiaque.

- Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant des facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral.

- Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients âgés atteints de

ALIVIAR® 50 mg

20 Gélules



27,00

principalement de la
-Chez l'enfant, un su
-La prise de comprim
peut avaler de travai
-En raison de prése
atteints de galactosé
de déficit en lactase

■ Précautions d'emploi

Afin que votre médicament soit efficace et sûr, il est nécessaire de prendre certaines précautions. Ces précautions sont destinées à protéger les personnes qui peuvent être sensibles au médicament ou qui ont des conditions médicales spécifiques. Elles sont également destinées à empêcher les interactions entre le médicament et d'autres médicaments ou substances.

■ Enfants et adolescents

Sans objet.

■ Usage des autres médicaments

Veuillez indiquer à votre pharmacien tous les médicaments que vous prenez actuellement, y compris ceux que vous prenez sans ordonnance. Il est important de ne pas prendre deux médicaments qui peuvent interagir.

■ Associations contre-indiquées

Dopaminergiques non antiparkinsoniens utilisés dans les troubles de la lactation.

■ Associations déconseillées

Certains médicaments cardiaques tels que :

- Antiparasitaires su...
Luméfantrine, pentam...
Antiarhythmiques de...
(amiodarone, sotalol,...
cisapride, diphenoxylate,...
spiramycine IV.

- Autres neuroleptiques...
halopéridol, levomé...
vérnilpride.

- Méthadone.

Certains médicaments.

- Antiparkinsonien.



الدكتور الناجي مصطفى

طبيب عسكري سابق بالمستشفى العسكري - الرباط
طبيب سابق بالمستشفى العسكري الفرنسي - باريس

Casablanca, le : 07/12/2020

Nom et Prénom : Dekkaz Sakina

R&P face

Dr Mustapha NAJI
Omnipraticien
Ancien Médecin
des Hôpitaux Militaires
Lissasta Extension n° 353 - Casablanca
Tel 0522 65 07 04



الدكتور الناجي مصطفى

طبيب عسكري سابق بالمستشفى العسكري - الرباط
طبيب سابق بالمستشفى العسكري الفرنسي - باريس

Casablanca, le : 07/12/2020

Nom et Prénom : DEKKAK Sakina

Radiographie thoracique face .

Absence de foyer parenchymateux organisé visible.

Pas d'épanchement pleural.

Pas d'anomalie de la silhouette cardio-médastinale.

Pas d'anomalie évidente du cadre osseux

Dr Mustapha NAJI
Omnipraticien
Ancien Médecin
des Hôpitaux Militaires
Lissasta Extension n° 353 - Casablanca
Tel 0522 65 07 04



الدكتور الناجي مصطفى

طبيب عسكري سابق بالمستشفى العسكري - الرباط
طبيب سابق بالمستشفى العسكري الفرنسي - باريس

Casablanca, le : ٥٣ / ١٢ / ٢٠٢٠

Nom et Prénom : Dekkai Sakina

FACTURE : 2341

RADIOGRAPHIE :

RXP FACE

- MONATANT: 150.00 DH

Dr Mustapha NAJI
Oncopaticien
Ancien Médecin
des Hôpitaux Militaires
Lissasta Extension n° 353 - Casablanca
Tél 0522 65 07 04