

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Ordonnance :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Maladie chronique :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 0038038

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3188 Société : RM (53220)
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre : Retraite
Nom & Prénom : AZENNOUD MAHAMED
Date de naissance : 01/01/51
Adresse : SALMA AV EL SOULANE n° 247
Tél. : 07 62 09 87 50 Total des frais engagés : 857 DH Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :
Date de consultation : 23 OCT 2020
Nom et prénom du malade : AZENNOUD Mohamed Age :
Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie : Cerveau - quelque malade
En cas d'accident préciser les causes et circonstances : maladie
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Signature de l'adhérent(e) :

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
2 OCT 2020	C2		2800	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE PASTEUR Dr Radwan ROHI et. CT Hay Essalam Bourkaiz T.E.3 - ☎ 0535.61.18.14	12/30/2020	307,80

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	2 OCT 2020	2+	3000

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient										
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>									
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>									
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>									
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>									
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE												
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412 00000000</td> <td>21433552 00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000 35533411</td> <td>00000000 11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table>		H		25533412 00000000	21433552 00000000	D	G	00000000 35533411	00000000 11433553	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
	H												
	25533412 00000000	21433552 00000000											
	D	G											
	00000000 35533411	00000000 11433553											
	B												
	<p>(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>		MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>										
			DATE DU DEVIS <input type="text"/>										

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EX

Dr. Fadil MILOUDI

Spécialiste en chirurgie orthopédique
et Traumatologique (Adultes et enfants)

Diplômé de la Faculté de Médecine de Toulouse (France)

*Chirurgie de la Main (Montpellier) et micro-chirurgie

*Chirurgie des Rhumatismes

*Chirurgie de la colonne vertébrale

*Podologie

*Traumatologie du sports

*Chirurgie Arthroscopique

بسم الله الرحمن الرحيم



الدكتور فاضل ميلودي

اختصاصي في جراحة العظام

والمفاصل (كبار وصغار)

خريج كلية الطب بتولوز (فرنسا)

* جراحة اليد (مونبولي) + جراحة بالمجهر

* جراحة أمراض الروماتيزم

* جراحة العمود الفقري

* تقويم أمراض الرجلين

* الطب الرياضي

* الكشف بالكاميرا للمفاصل

فاس، في 12 OCT 2020

Mohamed Aremouk

144.30

1 V o x c i s d o s



1 g o l r / E

14.50

2 c e t a n y l p e v



2 p o x 2 / r o g

149.14

37 F l e d i n a d g o l



PHARMACIE PASTEUR
Dr Radwan ROHI
Lot. CI Hay Essalam Bourkaiz
FES - ☎ 0535.61.18.14

307.80 1 g o l x 2 r

06.61.10.11.81 : مستعجلات

05.35.65.07.97 : هاتف وفاكس العيادة

إقامة الحناسي أ- 10 زنقة رجال المكنيني، شقة 3 شارع الجيش الملكي، (وراء محطة ستيام سابقا) - فاس

Résidence AL Hannasi A10 Rue Rahal El Maskini appt. 3 Av. Des F.A.R- Fès (derrière Ancien CTM)

INPE: 141113175 - E-mail: drfadil@hotmail.fr

FLEXIMAX

FORME ET PRESENTATION :

Gélule, Boîte de 30

LOT : 2005004
EXP : 05/2023
PVC : 149DH

COMPOSITION (par gélule) :

Substance active: Cartilage de requin 250mg, Extrait sec d'Harpagophytum 200mg, Agent de charge: Amidon de Maïs, Anti-agglomérant: Stéarate de Magnésium, Lubrifiant : Talc, Capsule végétale en HPMC

PROPRIETES :

FLEXIMAX améliore la qualité du cartilage grâce à la combinaison du cartilage de requin et de l'Harpagophytum et permet ainsi un bien-être articulaire

CONSEILS D'UTILISATION :

2 Gélules par jour

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Femmes enceintes ou allaitantes, demandez conseil à votre médecin
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée
Ne pas laisser à la portée des enfants
A conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité

Fabriqué et Distribué par HEALTH INNOVATION
Complément alimentaire n'est pas un médicament
Agrément sanitaire ONSSA : CAPV.59.217.19
Enregistré au ministère de la santé sous le N°:
DA20202002309DMP/20UCAV1

CETAMYL® 1g

Comprimés effervescents

Paracétamol



FORME ET PRESENTATION :

CETAMYL 1000 mg comprimés effervescents - tubes de 8.

COMPOSITION :

Paracétamol 1000,000 mg

Excipients qsp 1 comprimé

Excipients : acide citrique anhydre, PVP30, bicarbonate de sodium, carbonate de sodium

texapon, sorbitol poudre, arôme citron.

Excipients à effet notoire : sels de sodium - sorbitol poudre.

PROPRIETES :

CETAMYL® à base de paracétamol est un antalgique (calme la douleur) et un antipyrétique.

INDICATIONS :

- Traitement symptomatique des douleurs d'intensité légère à modérée et/ou des états dentaires).

- Traitement symptomatique des douleurs de l'arthrose.

CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité au paracétamol ou aux autres constituants.

- Insuffisance hépatocellulaire.

POSOLOGIE USUELLE, VOIES ET MODES D'ADMINISTRATION :

Posologie :

- Cette présentation contenant 1000 mg de paracétamol par unité, ne pas prendre 2 unités à la fois.

- CETAMYL® 1g comprimé effervescent est réservée à l'adulte et à l'enfant à partir de 50 kg (environ 15 ans).

La posologie unitaire usuelle est de ½ à 1 comprimé effervescent à 1000 mg par prise, à renouveler au bout de 6 à 8 heures.

En cas de besoin, la prise peut être répétée au bout de 4 heures minimum.

Il n'est généralement pas nécessaire de dépasser 3 g de paracétamol par jour, soit 3 comprimés par jour.

Cependant, en cas de douleurs plus intenses, la posologie maximale peut être augmentée jusqu'à 4 g par jour.

Toujours respecter un intervalle de 4 heures entre deux prises.

Fréquence d'administration :

Les prises systématiques permettent d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre :

• Chez l'adulte, elles doivent être espacées de 4 heures minimum.

Insuffisance rénale :

En cas d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine inférieure à 10 ml/min), l'intervalle entre deux prises sera au minimum de 8 heures.

Ne pas dépasser 3 g de paracétamol par jour.

La dose journalière efficace la plus faible doit être envisagée, sans excéder 60 mg/kg/jour (sans dépasser 3 g/j) dans les situations suivantes :

• Adultes de moins de 50 kg ;

• Insuffisance hépatocellulaire légère à modérée ;

• Alcoolisme chronique ;

• Malnutrition chronique ;

• Déshydratation.

Mode d'administration :

Vole orale.

Laisser dissoudre complètement le comprimé dans un verre d'eau. Boire immédiatement après.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mises en garde :

En raison de la dose unitaire (1000 mg), cette présentation n'est pas adaptée à l'enfant de moins de 15 ans.

Pour éviter un risque de surdosage :

• Vérifier l'absence de paracétamol dans la composition d'autres médicaments ;

• Respecter les doses maximales recommandées.

• Chez l'adulte et l'enfant de plus de 50 kg, la dose totale de paracétamol ne doit pas excéder 4 g par jour.

Précautions d'emploi :

Le paracétamol est à utiliser avec précaution en cas de :

poids < 50 kg, insuffisance hépatocellulaire légère à modérée, insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine : 30 ml/min, alcoolisme chronique, malnutrition chronique (réserves basses en glutathion hépatique), déshydratation.

En cas de découverte d'une hépatite virale aiguë, il convient d'arrêter le traitement.

En raison de la présence de sorbitol, ce médicament est déconseillé en cas d'intolérance au fructose

Ce médicament contient du sodium. A prendre en compte chez les patients suivant un régime hyposodé strict.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

CETAMYL® 1g comprimé effervescent dans les conditions normales d'utilisation, peut être administré pendant toute la grossesse.

Aux doses thérapeutiques recommandées, l'administration de CETAMYL® est possible pendant l'allaitement.

CETAMYL® est un médicament. Ne pas laisser à la portée des enfants.

En cas de doute ou de complications, demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

EFFETS INDESIRABLES :

- Rarement : réactions d'hypersensibilité à type de choc anaphylactique, œdème de Quincke, érythème, urticaire, rash cutané ont été rapportés. Leur survenue impose l'arrêt définitif de ce médicament et des médicaments apparentés.

- Exceptionnellement : thrombopénie, leucopénie et neutropénie.

En cas de doute ou de complications, demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

SURDOSAGE :

En cas de surdosage thérapeutique ou intoxication accidentelle, prévenir impérativement le médecin traitant ou le pharmacien et transférer

immédiatement le sujet en milieu hospitalier.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Nécessitant des précautions d'emploi :

Anticoagulants oraux : risque d'augmentation de l'effet de l'anticoagulant oral et du risque hémorragique en cas de prise de paracétamol aux

doses maximales (4 g/j) pendant au moins 4 jours. Contrôle régulier de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'anticoagulant oral

pendant le traitement par le paracétamol et après son arrêt.

Examens paracliniques :

La prise de CETAMYL® peut fausser le dosage de la glycémie par la méthode au glucose oxydase-peroxydase en cas de concentrations

anormalement élevées.

La prise de CETAMYL® peut fausser le dosage de l'acide urique sanguin par la méthode à l'acide phosphotungstique.

CONDITIONS DE CONSERVATION :

Comprimé effervescent : A conserver à l'abri de l'humidité et à une température inférieure à 30°.

Délivrance : libre

CETAMYL® 1g comprimés effervescents - Boîte de 8 AMM N° : 240/16DMP/21/NNP

Edition : Octobre 2016



LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES GALENICA
Casablanca - Maroc

Voxcib® 200mg, Boîte de 20 et 10 gélules

Celecoxib

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les instructions fournies dans cette notice.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nuisible.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, consultez votre médecin.

LOT: 20009
PER: 12/21
PPV: 144,30

à vos
en

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que VOXCIB et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre VOXCIB ?
3. Comment prendre VOXCIB ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VOXCIB ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE VOXCIB ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique: Anti-inflammatoire non stéroïdien, antirhumatismal, AINS, Coxibs (code ATC : M01AH01).

Indications : Voxcib est indiqué chez l'adulte dans le soulagement des symptômes dans le traitement de l'arthrose, de la polyarthrite rhumatoïde et de la spondylarthrite ankylosante. La décision de prescrire un inhibiteur sélectif de la cyclo-oxygénase-2 (COX-2) doit être basée sur l'évaluation de l'ensemble des risques spécifiques à chaque patient.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE VOXCIB,

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

Avertissements et précautions : Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Voxcib, gélules :

- Si vous avez des antécédents d'ulcère ou d'hémorragie au niveau de votre estomac ou de vos intestins, si vous prenez de l'acide acétylsalicylique (y compris à faible dose pour protéger votre cœur). Celecoxib peut être associé à de faibles doses d'acide acétylsalicylique, si vous prenez des médicaments pour diminuer la coagulation sanguine (par exemple la warfarine), si vous fumez, si vous avez du diabète, si vous souffrez d'hypertension, si vous avez un cholestérol élevé, si vous avez des pathologies du cœur, du foie ou des reins; votre médecin pourra être amené à vous suivre de façon régulière, si vous avez une rétention hydrique (chevilles et pieds gonflés), si vous êtes déshydraté, par exemple suite à une maladie, des diarrhées ou de la diarrhée, si vous avez des antécédents de réactions hépatiques graves ou de réaction cutanée grave à des médicaments, si vous avez une sensation de malaise suite à une infection ou lors d'une suspicion d'infection, car Celecoxib peut masquer une fièvre ou d'autres signes d'infection ou d'inflammation, si vous avez un âge supérieur à 65 ans; votre médecin pourra être amené à vous suivre de façon régulière. En dehors de l'acide acétylsalicylique, vous ne devez pas prendre Celecoxib avec d'autres antidouleurs ou anti-inflammatoires (AINS), tels que l'ibuprofène ou le diclofénac. Comme avec les autres AINS (par exemple ibuprofène et diclofénac), ce médicament peut provoquer une augmentation de la tension artérielle, c'est pourquoi votre médecin pourra être amené à contrôler votre tension artérielle régulièrement. Quelques cas de réactions hépatiques graves ont été rapportés avec Celecoxib, parmi lesquelles une inflammation hépatique grave, une lésion hépatique, une insuffisance hépatique (certaines d'issue fatale ou nécessitant une greffe du foie). Dans les cas graves, le décès a été observé. Si vous avez des antécédents de réactions hépatiques graves, votre médecin devra être particulièrement attentif.
- En cas de doute ne pas hésiter de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Contre-indications : Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients mentionnés à la rubrique Composition. Hypersensibilité connue aux sulfamides. Ulcère peptique évolutif ou saignement gastro-intestinal (GI). Antécédents d'asthme, de hémophilie, de polypes nasaux, d'œdème de Quincke, d'urticaire ou autres réactions de type allergique déclenchées par la prise d'acide acétylsalicylique (aspirine) ou d'autres AINS, y compris les inhibiteurs de la COX-2. Grossesse et femmes en âge de procréer, en l'absence d'une contraception efficace. Dans les deux espèces animales étudiées, le Celecoxib a entraîné des malformations. Dans l'espèce humaine, le risque au cours de la grossesse n'est pas connu mais ne peut être exclu. Abaissement insuffisant hépatique sévère (albuminémie < 25 g/l, ou score de Child-Pugh > 10). Patients ayant une clairance de la créatinine estimée < 30 ml/min. Maladie inflammatoire de l'intestin. Insuffisance cardiaque congestive (NYHA II-IV). Cardiopathie ischémique avérée, artériopathie périphérique et/ou antécédent d'accident vasculaire cérébral (y compris l'accident ischémique transitoire).

Fertilité, grossesse et allaitement

Grossesse : Le Celecoxib est contre-indiqué au cours de la grossesse et chez les femmes pouvant devenir enceintes. En cas de découverte d'une grossesse au cours du traitement, le Celecoxib devra être arrêté.

Allaitement : Les patientes traitées par Celecoxib ne devront pas allaiter.

Fertilité : En raison de leur mécanisme d'action, utilisation d'AINS, dont le Celecoxib, peut retarder ou empêcher la rupture des follicules ovariens, ce qui a été associé à une stérilité réversible chez certaines femmes.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Les patients qui présentent des étourdissements, des vertiges ou une somnolence lors de la prise du Celecoxib, devront s'abstenir de conduire ou d'utiliser des machines. **Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.**

Surdosage : Il n'existe aucune expérience clinique de surdosage. Des doses uniques jusqu'à 1200 mg et des doses répétées jusqu'à 1200 mg, deux fois par jour, ont été administrées pendant 9 jours à des sujets sains sans provoquer d'effets indésirables cliniquement significatifs. En cas d'éventuel surdosage, une prise en charge médicale adaptée est nécessaire, par exemple évacuation du contenu gastrique, surveillance clinique et, si nécessaire, un traitement symptomatique. Il est peu probable que la dialyse soit un moyen efficace d'élimination du médicament en raison de sa forte liaison aux protéines.

Si vous oubliez de prendre Voxcib, gélules : Si vous avez oublié de prendre une gélule, prenez-la dès que vous vous en apercevez. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Voxcib, gélules : L'interruption brutale de votre traitement par Voxcib, gélules peut provoquer une aggravation de vos symptômes. N'interrompez pas la prise de Voxcib, gélules sauf si votre médecin vous le demande. Votre médecin pourra vous conseiller de réduire la dose pendant quelques jours avant d'interrompre définitivement le traitement. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

3. COMMENT PRENDRE VOXCIB ?

Mode, voie d'administration et posologie :

Posologie : En raison de l'augmentation possible des risques cardiovasculaires du Celecoxib en fonction de la dose et de la durée de traitement, ce médicament doit être prescrit à la dose minimale journalière efficace pendant la période la plus courte possible. La nécessité du traitement symptomatique et son efficacité thérapeutique pour le patient devront être réévaluées périodiquement, en particulier chez les patients atteints d'arthrose.

- Arthrose : La dose journalière usuelle recommandée est de 200 mg répartie en une ou deux prises. Chez certains patients dont les symptômes sont insuffisamment soulagés, l'augmentation de la dose à 200 mg 2 fois par jour peut accroître l'efficacité. En l'absence d'amélioration du bénéfice thérapeutique après 2 semaines, d'autres options thérapeutiques doivent être envisagées.
- Maladie inflammatoire de l'intestin : La dose journalière recommandée est de 200 mg répartie en 2 prises. Si nécessaire, la dose peut être augmentée ultérieurement à 200 mg 2 fois par jour. En l'absence d'amélioration du bénéfice thérapeutique après 2 semaines, d'autres options thérapeutiques doivent être envisagées.

- Spondylarthrite ankylosante : La dose journalière recommandée est de 200 mg répartie en une ou deux prises. Pour un petit nombre de patients dont les symptômes sont insuffisamment soulagés, l'augmentation de la dose à 400 mg répartie en une ou deux prises peut accroître l'efficacité. En l'absence d'amélioration du bénéfice thérapeutique après 2 semaines, d'autres options thérapeutiques doivent être envisagées. La dose journalière maximale recommandée pour toutes les indications est de 400 mg.

Populations particulières :

Personnes âgées (de 65 ans) : Comme pour tous sujets, le traitement sera débuté à 200 mg par jour. Si nécessaire, la dose peut être augmentée ultérieurement à 200 mg 2 fois par jour.

Une attention particulière doit être portée aux sujets âgés de poids corporel inférieur à 50 kg.

Population pédiatrique : Le Celecoxib n'est pas indiqué chez l'enfant.

Métaboliseurs lents du CYP2C9 : Le risque d'effets indésirables dose-dépendants étant plus élevé, il convient d'administrer avec précaution le Celecoxib aux patients connus ou suspects d'être des métaboliseurs lents du CYP2C9, sur la base du génotype ou des antécédents/expériences antérieures avec d'autres substrats du CYP2C9. Une réduction de la dose, à la moitié de la dose la plus faible recommandée, est à envisager.

Insuffisance hépatique : Chez les patients atteints d'insuffisance hépatique modérée à sévère avec une albumine sérique comprise entre 25 et 35 g/l, le traitement doit être initié à la moitié de la dose recommandée. L'expérience chez ce type de patients se limite à celle des patients cirrhotiques.

Insuffisance rénale : L'expérience avec le Celecoxib chez les patients atteints d'insuffisance rénale légère à modérée étant limitée, ces patients devront être traités avec précaution.

Mode d'administration : Voie orale.

Voxcib peut être pris pendant ou en dehors des repas. Les patients qui ont des difficultés à avaler les gélules peuvent ajouter le contenu de la gélule de Celecoxib à de la compote de pommes, du riz, au lait, du yaourt ou de la purée de banane. Pour cela, l'intégralité du contenu de la gélule doit être soigneusement vidée dans une cuillère à café rase de compote de pommes, de riz ou lait, de yaourt ou de purée de banane, froids ou à température ambiante, et être ingérée immédiatement avec 240 ml d'eau. Une fois saupoudré sur la compote de pommes, le riz ou le lait, le contenu de la gélule reste stable pendant 2 heures placé au réfrigérateur (entre 2 et 8 °C). Si le contenu de la gélule est saupoudré sur de la purée de banane, il ne doit pas être mis au réfrigérateur et doit être immédiatement ingéré. Dans le cadre de l'asthénie, NE PAS UTILISER PLUS DE 4 SEMAINES SANS AVIS MÉDICAL.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Effets indésirables : Les effets indésirables ont été classés en fonction de leur incidence en utilisant la classification suivante :

Très fréquent : ≥ 1/10 ; **fréquent :** ≥ 1/100 à < 1/10 ; **peu fréquent :** ≥ 1/1000 à < 1/100 ; **rare :** ≥ 1/10000 à < 1/1000 ; **très rare :** < 1/10000 ; **fréquence indéterminée.**

Très fréquent : Hypertension (dont une aggravation de l'hypertension).

Fréquent : Sinusite, infection des voies respiratoires supérieures, pharyngite, infection de l'appareil urinaire, hypersensibilité, insomnie, vertiges, hypertonie, céphalées, infarctus du myocarde, rhinite, toux, dyspnée, nausées, douleurs abdominales, diarrhées, dyspepsie, flatulences, vomissements, dysphagie, éruption, prurit (indus un prurit généralisé, Arthralgie, Syndrome pseudo grippal, œdème périphérique/rétention liquidienne, Blessure (blessure accidentelle).

Peu fréquent : Anémie, Hyperkaliémie, Anxiété, Dépression, fatigue, Infarctus cérébral, paresthésies, somnolence, Vision floue, conjonctivite, Acouphènes, hypacousie, insuffisance cardiaque, palpitations, tachycardie, Bronchospasme, Constipation, gastrite, stomatite, inflammation gastro-intestinale (dont aggravation de l'inflammation gastro-intestinale), éruption, fonction hépatique anormale, enzyme hépatique augmentée (dont augmentation des ALAT et ASAT), urticaire, ecchymoses, Contractions musculaires (crampes des membres inférieurs).

Rare : Hépatite aiguë, urticaire sanguine augmentée, Œdème du visage, douleur thoracique.

Rare : Leucocytémie, Élat confusionnel, hallucinations, Alaxie, dysgueusie, Hémorragie de foie, Arythmie, Embolie pulmonaire, bouffées vasomotrices, Pneumonie, Hémorragie gastro-intestinale, ulcère duodénal, ulcère gastrique, ulcère œsophagien, ulcère intestinal et ulcère du colon, perforation intestinale, œsophagite, mélna, pancréatite, colite, Angio-œdème, alopécie, photosensibilité, Insuffisance rénale aiguë, hyponatémie, Troubles menstruels.

Très rare : Pancréatite, Cécé anaphylactique, réaction anaphylactique, Hémorragie intracranienne (dont hémorragie intracranienne fatale), méningite aseptique, épilepsie (dont aggravation de l'épilepsie), agueusie, anémie, Occlusion de l'artère rétinienne, occlusion de la veine rétinienne, Vasculature, insuffisance hépatique (parfois d'issue fatale ou nécessitant une greffe du foie), hépatite fulminante (parfois fatale), nécrose hépatique, cholestase, icterus, Dermatite exfoliative, érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique, réaction cutanée avec éosinophilie et symptômes systémiques (DRESS), pustulose exanthématique aiguë généralisée (EPAG), dermatite bulleuse.

Myosite, Néphrite tubulo-interstitielle, syndrome néphrotique, glomérulonéphrite à lésion minime.

Fréquence indéterminée : Infertilité féminine (diminution de la fécondité chez la femme)

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Déclaration des effets secondaires : Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.

Centre Anti-Poison et de Pharmacovigilance du Maroc - Site internet: <http://www.capm.ma/>

5. COMMENT CONSERVER VOXCIB ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage. Pas de précautions particulières de conservation. N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le conditionnement extérieur après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois. Ne jetez aucun médicament au tout-à-égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement. Conserver dans le conditionnement primaire d'origine, à l'abri de l'humidité.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Composition qualitative et quantitative en substance (s) actives (s) et en excipients :

Voxcib 200mg, gélules :

Celecoxib 200mg

Pour une gélule

Les autres composants sont : Lactose, Lauryl sulfate de sodium, Croscarmellose de sodium, Povidone K 30, Lactose compression directe, Stéarate de magnésium.

Excipient à effet notoire : lactose

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée : 04/09/2019.

Conditions de prescription et de délivrance : Tableau A, Liste I



Fabriquée par le laboratoire Pharmaceutique NOVOPHARMA
Z.I.2 Tit Melil - Casablanca -

PRL VOX02 V01

N=56 12/19

Dr. Fadil MILOUDI

الدكتور فاضل ميلودي



الدكتور فاضل ميلودي

اختصاصي في جراحة العظام

والمفاصل (كبار وصغار)

خريج كلية الطب بتولوز (فرنسا)

* جراحة اليد (مونيولي) + جراحة بالمجهر

* جراحة أمراض الروماتيزم

* جراحة العمود الفقري

* تقويم أمراض الرجلين

* الطب الرياضي

* الكشف بالكاميرا للمفاصل

Spécialiste en chirurgie orthopédique
et Traumatologique (Adultes et enfants)
Diplômé de la Faculté de Médecine de Toulouse (France)

*Chirurgie de la Main (Montpellier) et micro-chirurgie

* Chirurgie des Rhumatismes

* Chirurgie de la colonne vertébrale

* Podologie

*Traumatologie du sports

*Chirurgie Arthroscopique

Fès, le 12 OCT 2020 في

Dr. Azenmoud Mahr

fait

Ce = 250
m17x22 300

550.

fortune autre à l'arrêt de l'arrêt
cup to

Dr. Fadil MILOUDI

06.61.10.11.81 : مستعجلات

05.35.65.07.97 : هاتف وفاكس العيادة

إقامة العناسي أ- 10 زنقة رجال المسكيني، شقة 3 شارع الجيش الملكي، (وراء محطة ستيام سابقا) - فاس

Résidence AL Hannasi A10 Rue Rahal El Maskini appt. 3 Av. Des F.A.R- Fès (derrière Ancien CTM)

INPE: 141113175 - E-mail: drfadil@hotmail.fr

Dr.Fadil MILOUDI

**Spécialiste en chirurgie orthopédique
et Traumatologique (Adultes et enfants)**

Diplômé de la Faculté de Médecine de Toulouse (France)

*Chirurgie de la Main (Montpellier) et micro-chirurgie

* Chirurgie des Rhumatismes

*** Chirurgie de la colonne vertébrale**

** Podologie*

**Traumatologie du sports*

*Chirurgie Arthroscopique



الدكتور فاضل ميلودي

اختصاصي في جراحة العظام

والمفاصل (كبار وصغار)

خريج كلية الطب بتولوز (فرنسا)

* جراحة اليد (مونبولي) + جراحة بالمجهر

* جراحة أمراض الروماتيزم

*جراحة العمود الفقري

* تقويم أمراض الرجلين

• الطب الرياضي

* الكشف بالكاميرا للمفاصل

Fès, le فاس، في

7. Atom und Molek

Cybercard de la Mr Sam Bui

Face =

Pr. Fortise Interviewe in Jan

- R₁ & 2 gona surface =
arthron surface flatish
denticulate

Dr Fadil MELOUDI

مستعجلات: 06.61.10.11.81

هاتف وفاكس العيادة: 05.35.65.07.97

إقامة العناسي أ- 10 زنقة رحال المسكين، شقة 3 شارع الجيش الملكي، (وراء محطة ستيام سابقا) - فاس

Résidence AL Hannasi A10 Rue Rahal El Maskini appt. 3 Av. Des F.A.R- Fès (derrière Ancien CTM)

INPE: 141113175 - E-mail: drfadil@hotmail.fr