

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

armacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

otique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

entaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mail utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 045486

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 10525 Société : 532711

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : ABONHAYANE Youssef

Date de naissance : 01-01-68


Adresse : lot 5 n° 120 Hadj Fateh

ouliga comblanc

Tél. : 0664869562 Total des frais engagés : 786,8 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 12/12/22

Nom et prénom du malade : ABONHAYANE Youssef Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Diabète

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA



Signature de l'adhérent(e) : Lé : 23/12/2022

ACCUEIL
DEC. 2022
MUPRAS

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
12/12/20		2	250 dh	Dr. K. ZERKADOU ZAKOURNI Spécialiste Endocrinologue Diabétologie N°100 Résidence Al Otaq. Bd. Oum Rabia Oujda Casablanca Tél. 05 22 89 79 34

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	21/12/2020	236,80
	12/12/20	3009,-

Dr. Khadija CHERKAOUI ZAHOUANI

Endocrinologue - Diabétologue

Obésité - Nutrition

Ex Médecin Chef

du Centre Régional de Diabétologie

د. خديجة الشركاوي زهواني

إختصاصية في السكري وأمراض الغدد

السمنة - التغذية

طبيبة رئيسة سابقا للمركز

الجهوي للسكر

Casablanca, le : 12/12/18

ABOU hayane youssef

20,80 x 9

1) glucophage 500



x 3

49,60

2) D une feto x 3 mois



rene oup 1 mois

x 3 mois

PPV: 49,60 DH
LOT: 20J13
EXP: 10/2023

236,80

Dr. Khadija CHERKAOUI ZAHOUANI
Spécialiste Endocrinologie
Diabétologie
100, Résidence Al Ofoq Bd. Oum Rabii
Oulfa - Casa - Tél: 0522 89 79 34



Codefree™

SYSTEME DE SURVEILLANCE DE GLYCEMIE

NOTE :

1. Lire attentivement ces informations avant d'utiliser les bandelettes de test SD CodeFree.
2. Les bandelettes de test SD CodeFree sont destinées à être utilisées avec le lecteur de glycémie SD CodeFree.
3. Pour de plus amples informations sur un test de glycémie avec le lecteur manuel d'utilisation.

INTRODUCTION

Le dosage régulier de la glycémie améliore la gestion de votre diabète et permet, comme les études cliniques ont démontré, de mieux gérer son taux de glucose et de réduire les complications dues au diabète. Cette meilleure gestion permet surtout de mieux contrôler votre glycémie.



Fenêtre jaune (extrémité)
Déposer la goutte de sang

Avant la mise en contact
Cette fenêtre doit être ouverte

Après la mise en contact
Cette fenêtre doit être fermée

Electrodes

SD Biosensor is not related to Alere Inc. or to Standard Diagnostics, Inc.



LOT NO. :

MFG DATE :

EXP DATE :

50320066

2020. 04. 29

2022. 02. 06

6. Insérer une bandelette dans la fenêtre jaune.
7. Les bandelettes de test SD CodeFree recommandent de ne pas refermer le capot avant d'effectuer un test.
8. Les bandelettes de test SD CodeFree suivent leur propre rythme.
9. Ne pas utiliser les bandelettes de test SD CodeFree plus de 12 mois après la date d'expiration.
10. Ne pas insérer les bandelettes de test SD CodeFree dans le lecteur de glycémie si elles ne sont pas insérées correctement.
11. Le volume de sang doit être suffisant pour couvrir la fenêtr
12. Ne mettre la bandelette dans le lecteur de glycémie que si elle est correctement insérée.
13. Ne toucher la bandelette de test SD CodeFree que par les extrémités.
14. Ne pas piler ou couper la bandelette de test SD CodeFree.
15. Ne pas piler, couper ou modifier la bandelette de test SD CodeFree.
16. L'humidité extrême peut affecter les résultats de contrôle.

INFORMATIONS A PROPOS DES SITES DE PRELEVEMENTS

Prélever un échantillon de sang sur une autre zone peut être douloureux que sur le bout du doigt. La technique de prélèvement doit être la même. Les résultats de la glycémie sont également différents. Les variations glycémiques importantes après un repas, un pic d'insuline, ou une activité physique sont détectées plus rapidement dans le sang que dans les urines.

جليكوفاج 500 مغ، قرص مغلف **جليكوفاج 850 مغ، قرص مغلف** **جليكوفاج 1000 مغ، قرص مغلف**

كلوريدات الثورومين

يجب قراءة هذه النشرة باكملها بانتباه قبل تناول هذا الدواء. احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد. إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى، إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات من الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لك شخصيا. لا تعطه إلا لأحد سواك. حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر. إذا تعاقب أحد الأعراض غير المرغوبة أو إذا لاحظت تأثيرا غير مرغوب لم يرد ذكره في هذه النشرة، عليك إعلام الطبيب أو الصيدلي به.

على ماذا تحتوي هذه النشرة

- 1- ما هو جليكوفاج، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟
- 2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول جليكوفاج، قرص مغلف؟
- 3- ما هي طريقة تناول جليكوفاج، قرص مغلف؟
- 4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟
- 5- ما هي طريقة حفظ جليكوفاج، قرص مغلف؟
- 6- محتوى العبوة والمعلومات الإضافية.

1- ما هو جليكوفاج، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟

الصفصف الصيدلي العلاجي A10BA02 code ATC

دواعي الاستعمال:

يحتوي جليكوفاج على ثورومين، إنه دواء مستعمل لعلاج السكري. ينتمي إلى فئة الأدوية

الاسماء بيفوغايد.

الإنسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسمح للجسم باستعادة كمية الجلوكوز (السكر) المتواجدة في الدم. يستخدم الجسم الجلوكوز لإنتاج الطاقة أو يخزنه لاستخدامه لاحقا. عندما تكون مريضا بالسكري، لا ينتج البنكرياس لديك الإنسولين بكمية كافية أو جسمك ليس قادرا على استخدام الإنسولين الذي ينتجه بشكل صحيح. يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل الجلوكوز في الدم. يساعد جليكوفاج على تخفيض معدل الجلوكوز في دمك حتى يصبح المستوى أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي.

إذا كنت بالغاً وتعاني من وزن زائد، يسمح كذلك تناول جليكوفاج على المدى الطويل المساعدة على الحد من أخطار المضاعفات الصحية للسكري. يشترك جليكوفاج بالاستقرار في الوزن أو بفقدان قليل من الوزن.

ما هي الحالات التي يستعمل فيها جليكوفاج؟

يستخدم جليكوفاج لعلاج السكري من النوع 2 "السكري" كذلك "السكري" المتوقف على الإنسولين عندما لا يسمح النظام الغذائي والتمارين البدنية وحدهما بالتحكم بمعدل الجلوكوز في الدم. يستخدم بشكل خاص لدى المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن. يستخدم المرضى الباقين تناول جليكوفاج وحده أو مع أدوية أخرى ضد السكري (أدوية قابلة للدمج أو غير قابلة للدمج).

يستعمل الأطفال في سن العاشرة وما فوق وفق والمراقبون تناول جليكوفاج وحده أو مع الإنسولين.

2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول جليكوفاج، قرص مغلف؟

موانع الاستعمال:

لا تتناول جليكوفاج في الحالات التالية: إذا كنت تعاني من الأوعية (الحساسية المفرطة) تجاه الثورومين أو أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء المذكورة في الفقرة 6.

إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد.

إذا كنت تعاني من نُدور حاد في وظائف الكلى.

إذا كنت تعاني من سكري غير متحكم به، يصاحبه مثلاً فرط سكر الدم (ارتفاع حاد لمعدل السكر في الدم) بصورته صائمة، غثيان، قيء، إسهال، فقدان سريع للوزن، حمض لبني (انظر "خطر حمض لبني" أسفله) أو اضطراب كيتوني. الحماض الكيتوني إصابة تكمن في تراكم مواد في الدم تسمى "أحماض كيتونية" والذي من شأنه التسبب بسبب سكري أولى. الأمراض في مثل هذه الحالة، تنفس سريع وعميق، الرغبة في النوم، نفس ذو رائحة فاكهة غير معتادة.

إذا فقدت كمية كبيرة من الماء (الجفاف)، مثل على إثر إسهال مستمر أو جفاف، أو إذا تقيدت عدة مرات على التوالي، قد يؤدي الاختلاف في مشاكل كغوية من شأنها أن تعرضك لخطر الحماض اللبني (انظر "تحذيرات وإحتياطات").

إذا كنت تعاني من التهاب حاد، مثل التهاب الرئتين أو القصب، أو التهاب الكبد. قد تؤدي "الاضرابات الجادة" في مشاكل في الكلى من شأنها تعرضك لخطر الحماض اللبني (انظر "تنبيه مع جليكوفاج أثناء").

إذا كنت تتناول علاجاً مدعاً بالفصوص القلبية الحاد أو إذا عانيت من وقت قريب من نوبة قلبية، أو إذا كنت تعاني من مشاكل قلبية، ما يخص الدورة الدموية (مثل قصور، أو إذا كنت تعاني من صعوبات في التنفس. ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نقص في إمداد الأوعية بالأكسجين، مما يعرضك لخطر الحماض اللبني (انظر "تحذيرات وإحتياطات").

• إذا كنت تستهلك بكثرة المشروبات الكحولية.

• إذا انط

• يجب اس

• إذا كنت

• حتى كان

• إذا كنت

• يجب أن

• الجراح

• يجب أن

• يجب أن

• خطر

• قد يسب

• كليا

• سكري

• المش

• من الحالات الطبية حيث يقل الأكسجين (على سبيل المثال، أمراض القلب الحادة).

20,80

• اليد، يتناول هذا الدواء.

• سكان والذي قد يقتضي

• الفحوصات أو العمليات

• لال هذه الفترة، من المهم

• اللبني، خاصة إذا كانت

• ي يزداد في حال وجود

• في الطعام أو استهلاك

• تشكل في الكبد وغيرها

• من الحالات الطبية حيث يقل الأكسجين (على سبيل المثال، أمراض القلب الحادة).

• إذا كان أي من هذه الحالات تنطبق عليك، عليك بطبيبك للحصول على مزيد من التعليمات

توقف عن تناول جليكوفاج لفترة قصيرة إذا كنت تعاني من مرض من المحتمل أن يكون مرتبطاً

باحتفاج (فقدان مهم لوزن الجسم) مثل القيء الشديد، والإسهال، والحمى، والتعرض

للحرارة، أو ضربات أقل من المعتاد. تحدث مع طبيبك للحصول على مزيد من التعليمات.

توقف عن تناول جليكوفاج وعلى الفور اتصل بالطبيب أو بالقرب مستشفى إذا كنت تعاني

من أعراض الحماض اللبني لأنه قد يؤدي إلى غيبوبة.

وتشمل أعراض الحماض اللبني:

• الغثي.

• اضطراب في المعدة (الآلم في البطن)

• تقلصات العضلات

• الشعور العام بعدم الراحة مرتبطة بتعب كبير

• صعوبة في التنفس

• انخفاض درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب.

الحماض اللبني حالة طوارئ طبية يجب معالجتها في المستشفى.

إذا اضطرت إلى إجراء عملية جراحية، توقف عن تناول جليكوفاج في وقت و بعد العملية

سوف يقرر طبيبك متى تتوقف وتتأقظ عليك باستخدام جلوكوفاج.

جليكوفاج وحده لا يسبب انخفاض معدل السكر في الدم، لكن إذا تناولت جليكوفاج مع

نفس الوقت مع أدوية أخرى لخفض السكر والتي قد تؤدي إلى انخفاض معدل السكر في

الدم (مثل السلفاميدازول، الفضة لعدل السكر في الدم، الإنسولين، الميثيلنيديازول)، هذا

خطر انخفاض معدل السكر في الدم. إذا أحسست أعراض انخفاض معدل السكر في

الدم، مثل الشعور بالوهن، الدوخة، زيادة نصب البول، ناسار نظم الكلى، اضطراب

بصري، صعوبة التركيز المعنوي، في شرب أو أكل شيء، ما يحتوي على سكر قد يساعد

في تخفيف حالة الإحساس بالضعف.

أثناء فترة العلاج بجليكوفاج، سوفوم طبيبك فحص وظيفة الكلى مرة واحدة على الأقل

بشهر أو أكثر بشكل متكرر إذا كنت مسناً و / أو تدوموت وظائف الكلى.

الأطفال لا ينبغي أن تتناول جليكوفاج في الحالات التالية:

• معلومات عن سوغات لها تأثير ملحوظ لا ينطبق.

تناول أو استعمال الأدوية الأخرى

إذا كنت مريضاً حتى حنف تعاني من مادة مبيئة تحتوي على اليود، مثل لفحص بالأش

أو بالسكرات، عليك إيقاف تناول جليكوفاج قبل وبعد العلاج. سوف يقرر طبيبك متى

توقف واستئناف تناول جليكوفاج.

عليك إعلام الطبيب إذا كنت تتناول، تناولت مؤخراً أو من الممكن أن تتناول أي دواء. عند

قد تحدثا عن إجراء اختبارات جلوكوز الدم بشكل متكرر أو اختبارات وظائف الكلى

يكون يجب أن يفسط طبيبك الجرجة.

من المهم بعضة خاصة الأعلام عن الأدوية التالية

• الأدوية التي تزيد من كمية البول (مدرات البول).

• الأدوية المستخدمة لعلاج الألم والتهاب مثل (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية

مشتقات كوكبر- إيفابرومين وسيليتوكس).

• بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مضادات ECA ومضادات مستقبل

الأنجيوتنسين II).

• شابات الاستقبال بينة-2 للأدوية التي لا سالمتناول أو نيوبيال (التي تستخدم لعلاج

السكري-توتيريد (التي تستخدم لعلاج مختلف الحالات خاصة الكهيات الجادة لبطد أو الرب

• الأدوية التي قد تؤثر على كمية الجلوكوز في الدم، وخاصة إذا كنت وظائف

متخفضة (مثل فيتامين د، إيفابرومين، إيفابرومين، ديلوفيترايفر، ونالوناز، تريموثو

فاندينات، إيزافيترونول، كروزونيتين و أولافارب).

• أدوية أخرى مسجلة لعلاج السكري.

جليكوفاج مع الكحول.

تجنب الإفراط في استهلاك الكحول مع الأخذ جليكوفاج لأن هذا قد يزيد من خطر الحماض

اللبني (انظر التحذيرات وقسم الإحتياطات).

الحمل والإرضاع

جليكوفاج 500 مغ، قرص مغلف **جليكوفاج 850 مغ، قرص مغلف** **جليكوفاج 1000 مغ، قرص مغلف**

كلوريدات الثورومين

يجب قراءة هذه النشرة باكملها بانتباه قبل تناول هذا الدواء. احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد. إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى، إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات من الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لك شخصياً. لا تعطه إلا لأحد سواك. حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر. إذا تعاقب أحد الأعراض غير المرغوبة أو إذا لاحظت تأثيراً غير مرغوب لم يرد ذكره في هذه النشرة، عليك إعلام الطبيب أو الصيدلي به.

على ماذا تحتوي هذه النشرة

- 1- ما هو جليكوفاج، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟
- 2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول جليكوفاج، قرص مغلف؟
- 3- ما هي طريقة تناول جليكوفاج، قرص مغلف؟
- 4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟
- 5- ما هي طريقة حفظ جليكوفاج، قرص مغلف؟
- 6- محتوى العبوة والمعلومات الإضافية.

1- ما هو جليكوفاج، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟

الصفصف الصيدلي العلاجي A10BA02 code ATC

دواعي الاستعمال:

يحتوي جليكوفاج على ثورومين، إنه دواء مستعمل لعلاج السكري. ينتمي إلى فئة الأدوية

الاسماء بيفوغايد.

الإنسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسمح للجسم باستعادة كمية الجلوكوز (السكر) المتواجده في الدم. يستخدم الجسم الجلوكوز لإنتاج الطاقة أو يخزونه لاستخدامه لاحقاً. عندما تكون مريضاً بالسكري، لا ينتج البنكرياس لديك الإنسولين بكمية كافية أو جسمك ليس قادراً على استخدام الإنسولين الذي ينتجه بشكل صحيح. يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل الجلوكوز في الدم. يساعد جليكوفاج على تخفيض معدل الجلوكوز في دمك حتى يصبح المستوى أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي.

إذا كنت بالغاً وتعاني من وزن زائد، يسمح كذلك تناول جليكوفاج على المدى الطويل المساعدة على الحد من أخطار المضاعفات الصحية للسكري. يشترك جليكوفاج بالاستقرار في الوزن أو بفقدان قليل من الوزن.

ما هي الحالات التي يستعمل فيها جليكوفاج؟

يستخدم جليكوفاج لعلاج السكري من النوع 2 "السكري" كذلك "السكري" المتوافق مع الإنسولين عندما لا يسمح النظام الغذائي والتمارين البدنية وحدهما بالتحكم بمعدل الجلوكوز في الدم. يستخدم بشكل خاص لدى المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن. يستخدم المرضى الباقين تناول جليكوفاج وحده أو مع أدوية أخرى ضد السكري (أدوية قابلة للدمج أو غير قابلة للدمج).

يستعمل الأطفال في سن العاشرة وما فوق والراهقين تناول جليكوفاج وحده أو مع الإنسولين.

2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول جليكوفاج، قرص مغلف؟

موانع الاستعمال:

لا تتناول جليكوفاج في الحالات التالية:

إذا كنت تعاني من الأوعية (الحساسية المفرطة) تجاه الثورومين أو أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء المذكورة في الفقرة 6.

إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد.

إذا كنت تعاني من تدهور حاد في وظائف الكلى.

إذا كنت تعاني من سكري غير متحكم به، يصاحبه مثلاً فرط سكر الدم (ارتفاع حاد لمعدل السكر في الدم) بصورة صارمة، غثيان، قيء، إسهال، فقدان سريع للوزن، حمضيات بنية (انظر "تحذيرات وإحتياطات") أسئلة أو اضطرابات. الحساس الكيتوني إصابة تكمن في تراكم مواد في الدم تسمى "أجسام كيتونية" والذي من شأنه التسبب بسبب سكري أولى. الأمراض في مثل هذه الحالة، تنفس سريع وعميق، الرغبة في النوم، نفس ذو رائحة فاكهة غير معتادة.

إذا فقدت كمية كبيرة من الماء (الجفاف)، مثل على إثر إسهال مستمر أو جفاف، أو إذا تقيأت عدة مرات على التوالي، قد يؤدي الاختلاف في مشاكل كغوية من شأنها أن تعرضك لخطر الحساس البيني (انظر "تحذيرات وإحتياطات").

إذا كنت تعاني من التهاب حاد، مثل التهاب الرئتين أو القصب، أو التهاب الكبد. قد تؤدي "الاضطرابات الجارية" في مشاكل في الكبدتين من شأنها تعريض لخطر الحساس البيني (انظر "تنبيهات")

إذا كنت تتناول علاجاً مدعاً بالفصوص القلبية الحاد أو إذا عانيت من وقت قريب من نوبة قلبية، أو إذا كنت تعاني من مشاكل قلبية، ما يخص الدورة الدموية (مثل قصور القلب)، أو إذا كنت تعاني من مضاعفات في التنفس. ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نقص في إمداد الأوعية بالأكسجين، مما يعرضك لخطر الحساس البيني (انظر "تحذيرات وإحتياطات").

• إذا كنت تستهلك بكثرة المشروبات الكحولية.

• إذا انط

• يجب اس

• إذا كنت

• حتى كان

• إذا كنت

• يجب أن

• الجراح

• يجب أن

• يجب أن

• خطر

• قد يسب

• كليات

• سكري

• المشري

من الحالات الطبية حيث يقل الأكسجين (على سبيل المثال، أمراض القلب الحادة).

إذا كان أي من هذه الحالات تنطبق عليك، استشر طبيبك للحصول على مزيد من التعليمات.

توقف عن تناول جليكوفاج لفترة قصيرة إذا كنت تعاني من مرض من المحتمل أن يكون مرتبطاً باحتجاج (فقدان مهم لوزن الجسم) مثل القيء الشديد، والإسهال، والحمى، والتعرض للحرارة، أو ضربات أقل من المعتاد. تحدث مع طبيبك للحصول على مزيد من التعليمات.

توقف عن تناول جليكوفاج وعلى الفور اتصل بالطبيب أو باقر مستشاري إذا كنت تعاني من أعراض الحساس البيني لأنه قد يؤدي إلى غيبوبة.

وتشمل أعراض الحساس البيني:

• القيء.

• اضطراب في المعدة (الآلم في البطن)

• تقلصات العضلات

• الشعور العام بعدم الراحة مرتبطة بتعب كبير

• صعوبة في التنفس

• انخفاض درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب

الحساس البيني حالة طوارئ طبية يجب معالجتها في المستشفى.

إذا اضطرت إلى إجراء عملية جراحية، توقف عن تناول جليكوفاج في وقت وبعد العملية سوف يقرر طبيبك متى تتوقف وتتأقظ عليك باستخدام جلوكوفاج.

جليكوفاج وحده لا يسبب انخفاض معدل السكر في الدم، لكن إذا تناولت جليكوفاج مع نفس الوقت مع أدوية أخرى لمرض السكري والتي قد تؤدي إلى انخفاض معدل السكر في الدم (مثل السلفاميدازول المضاد للعدوى في الدم، الإنسولين، الميثيليدازول، هذا خطر انخفاض معدل السكر في الدم، إذا أحسست أعراض انخفاض معدل السكر في الدم، مثل الشعور بالوهن، الدوخة، زيادة نصب البول، ناسار نظم القلب، اضطرابا بصرية، صعوبة التركيز المعنوي، في شرب أو أقل شرب، ما يحتوي على سكر قد يساعد على تخفيف الآلام الإحساس بالقيء.

أثناء فترة العلاج بجليكوفاج، سوف طبيبك فحص وظيفة الكلى مرة واحدة على الأقل، أو أكثر بشكل متكرر إذا كنت مسناً و / أو تدمور وظائف الكلى.

الاطفال أو شيوخ

معلومات عن سواغات لها تأثير ملحوظ لا ينطبق.

تناول أو استعمال الأدوية الأخرى

إذا كنت مريضاً حتى حقن تعاني من مادة مبيئة تحتوي على اليود، مثل لفحص بالأشعة السينية، عليك إخبارك تناول جليكوفاج قبل وبعد الفحص. سوف يقرر طبيبك متى

التوقف واستئناف تناول جليكوفاج.

عليك إعلام الطبيب إذا كنت تتناول، تناولت مؤخراً أو من الممكن أن تتناول أي دواء، عند

قد تحدثا عن إجراء اختبارات جلوكوز الدم بشكل متكرر أو اختبارات وظائف الكلى

يكون يجب أن يفسط طبيبك الجرجة.

من المهم بعضاً خاصة الأعلام عن الأدوية التالية

• الأدوية التي تزيد من كمية البول (مدرات البول).

• الأدوية المستخدمة لعلاج الألم والتهاب مثل (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثلتبات كوكبري، إيبوبروفين، سيكلوكسيكس).

• بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مضادات ECA ومضادات مستقبل الإنوسيتين II).

• شابات الاستقبال بينة-2 للأدوية التي لا سالمتناول أو نيوبيال (التي تستخدم لعلاج الربو، كورتيكوستيرويد (الاستعملة لعلاج مختلف الإلتهالات خاصة الكهيات الحادة لبطد أو الربو).

• الأدوية التي قد تؤثر على كمية الجلوكوز في الدم، وخاصة إذا كنت وظائف الكلى منخفضة (مثل فلوأيدام، فاميسين، سيستينين، دولوفيرايفر، ونازانين، تريموبيو فاندينات، إيزافيرتاوول، كروزونتين و أولافارب).

• أدوية أخرى مسجلة لعلاج السكري.

جليكوفاج مع الكحول

تجنب الإفراط في استهلاك الكحول مع الأخذ جليكوفاج لأن هذا قد يزيد من خطر الحساس البيني (انظر التحذيرات وقسم الإحتياطات).

الحمل والإرضاع

اليد، يتناول هذا الدواء. سكان والذي قد يقتضي الفحوصات أو العمليات خلال هذه الفترة، من المهم البيني، خاصة إذا كانت ي يزداد في حال وجود في الطعام أو استهلاك في شكل في الكبد وغيرها من الحالات الطبية حيث يقل الأكسجين (على سبيل المثال، أمراض القلب الحادة).

20,80

جليكوفاج 500 مغ، قرص مغلف **جليكوفاج 850 مغ، قرص مغلف** **جليكوفاج 1000 مغ، قرص مغلف**

كلوريدات الثورومين

يجب قراءة هذه النشرة باكملها بانتباه قبل تناول هذا الدواء. احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد. إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى، إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات من الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لك شخصيا. لا تعطه إلا لأحد سواك. حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر. إذا تعاقب أحد الأعراض غير المرغوبة أو إذا لاحظت تأثيرا غير مرغوب لم يرد ذكره في هذه النشرة، عليك إعلام الطبيب أو الصيدلي به.

على ماذا تحتوي هذه النشرة

- 1- ما هو جليكوفاج، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟
- 2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول جليكوفاج، قرص مغلف؟
- 3- ما هي طريقة تناول جليكوفاج، قرص مغلف؟
- 4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟
- 5- ما هي طريقة حفظ جليكوفاج، قرص مغلف؟
- 6- محتوى العبوة والمعلومات الإضافية.

1- ما هو جليكوفاج، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟

الصفصف الصيدلي العلاجي A10BA02 code ATC

دواعي الاستعمال:

يحتوي جليكوفاج على ثورومين، إنه دواء مستعمل لعلاج السكري. ينتمي إلى فئة الأدوية

الاسماء بيفوغايد.

الإنسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسمح للجسم باستعادة كمية الجلوكوز (السكر) المتواجده في الدم. يستخدم الجسم الجلوكوز لإنتاج الطاقة أو يخزنه لاستخدامه لاحقا. عندما تكون مريضا بالسكري، لا ينتج البنكرياس لديك الإنسولين بكمية كافية أو جسمك ليس قادرا على استخدام الإنسولين الذي ينتجه بشكل صحيح. يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل الجلوكوز في الدم. يساعد جليكوفاج على تخفيض معدل الجلوكوز في دمك حتى يصبح المستوى أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي.

إذا كنت بالغاً وتعاني من وزن زائد، يسمح كذلك تناول جليكوفاج على المدى الطويل المساعدة على الحد من أخطار المضاعفات الصحية للسكري. يشترك جليكوفاج بالاستقرار في الوزن أو بقدار قليل من الوزن.

ما هي الحالات التي يستعمل فيها جليكوفاج؟

يستخدم جليكوفاج لعلاج السكري من النوع 2 "السكري" كذلك "السكري" المتوافق مع الإنسولين عندما لا يسمح النظام الغذائي والتمارين البدنية وحدهما بالتحكم بمعدل الجلوكوز في الدم. يستخدم بشكل خاص لدى المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن. يستخدم المرضى الباقين تناول جليكوفاج وحده أو مع أدوية أخرى ضد السكري (أدوية قابلة للدمج أو غير قابلة للدمج).

يستعمل الأطفال في سن العاشرة وما فوق وفق والمراقبون تناول جليكوفاج وحده أو مع الإنسولين.

2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول جليكوفاج، قرص مغلف؟

موانع الاستعمال:

لا تتناول جليكوفاج في الحالات التالية:

إذا كنت تعاني من الأربحية (الحساسية المفرطة) تجاه الثورومين أو أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء المذكورة في الفقرة 6.

إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد.

إذا كنت تعاني من تدهور حاد في وظائف الكلى.

إذا كنت تعاني من سكري غير متحكم به، يصاحبه مثلاً فرط سكر الدم (ارتفاع حاد لمعدل السكر في الدم) بصورته صارمة، غثيان، قيء، إسهال، فقدان سريع للوزن، حمض لبني (انظر "خطر حمض لبني" أسفله) أو اضطراب كيتوني. الحماض الكيتوني إصابة تكمن في تراكم مواد في الدم تسمى "أحماض كيتونية" والذي من شأنه التسبب بسبب سكري أولى. الأمراض في مثل هذه الحالة، تنفس سريع وعميق، الرغبة في النوم، نفس ذو رائحة فاكهة غير معتادة.

إذا فقدت كمية كبيرة من الماء (الجفاف)، مثل على إثر إسهال مستمر أو جفاف، أو إذا تقيأت عدة مرات على التوالي، قد يؤدي الاختلاف في مشاكل كغوية من شأنها أن تعرضك لخطر الحماض اللبني (انظر "تحذيرات وإحتياطات").

إذا كنت تعاني من التهاب حاد، مثل التهاب الرئتين أو القصبيا، أو التهاب الكبد. قد تؤدي "الاضرابات الجادة" في مشاكل في الكبدتين من شأنها تعريض لخطر الحماض اللبني (انظر "تنبيه مع جليكوفاج أثناء").

إذا كنت تتناول علاجاً ضد الفصور القلبي الحاد أو إذا عانيت من وقت قريب من نوبة قلبية، أو إذا كنت تعاني من مشاكل حادة في بعض الدورة الدموية (مثل قصصه)، أو إذا كنت تعاني من صعوبات في التنفس. ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نقص في إمداد الأنسجة بالأكسجين، مما يعرضك لخطر الحماض اللبني (انظر "تحذيرات وإحتياطات").

• إذا كنت تستهلك بكثرة المشروبات الكحولية.

• إذا انط

• يجب اس

• إذا كنت

• حتى كان

• إذا كنت

• يجب أن

• الجراح

• يجب أن

• يجب أن

• خطر

• قد يسب

• كليا

• سكري

• المش

• من الحالات الطبية حيث يقل الأكسجين (على سبيل المثال، أمراض القلب الحادة).

20,80

• اليد، يتناول هذا الدواء.

• سكان والذي قد يقتضي

• الفحوصات أو العمليات

• لال هذه الفترة، من المهم

• اللبني، خاصة إذا كانت

• ي يزداد في حال وجود

• في الطعام أو استهلاك

• تشكل في الكبد وغيرها

• من الحالات الطبية حيث يقل الأكسجين (على سبيل المثال، أمراض القلب الحادة).

• إذا كان أي من هذه الحالات تنطبق عليك، عليك بطبيبك للحصول على مزيد من التعليمات

توقف عن تناول جليكوفاج لفترة قصيرة إذا كنت تعاني من مرض من المحتمل أن يكون مرتبطاً

باحتفاج (فقدان مهم لنواتج الجسم مثل القيم الشديدة، والإسهال، والحمى، والتعرض

للحرارة)، أو ضرب سائل أقل من المعتاد. تحدث مع طبيبك للحصول على مزيد من التعليمات.

توقف عن تناول جليكوفاج وعلى الفور اتصل بالطبيب أو باقرب مستشفى إذا كنت تعاني

من أعراض الحماض اللبني لأنه قد يؤدي إلى غيبوبة.

وتشمل أعراض الحماض اللبني:

• الغثي.

• اضطراب في المعدة (الآلم في البطن)

• تقلصات العضلات

• الشعور العام بعدم الراحة مرتبطة بتعب كبير

• صعوبة في التنفس

• انخفاض درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب

الحماض اللبني حالة طوارئ طبية يجب معالجتها في المستشفى

إذا اضطرت إلى إجراء عملية جراحية، توقف عن تناول جليكوفاج في وقت وبعد العملية

سوف يقرر طبيبك متى تتوقف وتتأقظ عليك باستخدام جلوكوفاج.

جليكوفاج وحده لا يسبب انخفاض معدل السكر في الدم، لكن إذا تناولت جليكوفاج مع

نفس الوقت مع أدوية أخرى لمرض السكري والتي قد تؤدي إلى انخفاض معدل السكر في

الدم (مثل السلفاميدامخفض معدل السكر في الدم، الإنسولين، المانيتينيدات)، هناك

خطر انخفاض معدل السكر في الدم. إذا أحسست بأعراض انخفاض معدل السكر في

الدم، مثل الشعور بالوهن، الدوخة، زيادة نصب البول، ناسار نظم القلب، اضطراب

بصري، صعوبة التركيز المعنوي، في شرب أو أقل شرب، ما يحتوي على سكر قد يساعد

في تخفيف أعراض الإحساس بالضعف.

أثناء فترة العلاج بجليكوفاج، سوفوم طبيبك فحص وظيفة الكلى مرة واحدة على الأقل

بشهر أو أكثر بشكل متكرر إذا كنت مسناً و / أو تدهورت وظائف الكلى.

الأطفال لا ينبغي أن تتناول جليكوفاج.

معلومات عن سواغات لها تأثير ملحوظ لا ينطبق.

تناول أو استعمال الأدوية الأخرى

إذا كنت مريضاً حتى حقن تعاني من مادة مياينة تحتوي على اليود، مثل لفحص بالأش

أو بالسكرات، عليك إيقاف تناول جليكوفاج قبل وبعد العلاج. سوف يقرر طبيبك متى

توقف واستئناف تناول جليكوفاج.

عليك إعلام الطبيب إذا كنت تتناول، تناولت مؤخراً أو من الممكن أن تتناول أي دواء. عند

قد تحدثا عن إجراء اختبارات جلوكوز الدم بشكل متكرر أو اختبارات وظائف الكلى

يكون يجب أن يفسط طبيبك الجرجة.

من المهم بعضه خاصة الأعلام عن الأدوية التالية

• الأدوية التي تزيد من كمية البول (مدرات البول).

• الأدوية المستخدمة لعلاج الألم والأنهات (مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية

مثلثبات كوكبر- إيفابرومين وسيليتوكس).

• بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثلجات ECA ومضادات مستقبل

الأنجيوتنسين II).

• شابات الاستقبال بينة-الأدوية التي لا سالمتناول أو نيوبيال (التي تستخدم لعلاج ال

كوكبريتوريه (الاستعملة لعلاج مختلف الإلتهالات خاصة الكهبات الجادة لبطد أو الرب

الأدوية التي قد تؤثر على كمية الجلوكوفاج في الدم، وخاصة إذا كنت وظائف ال

منخفضة (مثل فلوأراميد، فاميسين، سيستينين، دولوفيرايفر، ونالوناز، تريموبي

فاندينات، إيزافيرتازول، كروزونيتين و أولأرابير).

• أدوية أخرى مسجلة لعلاج السكري.

جليكوفاج مع الكحول.

تجنب الإفراط في استهلاك الكحول مع الأخذ جليكوفاج لأن هذا قد يزيد من خطر الحما

اللبني (انظر التحذيرات وقسم الإحتياطات).

الحمل والإرضاع

Dr. Khadija CHERKAOUI ZAHOUANI

Endocrinologue - Diabétologue

Obésité - Nutrition

Ex Médecin Chef

du Centre Régional de Diabétologie

د. خديجة الشرقاوي زهواني

إختصاصية في السكري وأمراض الغدد

السمنة - التغذية

طبيبة رئيسة سابقا للمركز

الجهوي للسكر

Casablanca, le :

12/12/20

P² ABRAHAYANO / 10000 F

15000 X 2

Brendele He



فهم الغلucose

3 f - 15

3000

3 min

Pharmacie Oum Errabii
Dr. Adnane BIDAH
49, Boulevard OUM ERRAFI HAY HASSAM, EL OULFA
CASABLANCA - Tél: 05 22 90 80 72 - Fax: 05 22 90 12 66

PHARMACIE OUM ERRABII

Dr. Adnane BIDAH

49, Boulevard OUM ERRAFI HAY HASSAM, EL OULFA
CASABLANCA - Tél: 05 22 90 80 72 - Fax: 05 22 90 12 66

12/12/20



صيدلية أم الربيع

PHARMACIE OUM ERRABii

49 Bd Oued Oum Errabii

Hay Hassani Casablanca

Tél. 022.90.88.72

FACTURE № 04103

V/ C N° :

Client : _____

Casablanca, le :

Quantité	DESIGNATION	P.U.	TOTAL
2	Bombonette Glace fraise	150,-	300,-

PHARMACE OUMERRAH
 49, Boulevard OUMERRAH, EL OULFA
 CASABLANCA - Tél: 05 22 90 83 72 - Fax: 05 22 90 12 66