

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## adiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## éducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation	: contact@mupras.com
Prise en charge	: pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut	: adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

UPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - Bème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Nº P19- 0048456

NPD  
14990

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2783

Actif

Pensionné(e)

Société :

Nom & Prénom : DARIF AHMED

Autre :

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : ..... Total des frais engagés : ..... Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 25/12/2019

Nom et prénom du malade : HADDOUCI HADIA, Age : .....

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

ALC + Diabète


En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 02 JAN 2020 Le : .....

Signature de l'adhérent(e) :



# RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
25/12/2019	5 + CC6	1	250,-	Dr. Mohamed ALAOUI Cabinet de Radiologie 20, Rue France Ville Tél: 05 22 22 22 22 CLINIQUE ALAOUI Casablanca

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>PHARMACIE FERRADA</i> Dr. Hassan Im. B28 N°100 Casablanca Tél: 05 22 22 22 22	25/12/2019	1782,10

## ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>LABORATOIRE DR. SABER HASSAN</i> Dr. Saber Hassan Im. B28 N°100 Casablanca Tél: 05 22 22 22 22	30/12/2019	B113D	1535,00

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

# RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ordre de service.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

**O.D.F PROTHESES DENTAIRES**

H	G
25533412 00000000 35533411	21433552 00000000 11433553
D	B
00000000	00000000

**DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE**

H	G
25533412 00000000 35533411	21433552 00000000 11433553
D	B
00000000	00000000

**[Création, remont, adjonction]**  
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

**valable 3 mois**

Le 25/12/2015

## **DECLARATION DE MALADIE CHRONIQUE**

(À adresser au médecin conseil de la MUPRAS sous pli confidentiel)

Je soussigné :

Certifie que Mlle, Mme, M. :

Présente

AVC - Convalescence

Nécessitant un traitement d'une durée de :

Contraire

Dont ci-joint ordonnance :

(à défaut noter le traitement prescrit)



الدكتور محمد علاوي

**Dr. Mohamed ALLAOUI**

**CARDIOLOGUE**

DES de Cardiologie  
et

Pathologie Vasculaire  
de la Faculté  
de

Médecine de PARIS  
Ancien Interne

des

Hôpitaux de NANCY

Membre de la Société  
Française de Cardiologie

# مصحة أمراض القلب الدار البيضاء - الوازيس

## CLINIQUE Cardiologique Casa-Oasis

Cardiologie / Cardiologie Interventionnelle / Radiologie Vasculaire Interventionnelle

Chirurgie Cardio Vasculaire et Thoracique

**Coro-Scanner / 128 barrettes**

L. 25. 12. 2019

PHARMACIE JERRADA  
61, Bd Abderrahim Bouabdil  
Oasis - Casablanca  
Tél: 0522 23 54 49 / 05 23 54 47 28

Mme HARTOUN El Miloudia

Aspegic long : 1s/j

5 x 21.80

olmetec long : 1p/j

3 x 252.00

Biprol long : 1/2 p/j

2 x 67.80

CD NOR long : 1p/j

3 x 99.00

Aldachazine : 1p/j

5 x 39.30

Belmazole long : (1x1)

3 x 96.00

Vaxiprip : 1 seule inj/du

1782.10

(HT de 03 mois)

Tél. 0522 23 54 07 / 06 - Fax: 0522 23 54 98 - GSM: 06 72 29 45 14 -  
25 Rue de France Ville - Oasis - CASA  
CLINIQUE CASA - OASIS

Dr. Mohammed ALLAOUI  
Cardiologue  
20, Rue France Ville - Oasis  
Casa - Tel: 0522 23 54 07 / 06

Dr. Mohammed ALLAOUI  
Cardiologue  
20, Rue France Ville - Oasis  
Casa - Tel: 0522 23 54 07 / 06

20, زنقة فرنس سيل - الوازيس - الدار البيضاء 20000

Tél. : 05 22 98 75 75 / 05 22 98 07 06 / 05 22 99 49 72 - Fax : 05 22 98 83 25 - GSM : 06 72 29 45 14 - 06 72 29 47 13 - 06 72 29 48 72

E-mail : clinique\_cardiologique@hotmail.com - Patente : 34788311 - C.N.S.S : 7379622 - I.F. : 01006967 - I.C.E : 001750502000084

N° Cpte : 190 780 21211 430 4969 0009 74 Banque Centrale Populaire - Casablanca



# ASPÉGIC® NOURRISSONS

Acétylsalicylate de DL-Lysine

poudre pour solution buvable en sachet-dose

LOT : 19002  
PER : 01/2021

## 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a/ Dénomination : ASPÉGIC NOURRISSONS, 100 mg,

b/ Composition : Acétylsalicylate de DL-lysine ... 180,00 mg  
(quantité correspondante en acide acétylsalicylique ... 100 mg)

Excipients : glycine, arôme mandarine (contenant du lactose, jus d'orange, huile essence de mandarine), glycyrrhizate d'ammonium, pour un sachet-dose de 204,6 mg.

## c/ Forme pharmaceutique et présentation :

Poudre pour solution buvable en sachet-dose, boîte de 20.

## d/ Classe pharmaco-thérapeutique :

AUTRES ANALGÉSIE ET ANTIPIRÉTIQUES

## 2- DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT (Indications thérapeutiques)

Ce médicament contient de l'aspirine.

Il est indiqué : • en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures.

Dans cette indication, cette présentation est réservée à l'enfant de 6 à 22 kg ; lire attentivement la rubrique « Posologie ».

• dans le traitement de certaines affections rhumatismales.

Dans cette indication, cette présentation est réservée à l'enfant de 6 à 22 kg.

Pour les enfants ayant un poids ou un âge différent, il existe d'autres présentations d'aspirine : demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 3- ATTENTION !

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

## a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament (Contre-indications)

Ce médicament NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- allergie à l'aspirine ou à un médicament apparenté (notamment anti-inflammatoires non stéroïdiens) ou à l'un des autres composants, • antécédents d'asthme provoqué par l'administration d'aspirine ou d'un médicament apparenté (notamment anti-inflammatoires non stéroïdiens), • au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée) pour des doses supérieures à 100 mg par jour, • ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution, • maladie hémorragique ou risque de saignement, • maladie grave du foie, • maladie grave des

mains, • maladie grave du cœur, • traitement par le méthotrexate à des naine lorsque l'aspirine est utilisée à

le traitement des affections (g par jour), de la fièvre ou des douleurs

traitement avec des anticoagulants oraux, ie à fortes doses, notamment dans le matismales (50 à 100 mg/kg par jour), de la à 60 mg/kg par jour) et en cas d'antécédent interactions médicamenteuses et autres interactions).

EN CAS DE DOUCE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) Mises en garde spéciales : • Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée, chez les patients présentant une intolérance au lactose (maladie héréditaire rare). • En cas d'association à d'autres médicaments, pour éviter un risque de surdosage, vérifier l'absence d'aspirine dans la composition des autres médicaments. • En cas de maux de tête survenant lors d'une utilisation prolongée et à fortes doses d'aspirine, vous ne devez pas augmenter les doses, mais prendre l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

L'utilisation régulière d'antalgiques, en particulier plusieurs antalgiques en association, peut conduire à des lésions des reins. • Des syndromes de Reye (maladie rare mais très grave associant principalement des troubles neurologiques et une atteinte du foie) ont été observés chez des enfants présentant des maladies virales et recevant de l'aspirine. En conséquence :

- en cas de maladie virale, comme la varicelle ou un épisode d'allure grippale : ne pas administrer d'aspirine à un enfant sans l'avis d'un médecin, - en cas d'apparition de trouble de la conscience ou du comportement et de vomissements chez un enfant prenant de l'aspirine, prévenez immédiatement un médecin.

\* L'aspirine ne doit être utilisée qu'après avis de votre médecin : • en cas de traitement d'une maladie rhumatismale, • en cas de déficit en G6PD (maladie héréditaire des globules rouges), car des doses élevées d'aspirine ont pu provoquer des hémolyases (destruction des globules rouges), • en cas d'antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, d'hémorragie digestive ou de gastrite, • en cas de maladie des reins ou du foie, • en cas d'asthme : la survenue de crise d'asthme, chez certains sujets, peut être liée à une allergie aux anti-inflammatoires non stéroïdiens ou à l'aspirine. Dans ce cas, ce médicament est contre-indiqué, • en cas de règles abondantes, • en cas de traitement par : • des anticoagulants oraux, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (jusqu'à 60 mg/kg par jour) et en l'absence d'antécédent d'ulcère gastro-duodenal, • des

# ASPÉGIC® NOURRISSONS

Acétylsalicylate de DL-Lysine

poudre pour solution buvable en sachet-dose

LOT : 19002  
PER : 01/2021

## 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a/ Dénomination : ASPÉGIC NOURRISSONS, 100 mg,

b/ Composition : Acétylsalicylate de DL-lysine ... 180,00 mg  
(quantité correspondante en acide acétylsalicylique ... 100 mg)

Excipients : glycine, arôme mandarine (contenant du lactose, jus d'orange, huile essence de mandarine), glycyrrhizate d'ammonium, pour un sachet-dose de 204,6 mg.

## c/ Forme pharmaceutique et présentation :

Poudre pour solution buvable en sachet-dose, boîte de 20.

## d/ Classe pharmaco-thérapeutique :

AUTRES ANALGÉSIE ET ANTIPIRÉTIQUES

## 2- DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT (Indications thérapeutiques)

Ce médicament contient de l'aspirine.

Il est indiqué : • en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures.

Dans cette indication, cette présentation est réservée à l'enfant de 6 à 22 kg ; lire attentivement la rubrique « Posologie ».

• dans le traitement de certaines affections rhumatismales.

Dans cette indication, cette présentation est réservée à l'enfant de 6 à 22 kg.

Pour les enfants ayant un poids ou un âge différent, il existe d'autres présentations d'aspirine : demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 3- ATTENTION !

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

## a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament (Contre-indications)

Ce médicament NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- allergie à l'aspirine ou à un médicament apparenté (notamment anti-inflammatoires non stéroïdiens) ou à l'un des autres composants, • antécédents d'asthme provoqué par l'administration d'aspirine ou d'un médicament apparenté (notamment anti-inflammatoires non stéroïdiens), • au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée) pour des doses supérieures à 100 mg par jour, • ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution, • maladie hémorragique ou risque de saignement, • maladie grave du foie, • maladie grave des

mains, • maladie grave du cœur, • traitement par le méthotrexate à des naine lorsque l'aspirine est utilisée à

le traitement des affections (g par jour), de la fièvre ou des douleurs

traitement avec des anticoagulants oraux, ie à fortes doses, notamment dans le matismales (50 à 100 mg/kg par jour), de la à 60 mg/kg par jour) et en cas d'antécédent interactions médicamenteuses et autres interactions).

EN CAS DE DOUCE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) Mises en garde spéciales : • Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée, chez les patients présentant une intolérance au lactose (maladie héréditaire rare). • En cas d'association à d'autres médicaments, pour éviter un risque de surdosage, vérifier l'absence d'aspirine dans la composition des autres médicaments. • En cas de maux de tête survenant lors d'une utilisation prolongée et à fortes doses d'aspirine, vous ne devez pas augmenter les doses, mais prendre l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

L'utilisation régulière d'antalgiques, en particulier plusieurs antalgiques en association, peut conduire à des lésions des reins. • Des syndromes de Reye (maladie rare mais très grave associant principalement des troubles neurologiques et une atteinte du foie) ont été observés chez des enfants présentant des maladies virales et recevant de l'aspirine. En conséquence :

- en cas de maladie virale, comme la varicelle ou un épisode d'allure grippale : ne pas administrer d'aspirine à un enfant sans l'avis d'un médecin, - en cas d'apparition de trouble de la conscience ou du comportement et de vomissements chez un enfant prenant de l'aspirine, prévenez immédiatement un médecin.

\* L'aspirine ne doit être utilisée qu'après avis de votre médecin : • en cas de traitement d'une maladie rhumatismale, • en cas de déficit en G6PD (maladie héréditaire des globules rouges), car des doses élevées d'aspirine ont pu provoquer des hémolyases (destruction des globules rouges), • en cas d'antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, d'hémorragie digestive ou de gastrite, • en cas de maladie des reins ou du foie, • en cas d'asthme : la survenue de crise d'asthme, chez certains sujets, peut être liée à une allergie aux anti-inflammatoires non stéroïdiens ou à l'aspirine. Dans ce cas, ce médicament est contre-indiqué, • en cas de règles abondantes, • en cas de traitement par : • des anticoagulants oraux, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (jusqu'à 60 mg/kg par jour) et en l'absence d'antécédent d'ulcère gastro-duodenal, • des

# ASPÉGIC® NOURRISSONS

Acétylsalicylate de DL-Lysine

poudre pour solution buvable en sachet-dose

LOT : 19002  
PER : 01/2021

ASPÉGIC 100MG  
SACHETS B20

P.P.V : 210H80

118000 061113

## 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a/ Dénomination : ASPÉGIC NOURRISSONS, 100 mg,

b/ Composition : Acétylsalicylate de DL-lysine ... 180,00 mg  
(quantité correspondante en acide acétylsalicylique ... 100 mg)

Excipients : glycine, arôme mandarine (contenant du lactose, jus d'orange, huile essence de mandarine), glycyrrhizate d'ammonium, pour un sachet-dose de 204,6 mg.

## c/ Forme pharmaceutique et présentation :

Poudre pour solution buvable en sachet-dose, boîte de 20.

## d/ Classe pharmaco-thérapeutique :

AUTRES ANALGÉSIE ET ANTIPIRÉTIQUES

## 2- DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT (Indications thérapeutiques)

Ce médicament contient de l'aspirine.

Il est indiqué : • en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures.

Dans cette indication, cette présentation est réservée à l'enfant de 6 à 22 kg ; lire attentivement la rubrique « Posologie ».

• dans le traitement de certaines affections rhumatismales.

Dans cette indication, cette présentation est réservée à l'enfant de 6 à 22 kg.

Pour les enfants ayant un poids ou un âge différent, il existe d'autres présentations d'aspirine : demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 3- ATTENTION !

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

## a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament (Contre-indications)

Ce médicament NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- allergie à l'aspirine ou à un médicament apparenté (notamment anti-inflammatoires non stéroïdiens) ou à l'un des autres composants, • antécédents d'asthme provoqué par l'administration d'aspirine ou d'un médicament apparenté (notamment anti-inflammatoires non stéroïdiens), • au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée) pour des doses supérieures à 100 mg par jour, • ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution, • maladie hémorragique ou risque de saignement, • maladie grave du foie, • maladie grave des

mains, • maladie grave du cœur, • traitement par le méthotrexate à dose élevée lorsque l'aspirine est utilisée à la traite de l'affection (g par jour), de la fièvre ou des douleurs traitement avec des anticoagulants oraux, • à fortes doses, notamment dans les maladies (50 à 100 mg/kg par jour), de la (à 60 mg/kg par jour) et en cas d'antécédent interactions médicamenteuses et autres interactions).

EN CAS DE DOUCE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) Mises en garde spéciales : • Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée, chez les patients présentant une intolérance au lactose (maladie héréditaire rare). • En cas d'association à d'autres médicaments, pour éviter un risque de surdosage, vérifier l'absence d'aspirine dans la composition des autres médicaments. • En cas de maux de tête survenant lors d'une utilisation prolongée et à fortes doses d'aspirine, vous ne devez pas augmenter les doses, mais prendre l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

L'utilisation régulière d'antalgiques, en particulier plusieurs antalgiques en association, peut conduire à des lésions des reins. • Des syndromes de Reye (maladie rare mais très grave associant principalement des troubles neurologiques et une atteinte du foie) ont été observés chez des enfants présentant des maladies virales et recevant de l'aspirine. En conséquence :

- en cas de maladie virale, comme la varicelle ou un épisode d'allure grippale : ne pas administrer d'aspirine à un enfant sans l'avis d'un médecin, - en cas d'apparition de trouble de la conscience ou du comportement et de vomissements chez un enfant prenant de l'aspirine, prévenez immédiatement un médecin.

\* L'aspirine ne doit être utilisée qu'après avis de votre médecin : • en cas de traitement d'une maladie rhumatismale, • en cas de déficit en G6PD (maladie héréditaire des globules rouges), car des doses élevées d'aspirine ont pu provoquer des hémolyases (destruction des globules rouges), • en cas d'antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, d'hémorragie digestive ou de gastrite, • en cas de maladie des reins ou du foie, • en cas d'asthme : la survenue de crise d'asthme, chez certains sujets, peut être liée à une allergie aux anti-inflammatoires non stéroïdiens ou à l'aspirine. Dans ce cas, ce médicament est contre-indiqué, • en cas de règles abondantes, • en cas de traitement par : • des anticoagulants oraux, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (jusqu'à 60 mg/kg par jour) et en l'absence d'antécédent d'ulcère gastro-duodenal, • des

# ASPÉGIC® NOURRISSONS

Acétylsalicylate de DL-Lysine

poudre pour solution buvable en sachet-dose

LOT : 19002  
PER : 01/2021

## 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a/ Dénomination : ASPÉGIC NOURRISSONS, 100 mg,

b/ Composition : Acétylsalicylate de DL-lysine ... 180,00 mg  
(quantité correspondante en acide acétylsalicylique ... 100 mg)

Excipients : glycine, arôme mandarine (contenant du lactose, jus d'orange, huile essence de mandarine), glycyrrhizate d'ammonium, pour un sachet-dose de 204,6 mg.

## c/ Forme pharmaceutique et présentation :

Poudre pour solution buvable en sachet-dose, boîte de 20.

## d/ Classe pharmaco-thérapeutique :

AUTRES ANALGÉSIE ET ANTIPIRÉTIQUES

## 2- DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT (Indications thérapeutiques)

Ce médicament contient de l'aspirine.

Il est indiqué : • en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures.

Dans cette indication, cette présentation est réservée à l'enfant de 6 à 22 kg ; lire attentivement la rubrique « Posologie ».

• dans le traitement de certaines affections rhumatismales.

Dans cette indication, cette présentation est réservée à l'enfant de 6 à 22 kg.

Pour les enfants ayant un poids ou un âge différent, il existe d'autres présentations d'aspirine : demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 3- ATTENTION !

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

## a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament (Contre-indications)

Ce médicament NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- allergie à l'aspirine ou à un médicament apparenté (notamment anti-inflammatoires non stéroïdiens) ou à l'un des autres composants, • antécédents d'asthme provoqué par l'administration d'aspirine ou d'un médicament apparenté (notamment anti-inflammatoires non stéroïdiens), • au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée) pour des doses supérieures à 100 mg par jour, • ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution, • maladie hémorragique ou risque de saignement, • maladie grave du foie, • maladie grave des

mains, • maladie grave du cœur, • traitement par le méthotrexate à des naine lorsque l'aspirine est utilisée à

le traitement des affections (g par jour), de la fièvre ou des douleurs

traitement avec des anticoagulants oraux, ie à fortes doses, notamment dans le matismales (50 à 100 mg/kg par jour), de la à 60 mg/kg par jour) et en cas d'antécédent interactions médicamenteuses et autres interactions).

EN CAS DE DOUCE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) Mises en garde spéciales : • Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée, chez les patients présentant une intolérance au lactose (maladie héréditaire rare). • En cas d'association à d'autres médicaments, pour éviter un risque de surdosage, vérifier l'absence d'aspirine dans la composition des autres médicaments. • En cas de maux de tête survenant lors d'une utilisation prolongée et à fortes doses d'aspirine, vous ne devez pas augmenter les doses, mais prendre l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

L'utilisation régulière d'antalgiques, en particulier plusieurs antalgiques en association, peut conduire à des lésions des reins. • Des syndromes de Reye (maladie rare mais très grave associant principalement des troubles neurologiques et une atteinte du foie) ont été observés chez des enfants présentant des maladies virales et recevant de l'aspirine. En conséquence :

- en cas de maladie virale, comme la varicelle ou un épisode d'allure grippale : ne pas administrer d'aspirine à un enfant sans l'avis d'un médecin, - en cas d'apparition de trouble de la conscience ou du comportement et de vomissements chez un enfant prenant de l'aspirine, prévenez immédiatement un médecin.

\* L'aspirine ne doit être utilisée qu'après avis de votre médecin : • en cas de traitement d'une maladie rhumatismale, • en cas de déficit en G6PD (maladie héréditaire des globules rouges), car des doses élevées d'aspirine ont pu provoquer des hémolyases (destruction des globules rouges), • en cas d'antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, d'hémorragie digestive ou de gastrite, • en cas de maladie des reins ou du foie, • en cas d'asthme : la survenue de crise d'asthme, chez certains sujets, peut être liée à une allergie aux anti-inflammatoires non stéroïdiens ou à l'aspirine. Dans ce cas, ce médicament est contre-indiqué, • en cas de règles abondantes, • en cas de traitement par : • des anticoagulants oraux, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (jusqu'à 60 mg/kg par jour) et en l'absence d'antécédent d'ulcère gastro-duodenal, • des

# BELMAZOL® 20 mg

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas en cas de symptômes semblables, car cela pourrait lui être néfaste.

Gardez cette notice.

**BELMAZOL® 20 mg**

28 gélules



6 118000 070139

LOT :

EXP :

PPV :

## 1. IDENTIFICATION

### a) DENOMINAISON

BELMAZOL® 20

### b) COMPOSITION

Par gélule :

Oméprazole 20 mg

Excipients : q.s.

Composition de :

### c) FORME PHARMACEUTIQUE

Boîtes de 7, 14 et 28 gélules.

### d) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Inhibiteur de la pompe à protons (code ATC : A02BC01).

## 2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

### Adulte :

- Traitement des ulcères duodénaux.
- Prévention des récidives d'ulcères duodénaux.
- Traitement des ulcères gastriques.
- Prévention des récidives d'ulcères gastriques.
- En association à des antibiotiques appropriés, éradication de Helicobacter pylori (H.pylori) dans les malades ulcérueux gastroduodenale.
- Traitement des ulcères gastriques et duodénaux associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).
- Prévention des ulcères gastriques et duodénaux associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) chez les patients à risque.
- Traitements de l'oesophagite par reflux.
- Traitements d'entretien des patients après cicatrisation d'une oesophagite par reflux.
- Traitements du reflux gastro-oesophagien symptomatique.
- Traitements du syndrome de Zollinger-Ellison.

### Utilisation pédiatrique :

Enfant à partir de 1 an et ≥ 10 kg :

- Traitements de l'oesophagite par reflux.
  - Traitements symptomatiques du pyrosis et des régurgitations acides en cas de reflux gastro-oesophagien.
- Enfant de plus de 4 ans et adolescent :
- En association à des antibiotiques, traitement de l'ulcère duodénal consécutif à une infection par Helicobacter pylori.

## 3. ATTENTION !

### a) DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- Hypersensibilité à l'oméprazole, aux dérivés benzimidazolés ou à l'un des excipients.
- L'oméprazole ne doit pas être administré de façon concomitante avec le neflinavir.

### b) MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

#### UTILISER CE MEDICAMENT AVEC PRECAUTION :

Certains enfants atteints d'affections chroniques peuvent nécessiter un traitement à long terme bien que cela ne soit pas recommandé.

Un traitement par inhibiteurs de la pompe à protons pourrait légèrement augmenter le risque d'infection.

## 4. COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

### a) POSOLOGIE USUELLE

#### • Adulte :

Traitement des ulcères duodénaux : 1 à 2 gélules de BELMAZOL® 20 mg par jour pendant 2 à 4 semaines.  
Prévention des récidives des ulcères duodénaux : 1 à 2 gélules de BELMAZOL® 20 mg par jour.

Traitement des ulcères gastriques : 1 à 2 gélules de BELMAZOL® 20 mg par jour pendant 4 à 8 semaines.  
Répondeurs : 1 à 2 gélules de BELMAZOL® 20 mg par jour pendant 4 à 8 semaines.

le :  
100 mg, chacun 2 fois  
ronidazole 400 mg (ou  
métronidazole 400 mg  
semaine,  
répéte.  
AINS : 1 gélule de

5 chez les patients à  
écédent d'hémorragie  
maines.  
ar reflux : la dose peut

MALAZOL® 20 mg par jour  
les posologies supérieures à

65.

• Enfant :

Enfant de plus de 1 an et 10 - 20 kg :

Traitement symptomatique du pyrosis et des régurgitations acides en cas de reflux gastro-oesophagien : la posologie recommandée est de 10 à 20 mg 1 fois par jour pendant 2 à 4 semaines.

Oesophagite par reflux : la posologie recommandée est de 10 à 20 mg 1 fois par jour pendant 4 à 8 semaines.  
Enfant de plus de 2 ans et > 20 kg :

Traitement symptomatique du pyrosis et des régurgitations acides en cas de reflux gastro-oesophagien : la posologie recommandée est de 20 à 40 mg 1 fois par jour pendant 2 à 4 semaines.

(Oesophagite par reflux : la posologie recommandée est de 20 à 40 mg 1 fois par jour pendant 4 à 8 semaines.  
Adolescent et enfant de plus de 4 ans :

Traitement de l'ulcère duodénal associé à une infection par H.pylori :

Poids (15-30 kg) : oméprazole 10 mg + amoxicilline 25 mg/kg de poids corporel + clarithromycine 7,5 mg/kg de poids corporels sont administrés simultanément 2 fois par jour pendant une semaine.

Poids (31-40 kg) : oméprazole 20 mg + amoxicilline 750 mg + clarithromycine 7,5 mg/kg de poids corporels administrés simultanément 2 fois par jour pendant une semaine.

Poids (> 40 kg) : oméprazole 20 mg + amoxicilline 1 g + clarithromycine 500 mg administrés simultanément 2 fois par jour pendant une semaine.

• Population particulière :

Insuffisants rénaux : aucun ajustement posologique n'est nécessaire.

Insuffisants hépatiques : une dose journalière de 10 mg-20 mg peut suffire.

Sujets âgés (> 65 ans) : aucune adaptation posologique n'est nécessaire.

DANS TOUS LES CAS VOUS DEVREZ VOUS CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

### b) VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

# BELMAZOL® 20 mg

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas en cas de symptômes semblables, car cela pourrait lui être néfaste.

Gardez cette notice.

**BELMAZOL® 20 mg**

28 gélules



6 118000 070139

LOT :

EXP :

PPV :

## 1. IDENTIFICATION

### a) DENOMINAISON

BELMAZOL® 20

### b) COMPOSITION

Par gélule :

Oméprazole 20 mg

Excipients : q.s.

Composition de :

### c) FORME PHARMACEUTIQUE

Boîtes de 7, 14 et 28 gélules.

### d) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Inhibiteur de la pompe à protons (code ATC : A02BC01).

## 2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

### Adulte :

- Traitement des ulcères duodénaux.
- Prévention des récidives d'ulcères duodénaux.
- Traitement des ulcères gastriques.
- Prévention des récidives d'ulcères gastriques.
- En association à des antibiotiques appropriés, éradication de Helicobacter pylori (H.pylori) dans les malades ulcérueux gastroduodenale.
- Traitement des ulcères gastriques et duodénaux associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).
- Prévention des ulcères gastriques et duodénaux associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) chez les patients à risque.
- Traitements de l'oesophagite par reflux.
- Traitements d'entretien des patients après cicatrisation d'une oesophagite par reflux.
- Traitements du reflux gastro-oesophagien symptomatique.
- Traitements du syndrome de Zollinger-Ellison.

### Utilisation pédiatrique :

Enfant à partir de 1 an et ≥ 10 kg :

- Traitements de l'oesophagite par reflux.
  - Traitements symptomatiques du pyrosis et des régurgitations acides en cas de reflux gastro-oesophagien.
- Enfant de plus de 4 ans et adolescent :
- En association à des antibiotiques, traitement de l'ulcère duodénal consécutif à une infection par Helicobacter pylori.

## 3. ATTENTION !

### a) DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- Hypersensibilité à l'oméprazole, aux dérivés benzimidazolés ou à l'un des excipients.
- L'oméprazole ne doit pas être administré de façon concomitante avec le neflinavir.

### b) MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

#### UTILISER CE MEDICAMENT AVEC PRECAUTION :

Certains enfants atteints d'affections chroniques peuvent nécessiter un traitement à long terme bien que cela ne soit pas recommandé.

Un traitement par inhibiteurs de la pompe à protons pourrait légèrement augmenter le risque d'infection.

## 4. COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

### a) POSOLOGIE USUELLE

#### • Adulte :

Traitement des ulcères duodénaux : 1 à 2 gélules de BELMAZOL® 20 mg par jour pendant 2 à 4 semaines.  
Prévention des récidives des ulcères duodénaux : 1 à 2 gélules de BELMAZOL® 20 mg par jour.

Traitement des ulcères gastriques : 1 à 2 gélules de BELMAZOL® 20 mg par jour pendant 4 à 8 semaines.  
Répondeurs : 1 à 2 gélules de BELMAZOL® 20 mg par jour pendant 4 à 8 semaines.

le :  
100 mg, chacun 2 fois  
ronidazole 400 mg (ou  
métronidazole 400 mg  
semaine,  
répéte.  
AINS : 1 gélule de

5 chez les patients à  
écédent d'hémorragie  
maines.  
ar reflux : la dose peut

MALAZOL® 20 mg par jour  
les posologies supérieures à

65.

• Enfant :

Enfant de plus de 1 an et 10 - 20 kg :

Traitement symptomatique du pyrosis et des régurgitations acides en cas de reflux gastro-oesophagien : la posologie recommandée est de 10 à 20 mg 1 fois par jour pendant 2 à 4 semaines.

Oesophagite par reflux : la posologie recommandée est de 10 à 20 mg 1 fois par jour pendant 4 à 8 semaines.  
Enfant de plus de 2 ans et > 20 kg :

Traitement symptomatique du pyrosis et des régurgitations acides en cas de reflux gastro-oesophagien : la posologie recommandée est de 20 à 40 mg 1 fois par jour pendant 2 à 4 semaines.

(Oesophagite par reflux : la posologie recommandée est de 20 à 40 mg 1 fois par jour pendant 4 à 8 semaines.  
Adolescent et enfant de plus de 4 ans :

Traitement de l'ulcère duodénal associé à une infection par H.pylori :

Poids (15-30 kg) : oméprazole 10 mg + amoxicilline 25 mg/kg de poids corporel + clarithromycine 7,5 mg/kg de poids corporels sont administrés simultanément 2 fois par jour pendant une semaine.

Poids (31-40 kg) : oméprazole 20 mg + amoxicilline 750 mg + clarithromycine 7,5 mg/kg de poids corporels administrés simultanément 2 fois par jour pendant une semaine.

Poids (> 40 kg) : oméprazole 20 mg + amoxicilline 1 g + clarithromycine 500 mg administrés simultanément 2 fois par jour pendant une semaine.

• Population particulière :

Insuffisants rénaux : aucun ajustement posologique n'est nécessaire.

Insuffisants hépatiques : une dose journalière de 10 mg-20 mg peut suffire.

Sujets âgés (> 65 ans) : aucune adaptation posologique n'est nécessaire.

DANS TOUS LES CAS VOUS DEVREZ VOUS CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

### b) VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

# BELMAZOL® 20 mg

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas en cas de symptômes semblables, car cela pourrait lui être néfaste.

Gardez cette notice.

**BELMAZOL® 20 mg**

28 gélules



6 118000 070139

LOT :

EXP :

PPV :

## 1. IDENTIFICATION

### a) DENOMINAISON

BELMAZOL® 20

### b) COMPOSITION

Par gélule :

Oméprazole 20 mg

Excipients : q.s.

Composition de :

### c) FORME PHARMACEUTIQUE

Boîtes de 7, 14 et 28 gélules.

### d) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Inhibiteur de la pompe à protons (code ATC : A02BC01).

## 2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

### Adulte :

- Traitement des ulcères duodénaux.
- Prévention des récidives d'ulcères duodénaux.
- Traitement des ulcères gastriques.
- Prévention des récidives d'ulcères gastriques.
- En association à des antibiotiques appropriés, éradication de Helicobacter pylori (H.pylori) dans les malades ulcérueux gastroduodenale.
- Traitement des ulcères gastriques et duodénaux associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).
- Prévention des ulcères gastriques et duodénaux associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) chez les patients à risque.
- Traitements de l'oesophagite par reflux.
- Traitements d'entretien des patients après cicatrisation d'une oesophagite par reflux.
- Traitements du reflux gastro-oesophagien symptomatique.
- Traitements du syndrome de Zollinger-Ellison.

### Utilisation pédiatrique :

Enfant à partir de 1 an et ≥ 10 kg :

- Traitements de l'oesophagite par reflux.
  - Traitements symptomatiques du pyrosis et des régurgitations acides en cas de reflux gastro-oesophagien.
- Enfant de plus de 4 ans et adolescent :
- En association à des antibiotiques, traitement de l'ulcère duodénal consécutif à une infection par Helicobacter pylori.

## 3. ATTENTION !

### a) DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- Hypersensibilité à l'oméprazole, aux dérivés benzimidazolés ou à l'un des excipients.
- L'oméprazole ne doit pas être administré de façon concomitante avec le neflénavir.

### b) MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

#### UTILISER CE MEDICAMENT AVEC PRECAUTION :

- Certains enfants atteints d'affections chroniques peuvent nécessiter un traitement à long terme bien que cela ne soit pas recommandé.
- Un traitement par inhibiteurs de la pompe à protons pourrait légèrement augmenter le risque d'infection.

## 4. COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

### a) POSOLOGIE USUELLE

#### • Adulte :

Traitement des ulcères duodénaux : 1 à 2 gélules de BELMAZOL® 20 mg par jour pendant 2 à 4 semaines.  
Prévention des récidives des ulcères duodénaux : 1 à 2 gélules de BELMAZOL® 20 mg par jour.

Traitement des ulcères de REFLUX : 1 à 2 gélules de BELMAZOL® 20 mg par jour pendant 4 à 8 semaines.

répondeurs : 1 à 2

le :

100 mg, chacun 2 fois

ronidazole 400 mg (ou

métronidazole 400 mg

semaine,

répéte.

AINS : 1 gélule de

5 chez les patients à

écédent d'hémorragie

maines.

ar reflux : la dose peut

MALZOL® 20 mg par jour

les posologies supérieures à

65.

#### • Enfant :

Enfant de plus de 1 an et 10 - 20 kg :

Traitement symptomatique du pyrosis et des régurgitations acides en cas de reflux gastro-oesophagien : la posologie recommandée est de 10 à 20 mg 1 fois par jour pendant 2 à 4 semaines.

Oesophage par reflux : la posologie recommandée est de 10 à 20 mg 1 fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

Enfant de plus de 2 ans et > 20 kg :

Traitement symptomatique du pyrosis et des régurgitations acides en cas de reflux gastro-oesophagien : la posologie recommandée est de 20 à 40 mg 1 fois par jour pendant 2 à 4 semaines.

(Oesophage par reflux : la posologie recommandée est de 20 à 40 mg 1 fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

Adolescent et enfant de plus de 4 ans :

Traitement de l'ulcère duodénal associé à une infection par H.pylori :

Poids (15-30 kg) : oméprazole 10 mg + amoxicilline 25 mg/kg de poids corporel + clarithromycine 7,5 mg/kg de poids corporels sont administrés simultanément 2 fois par jour pendant une semaine.

Poids (31-40 kg) : oméprazole 20 mg + amoxicilline 750 mg + clarithromycine 7,5 mg/kg de poids corporels administrés simultanément 2 fois par jour pendant une semaine.

Poids (> 40 kg) : oméprazole 20 mg + amoxicilline 1 g + clarithromycine 500 mg administrés simultanément 2 fois par jour pendant une semaine.

#### • Population particulière :

Insuffisants rénaux : aucun ajustement posologique n'est nécessaire.

Insuffisants hépatiques : une dose journalière de 10 mg-20 mg peut suffire.

Sujets âgés (> 65 ans) : aucune adaptation posologique n'est nécessaire.

DANS TOUS LES CAS VOUS DEVREZ VOUS CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

### b) VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Voie orale.







# ALDACTAZINE®



spironolactone, altizide

## **Aldactazine®**

20 Comprimés effervescents



LOT N° :

B21818

UT. AV. :

03/2020 P.P.V: 39 30

6 118000 250517

Durétérique thiazidique et diurétique  
(C: système cardiovasculaire).

P10020326

### **2. DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT**

Ce médicament est une association de deux diurétiques préconisée dans le traitement de :  
- Hypertension artérielle.  
- Edèmes d'origine rénale, cardiaque et hépatique.

### **3. ATTENTION !**

#### **a. DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT (CONTRE-INDICATIONS)**

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Insuffisance rénale grave ;
- Insuffisance hépatique grave ;
- Hyperkaliémie ;
- Allergie à l'un des constituants de ce médicament ;
- Association à d'autres diurétiques épargneurs de potassium (sauf en cas d'hypokaliémie).  
**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

#### **b. MISES EN GARDE SPECIALES**

En cas d'atteinte hépatique, les diurétiques thiazidiques et apparentés peuvent induire une encéphalopathie hépatique. Dans ce cas, l'administration du diurétique doit être immédiatement interrompue.

#### **c. PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Dans certaines situations pathologiques comme les troubles hépatiques, le diabète, la goutte, les maladies rénales, votre médecin peut être amené à vous prescrire des examens paracliniques (prise de sang).

Compte tenu de l'effet diurétique de ce médicament, il est préférable d'éviter de reprendre la dernière prise tard dans la journée afin d'éviter d'éventuels réveils nocturnes.

**EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

#### **d. INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS**

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A

# ALDACTAZINE®



spironolactone, altizide

## **Aldactazine®**

20 Comprimés effervescents



LOT N° :

B21818

UT. AV. :

03/2020 P.P.V: 39 30

6 118000 250517

Durétérique thiazidique et diurétique  
(C: système cardiovasculaire).

P10020326

### **2. DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT**

Ce médicament est une association de deux diurétiques préconisée dans le traitement de :  
- Hypertension artérielle.  
- Edèmes d'origine rénale, cardiaque et hépatique.

### **3. ATTENTION !**

#### **a. DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT (CONTRE-INDICATIONS)**

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Insuffisance rénale grave ;
- Insuffisance hépatique grave ;
- Hyperkaliémie ;
- Allergie à l'un des constituants de ce médicament ;
- Association à d'autres diurétiques épargneurs de potassium (sauf en cas d'hypokaliémie).  
**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

#### **b. MISES EN GARDE SPECIALES**

En cas d'atteinte hépatique, les diurétiques thiazidiques et apparentés peuvent induire une encéphalopathie hépatique. Dans ce cas, l'administration du diurétique doit être immédiatement interrompue.

#### **c. PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Dans certaines situations pathologiques comme les troubles hépatiques, le diabète, la goutte, les maladies rénales, votre médecin peut être amené à vous prescrire des examens paracliniques (prise de sang).

Compte tenu de l'effet diurétique de ce médicament, il est préférable d'éviter de reprendre la dernière prise tard dans la journée afin d'éviter d'éventuels réveils nocturnes.

**EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

#### **d. INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS**

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A

# ALDACTAZINE®



spironolactone, altizide

## **Aldactazine®**

20 Comprimés effervescents



LOT N° :

B21818

UT. AV. :

03/2020 P.P.V: 39 30

6 118000 250517

P10020326

Diurétique thiazidique et diurétique  
(C: système cardiovasculaire).

### **2. DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT**

Ce médicament est une association de deux diurétiques préconisée dans le traitement de :  
- Hypertension artérielle.  
- Edèmes d'origine rénale, cardiaque et hépatique.

### **3. ATTENTION !**

#### **a. DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT (CONTRE-INDICATIONS)**

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Insuffisance rénale grave ;
- Insuffisance hépatique grave ;
- Hyperkaliémie ;
- Allergie à l'un des constituants de ce médicament ;
- Association à d'autres diurétiques épargneurs de potassium (sauf en cas d'hypokaliémie).  
**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

#### **b. MISES EN GARDE SPECIALES**

En cas d'atteinte hépatique, les diurétiques thiazidiques et apparentés peuvent induire une encéphalopathie hépatique. Dans ce cas, l'administration du diurétique doit être immédiatement interrompue.

#### **c. PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Dans certaines situations pathologiques comme les troubles hépatiques, le diabète, la goutte, les maladies rénales, votre médecin peut être amené à vous prescrire des examens paracliniques (prise de sang).

Compte tenu de l'effet diurétique de ce médicament, il est préférable d'éviter de reprendre la dernière prise tard dans la journée afin d'éviter d'éventuels réveils nocturnes.

**EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

#### **d. INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS**

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A

# ALDACTAZINE®



spironolactone, altizide

## **Aldactazine®**

20 Comprimés effervescents



LOT N° :

B21818

UT. AV. :

03/2020 P.P.V: 39 30

6 118000 250517

P10020326

Diurétique thiazidique et diurétique  
(C: système cardiovasculaire).

### **2. DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT**

Ce médicament est une association de deux diurétiques préconisée dans le traitement de :  
- Hypertension artérielle.  
- Edèmes d'origine rénale, cardiaque et hépatique.

### **3. ATTENTION !**

#### **a. DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT (CONTRE-INDICATIONS)**

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Insuffisance rénale grave ;
- Insuffisance hépatique grave ;
- Hyperkaliémie ;
- Allergie à l'un des constituants de ce médicament ;
- Association à d'autres diurétiques épargneurs de potassium (sauf en cas d'hypokaliémie).  
**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

#### **b. MISES EN GARDE SPECIALES**

En cas d'atteinte hépatique, les diurétiques thiazidiques et apparentés peuvent induire une encéphalopathie hépatique. Dans ce cas, l'administration du diurétique doit être immédiatement interrompue.

#### **c. PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Dans certaines situations pathologiques comme les troubles hépatiques, le diabète, la goutte, les maladies rénales, votre médecin peut être amené à vous prescrire des examens paracliniques (prise de sang).

Compte tenu de l'effet diurétique de ce médicament, il est préférable d'éviter de reprendre la dernière prise tard dans la journée afin d'éviter d'éventuels réveils nocturnes.

**EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

#### **d. INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS**

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A





A standard linear barcode is positioned at the top left of the label.

• 6 118001 101214

**OLMETEC® 20 mg**  
30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA,  
41, rue Mohamed DIOURI, Casablanca  
Pharmacien Responsable  
AMINA DAOUDI  
**PPV: 252,00 DH**

A standard linear barcode is positioned at the top left of the label.

• 6 118001 101214

**OLMETEC® 20 mg**  
30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA,  
41, rue Mohamed DIOURI, Casablanca  
Pharmacien Responsable  
AMINA DAOUDI  
**PPV: 252,00 DH**

A standard linear barcode is positioned at the top left of the label.

• 6 118001 101214

**OLMETEC® 20 mg**  
30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA,  
41, rue Mohamed DIOURI, Casablanca  
Pharmacien Responsable  
AMINA DAOUDI  
**PPV: 252,00 DH**



# مصحة أمراض القلب الدار البيضاء - الوازيس CLINIQUE Cardiologique Casa-Oasis

Cardiologie / Cardiologie Interventionnelle / Radiologie Vasculaire Interventionnelle  
Chirurgie Cardio Vasculaire et Thoracique  
Coro-Scanner / 128 barrettes

25.12.2019

الدكتور محمد علاوي

Dr. Mohamed ALLAOUI

CARDIOLOGUE

DES de Cardiologie  
et

Pathologie Vasculaire  
de la Faculté  
de

Médecine de PARIS

Ancien Interne  
des

Hôpitaux de NANCY

Membre de la Société  
Française de Cardiologie

Mme HARTOUN Elm Poudia

- NF, plg.
- glycémie à Jeun.
- TSH.
- ionogramme.
- uree, créat.
- vit. D.
- CRP.

LABORATOIRE HAY HASBANI  
Dr. Samira BEN BRAHIM  
Imm. B2d N°1 Bd. Ibn Sina Hay Hassani  
Tél: 0522 69 69 87 - 0522 94 32 21

CLINIQUE CARDIOLOGIQUE  
CASA - OASIS  
Tél: 0522 98 07 06 - Fax: 0522 98 25 25  
20, Rue de France Ville - Oasis - Casablanca

Dr. Mohamed ALLAOUI  
20, Rue France Ville - Oasis  
Casa - Tel: 0522 98 07 06

# LABORATOIRE HAY HASSANI

D'analyses Médicales et Biologiques

Immeuble B28, RDC N° 1, Bd. Ibn Sina - Hay Hassani - Casablanca

## Note d'honoraire

Honoraire N°: 2019-007477

Date 30/12/2019

Patient Mme HARTOUN EI Miloudia

Date Prélèvement : 30/12/2019

Analyses	Valeur en B	Montant
HEMOGRAMME : NFS + PLQ	80	107,20
CRP : PROTEINE-C REACTIVE	100	134,00
GLYCEMIE A JEUN	30	40,20
UREE	30	40,20
CREATININE	30	40,20
IONOGRAMME SANGUIN	160	214,40
TSH-US : THYREOSTIMULINE-HORMONE	250	335,00
VITAMINE D-25-Hydroxy-vitD ( 25 OH D2+D3 )	450	603,00
<b>Total B</b>	1130	1 514,20
<b>APB</b>	1,5	25,00
<b>Majoration de garde</b>		
<b>Total</b>		1 539,20

Note d'honoraire: Mille cinq cent trente-neuf dirhams 20 centimes\*\*\*





Dr. Samira BENBRAHIM  
 Pharmacien Biologiste  
 Diplôme Université Paris Descartes  
 DU Assurance de la qualité en biologie médicale  
 DU Auditeur qualité en biologie médicale

التحاليل الطبية  
 مختبر  
 الحي الحسني

Casablanca, le : 30/12/2019  
 Dossier N° : 301219-034



\*\*\*

Nom : Mme HARTOUN El Miloudia

Code Patient : 15-00313 Prélèvement du: 30/12/2019 09:13:

Demandé par Dr : ALLAOUI Mohamed

## Compte rendu d'analyses

Page : 1/2

### ANALYSES D'HEMATOLOGIE

Valeurs Usuelles

#### HEMOGRAMME : NFS + PLQ

Globules rouges	:	3,66	10 <sup>6</sup> /uL	( 4 - 5,3 )
Hémoglobine	:	11,00	g/dl	( 12,5 - 15,5 )
Hématocrite	:	32,30	%	( 37 - 46 )
VGM	:	88,25	fL	( 80 - 95 )
TCMH	:	30,05	pg	( 28 - 32 )
CCMH	:	34,06	g/dl	( 30 - 35 )
Plaquettes	:	251	10 <sup>3</sup> /uL	( 160 - 350 )
Globules blancs	:	8420	/uL	( 4000 - 10000 )

#### Formule sanguine

Neutrophiles	:	61 %	5136,00 /mm <sup>3</sup>	( 2000 - 7500 )
Eosinophiles	:	3,8 %	320,00 /mm <sup>3</sup>	( 100 - 400 )
Basophiles	:	0,2 %	17,00 /mm <sup>3</sup>	( Inférieur à 100 )
Lymphocytes	:	24,5 %	2063,00 /mm <sup>3</sup>	( 1500 - 4000 )
Monocytes	:	10,5 %	884,00 /mm <sup>3</sup>	( 200 - 800 )

LABORATOIRE HAY HASSANI  
 Dr. Samira BENBRAHIM  
 Immeuble B28 RDC 1, Boulevard Ibn Sina - Hay Hassani  
 Tél: 0522 89 69 87 - 0522 93 32 21  
 Fax: 0522 89 69 83

Immeuble B28, RDC N° 1, Boulevard Ibn Sina, Hay Hassani - Casablanca ( à coté dar El Hamra)  
 Tél. : 05 22 89 69 87 / 05 22 93 32 21 - Fax : 05 22 89 69 88

R.C. : 272 254 T.P. : 35001675 LS. : 51400810 TVA : 751107 CNSS : 6067195 ICE : 0004 99965 000047 INPE : 093 001 261



Dr. Samira BENBRAHIM  
Pharmacien Biologiste  
Diplôme Université Paris Descartes  
DU Assurance de la qualité en biologie médicale  
DU Auditeur qualité en biologie médicale

مختبر  
التحاليل الطبية  
الحي الحسني

Dossier N° : 301219-034

Mme HARTOUN El Miloudia

Page : 2/2

### ANALYSES DE BIOCHIMIE (SANG)

#### Valeurs Usuelles

CRP : PROTEINE-C REACTIVE	:	5,00	mg/l	( Inférieur à 6 )
GLYCEMIE A JEUN	:	1,52	g/l	( 0,7 - 1,05 )
		8,44	mmol/l	( 3,89 - 5,83 )
UREE	:	0,36	g/l	( 0,15 - 0,39 )
		6,00	mmol/l	( 2,5 - 6,5 )
CREATININE	:	13,40	mg/l	( 6 - 13 )
		118,59	μmol/l	( 53,1 - 97,35 )

### IONOGRAMME SANGUIN



PROTIDES TOTAUX	:	72,00	g/l	( 64 - 83 )
SODIUM	:	138,60	mmol/l	( 135 - 145 )
POTASSIUM	:	4,63	mmol/l	( 3,5 - 5,5 )
CHLORE	:	106,10	mmol/l	( 98 - 108 )
RESERVE ALCALINE	:	22,00	mmol/l	( 22 - 29 )
CALCIUM	:	95,70	mg/l	( 85 - 108 )
		2,39	mmol/l	( 2,15 - 2,58 )

### ANALYSES HORMONALES

#### Valeurs Usuelles

TSH-us : Thyréostimuline-Hormon (Technique : Immunoenzymatique)	:	1,65	μUI/ml	( 0,25 - 5 )
--	---	------	--------	--------------

### VITAMINES

#### Valeurs Usuelles

VITAMINE D-25-Hydroxy-vitD ( 25 OH D2+D3 ) (Technique : ELFA sur MiniVidas)	:	12,70	ng/ml	
		31,75	nmol/l	

Déficient : < 20 ng/ml  
Insuffisant : 20 - 29 ng/ml  
Suffisant : 30 - 100 ng/ml  
Toxicité potentielle : > 100 ng/ml

Le Biogiste  
LABORATOIRE HAY HASSANI  
Dr. Samira BENBRAHIM  
Imm. B28 N° 1, Boulevard Ibn Sina, Hay Hassani  
Tél : 0522 96 69 87 / 0522 93 32 21  
Fax : 0522 96 69 88

Immeuble B28, RDC N° 1, Boulevard Ibn Sina, Hay Hassani - Casablanca ( à coté dar El Hamra)  
Tél. : 05 22 89 69 87 / 05 22 93 32 21 - Fax : 05 22 89 69 88

R.C. : 272 254 T.P. : 35001675 LS. : 51400810 TVA : 751107 CNSS : 6067195 ICE : 0004 99965 000047 INPE : 093 001 261



# مصحة أمراض القلب الدار البيضاء - الوازيس CLINIQUE Cardiologique Casa-Oasis

Cardiologie / Cardiologie Interventionnelle / Radiologie Vasculaire Interventionnelle  
Chirurgie Cardio Vasculaire et Thoracique  
**Coro-Scanner / 128 barrettes**

Casablanca, le 25 Décembre 2019

Mme HARTOUN El Miloudia

FACTURE N 03835/19

Arrêtée la présent facture à la somme de :  
**Deux Cent cinquante dirhams (250,00 dhs)**

~~Dr. Mohamed ALZAOUI~~  
Cardiologue  
20, Rue Frantz Joffre - Oasis  
Casablanca - Tel: 0522 98 07 06

20, Rue de France Ville d'Avray - Case 25  
Tél. 01 52 98 07 06 - Fax 01 52 98 83 25

HADOUR  
ID:  
D-naiss  
ans,

25-Déc-2019 10:30:55

Fréq. Card. 60 BPM  
Int PR: 199 ms  
Dur.QRS 102 ms  
QT/QTc 408/410 ms  
Axes P-R-T 66 9 97

EL MELLOUDI

14115f

CLINIQUE CASA OASIS - CARDIOLOGIQUE  
Tél: 0522 98 07 06 Fax: 0522 98 25 25  
20, Rue de l'Industrie Ville Ouled - Casablanca - Maroc

