

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

N°D
14981

Déclaration de Maladie : N° P19-0019189

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2279 Société : RAM
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : BENMAKHLOUF Rachid Date de naissance : 29/03/54
Adresse : 294 AMELKUS II NAKHIL 8th RAK
Tél. : 0661311629 Total des frais engagés : 2645,20 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

CARDIOLOGUE
Rue 2 N°61 - 1er Etage RP Chahdia - El Oulfa
Tél : 05 22 91 07 62 - 05 04 72 39 14
INP: 01472070

Date de consultation : 15/10/2019
Nom et prénom du malade : BENMAKHLOUF Rachid Age :
Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie : HTA
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
Date : 02 JAN 2020

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : NAKHIL 8th RAK Le : 05/12/2019
Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
15/10/19	ECG		25000	Dr. Mehdi BENSALAH CARDIOLOGUE Rue 2, N°61 - 1er Etage Rd. - Casablanca Tél: 05 22 91 07 52 - 05 04 72 39 14 INPE: 04170379

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE ASSIA Docteur en Pharmacie 219, Bd. Allal El Fassi Unité 4 Daoudiate Marrakech - Tél : 05 21 20 18 44 INPE : 07201844	15/10/19	1645,20 DHs

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Dr. Mehdi BENSALAH CARDIOLOGUE Rue 2, N°61 - 1er Etage Rd. - Casablanca Tél: 05 22 91 07 52 - 05 04 72 39 14 INPE: 04170379	17/10/19	ECG	1500 DH

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'OD

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE H 25533412 00000000 D 00000000 35533411 H 21433552 00000000 G 00000000 11433553 B			Coefficient DES TRAVAUX
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



CLINIQUE CARDIOLOGIQUE FRANCEVILLE

مصلحة القلب والشرابين فرانس فيل

BENTAKHLOUF
RAHID

Casablanca le 15/10/13

1) Bimerekensa 1/2g

182,80 X 9

Dr. Mehdi BENJELLOUN
CARDIOLOGUE
Rue 2, N°61 - 1er Etage BP Chaboula - El Oulfa
Tél: 05 22 91 07 62 - 05 24 72 39 14
INPE: 81170670

= 1645,20



الدكتور مهدي بنجلون
Dr. Mehdi BENJELLOUN
CARDIOLOGUE
Rue 2, N°61 - 1er Etage BP Chaboula - El Oulfa
Tél: 05 22 91 07 62 - 05 24 72 39 14
INPE: 81170670

صيدلية أسيف
PHARMACIE ASSIF
Mme SESTI Farida
Docteur en Pharmacie
219, Bd. Allal El Fassi Unité 4 Daoudiate
Marrakech - Tél : 05 24 30 30 35

1 من کل 100 مریض)

1 من کل 100 مریض)

Figure 1

Bipreterax® 10

Arginine 10 mg / 2,5 mg

Comprimés pelliculés
Péridopril arginine / Indapamide

30 Comprimés pelliculés



182,80

بيبريتيراكس أرجينين

بيراندوبريل أرجينين / إنداباميد

اقرأ بَدقة هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء . لأنها تحتوي على معلومات هامة لك .

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج استئذنها من جديد .
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى استأطب أو الصيدلاني .
- لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً - فلا يجوز إطلاقاً إعطاؤه لشخص آخر ، حتى وإن كانت الأعراض متشابهة ، فقد تلحق به الضرر .
- إذا شعرت بأي آثار جانبية تكلم مع الطبيب أو الصيدلاني . هذا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المرغوبة بها في هذه النشرة (انظر

في هذه النشرة :

1. ما هو بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ ، حبات ملبسة وفي أية حالة يستعمل ؟
2. ما هي المعلومات المفروضة معرفتها قبل أخذ بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ ، حبات ملبسة ؟
3. كيف يؤخذ بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ ، حبات ملبسة ؟
4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة ؟
5. كيف يحفظ بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ ، حبات ملبسة ؟
6. محتوى العبوة ومعلومات إضافية .

1. ما هو بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ ، حبات ملبسة وفي أية حالة يستعمل ؟
 فئة العلاجية: هيدلالية - البيروندوبريل ومزرات البول ، كود C09BA04 : ATC .
 بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ عبارة عن مزيج من مادتين فاعلتين : البيروندوبريل والإنداباميد . وهو مفاد لإرتفاع الضغط الشرياني ، ويوصف لعلاج إرتفاع الضغط الشرياني .
 يوصف بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ للمصابين بواسطة البيروندوبريل 10 ملغ وبواسطة الإنداباميد 2,5 ملغ على حدة . فليكناهم ، عوضاً عن ذلك ، أن يأخذوا حبة واحدة من بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ حيث أنها تحتوي على هاتين المادتين الفاعلتين .
 ينتمي البيروندوبريل إلى صنف مشتقات خميرة تحوّل الأنجيوتنسين (IEC) . وتقوم هذه المادة بتوسيع الأوعية الدموية مسهلة بعد عمل القلب في مع الدم .
 إن الإنداباميد من البول ، وإن مزرات البول ترفع مقدار البول الصادر عن الكليتين . لكن الإنداباميد مختلف عن بقية مزرات البول ، بحيث أنه رغم مقدار البول بدرجة ضئيلة . بهذا تقوم هاتين المادتين الفاعلتين في تخفيض الضغط الشرياني وتعملان معاً بالتآزر .

2. ما هي المعلومات المفروضة معرفتها قبل أخذ بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ ، حبات ملبسة ؟

إن يجب وأعلمك طبيبك بعدم استعمالك لبعض أنواع السكاكر ، عليك باستشارته قبل المباشرة بأخذ هذا الدواء .
 لا يجوز استعمال بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ ، حبات ملبسة ، في الأوضاع التالية :
 • إن كانت لك حساسية من مادة البيروندوبريل ، أو من صنف آخر لمشتقات خميرة التحوّل ، أو من الإنداباميد ، أو من أي مساعدين آخر ، أو من أية مادة أخرى تدخل في تركيب هذا الدواء (انظر إلى ملف معلومات) :
 • مرضى العيوب ومعلومات إضافية) :
 • إن سبق وحصولك أعراض كالصداع في التنفس ، أو تضخم جانبي للصدر أو للسان ، أو حكة في معك جلدي شديدة ، تحدث عن مداوة سابقة بواسطة مشتقات خميرة التحوّل (IEC) ، أو إن كانت لك الأعراض (الصداع والبؤمة الوعائية أو بؤمة مقدار البول كوينك (redème de Quincke) قد سبق وحصولك في أي وضع آخر لك أو لأحد أفراد عائلتك .
 • إن كنت مصاباً بمرض السكري أو تشكو من داء كولي وتلقى علاجاً خاصاً لضغط الدم يحتوي على الأيسوكرين (Falskiren) ، أو تشكو من داء كولي وتلقى علاجاً خاصاً لضغط الدم يحتوي على الأيسوكرين (Falskiren) ،
 • إن كنت تشكو من قصور الكبد الشديد أو إن كنت تشكو من الحالة المسماة بالإحتلال الدمغي (الكبدية) (اضطرابات هضمية شديدة ناتجة عن الإصابة بالكبدية الشديدة) ،
 • إن كنت مصاباً بداء كولي سليم أو مع استئصال تدفق الدم إلى الكلى (تضيق في الشريان الكلوي أي الشريان الذي يروي الكلى بالدم) ،
 • إن كنت تشكو من تضخم لتحال الدم أو لديك طريقة أخرى لتصفية الدم . يمكن أن لا يتلائم بيريتيراكس مع الحالة المستعملة .

• إن كانت مقاييس اليوسايم في دمك فائقة الانخفاض ،
 • إن كنت تشكو بإصابتك بالصدور القلبي المرعاع (مع إيجابية ماني فائق وضيق في التنفس) ،
 • إن كنت تشكو من مشاكل أكثر من ثلاثة أشهر ، حيث ينبغي أيضاً تجنب بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ عند تناول الحمل (انظر إلى ملف معلومات وإرشادات) ،
 • إن كنت مرضع .

• إن كنت تتناول حاليًا بيكيتوكريل وفارسانز ، دواء يستعمل لعلاج قصور القلب (انظر إلى ملف معلومات وإرشادات) ،
 • إن كنت تتناول حاليًا بيكيتوكريل وفارسانز ، دواء يستعمل لعلاج قصور القلب (انظر إلى ملف معلومات وإرشادات) ،
 • إن كنت تشكو من ضغط الدم أو من الإصابة بالتهتك (أي تضيق في الشريان الرئسي للقلب) ، أو إعتلال عضلي قلبي شحامي (إصابة عضلية لبري) (أي تضيق في الشريان الكلوي) (أي تضيق في الشريان الذي يروي الكلية بالدم) ،
 • إن كنت تشكو من قصور أو أي خلل قلبي ،
 • إن كنت تشكو من داء كولي أو إن كنت خاضعاً لتحال الدم .
 • إن كنت تشكو من إرتفاع معدل هرون الكوليسترول في الدم ، بشكل غير طبيعي (كوليستيرولية الأولية) ،
 • إن كنت تشكو من إعتلال كبدية .

• إن كنت تشكو من داء كولي جنيني (إصابة جلدية) ، مثل الداء الحمضي المجموعي ، أو التصلب الجلدي .
 • إن كنت تشكو من التصلب العصيدي (أي تصلب الشرايين) .
 • إن كنت تشكو من فرط الدرقية (أي خلل في الغدة الدرقية) .
 • إن كنت مصاباً بالتهتك .
 • إن كنت مصاباً بداء السكري .
 • إن كنت خاضعاً للحمية من اللعق وتتبع بدلاً من حمود تحتوي على اليوسايم .
 • إن كنت تتناول حاليًا اليوسايم أو مستمداً الذي الكاذبة اليوسايم (spironolactone أو triamterene) أو مكملات اليوسايم لأن استعمالهم في نفس الوقت مع بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ (انظر إلى ملف معلومات وأدوية أخرى وبيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ ، حبات ملبسة) .

• إن كنت سناً .
 • إن كنت مصاباً بارتفاعات حمضية ضوئية ،
 • إن أصبت بتهتلات لحمية خطيرة ترافق بتورم الوجه والشفين والعم واللسان أو اليوسايم الذي قد يصيب عضوية في القلب (رزمة وعائية) ، والذي قد يحدث في أي وقت أثناء العلاج ،
 • إن كنت تشكو من تضخم في الكلى .

- بيريديل (علاج الذئبة الصغرية) .
- مسلولين (علاج الدخان) .
- الأدوية المستعملة في علاج خلل في
- isopramide , amiodarone , sotalol
- ميزابريد ، دافيناميل) تستعمل لعلاج
- ديفوكسين digoxine أو غيره من الأدوية
- باكوفين baclofen (علاج تيس العم)
- تيرازولام tetracalcin (علاج مزاج)
- ديفوكسين (علاج حالات الحمى) ،
- موشعات الأوعية الدموية ما قبل الت-
- (الدوية) .
- الأدوية المستعملة في علاج هبوط الضغط الشرياني
- إيفيدرين أو نورأدريتين أو أورثانين ،
- بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ حبات ملبسة
- من المستحسن أخذ بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ قبل
- الحبل والإصراع :
- إذا كنت حاملاً أو مرضعاً ، أو تعتقدن بأنك حامل أو تخططين
- الصيدلاني قبل المباشرة بتناول أي دواء .
- الحمل :
- فقد يقلب طبيبك التوقف عن أخذ بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ عند حمل أو وقوع الحمل أو
- حال ظهور الحمل ، وقد وصف لك دواء آخر بدلاً من بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ .
- لا ينبغي بأخذ بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ خلال الأشهر الثلاثة الأولى للحمل ، كما
- ينظر أخصاً قطعاً بعد حدوث الثالث للحمل ، حيث أنه يشكل خطراً على الجنين .
- الإرضاع :
- لا يجوز استعمال بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ لدى المرأة المرض . وإن كنت مصغمة
- على الإرضاع ، فحسب يختار لك طبيبك علاجاً آخر ، وخاصة إن كان طفلك حديث الولادة أو
- إن كانت ولادة مبكرة .
- راجعي طبيبك حالاً بعد الفدان .
- بالنسبة لقيادة السيارات أو العمل على الآلات :
- رغم أن بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ لا يؤثر على اليقظة ، بينما أن التفاعلات الدوائية
- الشائعة لإعطاء ضغط الشرياني قد تؤدي إلى الإحساس بالدوخة أو بالإرهاق لدى بعض
- الأشخاص . لذا فقد ينبغي هذا في هذه الفترة على قيادة السيارات أو العمل على الآلات .
- يحتوي بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ ، حبات ملبسة على سكر الشرايين (السكر) .
- إذا اخترت الطبيب بأنكم تعاون من عدم استعمالك لنوع من السكر المرجو اختياره قبل أخذ
- هذا الدواء .

3. كيف يؤخذ بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ ، حبات ملبسة ؟
 يجب دائماً الالتزام بتناول هذا الدواء بالطريقة التي وصفها لك طبيبك . وإن لم تكن متأكدًا ، عليك باستشارة طبيبك .
 إن الجرعة الموصى بها عبارة عن حبة واحدة في اليوم . يُتبع الحثمة مع كأس من الماء مرة واحدة في اليوم ،
 وإذا شعرت بأعراض أو أعراض أخرى ، فراجع طبيبك .
 إذا تناولت أقراصاً أو حباتاً أو سيجتي من بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ حبات ملبسة :
 • فارجو الإصرار على أخذها مع الماء أو عصير الفوا .
 • إن طرأ وألمت عند حبات ، فارجو فوراً بطيخك أو بأقرب مستشفى للطوارئ .
 • فافكر ما حصل ودوم في حال الإضرار بالجرعة ، مع هبوط الضغط الشرياني (مع الإحساس بالغثاء) ،
 • والإقياء ، والتشنجات والدوخة والغثاس ، ووجع الأرتاك ، وتغير في كمية البول الناتج من الكليتين .
 • ويمكن معالجة كل بتعديدها للغثاس مع دواء الساقين للأعلى .
 • في حال الشعور عن تناول بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ حبات ملبسة :
 • من الهام جداً أخذ الدواء يوماً بيوماً منتظمة ، وإن جوده الفعالية تابعة لتناولها المنتظم . فإن

سهوت عن أخذ جرعة بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ ، عليك بأخذ الجرعة العادية في اليوم التالي .
 • فلا يجوز أبداً إقطاع أخذ حبات إضافية لتعويض عن سوء .
 • في حال التوقف عن أخذ بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ حبات ملبسة :
 • حيث أن الدوائية عند إرتفاع الضغط الشرياني علاج طويل المدى ، عليك بالظفر مع طبيبك بامر

التوقف عن العلاج .
 • وإن تسائلت بأي أمر تابع لإستعمال هذا الدواء ، عليك بطبيبك المزيد من المعلومات لدى الطبيب أو الصيدلاني .
 • ما هي الآثار الجانبية المحتملة ؟
 • كما هي الحال مع كافة الأدوية ، من الممكن أن يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية ، رغم أنها لا تصيب

دواء شديداً أو إصداً يسبب هبوط ضغط الدم (شائع - قد يصيب حتى 10 من مرضى) ،
 • تفتح نصفي (الإحساس بقى الصدر ، صغير أثناء التنفس) (غير شائعة - قد يصيب حتى 1 من 100 مرضى) ،
 • إن لا تتخذ حدوث أي من الآثار الجانبية الجسيمة التالية ، عليك بالتوقف عن أخذ هذا الدواء

Bipreterax® 10

Arginine 10 mg / 2,5 mg

Comprimés pelliculés
Péridopril arginine / Indapamide

30 Comprimés pelliculés



182,80

بيبريتيراكس أرجينين

بيراندوبريل أرجينين / إنداباميد

اقرأ بَدقة هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء . لأنها تحتوي على معلومات هامة لك .

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج استئذنها من جديد .
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى استأطب أو الصيدلاني .
- لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً - فلا يجوز إطلاقاً إعطاؤه لشخص آخر ، حتى وإن كانت الأعراض متشابهة ، فقد تلحق به الضرر .
- إذا شعرت بأي آثار جانبية تكلم مع الطبيب أو الصيدلاني . هذا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المرغوبة بها في هذه النشرة (انظر

في هذه النشرة :

1. ما هو بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ ، حبات ملبسة وفي أية حالة يستعمل ؟
2. ما هي المعلومات المفروضة معرفتها قبل أخذ بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ ، حبات ملبسة ؟
3. كيف يؤخذ بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ ، حبات ملبسة ؟
4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة ؟
5. كيف يحفظ بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ ، حبات ملبسة ؟
6. محتوى العبوة ومعلومات إضافية .

1. ما هو بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ ، حبات ملبسة وفي أية حالة يستعمل ؟
 فئة العلاجية: هيدلالية - البيروندوبريل ومزرات البول ، كود C09BA04 : ATC .
 بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ عبارة عن مزيج من مادتين فاعلتين : البيروندوبريل والإنداباميد . وهو مفاد لإرتفاع الضغط الشرياني ، ويوصف لعلاج إرتفاع الضغط الشرياني .
 يوصف بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ للمصابين بواسطة البيروندوبريل 10 ملغ وبواسطة الإنداباميد 2,5 ملغ على حدة . فليكناهم ، عوضاً عن ذلك ، أن يأخذوا حبة واحدة من بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ حيث أنها تحتوي على هاتين المادتين الفاعلتين .
 ينتمي البيروندوبريل إلى صنف مشتقات خميرة تحوّل الأنجيوتنسين (IEC) . وتقوم هذه المادة بتوسيع الأوعية الدموية مسهلة بعد عمل القلب في مع الدم .
 إن الإنداباميد من البول ، وإن مزرات البول ترفع مقدار البول الصادر عن الكليتين . لكن الإنداباميد مختلف من بقية مزرات البول ، بحيث أنه رفع مقدار البول بدرجة ضئيلة . بهذا تقوم هاتين المادتين الفاعلتين في تخفيض الضغط الشرياني وتعملان معاً بالتآزر .

2. ما هي المعلومات المفروضة معرفتها قبل أخذ بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ ، حبات ملبسة ؟

إن يجب وأعلمك طبيبك بعدم استعمالك لبعض أنواع السكاكر ، عليك باستشارته قبل المباشرة بأخذ هذا الدواء .

- لا يجوز استعمال بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ ، حبات ملبسة ، في الأوضاع التالية :
 • إن كانت لك حساسية من مادة البيروندوبريل ، أو من صنف آخر لمشتقات خميرة التحول ، أو من الإنداباميد ، أو من أي مساعيد آخر ، أو من أية مادة أخرى تدخل في تركيب هذا الدواء (انظر إلى ملاحظة 6) .
- محتوى العبوة ومعلومات إضافية) .
- إن سبق وحصولك أعراض كالصداع في التنفس ، أو تضخم جانبي للصدر أو للسان ، أو حكة في معك جلدي صفة ، تحدث عن مداوة سابقة بواسطة مشتقات خميرة التحول (IEC) ، أو إن كانت لك الأعراض (الصداع والبؤمة الوعائية أو بؤمة كوينك redème de Quincke) قد سبق وحصولك في أي وضع آخر لك أو لأحد أفراد عائلتك .
- إن كنت مصاباً بمرض السكري أو تشكو من داء كولي وتلقى علاجاً خافضاً لضغط الدم يحتوي على الأيسرين (Falkiren) ،
- إن كنت تشكو من قصور الكبد الشديد أو إن كنت تشكو من الحالة المسماة بالإحتلال الدمغي (الكبدية) (اضطرابات عضوية جسيمة ناتجة عن الإصابة بالكبدية الشديدة) ،
- إن كنت مصاباً بداء كولي صفة أو مع اضطلال تدفق الدم إلى الكلى (تضيق في الشريان الكلوي أي الشريان الذي يروي الكبد) ،
- إن كنت تشكو من تضخم لتحال الدم أو لديك طريقة أخرى لتصفية الدم . يمكن أن لا يتلائم بيريتيراكس مع الحالة المسماة ،
- إن كانت مقاييس اليوسايم في دمك فائقة الانخفاض ،
- إن كنت تشكو بإصابتك بالصدور القلبي المرعاع (مع إيجابية ماني فالتن) وفي وقت (التنفس) ،
- إن كنت تشكو من مشاكل أكثر من ثلاثة أشهر ، حيث ينبغي أيضاً تجنب بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ عند تناول الحمل (انظر إلى ملاحظة 6) .
- إن كنت مريض .
- إن كنت تتناول حاليًا بيكيتيريل / فاسارتان ، دواء يستعمل لعلاج قصور القلب (انظر إلى ملاحظة 6) .
- إن كنت تشكو من اضطرابات واحتياطات

استشر مع طبيبك أو مع الصيدلاني قبل أخذ بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ :
 • إن كانت لك تضيق في الشريان الكلوي (أي تضيق في الشريان الذي يروي الكلى) ، أو إن كانت لك تضيق في الشريان الكلوي (أي تضيق في الشريان الذي يروي الكلى) ،
 • إن كنت تشكو من قصور في أي كلى صفة ،
 • إن كنت تشكو من داء كولي أو إن كنت تشكو من تضخم لتحال الدم .
 • إن كنت تشكو من إرتفاع معدل هرون الكوليسترول في الدم ، بشكل غير طبيعي (كوليسترولية الأولية) ،
 • إن كنت تشكو من إعتلال كبدية .
 • إن كنت تشكو من داء كولي جنيني (إصابة جلدية) ، مثل الداء الحمضي المجموعي ، أو التصلب الجلدي .
 • إن كنت تشكو من التصلب العصيدي (أي تصلب الشرايين) .
 • إن كنت تشكو من فرط الدرقية (أي خلل في الغدة الدرقية) .
 • إن كنت مصاباً بالصدور .
 • إن كنت مصاباً بداء السكري .

• إن كنت تشكو من ألم في اللع وتضخم بدلاً عنه مواداً تحتوي على اليوسايم .
 • إن كنت تتناول حاليًا الليثيوم أو تستعمل الكافيين الليثيوم (spironolactone أو triamterene) أو مكملات اليوسايم لأن استعمالهم في نفس الوقت مع بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ (انظر إلى ملاحظة 6) .
 • إن كنت تشكو من داء كولي أو إن كنت تشكو من تضخم لتحال الدم .
 • إن كنت تشكو من إرتفاع معدل هرون الكوليسترول في الدم ، بشكل غير طبيعي (كوليسترولية الأولية) ،
 • إن كنت تشكو من إعتلال كبدية .
 • إن كنت تشكو من داء كولي جنيني (إصابة جلدية) ، مثل الداء الحمضي المجموعي ، أو التصلب الجلدي .
 • إن كنت تشكو من التصلب العصيدي (أي تصلب الشرايين) .
 • إن كنت تشكو من فرط الدرقية (أي خلل في الغدة الدرقية) .
 • إن كنت مصاباً بالصدور .
 • إن كنت مصاباً بداء السكري .

- بيريتيل (علاج الدخية القصيرة) .
- مسهلين (علاج الدخان) .
- الأدوية المسجلة في علاج خلل في
- isopramide , amiodarone , sotalol
- ميزابريد ، دافيناميل) تستعمل لعلاج
- ديفوكسين digoxine أو غيره من الأدوية
- باكوفين baclofen (علاج تيس العم
- تيرازولام tetracalcin (علاج
- الكلسيوم ، أو فها كماليات الكلسيوم
- مضادات التهابات الغير ستيرويدية (مثل
- أمفوتريسين (مثل الأسيبرين) .
- أمفوتريسين B amphotericine B
- الأدوية المسجلة في علاج الاضطرابات
- مضاد الإكتئاب مثل التترايولام أو مضادات
- تيرازولام tetracalcin (علاج
- تيرازولام (علاج حالات العدوى) ،
- مبرومات الأوعية الدموية أو فها
- (الدوية) .
- الأدوية المسجلة في علاج خلل الضغط الشرياني
- إيفيدرين أو نورأدريالين أو أورثانين ،
- بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ حبات ملبسة
- من المستحسن أخذ بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ قبل
- الأكل والإصباح .

إذا كنت حاملًا أو مرضعًا ، أو تعتقدن بأنك حامل أو تخططين للخصول ، قبل المباشرة بتناول أي دواء .

الحمل :
 فقد يطلب منك طبيبك التوقف عن أخذ بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ حتى قبل ولوم الحمل أو حال ظهور الحمل ، وقد وصف لك دواء آخر بدلاً من بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ .
 لا ينبغي أخذ بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ خلال الأشهر الثلاثة الأولى للحمل ، كما ينظر لهذه الملاحظة بعد ظهور الثالث للحمل ، حيث أنه يشكل خطراً على الجنين .

الإرضاع :
 لا يجوز استعمال بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ لدى المرأة المرض . وإن كنت مصفحة على الإرضاع ، فحسب يختار لك طبيبك علاجاً آخر ، وخاصة إن كان طفلك حديث الولادة أو إن كانت ولادة مبكرة .

راجع طبيبك حالاً بعد الشان :
 بالنسبة لقيادة السيارات أو العمل على الآلات :
 رغم أن بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ لا يؤثر على اليقظة ، بينما أن التفاعلات الدوائية الشائعة لإعاضاض الضغط الشرياني قد تؤدي إلى الإحساس بالدوخة أو بالإرهاق لدى بعض الأشخاص . لذا فقد ينبغي هذا إلى فئة القدرة على قيادة السيارات أو العمل على الآلات .
 يحذر بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ ، حبات ملبسة على سكر الحليب (الكتير) .
 إذا استمر لك الطبيب بأنكم تعانون من عدم استيعاب لنوع من السكر المرجو استشارة قبل أخذ هذا الدواء .

3. كيف يؤخذ بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ ، حبات ملبسة ؟

حبات ملبسة الإرضاع يتناول هذه الدواء بالطريقة التي وصفها لك طبيبك . وإن لم تكن متأكدًا ، عليك باستشارة طبيبك .

الجرعة الموصى بها عبارة عن حبة واحدة في اليوم . يُتبع الخطة مع كأس من الماء مرة واحدة في اليوم ، مع أخذ مساعيد مسهلين .
 إذا تناولت أقراصاً أو حباتاً بيضاء من بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ حبات ملبسة :
 فارجو الإضطلاع على طبيبك أو الصيدلاني فوراً .

إن طرأ وأعلنت حبات ، حبات ، فوراً بطبيبك أو بأقرب مستشفى للطوارئ .
 فافكر ما حصل ودوم في حال الإرتفاع بالجرعة ، مع هبوط الضغط الشرياني (مع الإحساس بالغثاء والإفاه) ، والتشنجات والدوخة والغثاس ، ووجع الأرتاك ، وتغير في كمية البول المنتج من الكليتين .
 ويمكن معالجة كل تضخم لتحال الدم مع الساقين للأعلى .

في حال الشعور عن تناول بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ حبات ملبسة :
 من الهام جداً أخذ الدواء يوماً بيوماً منتظمة ، وإن جوده الفعالية تابعة للتداول المنتظم . فإن سهوت عن أخذ جرعة بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ ، عليك بأخذ الجرعة العادية في اليوم التالي .
 فلا يجوز أبداً إطلاقاً أخذ حبات إضافية تعويضاً عن سهو .

في حال التوقف عن أخذ بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ حبات ملبسة :
 حيث أن الدوائية قد إرتفاع الضغط الشرياني علاج طويل المدى ، عليك بالظفر مع طبيبك بأمر التوقف عن العلاج .
 وإن تسائلت بأي أمر تابع لإستعمال هذا الدواء ، عليك بطلب المزيد من المعلومات لدى الطبيب أو الصيدلاني .

4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة ؟
 كما هي الحال مع كافة الأدوية ، من الممكن أن يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية ، رغم أنها لا تصيب كافة الأشخاص .
 إن لا تلاحظ حدوث أي من الآثار الجانبية الجسيمة التالية ، عليك التوقف عن أخذ هذا الدواء والاستشارة فوراً :
 • دوار شديد أو إغماء يسبب هبوط ضغط الدم (شائع - قد يصيب حتى 10 من مرضى) ،
 • ضعف نصفي (الإحساس بقصر في الصدر ، صغير أثناء التنفس) (غير شائعة - قد يصيب حتى 1 من 100 مرضى) ،
 •

Bipreterax® 10

Arginine 10 mg / 2,5 mg

Comprimés pelliculés
Péridopril arginine / Indapamide

30 Comprimés pelliculés



182,80

بيبريتيراكس أرجينين

بيراندوبريل أرجينين / إنداباميد

اقرأ بَدقة هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء . لأنها تحتوي على معلومات هامة لك .

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج استئذنها من جديد .
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى استأطب أو الصيدلاني .
- لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً - فلا يجوز إطلاقاً إعطاؤه لشخص آخر ، حتى وإن كانت الأعراض متشابهة ، فقد تلحق به الضرر .
- إذا شعرت بأي آثار جانبية تكلم مع الطبيب أو الصيدلاني . هذا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المرغوبة بها في هذه النشرة (انظر

في هذه النشرة :

1. ما هو بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ ، حبات ملبسة وفي أية حالة يستعمل ؟
2. ما هي المعلومات المفروضة معرفتها قبل أخذ بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ ، حبات ملبسة ؟
3. كيف يؤخذ بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ ، حبات ملبسة ؟
4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة ؟
5. كيف يحفظ بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ ، حبات ملبسة ؟
6. محتوى العبوة ومعلومات إضافية .

1. ما هو بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ ، حبات ملبسة وفي أية حالة يستعمل ؟
 فئة العلاجية: هيدلالية - البيروندوبريل ومزرات البول ، كود C09BA04 : ATC .
 بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ عبارة عن مزيج من مادتين فاعلتين : البيروندوبريل والإنداباميد . وهو مفاد لإرتفاع الضغط الشرياني ، ويوصف لعلاج إرتفاع الضغط الشرياني .
 يوصف بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ للمصابين بواسطة البيروندوبريل 10 ملغ وبواسطة الإنداباميد 2,5 ملغ على حدة . فليكناهم ، عوضاً عن ذلك ، أن يأخذوا حبة واحدة من بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ حيث أنها تحتوي على هاتين المادتين الفاعلتين .
 ينتمي البيروندوبريل إلى صنف مشتقات خميرة تحوّل الأنجيوتنسين (IEC) . وتقوم هذه المادة بتوسيع الأوعية الدموية مسهلة بعد عمل القلب في مع الدم .
 إن الإنداباميد من البول ، وإن مزرات البول ترفع مقدار البول الصادر عن الكليتين . لكن الإنداباميد مختلف عن بقية مزرات البول ، بحيث أنه رغم مقدار البول بدرجة ضئيلة . بهذا تقوم هاتين المادتين الفاعلتين في تخفيض الضغط الشرياني وتعملان معاً بالتآزر .

2. ما هي المعلومات المفروضة معرفتها قبل أخذ بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ ، حبات ملبسة ؟

إن يجب وأعلمك طبيبك بعدم استعمالك لبعض أنواع السكاكر ، عليك باستشارته قبل المباشرة بأخذ هذا الدواء .
 لا يجوز استعمال بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ ، حبات ملبسة ، في الأوضاع التالية :
 • إن كانت لك حساسية من مادة البيروندوبريل ، أو من صنف آخر لمشتقات خميرة التحوّل ، أو من الإنداباميد ، أو من أي مساعدين آخر ، أو من أية مادة أخرى تدخل في تركيب هذا الدواء (انظر إلى ملاحظة : ملاحظة : محتوى العبوة ومعلومات إضافية) .
 • إن سبق وحصلت لك أعراض كالصداع في التنفس ، أو تضخم جانبي للشرية أو للسان ، أو حكة في معك جلدي شديدة ، تحدث عن مداوة سابقة بواسطة مشتقات خميرة التحوّل (IEC) ، أو إن كانت لك الأعراض (اللسان والبؤمة الزهرية) أو بؤمة كوينك (redème de Quincke) قد سبق وحصلت في أي وضع آخر لك أو لأحد أفراد عائلتك .
 • إن كنت مصاباً بمرض السكري أو تشكو من داء كولي وتلقى علاجاً خاصاً لضغط الدم يحتوي على الأيسوكرين (Falskiren) ، أو تشكو من داء كولي وتلقى علاجاً خاصاً لضغط الدم يحتوي على الأيسوكرين (Falskiren) ،
 • إن كنت تشكو من قصور الكبد الشديد أو إن كنت تشكو من الحالة المسماة بالإحتلال الدمغي (الكبدية) (اضطرابات عضوية جسيمة ناتجة عن الإصابة بالكبدية الشديدة) ،
 • إن كنت مصاباً بداء كولي سليم أو مع اضطلال تدفق الدم إلى الكلي (تضيق في الشريان الكلوي أي الشريان الذي يروي الكبد) ،
 • إن كنت تشكو من تضخم لتحال الدم أو لديك طريقة أخرى لتصفية الدم . يمكن أن لا يتلائم بيريتيراكس مع الحالة المسماة ،
 • إن كانت مقاييس اليوسايم في دمك فائقة الانخفاض ،
 • إن كنت تشكو بإصابتك بالصدور القلبي المرعاع (مع إيجابية مقياس فائق وضيق في التنفس) ،
 • إن كنت تشكو من داء كولي من ثلاثة أشهر ، حيث ينبغي أيضاً تجنب بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ منذ بدئت الحمل (انظر إلى ملاحظة : الحمل والإرضاع) ،
 • إن كنت مرضع .

• إن كنت تتناول حبات بيكسيكربيل وفازارنان ، دواء يستعمل لعلاج قصور القلب (انظر إلى ملاحظة : تداخلات وإحتياطات) ،
 • إن كنت تتناول حبات بيكسيكربيل وفازارنان ، دواء يستعمل لعلاج قصور القلب (انظر إلى ملاحظة : تداخلات وإحتياطات) ،
 • إن كنت تشكو من ضغط الدم أو من الصلابة قبل أخذ بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ :
 • إن كانت لك تضيق الشرايين (أي تضيق في الشريان الرئسي للقلب) ، أو إعتلال عضلي قلبي شخصي (إصابة عضلية في الشريان الذي يروي الكبد) أو تضيق في الشريان الذي يروي الكلى (القلب) ،
 • إن كنت تشكو من قصور أو أي خلل قلبي ،
 • إن كنت تشكو من داء كولي أو إن كنت تشكو من تضخم لتحال الدم .
 • إن كنت تشكو من إرتفاع معدل هرمون الكوليسترول في الدم ، بشكل غير طبيعي (كوليسترولية الأولية) ،
 • إن كنت تشكو من إعتلال كبدية .

• إن كنت تشكو من داء كولي جانبي (إصابة جلدية) ، مثل الداء الحماضي الجموعي ، أو التصلب الجلدي .
 • إن كنت تشكو من التصلب العصيدي (أي تصلب الشرايين) .
 • إن كنت تشكو من فرط الدرقية (أي خلل في الغدة الدرقية) .
 • إن كنت مصاباً بالصدور .
 • إن كنت مصاباً بداء السكري .

• إن كنت تشكو من ألم في اللع وتضخم بدليلاً عنه مواداً تحتوي على اليوسايم .
 • إن كنت تتناول حبات الليثيوم أو تستعمل مادة الكافيين الليثيوم (spironolactone أو triamterene) أو مكملات اليوسايم لأن استعمالهم في نفس الوقت مع بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ (انظر إلى ملاحظة : محتوى العبوة ومعلومات إضافية) ، والذي قد يحدث في أي وقت أثناء العلاج ، (ملاحظة : 2) .
 • إن كنت حائضاً .

• إن كنت مصاباً بارتفاعات حمضية ضوئية ،
 • إن أصبت بتضخمات لحمية خطيرة تترافق بتورم الوجه والشفين والعم واللسان أو بالعم الذي قد يصيب مجموعة في اليد (رمدية وضوئية) ، والذي قد يحدث في أي وقت أثناء العلاج ،

- بيريديل (علاج الذئبة الصغرية) .
- مسلويزين (علاج الدخان) .
- الأدوية المسجلة في علاج خلل في
- isopramide , amiodarone , sotalol
- ميزازوليد ، دافيناميل (تستعمل لعلاج
- ديفوكسين digoxine أو غيره من الأدوية
- باكوفين baclofen (علاج نيس العم
- تيرازوليد telmisartan (علاج ضغط
- الكلسيوم ، أو فها كماليات الكلسيوم
- مضادات التهابات الغير ستيرويدية (مثل
- أمفوتريسين (مثل الأحيويين) .
- أمفوتريسين B amphotericine B
- الأدوية المسجلة في علاج الإضطرابات
- مضاد الإكتئاب مثل التترايكلو أو مضادات
- تيرازوليد telmisartan (علاج ضغط
- تيرازوليد (علاج حالات العدوى) ،
- مبرومات الأوعية الدموية أو فها
- (الدوية) .
- الأدوية المسجلة في علاج حبوب الضغط الشرياني
- إيفيدرين أو نورأدريتين أو أورثانين ،
- بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ حبات ملبسة
- من المستحسن أخذ بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ قبل
- الحبل والإرضاع :

إذا كنت حاملاً أو مرضعاً ، أو تعتقدن بأنك حامل أو تخططين الصلابة قبل المباشرة بتناول أي دواء .

الحمل :
 فقد يطلب منك طبيبك التوقف عن أخذ بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ حتى قبل ولوج الحمل أو حال ظهور الحمل ، وقد وصف لك دواء آخر بدلاً من بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ .
 لا ينبغي أخذ بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ خلال الأشهر الثلاثة الأولى للحمل ، كما ينظر لهذه الملاحظة بعد ظهور الثالث للحمل ، حيث أنه يشكل خطراً على الجنين .

الإرضاع :
 لا يجوز استعمال بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ لدى المرأة المرضع . لأن كنت مصممة على الإرضاع ، فحسب يختار لك طبيبك علاجاً آخر ، وخاصة إن كان طفلك حديث الولادة أو إن كانت ولادته مبكرة .

راجع طبيبك حالاً بعد الشان :
 بالنسبة لقيادة السيارات أو العمل على الآلات :
 رغم أن بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ لا يؤثر على اليقظة ، بينما أن التفاعلات الدوائية الشائعة لإعطاء ضغط الشرياني قد تؤدي إلى الإحساس بالدوخة أو بالإرهاق لدى بعض الأشخاص . لذا فقد ينبغي هذا إلى فئة القدرة على قيادة السيارات أو العمل على الآلات .
 يحذر بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ ، حبات ملبسة على سكر الحليب (الكتان) .
 إذا اخترت الطبيب بأنك تعانين من عدم استعمال لنوع من السكر المرجو استعماله قبل أخذ هذا الدواء .

3. كيف يؤخذ بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ ، حبات ملبسة ؟

حبات ملبسة الإرضاع يتناول هذه الدواء بالطريقة التي وصفها لك طبيبك . لأن لم تكن متأكدًا ، عليك باستشارة طبيبك .
 إن الجرعة الموصى بها عبارة عن حبة واحدة في اليوم . يُتبع الحثية مع كأس من الماء مرة واحدة في اليوم ، مع أخذها مع وجبة الإفطار .
 إذا تناولت جرعة أكبر أو ينبغي مع بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ حبات ملبسة :
 إن فرغوا الإرضاع فليكنوا أو بالصليبي فوراً

إن فرغوا وأعلنت عدم حبات ، فوراً فليكنوا أو بالصليبي أو بأول مستشفى للطوارئ .
 فافكر ما حصل ودوم في حال الإرضاع بالجرعة ، مع هبوط الضغط الشرياني (مع الإحساس بالغثان والإفراة) ، والتشنجات والدوخة والغثان ، ووجعة الأرتاك ، وتغير في كمية البول المنتج من الكليتين .
 ويمكن معالجة كل بتعديدها للغثان ، مع السائقين للأعلى .

في حال الشعور عن تناول بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ حبات ملبسة :
 من الهام جداً أخذ الدواء يوماً بيوماً منتظمة ، وإن جوده الفعالية تابعة للتداول المنتظم . فإن سهوت عن أخذ جرعة بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ ، عليك بأخذ الجرعة العادية في اليوم التالي .
 فلا يجوز أبداً إطلاقاً أخذ حبات إضافية تعويضاً عن السهو .

في حال التوقف عن أخذ بيريتيراكس أرجينين 10 ملغ / 2,5 ملغ حبات ملبسة :
 حيث أن الدوائية قد إرتفاع الضغط الشرياني علاج طويل المدى ، عليك بالظفر مع طبيبك بامر التوقف عن العلاج .
 وإن تسائلت بأي أمر تابع لإستعمال هذا الدواء ، عليك بطلب المزيد من المعلومات لدى الطبيب أو الصيدلاني .

4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة ؟
 كما هي الحال مع كافة الأدوية ، من الممكن أن يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية ، رغم أنها لا تصيب كافة الأشخاص .
 إن لا تلاحظ حدوث أي من الآثار الجانبية الجسيمة التالية ، عليك التوقف عن أخذ هذا الدواء والاتصال بطبيبك فوراً :

• دوار شديد أو إغماء يسبب هبوط ضغط الدم (شائع - قد يصيب حتى 10 من مرضى) ،
 • تقيح نصفي (الإحساس بقى الصدر ، صغير أثناء التنفس) (غير شائعة - قد يصيب حتى 1 من 100 مرضى) ،
 • دوار شديد أو إغماء يسبب هبوط ضغط الدم (شائع - قد يصيب حتى 10 من مرضى) ،
 • تقيح نصفي (الإحساس بقى الصدر ، صغير أثناء التنفس) (غير شائعة - قد يصيب حتى 1 من 100 مرضى) ،

Figure 1



CLINIQUE CARDIOLOGIQUE FRANCEVILLE

مصلحة القلب والشرابين فرانس فيل

BENU ABDE LOUF
RACHID

Casablanca le 17/10/19

Patient hypertendu
avec dyspnée et
palpitations, à
l'effort

→ Examen
d'effort

الدكتور مهدي بنجلون
Dr. Mehdi BENJELLOUN
CARDIOLOGUE
Rue 2, N°61 - 1er Etage RP Chahdia - El Oulfa
Tél: 05 22 91 07 62 - 06 04 72 39 14
MDE: 91370670

FACTURE
201908460
Du : 17/10/2019

Etablie par : B. Fatimazahra

Clinique

Prestation	Quantité	Prix Unitaire	Total
EPREUVE D'EFFORT	1	750,00	750,00
TOTAL CLINIQUE			750,00

Encaissement Compte d'Autrui

Prestation	Quantité	Prix Unitaire	Total
TOTAL AUTRUI			0,00

Montants en exonération de la TVA suivant l'article n°91-VI-1° du C.G.I

Arrêtée la présente facture à la somme de SEPT CENT CINQUANTE DIRHAMS

	Patient
Total TTC	750,00

Clinique France Ville
393, Bd GHANDI, angle rue FOUI TEH
Tél: 05 22 23 26 27 - Fax : 022 99 30 26

RACHID BENMAKHOUF
17/10/2019 09:10

PAGE RESUMEE
Mesure ST basée sur J+60ms

Protocole: BRUCE
Durée d'ex.: 07:10

Patient Data

Nom: RACHID BENMAKHOUF
ID: ID(2):
DDN: 29/03/1954 Age: 65
Sexe: Masc Race:
Taille: cm Poids: kg

Max Valeurs:

Vit.: 5.5 km/h FC: 142 BPM % cible: 91%
Pente: 14.0% PAS: 176/56 mmHg 09:40 FC*PA 22620
METs: 8.5 PAD: 148/72 mmHg 00:00
Elév. PrtStr_ST: 1.3 mm en II à 08:30
Baisse ST: -0.8 mm en aVR à 09:20

Diagnosis:

Diagnosis 1:

Diagnosis 2:

Procedure 1:

Procedure 2:

Procedure 3:

Conclusions

EPREUVE D'EFFORT MAXIMALE NEGATIVE SUR LE PLAN CLINIQUE ET ELECTRIQUE ARRETEE AU
3EME PALIER DEVANT LA FATIGUE DU PATIENT ET A 92% DE LA FMT
ABSENCE DE TROUBLE DU RYTHME OU DE LA CONDUCTION
QUELQUES ESV NON PRECOSES D'ALLURE BENIGNE
BONNE ADAPTATION DE LA FC ET DE LA TA

الدكتور مهدي بنجلون
CARDIOLOGUE
Rue 2, N°51 - 1er Etage Rd. Chahdia - El Oulfa
Tél: 05 22 91 07 62 - 06 04 72 39 14
INPE: 91170670

RÉCAP p PALIER

NIV. ST (mm)

		Vit. (km/h)	Pente (%)	FC (BPM)	PA (mmHg)	METs	FC*PA	I	II	III	aVR	aVL	aVF	V1	V2	V3	V4	V5	V6
DEBUT EXE	EXE 00:00			99	148/72	1.0	11988	0.1	0.6	0.5	-0.5	-0.2	0.5	0.2	1.1	0.9	0.9	0.7	0.5
PALIER1	EXE 03:00	2.8	10.0	117	150/63	4.8	17400	0.0	0.4	0.3	-0.3	-0.2	0.3	0.0	0.9	0.7	0.5	0.6	0.3
PALIER2	EXE 06:00	4.0	12.0	134	174/49	7.1	22620	0.0	0.2	0.2	-0.2	-0.1	0.2	0.2	0.7	0.4	0.3	0.5	0.3
PIC EXE	EXE 07:10	5.5	14.0	142		8.3		-0.2	0.0	0.2	0.0	-0.3	0.1	0.0	0.5	0.5	0.1	0.2	0.1
RECUP.	RECUP 01:00	2.7	0.0	128		7.1		-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.2	0.1	0.1	1.1	0.9	0.9	0.6	0.3
FIN RECUP	RECUP 03:07	0.0	0.0	111	176/56	3.1	20240	-0.1	0.8	0.8	-0.5	-0.5	0.8	-0.1	0.7	0.7	0.6	0.3	0.0

Raisons de fin de test:

Reviewing Physician: Referring Physician: DR BENJELLOUN

ID:
D-naiss:
ans,


35.476
15-Oct-2019 12:45:40 Fréq. Card.: 76 BPM
Axes P-R-T: 30 -11 44 Int PR: 192ms
Dur.QRS: 90ms QT/QTc: 389/419ms

15-Oct-2019 12:45:40

9100-028-50

BENNAKH WNF
RACHID

Dr. Mehdi BENJELLOUN الدكتور مهدي بنجلون
CARDIOLOGUE
Rue 2, N° 81 - 1er Etage BP Ghazala - El Oumma
Tél: 05 22 91 07 62 - 06 04 72 39 14
INPE: 91170670



114330225506

Dr benjelloun Mehdi

Site * 0 App.* 0

Version 2.0.3.5 Séquence *11946 25mm/s 10mm/mV 0.05-40 Hz