

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com  
Prise en charge : pec@mupras.com  
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - [www.mupras.com](http://www.mupras.com)

**Déclaration de Maladie : N° P19- 0016427**

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

**(15365)**

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : **321** Société : **RAM / TRANSPORT)**  
 Actif  Pensionné(e)  Autre : **RÉTRAITE**  
Nom & Prénom : **TAZI Abbas** Date de naissance : **15-02-1940**  
Adresse : **13 J. KENNEDY Rue QUORONFAL N°3 CASA ANFA**  
Tél. : **0661 41 63 94** Total des frais engagés : ..... Dhs

Cadre réservé au Médecin

**Dr. SEFRAOUI Maher**  
Hépatologue Gastro-Enterologue  
175, Rue Bouakraâ - Casablanca  
Tél. : 05 22 27 78 18

Date de consultation : **21/12/2019**

Nom et prénom du malade : **TAZI Abbas** Age : **78 ans**

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

**Maladie de l'abdomen**

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : **01 JAN 2020**

Le : **21/12/19**

Signature de l'adhérent(e) :



**Dr. SEFRAOUI Maher**

Hépatologue Gastro-Enterologue  
175, Rue Bouakraâ - Casablanca  
Tél. : 05 22 27 78 18

**ACCUEIL**

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
21.12.19	CS	11L	300,-	Dr. SEFRAOUI Maher Hépatologue Gastro-Enterologue 175, Rue Boukraâ - Casablanca Tél : 05 22 20 78 18

## EXECUTION DES ORDONNANCES

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	21/12/2019	2 (200)	280,00

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Spas	Nombre					Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	MI	VI		
CTM CLINIQUE SADR	6/12/18					Pharmacie	110000

8 Pièces finies + 4 prospectus/prix

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important:

/veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODT.

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
00000000	00000000
35533411	11433553
B	

## [Création, remont, adjonction] ctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET GACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

## COEFFICIENT DES TRAVAUX

## MONTANTS DES SOINS

## DEBUT D'EXECUTION

FIN  
D'EXECUTION

## COEFFICIENT DES TRAVAUX

## MONTANTS DES SOINS

DATE DU  
DEVIS

DATE DE  
L'EXECUTION



REANIMATION MÉDICO - CHIRURGICALE

CHIRURGIE VISCÉRALE

COELIO CHIRURGIE

NEURO - CHIRURGIE

CHIRURGIE VASCULAIRE

CHIRURGIE GYNÉCOLOGIQUE

CHIRURGIE UROLOGIQUE - LITHO TRYPSE

CHIRURGIE OTO-RHINO - LARYNGOLOGIQUE

CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE

CHIRURGIE OPHTALMOLOGIQUE

CHIRURGIE TRAUMATOLOGIQUE ET ORTHOPÉDIQUE

Docteur :

**Dr. SEFRAOUI Maher**

Hépatologue Gastro-Enterologue

175, Rue Boukraâ - Casablanca

Tél.: 05 22 27 78 18

Casablanca, le 21.12.19.

Dr Taghi Abbès.

34.00

Osmosine 2câl 1.

1.5

58.30

Nefafun 160 dr x 2

1.5

1.5

45.90

Tridak 1c + 3L

1.5

91.00

Lithox

1.5

**Dr. SEFRAOUI Maher**  
Hépatologue Gastro-Enterologue  
175, Rue Boukraâ - Casablanca  
Tél.: 05 22 27 78 18

# OSMOSINE®

Hydroxyde de magnésium

## Composition :

Composition pour 5 ml :

Hydroxyde de magnésium .....

Excipients : sorbitol, arôme orange, parahydroxybenzoate de méthyle sodé, parahydroxybenzoate de propyle sodé, eau purifiée et autres excipients .....

## Titulaire et fabricant :

Laboratoires SPIMACO MAROC km 4 ancienne route de l'aviation Ta

## Qu'est ce qu'OSMOSINE, et dans quels cas est-il utilisé.

OSMOSINE, est présenté sous forme d'une suspension orale en flacon culière qui peut mesurer des doses de 2,5 et 5 ml.

OSMOSINE, est un médicament qui possède une activité laxative et d'acide dans l'estomac.


## OSMOSINE, est indiqué dans le traitement symptomatique de la c

## Avant de prendre OSMOSINE :

Ne prenez pas ce médicament :

- Si vous êtes allergique à n'importe quel composant de la suspension.
- Si vous souffrez d'une atteinte rénale grave.

- Si vous présentez n'importe quel symptôme d'appendicite, d'obstruction intestinale, tels que douleur abdominale d'origine inconnue, crampes, ve
- douloureux, nausées, vomissements ou diarrhée.



ent  
es

# Mega<sup>®</sup>sfon

## Phloroglucinol, Triméthylphloroglucinol

MEGASFON® 80 mg, comprimés orodispersibles

MEGASFON® 160 mg, comprimés orodispersibles

MEGASFON® 150 mg / 150 mg, suppositoires

### Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est à dire utilisé sans consultation ni prescription d'un médecin.

Si les symptômes persistent, s'il s'agit d'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.

Cette notice n'est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez là, vous pourrez avoir besoin de la y referer.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

NE LASSEZ PAS CE MÉDICAMENT À LA PORTEE DES ENFANTS

### PRÉSENTATION

MEGASFON® 80 mg et 160 mg, comprimés orodispersibles boîte de 10 et 20.

MEGASFON® 150 mg / 150 mg, suppositoires, boîte de 8.

### COMPOSITION

Substance active : Phloroglucinol, Triméthylphloroglucinol

MEGASFON® 80 mg contient 80 mg de Phloroglucinol hydraté par comprimé orodispersible

MEGASFON® 160 mg contient 160 mg de Phloroglucinol hydraté par comprimé orodispersible

MEGASFON® suppositoires contient 150 mg de Phloroglucinol hydraté et 150 mg de Triméthylphloroglucinol par suppositoire.

Exipients : gsp 1 comprimé orodispersible ou 1 suppositoire.

### CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE

ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE

MEGASFON® appartient à une classe de médicaments appelés antispasmodiques. Il agit contre les spasmes (contractions).

### INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

MEGASFON® est indiqué dans les traitements suivants :

- Traitement symptomatique des douleurs liées aux troubles fonctionnels du tube digestif et des voies bilaires.

- Traitement des manifestations spasmotiques et douloureuses aiguës des voies urinaires : coliques néphrétiques.

- Traitement symptomatique des manifestations spasmotiques douloureuses en gynécologie.

- Traitement adjuvant des contractions au cours de la grossesse en association au repos.

### CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez jamais MEGASFON® si vous êtes allergique (hypersensible) au phloroglucinol ou au triméthylphloroglucinol à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

Ne prenez jamais MEGASFON® comprimés orodispersibles en cas de phénylettonurie (maladie héréditaire déposée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam.

EN CAS DE DOUTTE NE PAS HESITER À DEMANDER LAVIS DE VOTRE MÉDÉCIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Faites attention avec MEGASFON®.

L'absorption du phloroglucinol avec des antidiéjanteurs majeurs tels que la morphine ou ses dérivés, doit être évitée en raison de leur effet spasmogène.

L'utilisation de MEGASFON® comprimés orodispersibles est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactate de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

EN CAS DE DOUTTE NE PAS HESITER À DEMANDER LAVIS DE VOTRE MÉDÉCIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### NE JAMAIS LASSEZ À LA PORTEE DES ENFANTS.

### INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Sans objet.

### GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Si vous êtes une femme enceinte, vous devez demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre ce médicament. L'utilisation de MEGASFON® ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.

### Allaitement

L'utilisation de MEGASFON® est déconseillée chez la femme qui allaitait.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### SPORTIFS

Sans objet.

### EFFECTS SUR L'APTITUDE À CONDUIRE DES VÉHICULES OU À UTILISER DES MACHINES

Sans objet.

### LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

MEGASFON® comprimés orodispersibles : Lactose, aspartam.

### POSOLOGIE, MODE ET/OU VOIE(S) D'ADMINISTRATION

#### Posologie

MEGASFON® 80 mg comprimés orodispersibles : chez l'adulte, la posologie usuelle et le 2 comprimés orodispersibles par jour, à prendre au moment de la crise, à renouveler en cas de spasmes importants.

Chez l'enfant, 1 comprimé orodispersible 2 fois par jour.

MEGASFON® 160 mg comprimés orodispersibles, et RESERVE à l'ADULTE. Prenez 1 comprimé orodispersible, au moment de la crise. Renouveler en cas de spasmes importants en respectant un intervalle minimum de 2 heures entre chaque prise sans dépasser 3 comprimés de MEGASFON® 160 mg par jour.

MEGASFON® suppositoires : 3 suppositoires par 24 heures.

#### Mode et voies d'administration, Fréquence d'administration

MEGASFON® comprimés orodispersibles : Voie orale.

Chez l'adulte, le comprimé est à dissoudre dans un verre d'eau ou le laisser fondre sous la langue pour obtenir un effet rapide.

Chez l'enfant, le comprimé est à dissoudre dans un verre d'eau.

MEGASFON® suppositoires : Voie rectale.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDÉCIN.

### SURDOSE

Si vous avez pris plus de MEGASFON® que vous n'auriez dû, consultez votre médecin.

### INSTRUCTIONS EN CAS D'OMISSION D'UNE OU DE PLUSIEURS DOSES

Si vous oubliez de prendre MEGASFON®, ne prenez pas double dose pour compenser celle que vous auriez oubliée de prendre.

### RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE

Sans objet.

### EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments, MEGASFON® est susceptible d'avoir des effets indésirables bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Dans certains cas, une allergie peut survenir.

Vous reconnaîtrez les signes d'une allergie :

- par des boutons et/ou des rougeurs sur la peau, prurit,

- par un brusque gonflement du visage et du cou (œdème de Quincke),

- ou par un malaise brutal dû à une chute de la pression artérielle (choc anaphylactique).

### CONSERVATION

MEGASFON® comprimés orodispersibles : A conserver à une température ne dépassant pas +30 °C et à l'abri de l'humidité.

MEGASFON® suppositoires : A conserver à une température ne dépassant pas +25 °C.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

### CONDITIONS DE DÉLIVRANCE

Sans objet.

### PERCEPTION

Ne pas utiliser après la date de péremption.

### DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Décembre 2016

Site de fabrication: Zone 21 Rue des Ang

21 Rue des Ang

Yasmine L'UQH

Site de fabrication: Zone 21 Rue des Ang

A22003 Fredmedqa

Phloroglucinol

lent extérieur.

Lot : 4071

U.T. AV. 07.21

P.P.V : 58 DH 30

INTERACTIONS AVEC LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

Sans objet.

Pour le traitement des symptômes intestinaux et génito-urinaires dûs à l'anxiété et à la tension psychique.

**Composition :**

5 mg de chlordiazépoxide : 7-chloro-2-méthylamino-5-phényl-3H, 1,4-benzodiazépine-4-oxo et 2,5 mg de bromure de clidinium : bromure de 1-méthyl3-benzoyloxyquinuclidinium par dragée.

1 dragée contient 279 mg de glucides, correspondant à 406 K.J.

**Propriétés :**

Le chlordiazépoxide et le bromure de clidinium se complètent dans leur action sur les troubles fonctionnels au niveau du tractus gastro-intestinal et des voies génito-urinaires. Le chlordiazépoxide, benzodiazépine bien tolérée, exerce un effet anxiolytique, tensiolytique et myorelaxant. Son emploi est indiqué lorsque l'anxiété et la tension psychique influent de manière causale ou secondaire sur le tableau clinique.

Le bromure de clidinium est un anticholinergique de synthèse. Il élimine les spasmes de la musculature lisse et inhibe l'activité sécrétatoire. L'association des deux principes actifs permet une action à la fois centrale et périphérique sur les symptômes que l'on observe lors de troubles fonctionnels survenant au niveau intestinal et au niveau des voies génito-urinaires. Dans de tels cas, elle entraîne une stabilisation rapide des fonctions neuro-végétatives.

**Pharmacocinétique :**

Après prise orale, le chlordiazépoxide est pratiquement entièrement absorbé et parvient en majeure partie sous forme inchangée dans la circulation. La concentration plasmatique maximale est atteinte en moyenne en l'espace de deux à quatre heures. A l'équilibre le volume de distribution du chlordiazépoxide est de 0,3-0,4 l/kg de poids corporel. La liaison aux protéines plasmatiques atteint 93-97%. La substance inchangée ainsi que le desmethylchlordiazépoxide, principal métabolite pharmacologiquement actif, traversent rapidement les barrières hémato-encéphaliques et placentaires; ils passent également en petites quantités dans le lait maternel.

La demi-vie plasmatique du chlordiazépoxide est de 15 minutes environ pendant la phase de distribution et de dix heures environ pendant la phase d'élimination. La clairance plasmatique totale est de l'ordre de 0,3-0,5 ml/min/kg. Moins de 1% d'une dose orale est retrouvé dans l'urine sous forme de chlordiazépoxide inchangé. La désalkylation et l'hydroxylation hépatique du chlordiazépoxide donnent naissance aux métabolites suivants, pharmacologiquement actifs : desmethylchlordiazépoxide, demoxepam, desmethylidiazepam. Le démoxepam et le desmethylidiazepam sont éliminés sous forme de conjugués inactifs de l'acide glucuronique. Lors d'administration répétée, l'état d'équilibre du chlordiazépoxide inchangé s'installe en l'espace de trois jours, tandis que les métabolites s'accumulent beaucoup plus lentement.

Le bromure de clidinium est absorbé en majeure partie sous forme inchangée, puis rapidement hydrolysé dans le foie en dérivé alcoolique complémentaire. Ce dérivé est éliminé dans l'urine et est également retrouvé au côté du bromure de clidinium inchangé. Une faible partie de la dose orale sous forme inchangée à une circulation entéro-hépatique. L'élimination dans en deux phases, avec des demi-vies de respectivement 1½ et 20 heure

**Indications :**

Manifestations de l'anxiété s'accompagnant de troubles fonctionnels digestifs spastiques.

**Posologie habituelle :**

3-4 dragées par jour. Prendre le médicament de préférence une demi-heure avec du liquide.

**Directives posologiques particulières :**

Patients âgés et faibles : commencer par 1-2 dragées par jour, puis augmenter jusqu'à la dose optimale, efficace et tolérée.

Enfants : 1-2 dragées par jour, selon l'âge et l'affection à traiter. Les dragées peuvent être avalées entières ou écrasées, avec du liquide.

LOT:19096 PER:07/2022  
PPU: 21,00 DH

# Trimedat®

Trimébutine Sachets

de la nécessité de le poursuivre.

## Allertement

Il est préférable de ne pas prendre ce médicament si vous allez. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

## Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire. Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable, non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

## PRÉSENTATION

TRIMEDAT® 150 mg sachets, boîte de 20.

TRIMEDAT® SANS SUCRE 150 mg sachets, boîte de 20.

## COMPOSITION

Substance active : Trimébutine base.

TRIMEDAT® 150 mg sachets

Trimébutine base.....

150 mg

Excipients q.s.p..... 1 sachet

TRIMEDAT® SANS SUCRE 150 mg sachets

Trimébutine base..... 150 mg

Excipients q.s.p..... 1 sachet

## Antispasmodique musculotropique.

## INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Ce médicament est indiqué chez l'adulte dans le traitement symptomatique des douleurs, des troubles du transit et de l'inconfort intestinal liés aux troubles fonctionnels intestinaux.

## CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament est contre-indiqué chez l'enfant de moins de 2 ans.

Ne prenez jamais TRIMEDAT® 150 mg sachets ou TRIMEDAT® SANS SUCRE 150 mg sachets, en cas d'hypersensibilité à la trimébutine.

Ne prenez jamais TRIMEDAT® SANS SUCRE 150 mg sachets en cas de phénylcétoneurone heréditaire (maladie dépistée à la naissance), à cause de la présence de l'aspartam.

EN CAS DE DOUBTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

TRIMEDAT® 150 mg sachets:

Chaque sachet de TRIMEDAT® 150 mg contient 2,6 g de sucre/sucrose, dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucre/sucrose/isomaltase (maladies héréditaires rares).

EN CAS DE DOUBTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## INTERACTIONS AVEC LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

Sans objet.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Grossesse

(Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger

## SPORTIFS

Sans objet.

## EFFETS SUR L'APTITUDE A CONDUIRE DES VÉHICULES OU A UTILISER DES MACHINES

Sans objet.

## LISTE DES EXCIPENTS A EFFET NOTOIRE

TRIMEDAT® 150 mg sachets contiennent du sucre/sucrose. TRIMEDAT® SANS SUCRE 150 mg sachets contiennent de l'aspartam.

## POSOLOGIE, MODE ET/OU VOIE(S) D'ADMINISTRATION

**Posologie :** DANS TOUTS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

Chez l'adulte, la posologie usuelle est de 1 sachet, 3 fois par jour. Le traitement doit être de courte durée.

## Mode et voie d'administration :

Voie orale.

Le contenu des sachets doit être dissous dans un verre d'eau.

## SURDOSE

Si vous avez pris plus de TRIMEDAT® 150 mg sachets ou TRIMEDAT® SANS SUCRE 150 mg sachets, que vous n'auriez dû: consultez votre médecin.

## INSTRUCTIONS EN CAS D'OMISSION D'UNE OU DE PLUSIEURS DOSES

Sans objet.

## RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE

Sans objet.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Comme tous les médicaments, TRIMEDAT® sachets est susceptible d'avoir des effets indésirables bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Rares réactions cutanées.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## DECLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne se serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement ou via le centre national de pharmacovigilance. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## CONSERVATION

Ne pas laisser à la portée des enfants.

## CONDITIONS DE DÉLIVRANCE

Liste II

## PEREMPTION

Ne pas utiliser TRIMEDAT® sachets après la figurent sur le conditionnement extérieur.

## DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Mars 2018

PHARMACE

Laboratoires Pharma

21 Rue des Apothécières - Casablanca

Site de fabrication: Zone Industrielle Jules

Yassine LAHOUFI ALI - Pharmacien Responsable

LOT  
UTAV  
P.P.V  
9608  
01-24  
45 DH 90



URGENCE 24/24

REANIMATION MÉDICO - CHIRURGICALE  
CHIRURGIE VISCÉRALE  
COELIO CHIRURGIE  
NEURO - CHIRURGIE  
CHIRURGIE VASCULAIRE  
CHIRURGIE GYNÉCOLOGIQUE  
CHIRURGIE UROLOGIQUE - LITHO TRYPSIE  
CHIRURGIE OTO-RHINO - LARYNGOLOGIQUE  
CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE  
CHIRURGIE OPHTALMOLOGIQUE  
CHIRURGIE TRAUMATOLOGIQUE ET ORTHOPÉDIQUE

Docteur :

Casablanca, le ..... 21.12.19 .....

Dr. Tayeb Abbas.

PP - TRA

Uro. Gyné.

Neph. CRP

GOT GGT DLT Sel RBC

Urgences

Dr. SEMAOUI Maher

Hépatologie Gastro-Enterologie

175, Rue Boukraâ - Casablanca

Tél : 05 22 27 78 18

laboratoire d'Analyses Médicales Bordeaux

Dr. EJ-JENNANE Zineb  
Médecin Biologiste

280, Bd. Bordeaux RDC Bourgogne-Casa  
Tél : 0522 22 30 37 - Fax : 0522 22 29 62  
tél : 33460318 - RC : 422030

**CONCLUSION:**

- *L'aspect TDM sus décrit de la FID pouvant faire évoquer soit une pathologie inflammatoire, appendicite sous-jacente rétrocaecale ne peut être éliminée, pathologie lésionnelle ? à confronter aux données biologiques et éventuellement endoscopiques.*
- *Sigmoïde spasme avec diverticules sigmoïdiens sans signes évidents ce jour de sigmoïdites.*
- *Pas de syndrome occlusif ce jour.*
- *Pas d'épanchement ou de collection en intra-abdomino-pelvien à l'examen de ce jour.*

***Dr. W. BENELKHADIR***  
***MEDECIN RADIOLOGUE***

*CITTA CLINIQUE DE DAKAR  
35 RUE EL ALIAS, PARIS 13<sup>e</sup>, FRANCE  
Tel : 05 22 49 28 20/08/2004  
Fax : 05 22 49 15 06*



## URGENCE 24/24 UNITE DE SCANNER

DATE: 21/12/19

IDENTITE

: Mr TAZI ABBAS

EXAMEN

: TDM ABDOMINO-PELVienne

MEDECIN TRAITANT

: Dr. SEFRAOUI

TECHNIQUE :

Acquisition spiralée millimétrique sans et avec injection d'iode

## COMPTE-RENDU

### L'analyse du cadre digestif :

- **Dolichocôlon avec stase stercorale.**
- **L'analyse de la FID** met en évidence un aspect inflammatoire du carrefour iléo-caecal, avec discrète agglutination des dernières anses iléales légèrement dilatées et rehaussement de leur paroi. Très fine lame d'épanchement liquidiens autour. L'appendice n'a pu être individualisé.
- **L'analyse du colon sigmoïde montre** un colon sigmoïde spasmé avec des petits diverticules, sans signes inflammatoires ce jour, sans collection ou épanchement pelvien.
- **A signaler:** un contenu très hyperdense spontanément au niveau rectal (à l'interrogatoire du patient: utilisation des laxatifs)
- Pas de syndrome occlusif grêlique ou colique à l'examen de ce jour.

### Par ailleurs:

- **Foie:** de taille normale, de densité spontanée homogène, de contours réguliers. Absence de lésion nodulaire ou de prise de contraste anormale
- Absence de dilatation des VBIH et VBEH.
- **Le pancréas** de taille normale, de densité spontanément homogène.
- Aspect normal des glandes surrénauliennes et de la rate.
- **Les deux reins:** de taille normale, siège de quelques kystes corticaux bilatéraux dont le plus gros est polaire inférieure droit à développement exo-rénal mesurant 50mm. . Absence d'anomalie fonctionnelle. Les cavités U.P.C. sont fines et libres.
- **Vessie** : en moyenne réplétion, homogène avec empreinte prostatique.
- **Prostate** : mesure 47x43x43mm (43,5g), homogène.
- Absence d'adénopathies abdomino-pelvienne.
- **Calcification de la paroi de l'aorte abdominale, ostium mésentériques, AMS et les bifurcations iliaques primitives.**
- Lombarthrose évoluée étagée.

ICE : 001529932000062

# CITM Clinique BADR

37, Rue Al Alloussi Bourgogne

92 / TP:35630123/ ICE: 001326100000037

## F A C T U R E

N° : 201903172  
Du : 21/12/2019

Nom patient : M. TAZI ABBES

*Médecin prescripteur ; DrSEFRAOUI MAHER*

Examens	Cotation(Z)	Prix Dhs
FRAIS CONSUTATION	1	300,00
FRAIS CLINIQUE	1	100,00
Total		400,00

Arrêtée la présente facture à la somme de :  
**QUATRE CENTS DIRHAMS**

*CITM CLINIQUE BADR  
35 Rue El Alloussi, Bourgogne - Casablanca  
Tel : 06 22 49 29 00/00/82184  
Fax : 06 22 49 23 86*

# CITM Clinique BADR

## BON D'EXECUTION

Réf dossier : 1912211202 4

Date 21/12/2019

Patient M. TAZI ABBES

Organisme : Payant

EXTERNE

*Renseignements cliniques*

Age 0

*Examens demandés*

SEFRAOUI MAHER

FRAIS CONSULTATION ... 300,00

FRAIS CLINIQUE ... 100,00

0,00 Total (Dhs) 400,00  
0,00

Encaissé (Dhs) 400,00

Reste (Dhs) 0,00

M. TAZI ABBES

Médecin Dr. SEFRAOUI MAHER

Casablanca Le : 21/12/2019

Patient M. TAZI ABBES

Date 21/12/2019

Examen FRAIS CONSULTATION

Médecin Dr. SEFRAOUI MAHER

# CITM Clinique BADR

37, Rue Al Alloussi Bourgogne

92 / TP:35630123/ ICE: 001326100000037

## F A C T U R E

N° : 201903171  
Du : 21/12/2019

Nom patient : M. TAZI ABBAS

*Médecin prescripteur ; DrSEFRAOUI MAHER*

Examens	Cotation(Z)	Prix Dhs
TDM ABDOMINO-PELVienne	200	2 800,00
<b>Total</b>		<b>2 800,00</b>

Arrêtée la présente facture à la somme de :  
**DEUX MILLE HUIT CENTS DIRHAMS**

*CITM CLINIQUE BADR  
35 Rue El Alloussi, Bourgogne - Casablanca  
Tél : 05 22 49 28 00/60/82/84  
Fax : 05 22 49 02 00*

# CITM Clinique BADR

37, Rue Al Alloussi Bourgogne  
IF N° 01006092 / TP:35630123/ ICE: 001326100000037

## Reçu d'accueil

Date 21/12/2019

Patient : M. TAZI ABBES

Organisme Payant

EXTERNE

### *Examens demandés*

**FRAIS CONSULTATION** 300

**FRAIS CLINIQUE** 100

**PHARMACIE** 100

---

Total (Dhs) 500

Encaissé (Dhs) 400

Reste (Dhs) 100

---

*Résultats à retirer le :*



URGENCE 24/24

REANIMATION MÉDICO - CHIRURGICALE  
CHIRURGIE VISCÉRALE  
COELIO CHIRURGIE  
NEURO - CHIRURGIE  
CHIRURGIE VASCULAIRE  
CHIRURGIE GYNÉCOLOGIQUE  
CHIRURGIE UROLOGIQUE - LITHO TRYPSIE  
CHIRURGIE OTO-RHINO - LARYNGOLOGIQUE  
CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE  
CHIRURGIE OPHTALMOLOGIQUE  
CHIRURGIE TRAUMATOLOGIQUE ET ORTHOPÉDIQUE

Docteur :

Seffadi Maher

Casablanca, le ...

21/12/2019

M<sup>r</sup> Tazi Abbas

TD A Abdomine - Fébrile

Dr. SEFFADI Maher  
Hépatologue Gastro-Entérologue  
175, Rue Boukrina Casablanca  
Tél: 05 22 49 28 00 - 05 22 49 23 80  
Fax: 05 22 49 23 86

~~35 Rue EL ALLOUSSI Bourgogne (Face Mosquée Badr) - Casablanca  
Tél: 05 22 49 28 00 - 05 22 49 23 80/81/82/83/84/85 - Fax: 05 22 49 23 86~~



# LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES BORDEAUX

## مختبر التحاليل الطبية ببوردو

Dr. Zineb EJ JENNANE : Médecin Biogiste

Biochimie | Hématologie | Hémostase | Immunologie | Hormonologie  
 Bactériologie | Parasitologie | Mycologie | Virologie | Biologie de la reproduction

LABORATOIRE BORDEAUX

Dossier : 1912210013

Mr TAZI Abbes

Le 21-12-2019

### Transaminases GPT (ALAT)

(Technique cinétique (IFCC))


15 U/L

(10-50)

05-11-2016

19

### Transaminases GPT (ALAT)



### Gamma glutamyl-transférase (GGT)

(Test colorimétrique enzymatique)


26 U/L

(8-70)

05-11-2016

33

### Gamma glutamyl-transférase (GGT)



### Bilirubine totale

(méthode Colorimétrique Cobas Roche)

8.8 mg/L (0.0-12.0)

15.0  $\mu$ mol/l (0.0-20.5)

### Bilirubine conjuguée (directe)

(Test colorimétrique (méthode diazo))

3.7 mg/L (0.0-3.0)

6.3  $\mu$ mol/L (0.0-5.1)

### Bilirubine libre (indirecte)

(Calculée)

5.1 mg/L (2.0-7.0)

8.7  $\mu$ mol/L (3.4-12.0)

### Lipasémie

(Dosage enzymatique colorimétrique)

30.2 UI/L (13.0-60.0)

### Protéine C-réactive (CRP)


(Test immunoturbidimétrique)

0.1 mg/L (<5.0)

05-11-2016

0.5

### Protéine C-réactive (CRP)



Demande validée biologiquement par : Dr. Zineb EJ JENNANE

Dr. EJ-JENNANE Zineb  
Laboratoire d'ANALYSES  
Médecin Biogiste

Page 7/3

Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 71 45 29 04

280, Bd Bordeaux, RDC - C.P : 20040 - Bourgogne - Casablanca / Tél.: 05 22 22 30 37 - 08 08 35 31 54

Fax.: 05 22 22 29 62 - E-mail : laboratoirebordeaux@gmail.com / Site web : www.labobordeaux.com

TP : 35460318 - IF : 15269526 - RC : 422030 - CNSS : 4782620 - ICE : 000232167000019 - INPE : 093061190



LABORATOIRE BORDEAUX

# LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES BORDEAUX

## مختبر التحاليل الطبية ببوردو

Dr. Zineb EJ JENNANE : Médecin Biologiste

Biochimie | Hématologie | Hémostase | Immunologie | Hormonologie  
Bactériologie | Parasitologie | Mycologie | Virologie | Biologie de la reproduction

Dossier : 1912210013

Mr TAZI Abbes

Le 21-12-2019

### BIOCHIMIE SANGUINE

Automate COBAS C111

#### Urée


(Test cinétique utilisant l'uréase et la glutamate déshydrogénase)

0.18 g/L  
3.00 mmol/L

(0.10-0.50)  
(1.67-8.33)

27-05-2019

0.33



#### Créatinine


(Test colorimétrique cinétique ,méthode de Jaffé.)

9.00 mg/L  
79.7 µmol/L

(7.00-13.00)  
(62.0-115.1)

27-05-2019

10.40



### BILAN HEPATIQUE

#### Transaminases GOT (ASAT)


(Technique cinétique (IFCC))

17 UI/L

(10-50)

05-11-2016

18



Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 71 45 29 04

Laboratoire d'Analyses Médicales Bordeaux  
Dr. EJ-JENNANE Zineb  
Médecin Biologiste  
Bordeaux RDC Bourgogne Casablanca  
05 22 22 30 37 08 08 35 31 54  
05 22 22 29 62  
laboratoirebordeaux@gmail.com  
www.labobordeaux.com

280, Bd Bordeaux, RDC - C.P : 20040 - Bourgogne - Casablanca / Tél.: 05 22 22 30 37 - 08 08 35 31 54

Fax.: 05 22 22 29 62 - E-mail : laboratoirebordeaux@gmail.com / Site web : www.labobordeaux.com

TP : 35460318 - IF : 15269526 - RC : 422030 - CNSS : 4782620 - ICE : 000232167000019 - INPE : 093061190



# LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES BORDEAUX

# مختبر التحاليل الطبية بوردو

Dr. Zineb EJ JENNANE : Médecin Biologiste

Biochimie | Hématologie | Hémostase | Immunologie | Hormonologie  
Bactériologie | Parasitologie | Mycologie | Virologie | Biologie de la reproduction

LABORATOIRE BORDEAUX



Dossier : 1912210013  
Prélèvement du : 21-12-2019  
Edition : 21-12-2019

Mr TAZI Abbes

Né(e) le 31-12-1940

Code Patient A161140015

Médecin Dr SEFRAOUI Maher

## HEMATOLOGIE

NUMERATION FORMULE SANGUINE (Automate SYSMEX XS-500i)

<b>Hématies</b>	4.82	M/ $\mu$ l	(4.50–5.80)	4.86
<b>Hémoglobine</b>	14.7	g/dL	(13.0–17.0)	14.7
<b>Hématocrite</b>	42	%	(37–50)	43
<b>VGM</b>	88	fL	(82–97)	89
<b>TCMH</b>	31	pg	(27–32)	30
<b>CCMH</b>	35	g/dL	(32–36)	34
 <b>Leucocytes</b>	 7 220	 /mm $^3$	 (4 000–10 000)	 6 670
Polynucléaires Neutrophiles	68.7	%		57.5
	Soit:			
	4 960	/mm $^3$	(1 500–7 000)	3 835
Lymphocytes	20.5	%		26.5
	Soit:			
	1 480	/mm $^3$	(1 500–4 000)	1 768
Monocytes	8.6	%		9.7
	Soit:			
	621	/mm $^3$	(200–1 000)	647
Polynucléaires Eosinophiles	1.8	%		6.0
	Soit:			
	130	/mm $^3$	(80–400)	400
Polynucléaires Basophiles	0.4	%		0.3
	Soit:			
	29	/mm $^3$	(0–100)	20
 <b>Plaquettes</b>	 271 000	 /mm $^3$	 (150 000–450 000)	 249 000

## HEMOSTASE

#### STABT4

<b>TAUX DE PROTHROMBINE (TP)</b>	86 %	(70-150)
Temps de Quick Patient	13.7 sec.	
Temps de Quick Témoin	12.6 sec.	
INR (International Normalized Ratio)	1.11	

<b>TEMPS DE CEPHALINE ACTIVEE (TCA)</b>	30.0 sec.	(24.0–35.0)
TCA Temps témoin	31.0 sec.	
TCA Ratio patient/témoin	0.97	(<1.20)

Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 71 45 29 04

# LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES BORDEAUX



LABORATOIRE BORDEAUX

Dr. EJ JENNANE ZINEB : Médecin Biologiste

280, Bd Bordeaux, RDC - 20040 - CASABLANCA

Tél : 0522 22 30 37 / 08 08 35 31 54 Fax : 0522 22 29 62

Site web: [www.labobordeaux.com](http://www.labobordeaux.com) Email: [laboratoirebordeaux@gmail.com](mailto:laboratoirebordeaux@gmail.com)

TP : 35460318 IF : 15269526 RC : 422030 INPE : 093061190 ICE : 000232167000019

**FACTURE N° : 191200153**

Casablanca le 21-12-2019

**Mr TAZI Abbes**

Demande N° 1912210013

Date de l'examen : 21-12-2019

Analyses :

## Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
PS	Prélèvement sang	E25	E
0103	Bilirubine (Totale Directe et Indirecte)	B70	B
0111	Créatinine	B30	B
0135	Urée	B30	B
0141	Gamma glutamyl transférase (GGT)	B50	B
0146	Transaminases O (TGO)	B50	B
0147	Transaminases P (TGP)	B50	B
0148	Lipase	B100	B
0216	Numération formule	B80	B
0236	Taux de prothrombine	B40	B
0239	Temps de céphaline: TCK	B40	B
0370	CRP	B100	B

Total des B : 640

**TOTAL DOSSIER : 880.00 DH**

Arrêtée la présente facture à la somme de : huit cent quatre-vingts dirhams

Laboratoire d'Analyses Médicales Bordeaux

Dr. EJ-JENNANE Zineb

Médecin Biologiste

280, Bd. Bordeaux RDC Bourgogne-Casa

Tél : 0522 22 30 37 - Fax : 0522 22 29 62

TP: 35460318 - RC: 422030