

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
01/12/2013	C3	1	65000	DOCTEUR HASSAN Spécialiste en Maladie Rhumatologie Clinique N° 10 Centre de Santé R-BEITAL Rue de la Gare 12 - 1000 Bruxelles Téléphone : 02 621 22 22 Fax : 02 621 22 23 e-mail : rbeital@telenet.be
01/12/2013	C3	1	65000	DOCTEUR HASSAN Spécialiste en Maladie Rhumatologie Clinique N° 10 Centre de Santé R-BEITAL Rue de la Gare 12 - 1000 Bruxelles Téléphone : 02 621 22 22 Fax : 02 621 22 23 e-mail : rbeital@telenet.be

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>JANQUIERE</i>	<i>14/11/19</i>	<i>387,00</i>

ANALYSES - RADIOPHARMACIES

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de la

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient									
				COEFFICIENT DES TRAVAUX								
				MONTANTS DES SOINS								
				DEBUT D'EXECUTION								
				FIN D'EXECUTION								
O.D.F PROTHESES DENTAIRES		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE										
		<table border="1" data-bbox="1604 880 1840 1036"> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> </table>	25533412	21433552	00000000	00000000	00000000	00000000	35533411	11433553		COEFFICIENT DES TRAVAUX
25533412	21433552											
00000000	00000000											
00000000	00000000											
35533411	11433553											
		(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		MONTANTS DES SOINS								
				DATE DU DEVIS								
				DATE DE L'EXECUTION								

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Samir BETTAL

Spécialiste en Médecine Interne

Rhumatologie - Maladies de Système

Ex. Directeur Médical CHR Moulay Youssef - Casablanca

Ex. CHU Ibn Rochd Casablanca

Sur Rendez-vous



الدكتور سمير البطاول

إختصاصي في الطب الباطني


الأمراض الباطنية - أمراض المفاصل

المدير الطبي للمستشفى الإقليمي مولاي يوسف سابقا

المركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد الدار البيضاء سابقا
بالموعد

Casablanca, le : ٢٠١٥/١٢/٢٠١٥
الدار البيضاء، في

La ghalia fchra



Docteur SAMIR BETTAL
Spécialiste en Médecine Interne
et Rhumatologie - Maladies de Système
Casablanca, 2015/12/20
Tél.: 05 22 48 26 - GSM : 06 61 42 52 06 - E-mail : bettalsamir@gmail.com

Business Plaza, N° 400 Boulevard Zerkouni

(Direction Mosquée Hassan II) 1er étage, N° 10 - Casablanca

Tél.: 05 22 48 26 - GSM : 06 61 42 52 06 - E-mail : bettalsamir@gmail.com

MeteoSpasm

capsule molle - Boîte de 20
alvérine et Siméticone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Qu'est-ce que cette notice ?

METEOS
aliments
Sans obj



Grossesse et allaitement

Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

Vous devez éviter de prendre ce médicament si vous allaitez.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Librax®

Pour le traitement des symptômes psychiques.

LÖT:19096 PER:07/2022
PPU: 21,00 DH

l'anxiété et à la

Composition :

1 dragée contient 279 mg de glucides, correspondant à 406 K.J.

Propriétés :

Le chlordiazépoxide et le bromure de clidinium se complètent dans leur action sur les troubles fonctionnels au niveau du tractus gastro-intestinal et des voies génito-urinaires. Le chlordiazépoxide, benzodiazépine bien tolérée, exerce un effet anxiolytique, tensiolytique et myorelaxant. Son emploi est indiqué lorsque l'anxiété et la tension psychique influent de manière causale ou secondaire sur le tableau clinique.

de manière causale ou secondaire sur le tableau clinique. Le bromure de clidinium est un anticholinergique de synthèse. Il élimine les spasmes de la musculature lisse et inhibe l'activité sécrétante. L'association des deux principes actifs permet une action à la fois centrale et périphérique sur les symptômes que l'on observe lors de troubles fonctionnels survenant au niveau intestinal et au niveau des voies génito-urinaires. Dans de tels cas, elle entraîne une stabilisation rapide des fonctions neuro-végétatives.

Pharmacocinétique :

Après prise orale, le chlordiazépoxide est pratiquement entièrement absorbé et parvient en majeure partie sous forme inchangée dans la circulation. La concentration plasmatique maximale est atteinte en moyenne en l'espace de deux à quatre heures. A l'état d'équilibre le volume de distribution du chlordiazépoxide est de 0,3-0,4 l/kg de poids corporel. La liaison aux protéines plasmatiques atteint 93-97%. La substance inchangée ainsi que le desméthylchlordiazépoxide, principal métabolite pharmacologiquement actif, traversent rapidement les barrières hémato-encéphaliques et placentaires; ils passent également en petites quantités dans le lait maternel.

La demi-vie plasmatique du chlordiazépoxide est de 15 minutes environ pendant la phase de distribution et de dix heures environ pendant la phase d'élimination. La clairance plasmatique totale est de l'ordre de 0,3-0,5 ml/min/kg. Moins de 1% d'une dose orale est retrouvé dans l'urine sous forme de chlordiazépoxide inchangé. La désalkylation et l'hydroxylation hépatique du chlordiazépoxide donnent naissance aux métabolites suivants, pharmacologiquement actifs : desméthylchlordiazépoxide, démoxépam, desméthyldiazepam. Le démoxépam et le desméthyldiazepam sont éliminés sous forme de conjugués inactifs de l'acide glucuronique. Lors d'administration répétée, l'état d'équilibre du chlordiazépoxide inchangé s'installe en l'espace de trois jours, tandis que les métabolites s'accumulent beaucoup plus lentement.

Le bromure de clidinium est absorbé en majeure partie sous forme inchangée dans l'intestin grêle, puis rapidement hydrolysé dans le foie en dérivé alcoolique comportant une amine quaternaire. Ce dérivé est éliminé dans l'urine et est également retrouvé dans les fèces au côté du bromure de clidinium inchangé. Une faible partie de la dose orale est soumise sous forme inchangée à une circulation entéro-hépatique. L'élimination dans l'urine s'effectue en deux phases, avec des demi-vies de respectivement 1½ et 20 heures en moyenne.

Indications :

Manifestations de l'anxiété s'accompagnant de troubles fonctionnels digestifs à composante spastique.

Posologie habituelle :

3-4 dragées par jour. Prendre le médicament de préférence une demi-heure avant les repas avec du liquide.

Directives posologiques particulières :

Patients âgés et faibles : commencer par 1-2 dragées par jour, puis augmenter peu à peu la posologie jusqu'à la dose optimale, efficace et tolérée.

Enfants : 1-2 dragées par jour, selon l'âge et l'affection à traiter. Les dragées peuvent être avalées entières ou écrasées, avec du liquide.

CT006E
06 2024
64 00

LOT :
PER :
PPV :

en®

Extra

Crème 1%



ques

g de crème pour application locale.

1 g de crème contient 0,01 g de bifonazole.

Excipients : alcool benzylique, alcool cétostéarylque, cetylpalmitate, octyldodécanol, polysorbate 60, eau purifiée, monostéarate de sorbitan.

Propriétés :

Le bifonazole est un antifongique à large spectre d'action, appartenant aux dérivés imidazolés.

Son spectre d'action comprend les dermatophytes, les levures et les moisissures. Il est également actif sur d'autres champignons comme Malassezia furfur et des bactéries tel que Corynebacterium minutissimum.

Le bifonazole agit en inhibant la synthèse de l'ergostérol à deux niveaux, ce qui le distingue des autres dérivés azolés qui n'agissent qu'à un seul niveau. Cette inhibition conduit à des altérations structurelles et fonctionnelles de la membrane cytoplasmique.

Indications :

Dermatophytoses :

- Traitement des dermatophytoses de la peau glabre : herpès circiné;
- Traitement des intertrigos des grands plis : eczéma marginé de Hébra, intertrigos génitaux et curraux ;
- Traitement des intertrigos des orteils : pied d'athlète ;
- Traitement d'appoint d'onyxis dermatophytique : un traitement antifongique est alors nécessaire.

Candidoses :

Les candidoses rencontrées en clinique humaine sont habituellement dues à Candida albicans. Cependant, la mise en évidence d'un candida sur la peau ne peut constituer en soi une indication.

- Traitement des intertrigos des grands plis : génitaux, curraux, interfessiers, axillaire et sous-mammaires;
- Traitement des intertrigos des petits plis : interdigitaux, interorteils;
- Traitement des perlèches, vulvites et anites;
- Traitement d'appoint d'onyxis ou périonyx. Un traitement systémique antifongique peut être discuté.

Dans certains cas, et en particulier dans les mycoses de la sphère péribuccale et péri-anogénitale, il est recommandé de traiter simultanément le tube digestif.

- pityriasis versicolor.

Contre-indications :

Le traitement par Canesten® Extra Crème est contre-indiqué en cas de :

- Hypersensibilité au bifonazole.
- Hypersensibilité à l'alcool cétostéarylque ou à l'un des autres constituants.

Mises en garde et précautions d'emploi :

Aucune étude approfondie n'a été réalisée chez l'enfant.

Les données cliniques recueillies ne laissent présager aucun effet nocif chez l'enfant.

Toutefois, le bifonazole ne doit être utilisé chez le nourrisson que sous surveillance médicale.

Eviter le contact avec les yeux.

Docteur Samir BETTAL

Spécialiste en Médecine Interne

Rhumatologie - Maladies de Système

Ex. Directeur Médical CHR Moulay Youssef - Casablanca

Ex. CHU Ibn Rochd Casablanca

Sur Rendez-vous



الدكتور سمير البطل

إختصاصي في الطب الباطني

الأمراض الباطنية - أمراض المفاصل

المدير الطبي للمستشفى الإقليمي مولاي يوسف سابقا

المركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد الدار البيضاء سابقا

بالموعد

Casablanca, le : ١٤/١٢/٢٠١٥ الدار البيضاء، في:

La ghalbi Fatma

٩٦٩٠

٢٩٠٠ ٢٠٠١

٣٠٠٠ ٣٠٠١

Dol. cox ٩٥٠

١٦٩٠٠

١٠٥٠٠ دهون ١٥٠

٣٧٠٠

Duroul ١٠٠

٦٨٠

Trimedol ٤٥٠

(١٥)

PHARMACIE JANQUIERE

Halima Janquierie
DOCTEUR SAMIR BETTAL
39, RUE JEAN JACQUES LA VILLE
H.M. CASABLANCA 10000
TÉL: 05 22 48 26 26



Business Plaza, N° 400 Boulevard Zerkouni

(Direction Mosquée Hassan II) 1er étage, N° 10 - Casablanca

Tél.: 05 22 48 26 26 - GSM : 06 61 42 52 06 - E-mail : bettalsamir@gmail.com

Acticoria 4

Wb. 90

3881w



(15)

~~Docteur SÉANIR BETTAL~~
Spécialiste en Médecine Interne
Rhumatologie - Maladies du Système
Business Plaza N° 1000 - Bâtiment 2
1er étage N° 10-0
Téléphone : 22 22 22 22

PHARMACIE JANQUIERE
39, Rue de la Gare - 75013 Paris
Tél. 53 61 66

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'allaitement de toujours DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MéDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

Zoegas n'est pas susceptible d'affecter l'aptitude de conduire ou d'utiliser des outils ou des machines.

LISTE DES EXCIPiens A EFFET NOTOIRE

Saccharose, Parahydroxybenzoate de propyle (E216), Parahydroxybenzoate de méthyle (E218).

EFFETS NON SAUHAITES OU GENANTS

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants. Si vous remarquez l'un de ces effets indésirables graves, arrêtez de prendre ZOEGAS et contactez un médecin immédiatement.

- Apparition soudaine d'une respiration sifflante, gonflement des lèvres, de la langue ou du corps, éruptions cutanées, perte de connaissance et difficultés à avaler (réactions allergiques graves).

- Rouges de la peau avec des bulles ou une desquamation. Parfois, les bulles peuvent être importantes et s'accompagner d'un saignement au niveau des lèvres, des yeux, de la bouche, du nez ou des parties génitales. Ceci peut correspondre à un syndrome de Stevens-Johnson ou à une destruction toxique de la peau.

- Jaunisse, urines foncées et fatigue peuvent être des symptômes d'une maladie du foie.

Ces effets sont rares et sont observés chez moins d'une personne sur 1000.

Les autres effets indésirables sont :

Effets indésirables fréquents (chez 1 à 10% des sujets traités) :

Maux de tête.

* Effets sur l'estomac ou l'intestin: diarrhée, douleurs à l'estomac, constipation, flatulence.

* Nausées, vomissements

Effets indésirables peu fréquents (chez moins de 1% des patients traités) :

* Gonflement des pieds et des chevilles.

* Troubles du sommeil (insomnie).

* Ecouissements, fourmissements, somnolence.

* Vertiges.

* Sécheresse de la bouche.

* Augmentation dans le sang des enzymes du foie.

* Éruptions cutanées, urticaire et démangeaisons.

* Fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres (si Zoegas 40mg est utilisé à des doses élevées et sur une longue période).

Effets indésirables rares (chez moins de 0,1% des patients traités) :

* Troubles sanguins tels qu'une diminution du nombre de globules blancs ou de plaquettes. Ces effets peuvent provoquer une faiblesse, des ecchymoses et faciliter la survenue d'infections.

* Diminution du taux de sodium dans le sang. Celle-ci peut provoquer une faiblesse, des nausées, des vomissements et des crampes.

* Agitation, confusion, dépression.

* Troubles du goût.

* Troubles de la vue, tels que vision trouble.

* Respiration sifflante ou souffle court (bronchospasme).

* Inflammation de l'intérieur de la bouche.

* Infection de l'intestin lié à un champignon (candidose gastro-intestinale).

* Troubles hépatiques incluant la jaunisse, pouvant entraîner une perte de poids.

* Perte de cheveux (alopecie).

* Éruption cutanée lors d'exposition au soleil.

* Douleurs articulaires (arthralgie) ou musculaires (myalgie).

* Sensation de faiblesse et manque d'énergie.

* Augmentation de la sueur.

Effets indésirables très rares (chez moins de 0,01% des patients)

* Modification du nombre de cellules du sang incluant l'agranulocytose.

* Agressivité.

Adultes et enfants à partir de 12 ans

* Si votre médecin diagnostique une inflammation pendant 4 semaines. Chez certains patients, une

réaction allergique peut se produire.

grave, votre estomac dû à

dose usuelle durant de tra

tion avec Zoegas.

stude de 40 patients chez

votre médecin.

conseil.

Si vous avez des problèmes hépatiques sévères, voici

En cas d'oubli :

Si vous oubliez de prendre votre dose, prenez-la dès que

prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose qui

normalement.

Demandez l'avis de votre médecin.

Conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de Zoegas que vous

pharmacien.

CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas

A conserver dans son emballage d'origine, à l'abri

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant

Tableau C (liste II).

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Septembre 2013.

DUOXOL
500 mg/2 mg
Boîte de 20 comprimés

une fois une
20 comprimés

37,00

PPV : 169DH00

PER : 10/22

LOT : I2105-2

Ceci est un médicament.

Un médicament n'est pas un produit comme les

Il vous concerne, vous et votre santé.

Le médicament est un produit actif.

Une longue recherche a permis de découvrir son efficacité.

Mais, son absorption n'est pas toujours sans danger.

Il ne faut jamais abuser des médicaments.

Il ne faut utiliser les médicaments qu'à bon escient.

Utiliser les médicaments prescrits comme vous le dit votre médecin.

Il sait quelles sont les médicaments dont vous avez besoin.

Exécutez explicitement les recommandations.

Interrompez pas. Ne

P.P.V : 47DH20
UT.AV : 05 - 24
LOT : 3132

COOPER PHARMA
LOT N°: 190944
PER : 01 - 2021
PPV : 86,90 DH