

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Pathologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



## Déclaration de Maladie

Nº P19- 0043363

Maladie

Dentaire

1578

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 02738 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre

Nom & Prénom :

Bourdane Fatima

Date de naissance :

Adresse :

Rue 32 d' 16 Quartier Ghommarienne  
Sidi Slimane

Tél. :

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Spécialiste en Radiologie  
2. Résidence Asphalte 11. Al Salihiya  
Tél. 05 22 50 18 18

Date de consultation :

Nom et prénom du malade : BOURDANE FATIMA Age:

Lien de parenté :

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :



Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) :

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes,	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
30/11/10	CS	01	280000 Assbab Sif SImane 50,79 18,12	J.F. AKA Gastroenterolog Bab Av. Al
11/12/10	CS	01	6	Specimen in my care

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie EL AFRY 4 N° 36 Hay Essam Gizi Silmane 27.00.02.21	30/11/19	560.80
	11/12/19	96.20

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

## AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### **Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ostéodensitométrie.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 D 00000000 35533411	21433552 00000000 G 00000000 11433553	B H 25533412 00000000 D 00000000 35533411	Coefficient DES TRAVAUX
	<b>[Création, remont, adjonction]</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

**DOCTEUR TIMRAZ AKRAM**

**الدكتور أكرم تمراز**

**SPECIALISTE**

Des Maladies de L'Appareil Digestif, Hémorroïdes

ENDOSCOPIE DIGESTIVE

ECHOGRAPHIE

Diplômé de la faculté de Médecine de Rabat

Ex Médecin à l'hôpital Ibn Sina de Rabat



اختصاصي

في أمراض الجهاز الهضمي والبواسير

الكشف بالمنظار

التشخيص بالأمواج الصوتية

خريج كلية الطب بالرباط

طبيب سابق بمستشفى ابن سينا بالرباط

Matricule 2738

Sidi Slimane, le 11/12/19

BOURDANE FATIMA

40.80

Ⓐ Algeixene supp sceng



30.40 Δ supp le soir



Ⓑ Nealgyl 80 sceng

21.00

Δ Ø X3)



Ⓒ Cibrox 80  
Δ Ø 72)

96.20

Pharmacie EL AFRAM  
Bloc 4 N° 3 Hay Essalem  
Sidi Slimane  
Tél : 0537.50.02.21

Dr. ANSELAH TIMRAZ  
Spécialiste en Béhavioral et Alimentation  
2, Résidence Sabah, Kissariat Abdessalam Ben Machich, Av. Istiklal - Sidi Slimane  
Tél: 05 37 65 13 18 / 06 22 90 63 60

Cabinet : 05 37 50 19 18

2، إقامة الصباح، قيسارية بن مشيش، شارع الاستقلال - سيدى سليمان

2, Résidence Sabah, Kissariat Abdessalam Ben Machich, Av. Istiklal - Sidi Slimane

**Librax®**

**Librax®** 5/2,5 mg

30 comprimés dragéifiés



6 118000 280019

LOT:19027 PER:04/2022  
PPU: 21,00 DH

permet une action rapide et efficace sur les symptômes intestinaux et génito-urinaires dûs à l'anxiété et à la tension psychique.

Chlordiazépoxide 5 mg et Clidinium bromure de 2,5 mg

espondant à 406 K.J.

Chlordiazépoxide et Clidinium bromure sont deux substances qui se complètent dans leur action sur les voies gastro-intestinales et les voies génito-urinaires. Chlordiazépoxide, exercice un effet anxiolytique, tensiolytique et sédatif. Il réduit l'anxiété et la tension psychique influent favorablement sur l'activité physique et mentale. Il élimine les spasmes de l'estomac et du rectum. L'association des deux principes actifs est très efficace dans le traitement des symptômes que l'on observe lors de troubles fonctionnels survenant au niveau intestinal et au niveau des voies génito-urinaires. Dans de tels cas, elle entraîne une stabilisation rapide des fonctions neuro-végétatives.

#### Pharmacocinétique :

Après prise orale, le chlordiazépoxide est pratiquement entièrement absorbé et parvient en majeure partie sous forme inchangée dans la circulation. La concentration plasmatique maximale est atteinte en moyenne en l'espace de deux à quatre heures. A l'état d'équilibre le volume de distribution du chlordiazépoxide est de 0,3-0,4 l/kg de poids corporel. La liaison aux protéines plasmatiques atteint 93-97%. La substance inchangée ainsi que le desméthylchlordiazépoxide, principal métabolite pharmacologiquement actif, traversent rapidement les barrières hémato-encéphaliques et placentaires; ils passent également en petites quantités dans le lait maternel.

La demi-vie plasmatique du chlordiazépoxide est de 15 minutes environ pendant la phase de distribution et de dix heures environ pendant la phase d'élimination. La clairance plasmatique totale est de l'ordre de 0,3-0,5 ml/min/kg. Moins de 1% d'une dose orale est retrouvé dans l'urine sous forme de chlordiazépoxide inchangé. La désalkylation et l'hydroxylation hépatique du chlordiazépoxide donnent naissance aux métabolites suivants, pharmacologiquement actifs : desméthylchlordiazépoxide, démoxépam, desméthyldiazepam. Le démoxépam et le desméthyldiazepam sont éliminés sous forme de conjugués inactifs de l'acide glucuronique. Lors d'administration répétée, l'état d'équilibre du chlordiazépoxide inchangé s'installe en l'espace de trois jours, tandis que les métabolites s'accumulent beaucoup plus lentement.

Le bromure de clidinium est absorbé en majeure partie sous forme inchangée dans l'intestin grêle, puis rapidement hydrolysé dans le foie en dérivé alcoolique comportant une amine quaternaire. Ce dérivé est éliminé dans l'urine et est également retrouvé dans les fèces au côté du bromure de clidinium inchangé. Une faible partie de la dose orale est soumise sous forme inchangée à une circulation entéro-hépatique. L'élimination dans l'urine s'effectue en deux phases, avec des demi-vies de respectivement 1½ et 20 heures en moyenne.

#### Indications :

Manifestations de l'anxiété s'accompagnant de troubles fonctionnels digestifs à composante spastique.

#### Posologie habituelle :

3-4 dragées par jour. Prendre le médicament de préférence une demi-heure avant les repas avec du liquide.

#### Directives posologiques particulières :

Patients âgés et faibles : commencer par 1-2 dragées par jour, puis augmenter peu à peu la posologie jusqu'à la dose optimale, efficace et tolérée.

Enfants : 1-2 dragées par jour, selon l'âge et l'affection à traiter. Les dragées peuvent être avalées entières ou écrasées, avec du liquide.

# ALGIXENE®

naproxène

ALGIXENE® 500

12 Suppositoires



6 118000 230052

40,80

LU : 04/2003  
PER : 02/2021  
PPV : 111,60 DH

antalgique et anti-inflammatoire non stéroïdien. Il possède également un effet

anti-inflammatoire

chroniques, notamment : polyarthrite rhumatoïde, arthrose invalidante, spondylarthrite ankylosante, goutte.

- Traitements de courte durée :

· Rhumatismes abarticulaires : tendinite, lombalgie, radiculalgie...

· Affections douloureuses non rhumatismales :

douleurs post-opératoires, douleurs post-traumatiques.

· Dysménorrhée

· Coliques néphrétiques.

Phlébite superficielle

;

· rhumatisme inflammatoire :

- Locaux : la forme suppositoires peut entraîner une irritation rectale, douleur et prurit. En cas d'intolérance rectale, le traitement doit être interrompu.

## MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE :

Voie orale ou rectale :

### Chez l'adulte :

\* rhumatisme inflammatoire :

- traitement d'attaque : la posologie est généralement de 1 g par jour : soit 4 gélules, ou 2 suppositoires par jour en 2 prises espacées de 12 heures, après repas.

- traitement d'entretien : la posologie est de 500 mg par jour : soit 2 gélules par jour en 2 prises espacées de 12 heures, ou 1 suppositoire par jour.

\* Dose antalgique :

la dose est généralement de 250 à 500 mg par jour en 1 ou 2 prises espacées de 12 heures.

Chez l'enfant dont le poids est supérieur à 25 kg : la posologie est généralement de 10 mg/kg/jour.

En cas d'effets indésirables digestifs mineurs (brûlure, douleurs), la prescription de topique gastro-duodénal peut être utile.

le pansement doit être administré à distance de la prise de ALGIXENE.

## SUPPOSÉS :

# NEALGYL® 80 mg

## Phloroglucinol

### IDENTIFICATION DU

#### Composition :

Phloroglucinol hydraté correspondant en phlor comprimé orodispersible

Excipients : lactose ma povidone PVP 90, stéarate d'oléine, crospovidone,

Excipient

NEALGYL® 80mg

Phloroglucinol

20 Comprimés  
orodispersibles

6 118 000 04 15 11

se

..... 80,00 mg quantité

..... 62,25 mg pour un

line, crospovidone,

Forme p

FPPV 34QH40

Comprim

PER 02/22

Existe en

LOT 1484-2

Classe p

.....

34,40

orodispersibles

### ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE

(A : appareil digestif et métabolisme)

(G : système génito-urinaire)

### DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est indiqué dans le traitement des douleurs spasmodiques de l'intestin, des voies biliaires, de la vessie et de l'utérus.

### ATTENTION !

Dans quel(s) cas ne pas utiliser ce médicament (Contre-indications)

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas d'allergie à l'un des composants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### Précautions d'emploi

EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.



**DOCTEUR TIMRAZ AKRAM**

**SPECIALISTE**

Des Maladies de L'Appareil Digestif, Hémorroïdes

ENDOSCOPIE DIGESTIVE

ECHOGRAPHIE

Diplômé de la faculté de Médecine de Rabat

Ex Médecin à l'hôpital Ibn Sina de Rabat

Mawicke 2738



**الدكتور أكرم تمراز**

اختصاصي

في أمراض الجهاز الهضمي والبواسير

الكشف بالمنظار

التخيص بالأمواج الصوتية

خريج كلية الطب بالرباط

طبيب سابق بمستشفى ابن سينا بالرباط

19.90

Sidi Slimane, le 30/11/11

BOURDAINE SATIMA

Ⓐ Ralmeugs ♂ S V

99.00 Ⓛ 8/2/11 A/R

Ⓑ Maymine ♂ 3cage  
Lcpl le soir

S.V

19.70 Ⓛ Azix ♂ Sac

S.V

46.00 Ⓛ 8/2/11 A/R

S.V

Ⓐ Voltaren ♂ 7/2/11  
Δρχ2/11 A/R

S.V

560.80 Ⓛ ~~Ralmeug Esac gèle~~ (bâte 28)  
Δcpl le 11/11/11 A/R

Dr. AKRAM TIMRAZ  
Spécialiste en Pathologie Digestive et Urologie  
Tél: 05 37 50 19 18 - Sidi Slimane  
2, Résidence Sabah, Kissariat Abdessalam Ben Machich, Av. Istiklal - Sidi Slimane  
Bab 44 - 10000 Hay Essaouira  
Tél: 0537500221

Cabinet : 05 37 50 19 18

2، إقامة الصباح، قيسارية بن مشيش، شارع الاستقلال - سيدى سليمان

2, Résidence Sabah, Kissariat Abdessalam Ben Machich - Sidi Slimane

# AZI

Azithro

6 118001 030408

VOLTAREN® SR 75 mg

Comprimés enrobés

**COMPOSÉ :**

Comprimé

**INDICATIONS :**

Traitement

- infection

pharyngée

- infection

- infection

- infection

- infection

- urétrite

**AZIX® 500 mg**

Azithromycine

3 Comprimés sécables



6 118000 040941

**CONTRAINTE :**

- Antécédent

- Insuffisance

PPV 79 DH / 0

PER 08/18

LOT E1500

**MISES EN GARDE :**

- Toute manifestation allergique (éruption cutanée, démangeaison ...) en cours de traitement doit être signalée immédiatement à votre médecin.
- Signaler au médecin traitant toute allergie ou manifestation allergique survenue lors de traitements par les antibiotiques de la famille des macrolides.
- Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une maladie hépatique.
- En l'absence de données, l'association aux dérivés de l'ergot de seigle n'est pas recommandée.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :**

- Prévenir le médecin traitant en cas de :

Insuffisance hépatique, antécédents allergiques, manifestations cutanées d'origine allergique, prise concomitante d'autres médicaments, grossesse, allaitement.

**EFFETS INDESIRABLES :**

- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées et douleurs abdominales.
- Manifestations allergiques; prurit, rash cutané, oedème de Quincke.

**POSOLOGIE :**

Se conformer à la prescription médicale.

Adulte et enfant de plus de 45 kg : 500 mg par jour, 1 comprimé de 500 mg en une prise par jour pendant 3 jours.

**MODE D'ADMINISTRATION :**

Azix peut être pris pendant ou en dehors des repas.

**TABLEAU A (LISTE I).**

82, Allée des Casuarinas - Ain Sebaï - Casablanca

S. Bachouchi - Pharmacien Responsable



Gouttes buvables  
Voie orale

# KALMAGAS®

Comprimés et Gouttes buvables



Comprimé  
Voie orale

## FORME ET PRÉSENTATION :

Comprimé, boîte de 30 comprimés  
Gouttes buvables, flacon de 30 ml

Lot: 180269

A consommer de préférence avant le: 05/2023

## COMPOSITION :

PPC: 79,90 DH

- Comprimé: Charbon actif naturel de tourbe (*piperita*); Huiles essentielles de Cellulose, phosphate mono calcium, amidon, gomme arabique, huile de ricin.
- Gouttes buvables: extraits secs de *Recutita*, de Carvi (*Carum carvi*), déminéralisée, Glycérol, conservateur.



8 032578 473018

**KALMAGAS®**

Boîte de 30 comprimés

**KALMAGAS®**

Boîte de 30 comprimés

## PROPRIÉTÉS :

- KALMAGAS® comprimé est un produit naturel à base de :
  - Charbon végétal (dérivé de la tourbe) à grande capacité d'absorption de gaz intestinaux ce qui permet de soulager les patients ballonnés et de faciliter la digestion.
  - Huiles essentielles de Menthe et de Fenouil qui renforcent l'action du charbon

# magmine

Magnésium 300 mg

Magnésium 300 mg  
+ Vitamine B6  
30 Comprimés

## COMPOSITION

### par comprimé

Oxyde de magnésium 1200 mg  
Soit un apport en magnésium élément  
par comprimé de 300 mg  
Vitamine B6 2 mg

## INGREDIENTS

Oxyde de magnésium,  
Sorbitol, Amidon de maïs,  
Stéarate de magnésium,  
Vitamine B6.

Valeur énergétique pour  
100 g (soit 12 comprimés) :  
128 Kcal/537 kJ

Complément alimentaire.  
N'est pas un médicament.

3 160929 905156

## CONSEILS D'EMPLOI

- Prendre 1 com

## PRÉSENTATION

Boîte de 30 com

# Magmine

Magnésium 300 mg  
+ Vitamine B6

1200 mg  
300 mg  
..... 2 mg

Sans sucre  
Sans sel

30 Comprimés

664 02 10  
LOT PER  
Prix 99,00

Laboratoires JUVA SANTE  
8, Rue Christophe Colomb  
75008 - PARIS

# ESAC® 40 mg

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice.



Ce médicament se présente sous forme de gélules contenant des microgranules gastro-résistantes.

ESAC est un médicament de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

ESAC est utilisé dans :

- Reflux gastro-oesophagien : traitement de l'œsophagite érosive par reflux.
- Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison.

## Quelles sont les informations nécessaires avant de prendre ESAC 40 mg ?

Il est particulièrement important d'informer votre médecin si vous prenez d'autres médicaments, même ceux sans prescription médicale.

## Ne pas utiliser ESAC 40 mg dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique à l'un des constituants d'ESAC,
- si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons,
- si vous prenez un médicament contenant de l'atazanavir (utilisé dans le traitement du VIH).

## Prendre des précautions particulières avec ESAC 40 mg dans les cas suivants :

- si vous prenez d'autres médicaments comme l'itraconazole ou le kétocozaole (pour les infections fongiques), le diazépam (contre l'anxiété), la phénytoïne (pour l'épilepsie), la warfarine (pour des troubles de la coagulation sanguine), ou le cisapride (pour des troubles liés à un retard de l'évacuation gastrique).
- si vous avez des problèmes hépatiques graves. Vous devez en discuter avec votre médecin, il peut réduire la posologie.
- si vous avez des problèmes rénaux graves. Vous devez en discuter avec votre médecin.
- si une association de médicaments vous est prescrite pour l'éradication de *Helicobacter pylori* avec ESAC ou si vous prenez ESAC dans le cadre d'un traitement à la demande, vous devez informer votre médecin des autres médicaments que vous prenez.

En cas de traitement à la demande, vous devez informer votre médecin de toutes modifications des symptômes.

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en sucrase isomaltase (maladies métaboliques rares).

gastro-duodénal.

Adultes :

Traitement de l'ulcère du duodénum en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori* :

La dose initiale est de 20 mg associé à deux antibiotiques (amoxicilline 1 G et arithromycine 500 Mg) deux fois par jour pendant 7 jours.

Traitement des ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens :

La dose habituelle est de 20 mg une fois par jour. La durée de traitement est de 4 semaines.

Prévention des ulcères de l'estomac et du duodénum associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens :

20 mg une fois par jour.

ESAC ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 12 ans en l'absence de données disponibles.

Suivez strictement les instructions de votre médecin et si vous avez un doute, n'hésitez pas à lui demander conseil.

**Si vous avez pris plus d'ESAC 40 mg que vous n'auriez dû :**

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

**Si vous avez oublié de prendre ESAC 40 mg :**

Prenez-le dès que possible.

Cependant, si vous êtes prêt à prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose que vous avez oubliée mais poursuivez votre traitement normalement.

## Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ESAC 40 mg est susceptible d'entraîner occasionnellement des effets indésirables chez certaines personnes.

Ces effets indésirables sont généralement d'intensité légère et disparaissent à l'arrêt du traitement.

## Effets indésirables fréquents

(chez 1 à 10 % des patients traités) :

Maux de tête, diarrhée, constipation, nausées, vomissements, douleurs abdominales, flatulence.

## Effets indésirables peu fréquents

(chez moins de 1 % des patients traités) :

Sensation vertigineuse, œdème périphérique, paresthésie (sensation anormale dans une région cutanée ou profonde), somnolence, insomnie, augmentation des enzymes du foie, réactions cutanées (dermatite, rash, prurit, urticaire), malaise.

## Effets indésirables rares

(chez moins de 0,1 % des patients traités) :

Confusion mentale réversible, agitation, agressivité, dépression et hallucinations, particulièrement chez des patients présentant des pathologies sévères, gynécostastie (gonflement des seins chez l'homme), sécheresse de la bouche, stomatite (inflammation de la bouche), candidose gastro-intestinale (infection due à un champignon), diminution du nombre des cellules sanguines (globules rouges,

