

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES À LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET ÉVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

0 Réclamation	: contact@mupras.com
0 Prise en charge	: pec@mupras.com
0 Adhésion et changement de statut	: adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W19-489431

15800

<input type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent (e)			
Matricule : <i>42119</i>	Société :		
<input type="checkbox"/> Actif	<input checked="" type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	
Nom & Prénom : <i>REHNAWI AZZEDDINE</i>			
Date de naissance : <i>26-11-57</i>			
Adresse : <i>143, Résidence Koura 149000 Casablanca</i>			
Tél. : <i>06-41-87-40-03</i> Total des frais engagés : <i>0/80,00</i> Dhs			

Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin :			
<div style="text-align: center;">  <i>DOCTEUR ABDELLAH OUAZZANI</i> <i>Spécialiste en Chirurgie Maxillo-Faciale & Stomatologique</i> <i>CASABLANCA</i> </div>			
Date de consultation : <i>02-01-2020</i>			
Nom et prénom du malade : <i>REHNAWI AZZEDDINE</i>			
Age: <i>63</i>			
Lien de parenté : <input checked="" type="checkbox"/> Lui-même <input type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant			
Nature de la maladie : <i>Maladie de l'ACCUEIL</i>			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : *02/01/2020*

Le : *02/01/2020*

Signature de l'adhérent(e) :

Docteur Abdellah OUAZZANI

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
02/01/20	CS	1CS	350.00	INP : INPE N° 091116400 Docteur Abdellah AOUAZZANI Spécialiste en Chirurgie Maxillo Faculté & Stomatologie 11, Rue Prince Moutay Abdellah CASABLANCA

EXÉCUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE DU DOUDOU	02/01/20	350.00
PHARMACIE DU DOUDOU	02/01/20	60.00

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
PHARMACIE DU DOUDOU	02/01/20	500 Dhs	500.00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES


Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :
				Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

O.D.F PROTHESES DENTAIRES



DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
	35533411	11433553
B		
G		

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

Coefficient DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Abdellah OUAZZANI

Spécialiste

En Chirurgie Maxillo-Faciale et Stomatologie
Diplômé de la faculté de Médecine de Paris

الدكتور عبد الله وزانى
اختصاصي في أمراض
وجراحة الفم وهيكل الوجه

Casablanca, le 22/01/2020

H. Benazzani Abdellah

(1) Bidontogyl



102,00 d 500 x 3 par jours 5 jours

PHARMACIE OUADOUDY
Dr OUADOUDY HICHAM
Tél: 0522 89 68 89
Hay Nassim Lissasta, Imme 400
Projet Yasmine - Casablanca

(2) Pharmaxil
JADOUDY HICHAM
Imme 400
Casablanca 35000



60,10 d 100 x 3 par jour 0,5 jrs

(3) Buccolyl (bon de bouchie
dilué après les repas

18,90

Docteur Abdellah OUAZZANI
Spécialiste en Chirurgie Maxillo-
Faciale et Stomatologie
Rue Prince Moulay Abdellah
22-89-43/44 - CASABLANCA

PHARMACIE OUADOUDY
Dr OUADOUDY HICHAM
Tél: 0522 89 68 89
Hay Nassim Lissasta, Imme 400
Projet Yasmine - Casablanca

11, Rue Prince Moulay Abdellah (4ème étage) - Prés du Café La Chope - Casablanca
Tél : 05 22 22 69 44 - E-mail : ouazzani.a@menara.ma

OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT

f) Conducteurs et utilisateurs de

En raison du risque potentiel de ve
ou de convulsions, il est recommandé
d'utiliser de machines en cas de su

**g) Liste des excipients dont la co
utilisation sans risque chez certa
Sorbitol.**

4. COMMENT UTILISER CE MEDICA

a) Posologie :

A titre indicatif, la posologie usuelle est la suivante :

Adulte et enfant de plus de 15 ans : 2 à 3 comprimés par jour en 2 ou 3
prises, au cours des repas.

**DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE
VOTRE MEDECIN.**

b) Mode et Voie d'administration :

Voie orale.

Prendre les comprimés avec un verre d'eau.

**c) Fréquence et moment auxquels le médicament doit être
administré :**

En 2 à 3 prises par jour, au cours d'un repas.

d) Durée du traitement :

Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé régulièrement aux
doses prescrites, et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura
conseillé.

La disparition de la fièvre, ou de tout autre symptôme, ne signifie pas
que vous êtes complètement guéri. L'éventuelle impression de fatigue,
n'est pas due au traitement antibiotique mais à l'infection elle-même. Le
fait de réduire ou de suspendre votre traitement serait sans effet sur
cette impression et retarderait votre guérison.

e) Conduite à tenir en cas de surdosage :

Consulter votre médecin car il peut vous proposer un traitement et une
surveillance.

5. EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

**COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT ENTRAINER, CHEZ
CERTAINES PERSONNES DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS.**

- Manifestations digestives : douleurs à l'estomac, nausées,
 vomissements, diarrhée, goût métallique dans la bouche, inflammation
 de la langue avec sensation de bouche sèche, perte d'appétit ;

Très rarement : colites pseudomembranuses (maladie de l'intestin avec
diarrhée et douleurs abdominales), pancréatites (inflammation du
pancréas) régressant à l'arrêt du traitement. Dans ces cas, consulter votre
médecin.

- Manifestations au niveau de la peau : éruptions parfois avec fièvre,
 urticaire (éruption cutanée analogue à celle que provoque la piqûre
 d'ortie), démangeaisons, œdème de Quincke (brusque gonflement du
 visage et du cou d'origine allergique), très rarement : choc allergique.
 Très rares cas de rougeur se généralisant à tout le corps avec des pustules
 et accompagnée de fièvre (pustulose exanthématique aiguë généralisée)
(cf. Mises en garde spéciales). Dans tous ces cas, consulter votre médecin.

- Système nerveux : sensations de picotement ou de fourmillement
 survenant occasionnellement et de façon passagère, maux de tête.

LOT : 9MA087
PER : 04/2022

**BIRODOGYL
CP PEL B15**

P.P.V : 102DH00



1180001860567

1180001860567

- Univers : coloration brun-rougeâtre des urines en raison de l'élimination
 du produit dans les urines.

**SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON
 SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE
 NOTICE.**

6. CONSERVATION

**Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le
 conditionnement extérieur.**

7. DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Mars 2010.

CONSEILS/ EDUCATION SANITAIRE :

Que savoir sur les antibiotiques?

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux
 bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus.
 Aussi, votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce
 qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle.
 Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré
 l'action d'un antibiotique. Ce phénomène est appelé résistance : il rend
 certains traitements antibiotiques inactifs.
 La résistance s'accroît par l'usage abusif ou inapproprié des
 antibiotiques.

Vous risquez de favoriser l'apparition de bactéries résistantes et donc de
 retarder votre guérison ou même de rendre inactif ce médicament, si
 vous ne respectez pas :

- la dose à prendre,
- les moments de prise,
- et la durée de traitement.

En conséquence, pour préserver l'efficacité de ce médicament :

**1/ N'utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a
 prescrit.**

2/ Respectez strictement votre ordonnance.

**3/ Ne réutilisez pas un antibiotique sans prescription médicale
 même si vous pensez combattre une maladie apparemment
 semblable.**

**4/ Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il
 n'est peut-être pas adapté à sa maladie.**

**5/ Une fois votre traitement terminé, rapportez à votre pharmacien
 toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et
 appropriée de ce médicament.**

des sensations, hallucinations; convulsions,
 et les mouvements, confusion. Dans ces
 cas, consulter votre médecin.

très rarement, modifications des tests du
 bilan hépatique, hépatite due à

sanguine : très rarement, anémie avec
 es rouges (cf. Précautions d'emploi), taux
 blancs ou de plaquettes dans le sang.

BUCCOTHYMOL

à la Lidocaïne

Flacon de 150 ml
Solution pour bain de bouche
et gargarismes

COMPOSITION

Acide salicylique	0,100 g
Chlorhydrate de lidocaïne	0,100 g
Menthol	0,050 g
Thymol	0,010 g
Ethanol	9,500 ml
Jaune orangé S	0,002 g
Eau purifiée q.s.p.	100,000 ml

INDICATIONS

Traitements locaux à visée antiseptique et antalgique.

CONTRE-INDICATIONS

Contre-indiqué chez les personnes sensibles aux substances actives.

MODE D'EMPLOI

Trois bains de bouche de 15 ml, soit le même volume de solution. Ce produit peut se prendre par la gencive.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Réserve à l'adulte et

18,90

Aldir 11/18
N10230B00

PPV:
60DH10

CEP
100

MAXILASE®
MAYLASE 3000 U. C.E.P.

60AD

SE/085

Distribué sous licence
par LAPROPHAN
21, rue des Outreaga
CASABLANCA - Maroc

**1. Que cette notice avant de
l'utiliser contient des informations
utiles.**
1. Utilisé en automédication
consultation ni prescription
sistent, au delà de 5 jours,
de nouveaux symptômes
chez l'aîné de votre pharmacien
pour vous aider à bien utiliser
ardez-là, vous pourriez avoir

MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES

2. Qu'est-ce que MAXILASE MAUX DE GORGE
ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P. comprimé enrobé
3. Comment prendre MAXILASE MAUX DE GORGE
ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P. comprimé enrobé
4. Quels sont les effets indésirables, éventuels
et de l'allaitement.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre

médicament, y compris un médicament obtenu sans

ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre

pharmacien.

EN CAS DE DOUCE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS

DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

3. Grossesse et allaitement
Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant
la grossesse.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le
traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger
de la nécessité de le poursuivre.

4. Allaitement
L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant
l'allaitement.

5. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE
ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé ?

La substance active est :

Alpha-amylase _____ 3000 U. C.E.P.*

Pour un comprimé enrobé.

* Soit 2143 Unités Pharmacopée Européenne par comprimé.

Une unité C.E.P. correspond à la quantité d'enzyme en mg

qui catalyse l'hydrolyse de 1 mg d'amidon en 10 secondes

dans les conditions du dosage.

6. Informations complémentaires

Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

7. Les autres composants sont :

Carmellose calcium, povidone, acide stéarique, silice

colloidale anhydre, lactoglobuline lactose, gomme laque

décrite blanche, gomme arabelique, saccharose, talc,

dioxyde de titane (E171), jaune orange S (E110), cire

d'abeille blanche.

8. D'où provient l'effet de ce médicament ?

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse

et de l'allaitement de toujours demander avis à votre

pharmacien.

9. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

10. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

11. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

12. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

13. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

14. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

15. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

16. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

17. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

18. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

19. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

20. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

21. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

22. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

23. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

24. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

25. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

26. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

27. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

28. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

29. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

30. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

31. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

32. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

33. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

34. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

35. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

36. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

37. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

38. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

39. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

40. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

41. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

42. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

43. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

44. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

45. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

46. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

47. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

48. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

49. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

50. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

51. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

52. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

53. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

54. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

55. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

56. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

57. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

58. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

59. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

60. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

61. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

62. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

63. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

64. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

65. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

66. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

67. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

68. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

69. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

70. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

71. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

72. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

73. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

74. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

75. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

76. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

77. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

78. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

79. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

80. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

81. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

82. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

83. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

84. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

85. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

86. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

87. Comment utiliser MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé

6. Informations complémentaires.

88. Que contient MAXILASE MAUX DE GORGE

ALPHA-AMYLASE 3000 U. C.E.P., comprimé enrobé et

CABINET DE RADIOLOGIE DU MAARIF

Dr. BERRADA M.
Radiologue

Dr BENYAHIA Z.
Radiologue

Domiciliation bancaire : Compte N 013 780011 20 000183001 43 48 BMCI Agence Val d'Anfa-casa
Patente : 34770967 LF 1087675 ICE : 001745076000019

Casablanca, le 02/01/2020

Facture

Nom & Prénom : **BENNANI AZEDDINE**

Date d'examen : 02/01/2020

Examen(s)	
ECHOGRAPHIE CERVICALE	
Montant TOTAL	500 DH

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
CINQ CENTS DH

RADIOLOGIE MAARIF
BERRADA M BENYAHIA Z
17, Rue Med Bahi
Tél 0522 25.74.82
Fax 0522 23 77.05

17, Rue Mohamed BAHI (es. Rue Meissonnier) en face du bureau de pointage des taxis-
Maarif. Casablanca 20100 Tél : 0522257482.237934/253030. Fax : 0522237705

Casablanca , le 02/01/2020

R/S

Mr. BENNANI AZEDDINE

ECHOGRAPHIE THYROIDIENNE :

- Glandes sub mandibulaires symétriques de taille et de morphologie normale, sans dilatation canalaire ni image de lithiase notable.

- Glandes parotides d'aspect morphologique normal.

- Glande thyroïde de taille normale, de contours réguliers, d'échostructure homogène, normovascularisée au doppler couleur, mesurant :
Lobe thyroïdien droit : 49 x 25 x 17 mm, soit un volume de 10,8 ml.
Lobe thyroïdien gauche : 54 x 22 x 16 mm, soit un volume de 10,5 ml.
L'isthme mesure 3,3 mm d'épaisseur.

- Présence de quelques ganglions jugulo-carotidiens et sub mandibulaires bilatéraux de taille millimétrique d'architecture conservée sans caractère suspect notable

AU TOTAL :

- **ECHOGRAPHIE THYROIDIENNE NE REVELANT PAS D'ANOMALIE SIGNIFICATIVE NOTABLE.**

Avec mes amicales salutations.

Dr. BENYAHIAZ
RADIOLOGISTE
BERRADA M. BENYAHIAZ
17, RUE MED. BAHI
Tél: 0522.25.74.82
Fax: 0522.23.71.05