

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - [www.mupras.com](http://www.mupras.com)

Nº P19- 0043218

15884

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent [e]

Matricule : 322 Société :

Actif  Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : 49MZA ZOHRA Rue MOUFTIR

Date de naissance : 1948

Adresse : 30c 50 N° 42 Spécialisé  
CSA

Tél. : 0692 13 60 56 Total des frais engagés : 2887,50 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

*Dra ENABOUD Hassan*  
Dra ENABOUD Hassan  
Medecin  
Derb Milan Av. 29 N° 80  
Casablanca

Date de consultation : 31/12

Nom et prénom du malade : 49MZA ZOHRA Age :

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : Diabète

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : 1/1/2010

Signature de l'adhérent(e) :

*MUPRAS*

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le paiement des Actes
23/01/20	U		200.00	DR BENABOUU HASSAN Médecin Dent Milan Av. No 80 Casablanca

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fourisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE HABIBA N° 10 Mars CASA - Tel: 0522 577 770	03/01/20	2477.50

### ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires
LABORATOIRE SIDI OTHMANE 1, Av. Abi Hourira Sidi Othmane Casablanca Tél: 0522 576 450 - Fax: 0522 371 190 Gsm: 06 60 11 27 32	04 JAN 2020	β 200.00	310.00

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'acte.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			Coefficient des Travaux
	H	25533412 00000000 35533411	G	21433552 00000000 11433553
	D	00000000 00000000	B	00000000 35533411
[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession				
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# Dr. BEN ABOUD Hassan

## الدكتور حسن بن عبد

Diplômé en Médecine Générale  
 Université Salamanque Espagne  
 DU en Echographie  
 DU en Diabétologie  
 DU en Nutrition Diététique  
 Université Montpellier France  
 DU en Gynécologie Médicale  
 Université Strasbourg France  
 Autorisation N 4971



شهادة الطب العام

خريج جامعة سلمانكا بإسبانيا  
 شهادة جامعية الفحص بالصدى  
 شهادة جامعية أمراض السكر  
 شهادة جامعية أمراض التغذية  
 خريج جامعة مونبليي بفرنسا  
 شهادة جامعية أمراض النساء  
 خريج جامعة ستراسبورغ بفرنسا  
 الرخصة رقم 4971

Casablanca, le ..... 3.1.10 ..... صيدلية نسرين

PHARMACIE NISRINE  
 Dr. Abdeljabbar HILLAL  
 Av. 10 Mars Bloc 50 N°80 Sidi Othmane  
 CASA - Tél : 05.22.57.77.03

HAMZA  
 ZOHNA  
 2,37 x 4  
 182,80 x 3

31,80 x 3

21,80 x 4

2477,50

JANUET 50/100  
 (K 2 fts)

Bi-preterax 10/2,5  
 1 un /

Zyloxic 200  
 100 / 5

Aspegoc 100  
 150 g /

Dr. .... Hassan  
 Medecin  
 Milan Av. 29 N° 80  
 Casablanca

# Dr. BEN ABOUD Hassan

## الدكتور حسن بن عبد

Diplômé en Médecine Générale  
Université Salamanque Espagne



DU en Echographie

DU en Diabétologie

DU en Nutrition Diététique

Université Montpellier France

DU en Gynécologie Médicale

Université Strasbourg France

Autorisation N 4971

شهادة الطب العام

خريج جامعة سالمونكا بإسبانيا

شهادة جامعية الفحص بالصدري

شهادة جامعية أمراض السكر

شهادة جامعية أمراض التغذية

شهادة جامعية أمراض النساء

خريج جامعة مونبليي بفرنسا

شهادة جامعية أمراض النساء

خريج جامعة ستراسبورغ بفرنسا

الرخصة رقم 4971

Casablanca, le ..... 3.1.20 .....

HANZA  
ZAFARA

sur

20 B7147

gynecolog, 2020

OB/GYN

Accide uaiou,

NFS

04 JAN. 2020

Dr BENABOUD Hassan  
Medecin  
Derb Milan Ay. 29 N° 80  
Casablanca

عمر بن الخطاب زنقة 29 رقم 80، الفداء - الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 81 52 18 - المتنقل : 06 61 13 00 07

Omar Ibn Khattab Rue 29 N° 80, El Fida - Casablanca - Tél. : 05 22 81 52 18 - GSM / 06 61 13 00 07

# ASPÉGIC® NOURRISSONS 100mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine

poudre pour solution buvable en sachet-dos

## 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a/ Dénomination : ASPÉGIC NOURRISSONS, 1

b/ Composition : Acétylsalicylate de DL-lysine

(quantité correspondante en acide acétylsalicylique)

Excipients : glycine, arôme mandarine (contient d'orange, huile essence de mandarine), glycérine, un sachet-dose de 204,6 mg.

c/ Forme pharmaceutique et présentation

Poudre pour solution buvable en sachet-dos

d/ Classe pharmaco-thérapeutique :

AUTRES ANALGÉSIEUX ET ANTIPYRÉTIQUES

2- DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

thérapeutiques)

Ce médicament contient de l'aspirine.

Il est indiqué : • en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures.

Dans cette indication, cette présentation est réservée à l'enfant de 6 à 22 kg ; lire attentivement la rubrique « Posologie ».

• dans le traitement de certaines affections rhumatismales.

Dans cette indication, cette présentation est réservée à l'enfant de 6 à 22 kg.

Pour les enfants ayant un poids ou un âge différent, il existe d'autres présentations d'aspirine : demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 3- ATTENTION !

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament (Contre-indications)

Ce médicament NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- allergie à l'aspirine ou à un médicament apparenté (notamment anti-inflammatoires non stéroïdiens) ou à l'un des autres composants, • antécédents d'asthme provoqué par l'administration d'aspirine ou d'un médicament apparenté (notamment anti-inflammatoires non stéroïdiens), • au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée) pour des doses supérieures à 100 mg par jour, • ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution, • maladie hémorragique ou risque de saignement, • maladie grave du foie, • maladie grave des

reins, • maladie grave du cœur, • traitement par le méthotrexate à des doses supérieures à 20 mg/semaine, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses, notamment dans le traitement des affections rhumatismales (50 à 100 mg/kg par jour), de la fièvre ou des douleurs (jusqu'à 60 mg/kg par jour), • traitement avec des anticoagulants oraux, et lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses, notamment dans le traitement des affections rhumatismales (50 à 100 mg/kg par jour), de la fièvre ou des douleurs (jusqu'à 60 mg/kg par jour) et en cas d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal (Cf. Interactions médicamenteuses et autres interactions).

EN CAS DE DOUCE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) Mises en garde spéciales : • Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée, chez les patients présentant une intolérance au lactose (maladie héréditaire rare). • En cas d'association à d'autres médicaments, pour éviter un risque de surdosage, vérifier l'absence d'aspirine dans la composition des autres médicaments. • En cas de maux de tête survenant lors d'une utilisation prolongée et à fortes doses d'aspirine, vous ne devez pas augmenter les doses, mais prendre l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

L'utilisation régulière d'antalgiques, en particulier plusieurs antalgiques en association, peut conduire à des lésions des reins. • Des syndromes de Reye (maladie rare mais très grave associant principalement des troubles neurologiques et une atteinte du foie) ont été observés chez des enfants présentant des maladies virales et recevant de l'aspirine.

En conséquence :

- en cas de maladie virale, comme la varicelle ou un épisode d'allure grippale : ne pas administrer d'aspirine à un enfant sans l'avis d'un médecin, - en cas d'apparition de trouble de la conscience ou du comportement et de vomissements chez un enfant prenant de l'aspirine, prévenez immédiatement un médecin.

\* L'aspirine ne doit être utilisée qu'après avis de votre médecin : • en cas de traitement d'une maladie rhumatismales, • en cas de déficit en G6PD (maladie héréditaire des globules rouges), car des doses élevées d'aspirine ont pu provoquer des hémolyse (destruction des globules rouges), • en cas d'antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, d'hémorragie digestive ou de gastrite, • en cas de maladie des reins ou du foie, • en cas d'asthme : la survenue de crise d'asthme, chez certains sujets, peut être liée à une allergie aux anti-inflammatoires non stéroïdiens ou à l'aspirine. Dans ce cas, ce médicament est contre-indiqué, • en cas de règles abondantes, • en cas de traitement par : • des anticoagulants oraux, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (jusqu'à 60 mg/kg par jour) et en l'absence d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal, • des

# ASPÉGIC® NOURRISSONS 100mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine

poudre pour solution buvable en sachet-dos

## 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a/ Dénomination : ASPÉGIC NOURRISSONS, 1

b/ Composition : Acétylsalicylate de DL-lysine

(quantité correspondante en acide acétylsalicylique)

Excipients : glycine, arôme mandarine (contient d'orange, huile essence de mandarine), glycérine, un sachet-dose de 204,6 mg.

c/ Forme pharmaceutique et présentation

Poudre pour solution buvable en sachet-dos

d/ Classe pharmaco-thérapeutique :

AUTRES ANALGÉSIEUX ET ANTIPIRÉTIQUES

2- DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

thérapeutiques)

Ce médicament contient de l'aspirine.

Il est indiqué : • en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures.

Dans cette indication, cette présentation est réservée à l'enfant de 6 à 22 kg ; lire attentivement la rubrique « Posologie ».

• dans le traitement de certaines affections rhumatismales.

Dans cette indication, cette présentation est réservée à l'enfant de 6 à 22 kg.

Pour les enfants ayant un poids ou un âge différent, il existe d'autres présentations d'aspirine : demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 3- ATTENTION !

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament (Contre-indications)

Ce médicament NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- allergie à l'aspirine ou à un médicament apparenté (notamment anti-inflammatoires non stéroïdiens) ou à l'un des autres composants, • antécédents d'asthme provoqué par l'administration d'aspirine ou d'un médicament apparenté (notamment anti-inflammatoires non stéroïdiens), • au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée) pour des doses supérieures à 100 mg par jour, • ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution, • maladie hémorragique ou risque de saignement, • maladie grave du foie, • maladie grave des

reins, • maladie grave du cœur, • traitement par le méthotrexate à des doses supérieures à 20 mg/semaine, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses, notamment dans le traitement des affections rhumatismales (50 à 100 mg/kg par jour), de la fièvre ou des douleurs (jusqu'à 60 mg/kg par jour), • traitement avec des anticoagulants oraux, et lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses, notamment dans le traitement des affections rhumatismales (50 à 100 mg/kg par jour), de la fièvre ou des douleurs (jusqu'à 60 mg/kg par jour) et en cas d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal (Cf. Interactions médicamenteuses et autres interactions).

EN CAS DE DOUCE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) Mises en garde spéciales : • Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée, chez les patients présentant une intolérance au lactose (maladie héréditaire rare). • En cas d'association à d'autres médicaments, pour éviter un risque de surdosage, vérifier l'absence d'aspirine dans la composition des autres médicaments. • En cas de maux de tête survenant lors d'une utilisation prolongée et à fortes doses d'aspirine, vous ne devez pas augmenter les doses, mais prendre l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

L'utilisation régulière d'antalgiques, en particulier plusieurs antalgiques en association, peut conduire à des lésions des reins. • Des syndromes de Reye (maladie rare mais très grave associant principalement des troubles neurologiques et une atteinte du foie) ont été observés chez des enfants présentant des maladies virales et recevant de l'aspirine.

En conséquence :

- en cas de maladie virale, comme la varicelle ou un épisode d'allure grippale : ne pas administrer d'aspirine à un enfant sans l'avis d'un médecin, - en cas d'apparition de trouble de la conscience ou du comportement et de vomissements chez un enfant prenant de l'aspirine, prévenez immédiatement un médecin.

\* L'aspirine ne doit être utilisée qu'après avis de votre médecin : • en cas de traitement d'une maladie rhumatismales, • en cas de déficit en G6PD (maladie héréditaire des globules rouges), car des doses élevées d'aspirine ont pu provoquer des hémolyse (destruction des globules rouges), • en cas d'antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, d'hémorragie digestive ou de gastrite, • en cas de maladie des reins ou du foie, • en cas d'asthme : la survenue de crise d'asthme, chez certains sujets, peut être liée à une allergie aux anti-inflammatoires non stéroïdiens ou à l'aspirine. Dans ce cas, ce médicament est contre-indiqué, • en cas de règles abondantes, • en cas de traitement par : • des anticoagulants oraux, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (jusqu'à 60 mg/kg par jour) et en l'absence d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal, • des

# ASPÉGIC® NOURRISSONS 100mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine

poudre pour solution buvable en sachet-dos

## 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a/ Dénomination : ASPÉGIC NOURRISSONS, 1

b/ Composition : Acétylsalicylate de DL-lysine

(quantité correspondante en acide acétylsalicylique)

Excipients : glycine, arôme mandarine (contient d'orange, huile essence de mandarine), glycérine, un sachet-dose de 204,6 mg.

c/ Forme pharmaceutique et présentation

Poudre pour solution buvable en sachet-dos

d/ Classe pharmaco-thérapeutique :

AUTRES ANALGÉSIEUX ET ANTIPYRÉTIQUES

2- DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

thérapeutiques)

Ce médicament contient de l'aspirine.

Il est indiqué : • en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures.

Dans cette indication, cette présentation est réservée à l'enfant de 6 à 22 kg ; lire attentivement la rubrique « Posologie ».

• dans le traitement de certaines affections rhumatismales.

Dans cette indication, cette présentation est réservée à l'enfant de 6 à 22 kg.

Pour les enfants ayant un poids ou un âge différent, il existe d'autres présentations d'aspirine : demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 3- ATTENTION !

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament (Contre-indications)

Ce médicament NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- allergie à l'aspirine ou à un médicament apparenté (notamment anti-inflammatoires non stéroïdiens) ou à l'un des autres composants, • antécédents d'asthme provoqué par l'administration d'aspirine ou d'un médicament apparenté (notamment anti-inflammatoires non stéroïdiens), • au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée) pour des doses supérieures à 100 mg par jour, • ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution, • maladie hémorragique ou risque de saignement, • maladie grave du foie, • maladie grave des

reins, • maladie grave du cœur, • traitement par le méthotrexate à des doses supérieures à 20 mg/semaine, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses, notamment dans le traitement des affections rhumatismales (50 à 100 mg/kg par jour), de la fièvre ou des douleurs (jusqu'à 60 mg/kg par jour), • traitement avec des anticoagulants oraux, et lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses, notamment dans le traitement des affections rhumatismales (50 à 100 mg/kg par jour), de la fièvre ou des douleurs (jusqu'à 60 mg/kg par jour) et en cas d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal (Cf. Interactions médicamenteuses et autres interactions).

EN CAS DE DOUCE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) Mises en garde spéciales : • Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée, chez les patients présentant une intolérance au lactose (maladie héréditaire rare). • En cas d'association à d'autres médicaments, pour éviter un risque de surdosage, vérifier l'absence d'aspirine dans la composition des autres médicaments. • En cas de maux de tête survenant lors d'une utilisation prolongée et à fortes doses d'aspirine, vous ne devez pas augmenter les doses, mais prendre l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

L'utilisation régulière d'antalgiques, en particulier plusieurs antalgiques en association, peut conduire à des lésions des reins. • Des syndromes de Reye (maladie rare mais très grave associant principalement des troubles neurologiques et une atteinte du foie) ont été observés chez des enfants présentant des maladies virales et recevant de l'aspirine.

En conséquence :

- en cas de maladie virale, comme la varicelle ou un épisode d'allure grippale : ne pas administrer d'aspirine à un enfant sans l'avis d'un médecin, - en cas d'apparition de trouble de la conscience ou du comportement et de vomissements chez un enfant prenant de l'aspirine, prévenez immédiatement un médecin.

\* L'aspirine ne doit être utilisée qu'après avis de votre médecin : • en cas de traitement d'une maladie rhumatismales, • en cas de déficit en G6PD (maladie héréditaire des globules rouges), car des doses élevées d'aspirine ont pu provoquer des hémolyse (destruction des globules rouges), • en cas d'antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, d'hémorragie digestive ou de gastrite, • en cas de maladie des reins ou du foie, • en cas d'asthme : la survenue de crise d'asthme, chez certains sujets, peut être liée à une allergie aux anti-inflammatoires non stéroïdiens ou à l'aspirine. Dans ce cas, ce médicament est contre-indiqué, • en cas de règles abondantes, • en cas de traitement par : • des anticoagulants oraux, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (jusqu'à 60 mg/kg par jour) et en l'absence d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal, • des

# ASPÉGIC® NOURRISSONS 100mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine

poudre pour solution buvable en sachet-dos

## 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a/ Dénomination : ASPÉGIC NOURRISSONS, 1

b/ Composition : Acétylsalicylate de DL-lysine

(quantité correspondante en acide acétylsalicylique)

Excipients : glycine, arôme mandarine (contient d'orange, huile essence de mandarine), glycérine, un sachet-dose de 204,6 mg.

c/ Forme pharmaceutique et présentation

Poudre pour solution buvable en sachet-dos

d/ Classe pharmaco-thérapeutique :

AUTRES ANALGÉSIEUX ET ANTIPIRÉTIQUES

2- DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

thérapeutiques)

Ce médicament contient de l'aspirine.

Il est indiqué : • en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures.

Dans cette indication, cette présentation est réservée à l'enfant de 6 à 22 kg ; lire attentivement la rubrique « Posologie ».

• dans le traitement de certaines affections rhumatismales.

Dans cette indication, cette présentation est réservée à l'enfant de 6 à 22 kg.

Pour les enfants ayant un poids ou un âge différent, il existe d'autres présentations d'aspirine : demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 3- ATTENTION !

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament (Contre-indications)

Ce médicament NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- allergie à l'aspirine ou à un médicament apparenté (notamment anti-inflammatoires non stéroïdiens) ou à l'un des autres composants, • antécédents d'asthme provoqué par l'administration d'aspirine ou d'un médicament apparenté (notamment anti-inflammatoires non stéroïdiens), • au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée) pour des doses supérieures à 100 mg par jour, • ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution, • maladie hémorragique ou risque de saignement, • maladie grave du foie, • maladie grave des

reins, • maladie grave du cœur, • traitement par le méthotrexate à des doses supérieures à 20 mg/semaine, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses, notamment dans le traitement des affections rhumatismales (50 à 100 mg/kg par jour), de la fièvre ou des douleurs (jusqu'à 60 mg/kg par jour), • traitement avec des anticoagulants oraux, et lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses, notamment dans le traitement des affections rhumatismales (50 à 100 mg/kg par jour), de la fièvre ou des douleurs (jusqu'à 60 mg/kg par jour) et en cas d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal (Cf. Interactions médicamenteuses et autres interactions).

EN CAS DE DOUCE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) Mises en garde spéciales : • Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée, chez les patients présentant une intolérance au lactose (maladie héréditaire rare). • En cas d'association à d'autres médicaments, pour éviter un risque de surdosage, vérifier l'absence d'aspirine dans la composition des autres médicaments. • En cas de maux de tête survenant lors d'une utilisation prolongée et à fortes doses d'aspirine, vous ne devez pas augmenter les doses, mais prendre l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

L'utilisation régulière d'antalgiques, en particulier plusieurs antalgiques en association, peut conduire à des lésions des reins. • Des syndromes de Reye (maladie rare mais très grave associant principalement des troubles neurologiques et une atteinte du foie) ont été observés chez des enfants présentant des maladies virales et recevant de l'aspirine.

En conséquence :

- en cas de maladie virale, comme la varicelle ou un épisode d'allure grippale : ne pas administrer d'aspirine à un enfant sans l'avis d'un médecin, - en cas d'apparition de trouble de la conscience ou du comportement et de vomissements chez un enfant prenant de l'aspirine, prévenez immédiatement un médecin.

\* L'aspirine ne doit être utilisée qu'après avis de votre médecin : • en cas de traitement d'une maladie rhumatismales, • en cas de déficit en G6PD (maladie héréditaire des globules rouges), car des doses élevées d'aspirine ont pu provoquer des hémolyse (destruction des globules rouges), • en cas d'antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, d'hémorragie digestive ou de gastrite, • en cas de maladie des reins ou du foie, • en cas d'asthme : la survenue de crise d'asthme, chez certains sujets, peut être liée à une allergie aux anti-inflammatoires non stéroïdiens ou à l'aspirine. Dans ce cas, ce médicament est contre-indiqué, • en cas de règles abondantes, • en cas de traitement par : • des anticoagulants oraux, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (jusqu'à 60 mg/kg par jour) et en l'absence d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal, • des

78027234/010414-1



6 118001 160495

JANUMET® 50/1000 mg

AMM 59DMP/21/NCI

Boîte de 56 comprimés pelliculés

DISTRIBUÉ PAR MSD MAROC P.P.V : 437,00 DH

78027234/010414-1



6 118001 160495

JANUMET® 50/1000 mg

AMM 59DMP/21/NCI

Boîte de 56 comprimés pelliculés

DISTRIBUÉ PAR MSD MAROC P.P.V : 437,00 DH

78027234/010414-1



6 118001 160495

JANUMET® 50/1000 mg

AMM 59DMP/21/NCI

Boîte de 56 comprimés pelliculés

DISTRIBUÉ PAR MSD MAROC P.P.V : 437,00 DH

78027234/010414-1



6 118001 160495

JANUMET® 50/1000 mg

AMM 59DMP/21/NCI

Boîte de 56 comprimés pelliculés

DISTRIBUÉ PAR MSD MAROC P.P.V : 437,00 DH

# بِيرِيتِرَاكِس® أَرْجِنِين 10 ملِغ/2,5 ملِغ

حِبَّاتِ مَلِبَسَةٍ

أرجینین / اندابامید

برواد: لأنها تحتوي على معلومات هامة لك.

اعطاها الشخص آخر، ستر، وإن كانت الأعراض مشابهة، فقد تتحقق بغيره. **عادي**، إن هذا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المرئي بها في هذه النشرة (انظر إلى منقطع 4: **ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟**)

- بريديل (العلاج الذئبة الصدرية) .  
ستوريد (العلاج العلاني) .  
الدواء المسعمه في علاج خلل ضربات القلب (منها: quinidine ، hydroquinidine ، sotalol ، disopyramide ، amiodarone ، sotalol ، disopyramide ، daigemizol) تتمثل علاج اضطرابات المدنة و اضطرابات الهضم ) سيرابيد ، دايجيميزول) .  
ديغوكسين digoxine أو غيره من الدواء الديجيغالية (العلاج اضطرابات القلب) .  
باقاً كفون baclofene (العلاج تيسن المضلات الناتج عن تعبات متوفة) .  
الدواء المسعمه في علاج داء السكري مثل الأسلونين والمتفورمين والكلينتين .  
الكلسيوم ، بما فيها كاتالستوكلسون .  
المسلفات اللثائية ( منها send ) .  
مضادات الالتهاب الغير سيروبوديما ( مثل ibuprofene ) ، أو الأدوية المفترية على مقدار كبير من اسلاسلات ( مثل اسيبرين ) .  
اموفوريسين amphotericine B ياخذون (العلاج اضطرابات الفطريه السفنه) .  
الدواء المسعمه في علاج اضطرابات القلب ، مثل الاكتئاب ، او القلق ، او القضم ... ( مثل مضاد الاركتاب تلك الحقلي ، او مضادات الدهان) .  
تشراكتوكينide tetracosactide (العلاج مرض كرون maladie de Crohn ) .  
برامينوروم (العلاج حالات العبوبي) .  
ومعات الأدوية المسعمه بما فيها التبرات (المتحضرات التي من شأنها توسيع الأوعية الدموية)

الأدوية المستعملة في علاج موطن الصبغة الوردي علاج الريبو (منها فيبرين أو نورا درين أو أورين)، مستاكروجنين 10 ملجم/2.5 ملجم حبات ملائمة مع الطعام والشراب

العمل والإرضاع: إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، أو متقدبين بأنك حامل أو متخطلين للإنتبا، راجعي الطبيب أو العيادة لأني قبل المباشرة بتعاطي أي دواء.

ملبة وفي آية حالة يستعمل؟  
نـس ارجـنـين 10 مـلـعـ / 2,5 مـلـعـ ،

میات ملیتہ؟

## ملائكة وفي أية حالة يستعمل؟

اللام انتقام الضغط الشهري

ملاة البراندوميريل 10 ملخ وبواسطة

لنك ، ان يأخذوا حبة واحدة من المادتين الفعاليتين

جودة الماء (IEC) . ونقوم هذه

مصدر عن الكليتين . لكن الاندماج

رقة ضئيلة . بهذه تقوم هاتين المادتين

11-3541-10-1-1-2

راكس ارجنتين 10 مل (5,5٪ مدع)

ناكر ، عليك باستئنافه قبل المباشرة

**Bipreterax®** 

Péridopril arginine/Indapamide  
30 Comprimés pelliculés



6118000100331

ان بيسيتراس ارجين 10 مل 2.5 مل علبة عبارة عن مزيج من مادتين فعاليتين .- البرانوبريل والانداباميد . وعوнач لارتفاع الضغط الشرياني . يوصى لعلاج ارتفاع الضغط الشرياني . يوصى ببيسيتراس ارجين 10 مل 2.5 مل للملتحفين بواسطة البرانوبريل 10 مل وبواسطة الانداباميد 2.5 مل على حدا . فاما بسيتراس ارجين عصان عن كل ذلك ، ان اخذنا حلة واحدة من ببيسيتراس ارجين 10 مل 2.5 مل حيث أنها تؤثر على هاتين المادتين الفعاليتين . ينصح البرانوبريل إلى ستف بسيطات ضخمة بروول الالكترونيين (IEC) . وتقوم هذه المادة بفتح الاصمام المائية . مدة اثمارها 15 دقيقة . شدة الالم

إن الإنذار يزيد مقدار اليلول. وإن مقدرات اليلول ترفع مقدار اليلول الصادر عن الكليتين. لكن الإنذار يزيد

مختلف عن بقية مدنات اليلو ، بحيث أنه يرتفع مقدار اليلو بدرجة غشية . بهذا تقوم هاتين المادتين المعاكستن : تلخص الفسط الشيابي و تعميلان معنة بالتحكم به .

2- ما هي المعلومات المفروض معرفتها قبل أحد بيين ستيرلاكس ارجحب 10 منع (٢,٥ منع ، حبات ملمسة؟

إن سبق وأعملت طبيك بعدم استيعابك لبعض أنواع السكاكر ، عليك باستشارته قبل الماشرة

# بِيرِيتِرَاكِس® أَرجُنِين 10 ملِغ/2,5 ملِغ

حِبَّاتِ مَلْبَسَةٍ

أرجینین / اندابامید

رواء : لأنها تحتوي على معلومات هامة لك .

اعطاً الشخص آخر، حتى وإن كانت الأعراض مشتبه بها، فقد تلحظ به الصورة. **وفي هذا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المرئي بها في هذه النشرة (انظر إلى منقطع 4: ماهي الآثار الجانبية المحتملة؟)**

- بريديل (العلاج الذئبة الصدرية) .  
 ستروريد (العلاج العلاني) .  
 الادوية المسنعة في علاج خلل ضربات القلب (منها: quinidine ، hydroquinidine ، disopyramide ، amiodarone ، sotalol ، procainamide ، procainamide ، دايبقمايل) تتمثل علاج اضطرابات المدنة و اضطرابات الهضم ) سيرابيرد ، دايبقمايل( .  
 ديفوكسين digoxine او غيره من الادوية الديجيتالية (العلاج اضطرابات القلب) .  
 بايكوفون baclofene (العلاج تيسن المضلات الناتج عن تعبات متعددة) .  
 الادوية المسنعة في علاج داء السكري مثل الاسلوتين والمتغورمين والكلابين .  
 الكسلوبوم ، بما فيها كاتالوبولكسيل .  
 المسهلات اللثائية ( منها send ) .  
 مضادات الالتهاب الغير ستروريدية ( مثل ibuprofene ) ، او الادوية المفترضة على مقدار كبير من المسهلات ( مثل اسيتوفين ) .  
 اموفوريسين amphotericine B ياخذون (العلاج اضطرابات الفطريات السفينة) .  
 الادوية المسنعة في علاج اضطرابات النفسية ، مثل الاكتئاب ، او القلق ، او القضم ... ( مثل مضاد الاركتان تلك الحقلي ، او مضادات الذهان) .  
 تشراكوزاكيد tetracosactide (العلاج مرض كرون maladie de Crohn ) .  
 ترياميزوروم (العلاج حالات العبوبي) .  
 مساعات الادوية المسنعة بما فيها التترات (المستحضرات التي من شأنها توسيع الاوعية الدموية)

الأدوية المستعملة في علاج موطن الصبغة الوردي علاج الريبو (منها فيبرين أو نورا درين أو أورين)، مستاكروجنين 10 ملجم/2.5 ملجم حبات ملائمة مع الطعام والشراب

العمل والإرضاع: إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، أو متقدبين بأنك حامل أو متخطلين للإنجاب، راجعي الطبيب أو العيادة لأي تغيير في الملامح أو تغير في المenses أو أي دوار.

ملبة وفي آية حالة يستعمل؟  
نـس ارجـنـين 10 مـلـعـ / 2,5 مـلـعـ ،

میات ملیتہ؟

## ملائكة وفي أية حالة يستعمل؟

## اللام انتقام الضغط الشهري

ملاة البراندوميريل 10 ملخ وبواسطة

لنك ، ان يأخذوا حبة واحدة من المادتين الفعاليتين .

جودة الماء (IEC) . ونقوم هذه

مصدر عن الكليتين . لكن الانداباميد

رقة ضئيلة . بهذه تقوم هاتين المادتين

11-25411-10-1-1-2

ألاكس ارجنتين 10 مل (5,5٪ مدع )

ناكر ، عليك باستئنافه قبل المباشرة

**Bipreterax®** 

**Péridopril arginine/ Indapamide  
30 Comprimés pelliculés**



6118000100331

إن بيبيرلاكس أرجين 10 مل 2.5 مل ملعة عبارة عن مزيج من مادتين مغلفتين: البراندوميريل والإندانابايد. وهو مصادر لانفع الصبغة الكربوكسية، ويوصي بعلاجه لارتفاع ضغط الدم الشرياني. يوصي بيبيرلاكس أرجين 10 مل 2.5 مل ملعة عبارة عن مزيج من مادتين مغلفتين ببراندوميريل 10 مل وبروستاتين الإندانابايد 2.5 مل على حدا. تناولكم، عصا عن ذلك، أن يأخذوا منه واحدة من بيبيرلاكس أرجين 10 مل 2.5 مل حيث أنها تحتوي على هاتين المادتين المغلفتين. يوصي ببراندوميريل على حشف معدلات شحمة تحويل الأرجينوتين (ICB). ونقوم هذه المادة بدوره الأهمية في تحويل الأرجين إلى أرجينات.

إن الإنذار يزيد مدّة الـ 30 يوماً. وإن مدّرات الـ 30 يوماً ترفع مقدار الـ 30 يوماً الصادر عن الكلتين. لكن الإنذار يزيد مدّة الـ 30 يوماً.

مختلف عن بقية مملوکات الیوق ، بحيث انه يرقى مقدار الیول بدرجة غشیلة . بهذا تقوم هاتین المادتين الفعاليتين . تخفیض الضغط الشیاری . و تعمیلان معنة بالتحكم به .

٢ . ما هي المعلومات المفروض معرفتها قبل أحد بيين شيراس ارججن ١٥ منع / ٢,٥ منع ،  
حيث ملءة ؟

إن سبق وأعلنت طبتك بعدم استيعابك لبعض أنواع السكاكر، عليك باستئنافه قبل الماشرة

# بِيرِيتِرَاكِس® أَرْجِنْتِين 10 ملِغ/2,5 ملِغ

حِبَّاتِ مَلِبَسَةٍ

أرجینین / اندابامید

لأنها تحتوي على معلومات هامة لك.

- بيريديل (العلاج الذئبة الصدرية) .  
 ستيرويد (العلاج للدهان) .  
 الأدوية المسنعة في علاج خلل ضربات القلب (منها: quinidine ، hydroquinidine ، disopyramide ، amiodarone ، sotalol ، procainamide ، daunamycin) .  
 تتمثل علاج اضطرابات المعدة واضطرابات الهضم (دغوكسین digoxine أو غيره من الأدوية الديجيتالية (العلاج لاضطرابات القلب) .  
 ياكافون baclofene (العلاج تيسير المضلات الناتج عن تعبات متعددة) .  
 الأدوية المسنعة في علاج داء السكري مثل الأسلونين والمتفورمين والكلابين .  
 الكلسوبون ، بما فيها كاتالست الكلسوبون .  
 المسهولات للنفحة (منها send) .  
 مضادات الاتهاب الغير ستيرويدية (مثل ibuprofene) ، أو الأدوية المفترضة على مقدار كبير من مضادات الاتهاب (مثل الأسيتون) .  
 سيلسالات (مثل amphotericine B) .  
 أموفوريسين amphotericine B بالحقن (العلاج لاضطرابات الفطريات السفهية) .  
 الأدوية المسنعة في علاج اضطرابات القلب ، مثل الإكتئاب ، أو القلق ، أو القضم ... (مثل مضاد الإكتئاب ثلاثي الحلقي ، أو مضادات الدهان) .  
 تشراكوزاكبide tetracosactide (العلاج مرض كرون maladie de Crohn) .  
 ترياميزوروم (العلاج حالات العدوى) .  
 مساعات الأدوية المسنعة بما فيها التبرات (المستحضرات التي من شأنها توسيع الأوعية الدموية)

الآذية المستعملة في علاج هوط الصعقة الشريانية، أو في علاج الصدمة أو في علاج الربو (منها فيديرين أو نورادرينالين أو أفيدين)،  
برستاك - أرجين 10 مل - 2.5 مل محت ملطة مع الطعام والشراب

العمل والارتفاع: إذا كنت حاملاً أو مرتضاً، أو تعتقدين بأنك حامل أو تحظين بالإنجاب، راجعي الطبيب أو العيادة لأني قبل الملاشرة بتعاطي أي دواء.

مليئة وفي أية حالة يستعمل؟  
كيس ارجوين 10 ملخ / 2.5 ملخ ،  
فبات مليئة؟

## بـ ملبة وفي آية حالة يستعمل؟

2- ما هي المعلومات المفروض معرفتها قبل أحد ببريزيراكس لرجبن 10 ملخ / 2,5 ملخ ،  
حيات مليئة؟  
إن سبق وأعملت طبتك بعدم استيعابك بعض أنواع السكاكر ، عليك باستشارته قبل الماشرة  
بأخذ هذا الدواء .

182,80

**Bipreterax®**  
Arginine 10

Périmodopril arginine/ Indapamide  
30 Comprimés pelliculés



6118000100331







**SIDI OTHMAN**

مختبر التحاليل الطبية

**ANALYSES MEDICALES  
ET SCIENTIFIQUES**

Dr. Abderrahim KOUNDA

Pharmacien Biologiste

31, Avenue Abi Houraira - Sidi Othman - Casablanca 04 - Tél.: 05.22.576450/06.60.11.27.32 - Fax: 05.22.371190

**RC.: 171492 - CNSS 1284041 - Patente 37200352**

## FACTURE

*Casablanca le:* 04/01/2020

**Nom et Prénom:** HAMZA ZOHRA

**Référence:** 0ADH39252



2DB7147



*A payé au laboratoire la somme de :* 310.00 DH B 200

*Pour des analyses cotées à :*

NFS=B50 HBA1C=B100 GLY=B20 AUR=B30

**RETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :**

TROIS CENT DIX Dhs 00 Cts

**Dont Prélèvement inclus**

**N° DE PATENTE :** 37200351

**Et sur demande du docteur :** BEN ABOUD HASSAN

IF: 49401760  
INPE: 093000172  
ICE: 001566977000014

LABORATOIRE SIDI OTHMANE  
31, Av. Abi Houraira Sidi Othmane  
Casablanca  
Tél.: 0522.576.450 - Fax: 0522.371.190  
Gsm: 06.60.11.27.32

**SIDI OTHMAN****مختبر التحاليل الطبية****ANALYSES MEDICALES  
ET SCIENTIFIQUES**

Dr. Abderrahim KOUNDA

Pharmacien Biologiste

31, Avenue Abi Houraira - Sidi Othman - Casablanca 04 - Tél.: 05.22.576450/06.60.11.27.32 - Fax: 05.22.371190

**RC.: 171492 - CNSS 1284041 - Patente 37200352****Casablanca le: 04/01/2020****Mme HAMZA ZOHRA****ORGANISME: MUTUELLE****Référence: 0ADH39252****Dossier No: 2DB7147** **Médecin: Dr. BEN ABOUD HASSAN****HEMATOLOGIE**

Analyses	Résultats	Normes	Analys
Globules rouges.....: 4.9	M/mm3	(4.0 à 5.0)	5.0
Hémoglobines.....: 11.6	g/100 ml	(11.5 à 15)	12.2
Hematocrites.....: 35.7*	%	(37 à 45)	37.5
V.G.M .....: 73.	u3	(76 à 96)	75.
C.C.M.H.....: 32.	%	(32 à 36)	33.
T.C.M.H.....: 24.	g/100 ml	(27 - 33)	
Globules blancs.....: 11100*	/mm3	(4000 à 10000)	11500*

**FORMULE LEUCOCYTAIRE**

Polynucléaires Neutrophiles.: 60	%	55 à 65	55%
Soit : 6660.	/mm3	(2500 - 7125/mm3)	
Polynucléaires Eosinophiles.: 2	%	1 à 4	2%
Soit : 222.	/mm3	(50 - 285/mm3)	
Polynucléaires Basophiles...: 0	%	0 à 1	0%
Soit : 0.	/mm3	(< 95/mm3)	
Lymphocytes.....: 35	%	20 à 40	40%
Soit : 3885.	/mm3	(1000 - 3800/mm3)	
Monocytes .....: 3	%	4 à 8	3%
Soit : 333.	/mm3	(150 - 665/mm3)	
Plaquettes.....: 346.000	/mm3	(150 000 à 400 000)	287.000/m

**BIOCHIMIE**

Analyses	Résultats	Normes	Analys
Hémoglobine Glycosylée...: 7.0*	%	(4.2 à 6.2)	6.90*%
Glycémie.....: 0.86	g/l	(0.70 à 1.05)	1.98*g/l
Acide Urique.....: 76.05*	mg/l	(26 à 60)	78.10*mg/l

N.B : LE RESULTAT EST CONTROLE

A. KOUNDA