

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Aïtal Ben Abdellah - 6ème Etage Angie Rue Mohamed Fakir et Rue Aïtal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél : 05 22 70 45 85 (L.G.) Fax : 05 22 72 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W19-500476

16007

Maladie Dentaire Optique Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : M365 Société : ROYAL AIR MAROC

Actif Pensionné(e) Autre

Nom & Prénom : BEN ZAIDOUNE ANAS

Date de naissance : 08/03/1973

Adresse : Rue Riyad ALHAMDI, Rue de Guis, APTUS BEVEDERE

Tél. : 0693121212 Total des frais engagés : 539,10 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 16.12.2019

Nom et prénom du malade : BEN ZAIDOUNE ANAS Age: _____

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : _____

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : _____

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA

Signature de l'adhérent(e) : _____

Le : 09 JAN 2020 / 12 / 2019

ACCUEIL

Dr. El Mostapha Aziz ALAOUI

Neurochirurgien
Chirurgie de la colonne vertébrale
Electroencéphalographie

18, Rue Abou Maachar quartier des Hôpitaux
(à coté de Radiologie Anoual) - Casablanca
Casablanca - Tél.: 05 22 86 41 00 - Fax: 05 22 86 19 38
E.mail: doctoralaoui@hotmail.com

Sur Rendez-vous



الدكتور عزيز علوي المصطفى

أخصائي في أمراض وجراحة الرأس،
الدماغ، الأعصاب والعمود الفقري
التخطيط الكهربائي للدماغ

18، زنقة أبو معشر حي المستشفيات

بجانب الفحص بالأشعة أنوال - الدار البيضاء.

الهاتف: 05 22 86 19 38 - الفاكس: 05 22 86 41 00
البريد الإلكتروني: doctoralaoui@hotmail.com

بالموعد

Casablanca, le..... في الدار البيضاء في

14/12/2019

BENZAIDOUNE Anass

MYDOFLEX

1 comprimé, 3 fois par jour (pendant 6J)

TRAMAL LP 100

1 comprimé, matin et soir (pendant 6J)

NOCICEPTOL

2 MASSAGES (pendant 10)

PHARMACIE ALMASSIRA
BENMOUSSA Ouafae
Docteur en Pharmacie
51, Rue Rahel Ben Ahmed
Tél: 0522 24 00 34 Fax: 0522 24 85 44
GSM : 06 89 51 62 81

Dr. EL MOSTAPHA
AZIZ ALAOUI
Neurochirurgien
18, Rue Abou Maachar - Anoual
Casablanca
Tél: 05 22 86 19 38



Laboratoire Pol
8 Rue des Contours,
75011 PARIS, FRANCE



CNK 3259-850



ournisseur officiel
des équipes
médicales de la
Fédération Française
d'Équitation

Batch No./Exp./PPV 94 dhs 00

PVC: 198,00 DH

NOCICEPTOL

GEL ANTI-DOULEUR

120 ml

10mg

composé unique amygdre, povidone, cellulose microcristalline PH102, eau purifiée, cellulose microcristalline PH112, dioxyde de silice colloïdale, Crospovidone, stéarate de magnésium, alcool polyvinylique partiellement hydrolysé, dioxyde de titane, polyéthylène de glycol, Talc

3. Classe pharmaco thérapeutique ou le type d'activité:
MYDOFLEX est un myorelaxant

4. Indications thérapeutiques

MYDOFLEX contient le principe actif chlorhydrate de tolpérisone qui est un décontractant musculaire. Il est utilisé, sur prescription médicale, dans le traitement des spasmes musculaires, lors d'affections douloureuses d'origine musculo-squelettique, notamment de la colonne vertébrale et des grosses articulations. Il peut aussi être prescrit dans l'hypertonie de la musculature squelettique associée à une affection neurologique.

5. Posologie et mode d'administration :

Chez l'adulte la dose initiale est en général d'un comprimé pelliculé de MYDOFLEX (soit une dose de 150 mg) matin, midi et soir (soit une dose journalière de 450 mg). Dans certains cas le médecin peut prescrire une dose plus importante (quatre fois un comprimé pelliculé à 150 mg par jour). Chez les personnes âgées, ou en cas de certaines maladies associées (insuffisance hépatique ou rénale), la dose prescrite est souvent plus faible. La dose journalière est maintenue jusqu'à l'obtention du résultat thérapeutique. La prescription médicale peut prévoir pour la suite un intervalle plus long entre les prises. En cas de simple retard d'une prise prenez la dose prévue. En cas d'oubli complet d'une prise ne pas doubler la dose suivante.



comprimés

ine faiblesse

Voie orale

ISABLE DE
IN OU DE

LABATEC

Les récentes études cliniques ont montré que moins de 5% des patients traités avaient annoncé des effets indésirables. Les effets indésirables rapportés sont les suivants:

Système nerveux central:

Occasionnel: vertige, tremblement, paraesthesia
Peu fréquent: mal de tête

Système cardiovasculaire:

Occasionnel: palpitations, hypotension

Étendue gastro-intestinale:

Occasionnel: bouche sèche, dyspepsie, nausée, vomissements, diarrhée, douleur abdominale, flatulence
Peu fréquent: constipation, brûlures d'estomac

Peau:

Occasionnel: transpiration, urticaire, éruption

Troubles généraux:

Peu fréquent: asthénie, somnolence, douleur
Si vous remarquez d'autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

8. Mises en garde spéciales :

Faites attention avec MYDOFLEX 150 mg :

En prescrivant MYDOFLEX le médecin doit informer le patient des risques d'allergies liés à ce produit (voir Effets indésirables). Si après la prise du médicament, vous ressentez des manifestations anormales (fourmillements dans les mains, les pieds, apparition de plaques rouges, enflure de la face ou des muqueuses, gêne respiratoire, malaise, signes pouvant faire penser à une allergie médicamenteuse),

il faut arrêter le traitement et avertir immédiatement le médecin.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Tramal® L.P. 100mg

Chlorhydrate de tramadol

Comprimé à libération prolongée

MÉDICAMENTS POUVANT ÊTRE OBTENUS UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre le médicament. Elle contient des informations importantes sur son utilisation.

Si vous avez un doute, demandez conseil à votre médecin.

PPV 68DH70
MER 06/24
LOT 11446

LIBÉRATION PROLONGÉE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ? FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU; CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Comprimé à libération prolongée, de forme ronde et de couleur blanche; boîte de 10 et 30.

Le tramadol, principe actif contenu dans TRAMAL® L.P. 100 mg, est un antalgique (substance calmant la douleur) qui appartient à la classe des opiacés. Il agit sur le système nerveux central et soulage la douleur en agissant sur des cellules nerveuses particulières de la moelle épinière et du cerveau.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

TRAMAL® L.P. 100 mg est utilisé pour le traitement des douleurs modérées à intenses.

II. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE TRAMAL® L.P. 100 mg, comprimé à libération prolongée?

LISTE DES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT LA PRISE DU MÉDICAMENT

CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez pas TRAMAL® L.P. 100 mg, comprimé à libération prolongée.

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au tramadol ou à l'un des autres composants de TRAMAL® L.P. 100 mg.
- En cas d'intoxication aiguë par l'alcool, des somnifères, d'autres médicaments contre la douleur ou des médicaments psychotropes (médicaments qui agissent sur l'humeur et les émotions).
- Si vous prenez en même temps des inhibiteurs de la MAO (médicaments utilisés pour le traitement de la dépression) ou si vous en avez pris au cours des deux semaines précédant le traitement par TRAMAL® L.P. 100 mg (voir «Utilisation d'autres médicaments»).
- Si vous êtes épileptique et que vos crises ne sont pas bien contrôlées par le traitement.
- Comme traitement de substitution dans le cadre du sevrage d'une toxicomanie.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI / MISES EN GARDE SPÉCIALES

Prenez des précautions particulières avec TRAMAL® L.P. 100 mg, comprimé à libération prolongée.


- Si vous estimez que vous êtes dépendant à d'autres antalgiques (opiacés).
 - Si vous souffrez de troubles de la conscience (si vous avez l'impression que vous allez vous évanouir).
 - Si vous êtes en état de choc (ce qui peut se manifester par des sueurs froides).
 - Si vous souffrez d'une augmentation de la pression dans le cerveau (par exemple après un traumatisme crânien ou une maladie cérébrale).
 - Si vous avez des difficultés respiratoires.
 - Si vous présentez une tendance à l'épilepsie ou aux convulsions.
 - Si vous souffrez d'une maladie hépatique ou rénale.
- Dans ces cas, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

Notez bien que TRAMAL® L.P. 100 mg peut provoquer une dépendance physique et psychique. Quand TRAMAL® L.P. 100 mg est pris pendant une durée prolongée, son effet peut s'atténuer, si bien qu'il faut augmenter les doses (développement d'un phénomène d'accoutumance). Les patients qui ont tendance à abuser des médicaments ou qui sont dépendants de certains médicaments ne doivent utiliser TRAMAL® L.P. 100 mg que pendant de courtes durées et sous surveillance médicale stricte.

Tramal® L.P. 100mg

Chlorhydrate de tramadol

30 comprimés à libération prolongée



pas utiliser TRAMAL® L.P. 100 mg, si vous êtes enceinte. D'une manière générale l'emploi du tramadol est déconseillé pendant l'allaitement. De faibles quantités de tramadol passent dans le lait maternel. Après une prise unique, il n'est généralement pas nécessaire d'interrompre l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin.

EFFETS SUR L'APTITUDE À CONDUIRE DES VÉHICULES OU À UTILISER DES MACHINES

Conduite de véhicules et utilisation de machines

TRAMAL® L.P. 100 mg peut provoquer une somnolence, des sensations vertigineuses et une vision floue, et donc perturber votre capacité de réaction. Si vous sentez que vos réactions sont perturbées, ne conduisez pas de voiture ou un autre véhicule, n'utilisez pas d'outils électriques ou de machines et ne travaillez pas sans appui solide.

LISTE DES EXCIPIENTS À EFFET NOTOIRE

Information importante concernant certains composants de TRAMAL® L.P. 100 mg, comprimé à libération prolongée: Si votre médecin vous a dit que vous présentez une intolérance à certains sucres, consultez-le avant de prendre ce médicament.

INTERACTION AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS

Utilisation d'autres médicaments

Veillez prévenir votre médecin ou votre pharmacien si vous recevez ou avez reçu récemment tout autre médicament, y compris des médicaments délivrés sans ordonnance. Il ne faut pas prendre TRAMAL® L.P. 100 mg avec des inhibiteurs de la MAO (médicaments destinés au traitement de la dépression).

L'effet antalgique de TRAMAL® L.P. 100 mg peut être atténué et sa durée d'action raccourcie si vous prenez des médicaments contenant:

- La carbamazépine (un anticonvulsif).
 - La pentazocine, de la nalbuphine ou de la buprénorphine (des antalgiques).
 - L'ondansétron (pour prévenir les nausées).
- Votre médecin vous dira si vous pouvez prendre TRAMAL® L.P. 100 mg et à quelle posologie.

Le risque d'effets indésirables augmente

- Si vous prenez en même temps que TRAMAL® L.P. 100 mg, des médicaments qui ont un effet dépresseur sur le système nerveux comme les tranquillisants, les somnifères, d'autres antalgiques tels que la morphine et la codéine (également si ces médicaments sont prescrits pour traiter la toux), ainsi que l'alcool, vous risquez de vous sentir plus somnolent ou d'avoir l'impression que vous allez vous évanouir. Si cela se produit, parlez-en à votre médecin.
- Si vous prenez des médicaments susceptibles de provoquer des convulsions (crises d'épilepsie), par exemple des médicaments destinés au traitement de maladies psychologiques (comme certains antidépresseurs). Le risque de crise d'épilepsie peut augmenter si vous prenez TRAMAL® L.P. 100 mg en même temps. Votre médecin vous dira si TRAMAL® L.P. 100 mg vous convient.
- Si vous prenez des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (souvent appelés IRS) ou des inhibiteurs de la MAO (pour le traitement de la dépression), TRAMAL® L.P. 100 mg peut interagir avec leur effet ce qui peut, rarement, conduire à un «syndrome sérotoninergique». Ce syndrome peut se manifester, par exemple, par une confusion, une agitation, de la fièvre, des sueurs, des mouvements non coordonnés des membres ou des yeux, des saccades musculaires incontrôlables ou une diarrhée.
- Si vous prenez des anticoagulants dérivés de la coumarine (médicaments fluidifiant le sang), par exemple de la warfarine, en même temps que TRAMAL® L.P. 100 mg, l'effet de ces médicaments sur la coagulation peut s'en trouver modifié et il peut survenir des hémorragies.

III. COMMENT UTILISER TRAMAL® L.P. 100 mg, comprimé à libération prolongée ?

INSTRUCTIONS POUR UN BON USAGE

POSOLOGIE, FRÉQUENCE D'ADMINISTRATION ET DURÉE DU TRAITEMENT MODE ET/OU VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Prenez toujours TRAMAL® L.P. 100 mg en respectant strictement les instructions de votre médecin. En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Il faut ajuster la posologie en fonction de l'intensité de votre douleur et de votre sensibilité personnelle à la douleur. D'une manière générale, il faut prendre la dose minimale qui soulage la douleur.

Sauf prescription contraire de votre médecin, la posologie usuelle est la suivante:

CLINIQUE ANOUAL CASABLANCA
14, Rue Zakieddine ATTAOUSSI
CASABLANCA
Tel: 022 86 02 08 Fax: 022 86 02 11
Patente: 36357750 - CNSS : 2282797
ICE 00 169 613 40 000 22

Site web: clinique-anoual.com

Facture N° : 2190261

CASA LE: 13/12/2019

Nom et Prénom : BENZAIDOUNE ANASS

ORGANISME : ESP

REFERENCE : U: 19120012

LIBELLE	TOTAL
PRESTATION CLINIQUE	150,00
PHARMACIE	89,10
TOTAL CLINIQUE	239,10

LE DIRECTEUR



CLINIQUE ANOUAL

14RUE ZAKI EDDINE ATTAOUSSI



KH FZ

R.C :
T.V.A :

Patente:

Tél : 0522 86 02 07....1

Le 14/12/2019

FACTURE N°111422

Page: 1

N° ICE :

BENZAIDOUNE ANAS -

N° ICE CLIENT:

Forme	Produits	% TVA	Prix Public NET	Qté.	Prix Public Total	Dont TVA
IN	APOTEL100ML	7,00	21,45	1	21,45	1,40
IN	CHLORURE D'ETHYLE 100ML		10,30	1	10,30	
IN	ACUPAN INJ /1		10,50	1	10,50	
IN	PROFENID INJ / 1		9,00	1	9,00	
AC	PERFUSEUR	20,00	3,90	1	3,90	0,65
AC	INTRANULE ROSE	20,00	5,55	1	5,55	0,92
AC	SERIN 10CC	20,00	3,40	1	3,40	0,57
AC	COMPRESSES JETABLE	20,00	3,00	4	12,00	2,00
AC	GANT JETTABLE	20,00	3,00	1	3,00	0,50
AC	ANTISEPTIQUE - SITE	20,00	10,00	1	10,00	1,67

= NET TTC

89,10

TVA 7% Base : 20,00	Montant : 1,40	TVA 20% Base: 31,55	Montant : 6,31	Total TVA : 7,71
---------------------	----------------	---------------------	----------------	------------------

Arrêté la présente facture à la somme de :
Quatre-vingt Neuf DIRHAMS et 10 centimes.

