

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 668

Actif

Pensionné(e)

Nom & Prénom : SAGHIR BA ND AbdellahLab.

Date de naissance : 01/01/1942

Adresse : ITAY SALMIH II Rue 1 N° 245 Casablanca .

Tél. : 0663523785

Total des frais engagés : 406,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : ...../...../.....

Nom et prénom du malade : KARMI FATNA .

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Nature de la maladie :

maladie chronique

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Signature de l'adhérent(e) :

Le : 13/01/20

*(Signature)*

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

| Dates des Actes | Natures des Actes | Nombre et Coefficient | Montant détaillé des Honoraires | Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes |
|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
|                 |                   |                       |                                 |  |
|                 |                   |                       |                                 |  |
|                 |                   |                       |                                 |  |
|                 |                   |                       |                                 |  |

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

| Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur                     | Date     | Montant de la Facture |
|--|----------|-----------------------|
| PHARMACIE<br>Rue 1 N°11<br>Casablanca<br>Tél: 05 22 28 350 | 13/01/20 | 406,00                |

#### **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

| Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue | Date | Désignation des Cœfficients | Montant des Honoraires |
|---|------|-----------------------------|------------------------|
|   |      |                             |                        |
|   |      |                             |                        |
|   |      |                             |                        |
|   |      |                             |                        |
|   |      |                             |                        |

## AUXILIAIRES MEDICAUX

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### **Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ICD.

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

| H        |          |
|----------|----------|
| 25533412 | 21433552 |
| 00000000 | 00000000 |
| D        |          |
| 00000000 | 00000000 |
| 35533411 | 11433553 |
| T        |          |

The diagram illustrates the H-D-H system, showing the arrangement of atoms and bond angles. The central hydrogen atom (H) is at the top, bonded to two deuterium atoms (D). Each D atom is bonded to three hydrogen atoms (H). The entire structure is oriented along a vertical axis, with the horizontal axis labeled D and G.

#### **[Création, remont, adjonction]**

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Casablanca Le 13/01/20

Facture N° 69

M : Mme KARMI FITNA

| Quantité | Désignation   | P. Unit. | P. Total |
|----------|---------------|----------|----------|
| 1        | Orlita 4 mg   | 84,00    | 84,00    |
| 3        | Stagid 700 mg | 107,00   | 321,00   |
| Total    |               |          | 406,00   |

Quatre Cent six dirhams.

PHARMACIE BELLOUCH  
Rue 1 N° 116 Salmia Casablanca  
Tél: 05 22 33 35 84

# ODIA

1 mg, 2 mg, 3 mg, et 4 mg,

comprimé

Glimépiride

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

• Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ODIA, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ODIA, comprimé ?

3. COMMENT PRENDRE ODIA, comprimé ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER ODIA, comprimé ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE ODIA, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ODIA est un antidiabétique oral, appartenant à la famille des sulfonylurées, qui diminue le taux de sucre dans le sang.

ODIA agit en augmentant la quantité d'insuline libérée par votre pancréas. L'insuline fait ensuite baisser votre taux de sucre dans le sang.

### Dans quel cas ODIA est-il utilisé :

ODIA est utilisé dans le traitement du diabète sucré de type 2, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la perte de poids ne sont pas suffisants pour contrôler à eux seuls les taux de sucre dans le sang.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ODIA, comprimé ?

• Ne prenez jamais ODIA et informez votre médecin :

• Si vous êtes allergique : au glimépiride, aux autres sulfonylurées (médicaments utilisés pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, tels que le glibenclamide), aux sulfamides antibactériens (médicaments pour les infections bactériennes, tels que le sulfaméthoxazole), ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6 ;

• si vous avez un diabète insulinodépendant (diabète de type 1) ;

• en cas de décompensation acido-cétosique (complication du diabète lorsque votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains des signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et raideur musculaire) ;

• en cas de coma diabétique ;

• si vous avez une maladie grave des :

• si vous avez une maladie grave des :

• Si vous présentez l'une de :

• ci-dessus, ne prenez pas ce :

• En cas de doute, parlez-en à :

• votre pharmacien avant de prendre ce :

• • Avertissements et précautions :

• Adressez-vous à votre pharmacien avant de prendre ce :

• Vous vous rétablissez d'une :

• intervention chirurgicale, d'un :

• avec fièvre, ou de toute autre forme de stress. Informez :

• votre médecin car un changement temporaire de :

• votre traitement peut être nécessaire.

• Vous avez un problème grave au niveau de :

• votre foie ou de vos reins.

Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations

vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou

votre pharmacien avant de prendre ODIA.

Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction

des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent

survenir chez les patients porteurs d'un déficit

enzymatique en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (maladie héréditaire des globules

rouges).

Les informations disponibles sur l'utilisation

d'ODIA chez les patients de moins de 18 ans

sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez

ces patients n'est pas recommandée.

Informations importantes sur l'hypoglycémie

(faible taux de sucre dans le sang)

Lorsque vous prenez ODIA, une hypoglycémie

peut survenir (faible taux de sucre dans le sang).

Veuillez lire les informations supplémentaires

ci-dessous sur l'hypoglycémie, ses signes et

symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue

d'une hypoglycémie :

• Malnutrition, horaires de repas irréguliers, saut

de repas, retard dans la prise d'un repas,

période de jeûne ;

• modification du régime alimentaire ;

• prise de plus d'ODIA que ce dont vous avez besoin ;

• fonction rénale diminuée :

• maladie grave du foie ;

• si vous souffrez de troubles hormonaux particuliers

(troubles de la glande thyroïde, de la glande

hypophysoire ou des glandes surrenales) ;

• consommation d'alcool (en particulier en l'absence

de repas) ;

• prise de certains autres médicaments (Voir

ci-dessous «Autres médicaments et ODIA») ;

• si votre activité physique est augmentée, si

vous ne mangez pas suffisamment ou que vous

mangez des aliments contenant moins de

glucides qu'habituellement.

Les signes de l'hypoglycémie incluent :

• Faim intense, maux de tête, nausées,

vomissements, apathie, somnolence, troubles

du sommeil, agitation, agressivité, difficultés de

concentration, diminution de la vigilance et des

réactions, dépression, confusion

et de la parole, difficulté à articuler

paralysie

peuvent é

, peau

s, hyper

ense et

dans les

les du

ns le

prés

partie de la maîtrise de so

courte et rapide, un ralentis

rhythme cardiaque, une perte

Une hypoglycémie sévère

ressemble à une attaque céré

Traitemen

t de l'hypoglycémie

Dans la plupart des cas, les signes

disparaissent très rapidement

de sucre : par exemple mor

boisson sucrée ou thé sucré.

toujours avoir du sucre (mor

avec vous. Par contre, les

synthèse ne sont pas efficaces

Contactez votre médecin ou a

l'ingestion de sucre n'est pas

de reaparition des symptômes

Tests de laboratoire

Votre taux de sucre dans le s

urines doit être contrôlé régul

médecin peut vous demander de

de sang pour vérifier le no

sanguins ainsi que votre foncti

Enfants et adolescents

L'utilisation d'ODIA n'est pa

chez les enfants âgés de moins

• Autres médicaments et ODIA

Informez votre médecin ou vo

vous prenez, avez récemment

prendre tout autre médicament.

Votre médecin peut être ame

dose d'ODIA si vous prenez d'aut

En effet, ceux-ci peuvent dimin

l'effet d'ODIA sur votre taux de

L'effet d'ODIA (diminution du ta

le sang) peut être augmenté par

suivants et entraîner un risq

• Autres médicaments pour trait

que l'insuline ou la metformine

• médicaments pour traiter

l'inflammation (phénylbutazone, oxyphenbutazone, aspirine)

• médicaments pour traiter les i

(tels que certains sulfamides

longue durée d'action) ;

• médicaments pour traite

bactériennes et fongiques

chloramphénicol, fluconazole,

quinolones, clarithromycine) ;

• médicaments pour empêcher

sang (antivitamines K de type d

tels que la warfarine) ;

• médicaments favorisant le

**S1AGIUD** 700 mg, tutti i giorni  
comprime sottili  
Embonate de metformine

# STAGID 700 mg, comprimé sécable

Embonate de metformine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE STAGID 700 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable ?
3. COMMENT PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER STAGID 700 mg, comprimé sécable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE STAGID 700 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Ce médicament est un antidiabétique oral (biguanide). Il est destiné au traitement du diabète associé à un régime alimentaire adéquat. Il peut parfois être prescrit en association à l'insuline.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STAGID 700 mg,

- Ne prenez pas STAGID 700 mg, comprimé sécable si vous êtes dans les cas suivants :
  - si vous êtes diabétique et que vous prenez déjà d'autres médicaments contenant d'autres composants qui peuvent augmenter vos niveaux de sucre dans le sang ;
  - si vous avez des problèmes liés à vos reins ou votre foie ;
  - si vous avez un diabète non contrôlé, s'accompagnant par exemple d'une hyperglycémie sévère (taux de sucre trop élevé dans le sang), de nausées, de vomissements, d'une déshydratation, d'une perte de poids rapide ou d'une acidocétose. L'acidocétose est une affection qui consiste en une accumulation dans le sang de substances appelées « corps cétoniques » et qui peut provoquer un précoma diabétique. Les symptômes sont plus particulièrement une douleur à l'estomac, une respiration rapide et profonde, une envie de dormir ou une haleine ayant une odeur fruitée inhabituelle ;
  - si vous avez perdu trop d'eau (déshydratation), par exemple suite à une diarrhée persistante ou sévère, ou si vous avez vomis plusieurs fois d'affilée. La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins, qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Faites attention avec STAGID 700 mg, comprimé sécable ») ;
  - si vous avez une infection grave, par exemple une infection des poumons ou des bronches, ou une infection des reins. Des infections sévères peuvent entraîner des problèmes de reins qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Faites attention avec STAGID 700 mg, comprimé sécable » ci-dessous) ;
  - si vous prenez un traitement contre

l'insuffisance cardiaque, si vous avez récemment eu un problème cardiaque, si vous avez des symptômes graves de la circulation sanguine (tel un malaise, une crise cardiaque) ou si vous avez des difficultés respiratoires.

• si vous consommez de l'alcool. Si l'un des cas ci-dessus vous concerne, parlez-en à votre médecin avant de commencer ce médicament.

## • Faites attention avec STAGID 700 mg, comprimé sécable

Veuillez noter que dans certains cas particuliers, STAGID peut entraîner une complication très rare et grave appelée acidose lactique. Ces cas sont particulierement courants chez les personnes qui fonctionnent physiquement de manière intensive. Le risque d'acidose lactique est également accru chez les personnes diabétiques non contrôlées, prolongées ou qui consomment de l'alcool. Les personnes diabétiques peuvent développer une acidose lactique sans être diabétiques. Les symptômes peuvent inclure des vomissements, des douleurs abdominales, une sensation de faiblesse et de fatigue, avec une difficulté à respirer. Si vous trouvez que vous avez ces symptômes, vous devez immédiatement arrêter de prendre STAGID et vous faire traiter par un professionnel de la santé. Si vous avez des symptômes de précoma diabétique, vous devez immédiatement vous rendre à l'hôpital.

STAGID à lui-même ne cause pas d'hypoglycémie (faible niveau de sucre dans le sang). Cependant, STAGID en association avec d'autres médicaments peut entraîner une hypoglycémie.