

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation	: contact@mupras.com
Prise en charge	: pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut	: adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



## Déclaration de Maladie

Nº P19-0035003

ND = 16675

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 379975 Jan 2020 Société :

Actif  Pensionné(e)  Autre :

Nom & Prénom : BOUAFALAT MBARKA Veuve KASSEDE

Date de naissance : 1932

Adresse : Cite Hassan Bloc Raja 528 N°951 Casa

Tél. : 05 22 90 79 56 Total des frais engagés : 778 DHS Dhs

## Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : ..... / ..... /

Nom et prénom du malade : Dr. Nabi GARTI Age: .....

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : ACFA

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : .....

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... /

Signature de l'adhérent(e) : .....

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
07/01/2020	Cas + ECG		30000A	DR. JACQUES GARTI Cabinet de Radiologie 10 rue Franklin Roosevelt - 94110 CACHAN 01 49 08... GECI - 06 61 24 30 06
2020				

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	07/11/2020	47800

#### **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

#### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### **Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de la

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 D 00000000 35533411	G 21433552 00000000 G 00000000 11433553	B	COEFFICIENT DES TRAVAUX
	<p>(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXÉCUTION



**Cardiologie Val d'Anfa**

**URGENCES  
24/24**

05 22 36 09 09

**Dr Najib GARTI**

Cardiologue - Rythmologue

Pace Maker

Défibrillateurs

Cryoablation de la Fibrillation  
auriculaire

Traitement des troubles du rythme  
par Radiofréquence

Echocardiographie Doppler.Couleur  
Epreuve d'effort

Holter tensionnel et rythmique

Diplômé de la faculté de médecine  
de limoges (France)

Sur Rendez - Vous

Gsm : 0661 24 30 06


**Casablanca, le**

**07/05/2020**

**Mr (Mme) .....**

- Borrifat 12mls  
 N° KASSE 17 1 mas  
 600 X 3 + 1 mas  
 Feuillet 1 ange  
 200 X 2  
 Sinhui 1 : ½ 4')  
 250 X 2  
 Dr fixo 0.25 : ½ 4')  
 - Corne 5 15  
 200

= 4780

19, Bd. Franklin Roosevelt, Anfa (Rez de chaussée Clinique Val D'anfa) - Casa  
Patente N° 35615328 - IF 40713811 - INPE 091066621 - ICE 001584040000063

Tél : 05 22 36 09 09 - Tél / Fax : 05 22 36 08 88

E-mail : garti.naj@hotmail.fr - Site : www.cvarythmologie.com





## NOTICE D'INFORMATION POUR LES UTILISATEURS

### FÉRPLEX® 40 mg, Solution Orale

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 flacons de 15 ml

#### Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### Contenu de la notice :

Qu'est-ce que FERPLEX 40 mg solution orale et dans quels cas est-il utilisé.

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FERPLEX 40 mg solution orale.

Comment prendre FERPLEX 40 mg s.

Quels sont les effets indésirables év.

Comment conserver FERPLEX 40 mg

Informations supplémentaires.

#### 1. QU'EST-CE QUE FERPLEX 40 MG QUELS CAS EST-IL UTILISÉ :

Classe pharmacothérapeutique : Anti-  
FERPLEX 40 mg solution orale est un fer aux globules rouges dans le s.

carences de fer ainsi que le traitement de l'anémie (diminution du taux d'hémoglobine ainsi que du nombre et de la dimension des globules rouges), due à cette carence en fer.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FERPLEX 40 MG SOLUTION ORALE :

Ne prenez jamais FERPLEX 40 mg solution orale dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au Fer protéinsuccinylate ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous êtes allergique aux protéines lactées.
- Si vous souffrez d'une maladie qui provoque une accumulation de fer dans l'organisme (Hémosidérose et Hémochromatose).
- Si vous souffrez d'une pancréatite (inflammation du pancréas) ou d'une cirrhose hépatique (maladie chronique du foie qui se caractérise par la formation de tissus de fibrose ou de «kystes» dans le tissu hépatique et qui altère sa structure et son fonctionnement normal) dues à une accumulation de fer.
- Si vous souffrez d'une anémie sans carence en fer.

Faites attention avec FERPLEX 40 mg :

En cas de carence en fer ou d'anémie, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

#### Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien :

Antibiotiques de la classe des quinolones et des tétracyclines.

- Si vous prenez d'autres médicaments visant à traiter les problèmes osseux (ostéoporose), comme des biphosphonates. La pénicillamine utilisée pour l'arthrite (inflammation des articulations).

Alfa méthyldopa, utilisée pour le traitement de l'hypertension artérielle.

Thyroxine, utilisée pour le traitement de l'hypothyroïdie (glande thyroïde trop peu active).

Lévodopa et carbidopa utilisés pour le traitement de la maladie de Parkinson.

Mycophénolate mofétil, utilisé en prévention de rejet de greffe. L'absorption intestinale du fer et ainsi l'efficacité du FERPLEX 40 mg solution orale peut être réduite si l'administration est accompagnée par les médicaments mentionnés ci-dessous. Il est nécessaire d'espacer d'au moins deux heures la prise du FERPLEX et celle des médicaments suivants :

Antiacides, habituellement utilisés chez les patients qui

**FERPLEX® 40 mg**

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Flacons buvables

PPV 60,00 Dhs

6 118001 440016

ts ayant une

trique ou le reflux  
lansoprazole et le

es :  
yses en laboratoire  
les.

ec les aliments et

#### Prise de FERPLEX 40 mg avec les boissons :

Certains aliments végétaux, le lait, le café et le thé diminuent l'absorption du fer. Il est donc nécessaire d'espacer d'au moins deux heures l'administration de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

L'absorption des dérivés de fer peut être augmentée suite à l'ingestion de jus citrique (orange, citron, etc.) fraîchement pressé.

#### Grossesse et allaitement :

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

FERPLEX est indiqué pendant la grossesse et l'allaitement pour le traitement des carences en fer, il n'y a donc aucune précaution particulière à prendre.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Aucun effet sur l'aptitude à la conduite et l'utilisation de machines n'a été observé.

Informations importantes concernant certains composants de FERPLEX 40 mg solution orale :

## **COVERAM® 5 mg / 5 mg** Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

## **COVERAM® 10 mg / 5 mg** Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

## **COVERAM® 5 mg / 10 mg** Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

## **COVERAM® 10 mg / 10 mg** Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

**Veillez Lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. (Cf. «Quels sont les effets indésirables éventuels ?»)

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que COVERAM, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre COVERAM, comprimé ?
3. Comment prendre COVERAM, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver COVERAM, comprimé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

**1-QU'EST-CE QUE COVERAM, COMPRIMÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique : inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) et inhibiteurs calciques

Code ATC : C09BB04

COVERAM, comprimé est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle et/ou dans le traitement de la maladie coronaire stable (une maladie où l'alimentation du cœur en sang est réduite ou bloquée).

Les patients qui prennent déjà séparément des comprimés de péridopril et d'amlopipine peuvent à la place recevoir un comprimé de COVERAM, comprimé qui contient les deux principes actifs.

COVERAM, comprimé est une association de deux principes actifs, péridopril et amlopipine.

Le péridopril est un inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC). L'amlopipine est un antagoniste calcique (qui appartient à la classe des dihydropyridines). Ceux-ci agissent en dilatant et en décontractant les vaisseaux sanguins, facilitant ainsi le travail du cœur pour expulser le sang dans les vaisseaux.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE**

**COVERAM, COMPRIMÉ ?**

**Ne prenez jamais COVERAM, comprimé :**

- si vous êtes allergique au péridopril ou à tout autre inhibiteur de l'enzyme de conversion ou à l'amlopipine ou aux autres inhibiteurs calciques, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (Cf. «Contenu de l'emballage et autres

Votre médecin vous comprimé avant d'être vous recommandera le comprimé. COVERAM, comprimé pris si vous êtes à votre enfant.

**Allaitement**

Il a été démontré que l'informez votre médecin COVERAM, comprimé rait choisir un autre nouveau-né ou un pré Conduite de véhicule COVERAM, comprimé avec des machines.

Si avec le traitement, si vous vous sentez fatigué, nevez pas conduire de véhicules ni de machines.

**COVERAM, comprimé**

Si votre médecin vous sucre, contactez-le au

**3. COMMENT PRENDRE**

Veillez à toujours prendre votre médicament ou phar- cas de doute,

Avez votre comprimé avec

la journée, le matin, avant le repas. Votre médecin décidera de la posologie adaptée pour vous. La dose habituelle est de 1 comprimé par jour.

COVERAM, comprimé sera généralement prescrit chez les patients prenant déjà sépa- rémement des comprimés de péridopril et d'amlopipine.

**COVERAM® 5mg/5mg**  
Péridopril arginine / amlodipine

30 comprimés



6 118001 130078

80,00

AM,  
ie. il  
om-  
pas  
ment

tites.  
liter.  
pour-  
est un

liser,  
dus ne  
nativin

dume,  
dus ne  
nativin

de  
en


de  
la

# Digoxine Nativelle® 0,25 mg

## comprimé

Veuillez lire attentivement l'intégralité

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin d'en lire une partie à nouveau.
- Si vous avez toute autre question, siègez à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit pour des symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.



prendre ce médicament.

Si vous avez des questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à

ne donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de nécessité.

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé?
3. COMMENT PRENDRE DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?
5. COMMENT CONSERVER DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### **1. QU'EST-CE QUE DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?**

#### **Classe pharmacothérapeutique**

**GLUCOSIDE CARDIOTONIQUE**

#### **Indications thérapeutiques**

Ce médicament est un tonicardiaque, il augmente la force de contraction du muscle cardiaque. Il possède également des propriétés antiarythmiques (il régularise le rythme cardiaque).

Ce médicament est préconisé dans:

- le traitement de l'insuffisance cardiaque,
- certains troubles du rythme cardiaque.

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé?**

Centres d'indications:

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourrez la consulter si vous avez une autre question, ou si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
  - Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
  - Ce médicament vous a été prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait nuire à sa santé.
  - Si l'un des effets indésirables détaillés ci-dessous vous remarcue un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Dans cette notice :
1. QU'EST-CE QUE DIGOXINE NATIVE 0,25 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?
  2. QU'ELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DIGOXINE NATIVE 0,25 mg,
  3. COMMENT PRENDRE DIGOXINE NATIVE 0,25 mg, comprimé?
  4. QU'ELLES SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES EN COURS D'UTILISATION?
  5. COMMENT CONSERVER DIGOXINE NATIVE 0,25 mg, comprimé?
  6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE DIGOXINE NATIVE 0,25 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?
2. QU'ELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DIGOXINE NATIVE 0,25 mg, comprimé?
3. COMMENT PRENDRE DIGOXINE NATIVE 0,25 mg, comprimé?
4. QU'ELLES SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES EN COURS D'UTILISATION?
5. COMMENT CONSERVER DIGOXINE NATIVE 0,25 mg, comprimé?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.
- GLUCOSIDE CARDIOTHÉRAPEUTIQUE**
- Indications thérapeutiques**
- Ce médicament est un tonique cardiaque, il augmente la force de contraction du muscle cardiaque. Il possède également des propriétés antirhythmiques (il régularise le rythme cardiaque).
- Ce médicamenteux est un tonique cardiaque, il augmente la force de contraction du muscle cardiaque. Il possède également des propriétés antirhythmiques (il régularise le rythme cardiaque).
- Le traitement est préconisé dans:
- Ce médicamenteux est un tonique cardiaque, il augmente la force de contraction du muscle cardiaque.
- Ce médicamenteux est un tonique cardiaque, il augmente la force de contraction du muscle cardiaque.
- Certains troubles du rythme cardiaque.

# SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

## Acénocoumarol

### Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

**Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.**

**Si vous avez des questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.**

**Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.**

**Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.**

#### 1. Que contient cette notice :

Qu'est-ce que SINTROM 4 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ? Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?

4. Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?

7. Informations supplémentaires

#### 1. QU'EST-CE QUE SINTROM 4 mg, COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

**Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :**

Antithrombotique (code ATC : B01AA07).

**Indications thérapeutiques :**

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK).

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

- phlébite (caillot dans une veine),

- embolie pulmonaire (caillot dans les poumons),

- maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillation auriculaire), anomalies ou prothèse des valves cardiaques,

- certains infarctus du myocarde,

Il peut également être prescrit pour empêcher l'héparine (autre médicament anticoagulant).

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAIRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

**Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Contre-indications :**

**Ne prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :**

• Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament;

• En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie) ;

• En cas d'association avec les médicaments suivants :

- l'aspirine à fortes doses

- le miconazole utilisé pour le traitement de mycoses (infections à champignons) par voie générale ou buccale,

- les AINS pyrazolés : phénbutazone, médicaments utilisés comme anti-inflammatoires.

• En cas d'interaction avec le milteperutol (plante utilisée en phytothérapie).

**Maintenez garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :**

Faites attention avec Sintrom 4 mg, comprimé : Il est important de comprendre les principes et les modalités du traitement afin de ne pas prendre de risque inutile. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin et utilisez le carnet de suivi prévu (voir Carnet d'information et suivi de traitement).

Ce médicament est généralement déconseillé, sauf avis contraire de votre médecin :

• En cas de risque connu de saignement.

• En cas d'insuffisance rénale sévère.

• En association avec :

- l'aspirine ou ses dérivés aux doses habituelles par voie orale,

- les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (sauf AINS pyrazolés),

- le fluoruracile, et par extrapolation, tegafur et capécitabine (médicaments anticancéreux).

Avant le traitement

Il est important que votre médecin puisse évaluer votre risque personnel de saignement évolutif. Alors, signalez-lui si vous êtes sujet à des saignements, notamment digestifs, et/ou urinaires, et/ou sanguinolents.

sont pas interdits, à condition de les répartir dans votre alimentation de manière régulière et sans excès.

Durant le traitement par Sintrom, vous devrez éviter toute consommation excessive d'alcool, étant donné que l'alcool risque de modifier l'action de Sintrom sur votre organisme.

**Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives utilisées :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant votre grossesse.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant votre grossesse.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant l'allaitement.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant la grossesse.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant l'allaitement.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant la grossesse.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant l'allaitement.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant la grossesse.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant l'allaitement.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant la grossesse.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant l'allaitement.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant la grossesse.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant l'allaitement.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant la grossesse.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant l'allaitement.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant la grossesse.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant l'allaitement.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant la grossesse.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant l'allaitement.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant la grossesse.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant l'allaitement.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant la grossesse.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant l'allaitement.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant la grossesse.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant l'allaitement.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant la grossesse.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant l'allaitement.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant la grossesse.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant l'allaitement.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant la grossesse.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant l'allaitement.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant la grossesse.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant l'allaitement.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant la grossesse.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant l'allaitement.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant la grossesse.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant l'allaitement.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant la grossesse.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

**Utilisation pendant l'allaitement :**

En général, l'utilisation de ce médicament

# SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

## Acénocoumarol

### Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

**Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.**

Si vous avez des questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.**

**Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.**

#### 1. Que contient cette notice :

Qu'est-ce que SINTROM 4 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ? Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?

Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?

#### 7. Informations supplémentaires

### 1. QU'EST-CE QUE SINTROM 4 mg, COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

#### • Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antithrombotique (code ATC : B01AA07).

#### • Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K (AVK).

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et d'éviter ainsi la formation de caillot dans les artères et les veines.

Il est prescrit dans certaines situations en médecine ou en chirurgie :

- phlébite (caillot dans une veine),
- embolie pulmonaire (caillot dans les poumons),

• maladies cardiaques connues : certains troubles du rythme cardiaque (tels que fibrillations auriculaires), anomalies ou prothèse des valves cardiaques, certains infarctus du myocarde,

Il peut également être prescrit pour empêcher l'héparine (autre médicament anticoagulant).

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAIRE AVANT DE PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

#### • Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

#### Contre-indications :

#### No prenez jamais Sintrom 4 mg, comprimé dans les cas suivants :

• Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament;

• En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie) ;

• En cas d'association avec les médicaments suivants :

- l'aspirine à fortes doses

- le miconazole utilisé pour le traitement de mycoses (infections à champignons) par voie générale ou buccale,

- les AINS pyrazolés : phénbutazone, médicaments utilisés comme anti-inflammatoires.

• En cas d'interaction avec le milteperpine (plante utilisée en phytothérapie).

#### Maintenez garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec Sintrom 4 mg, comprimé :

Il est important de comprendre les principes et les modalités du traitement afin de ne pas prendre de risque inutile. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin et utilisez le carnet de suivi prévu (voir Carnet d'information et suivi de traitement).

Ce médicament est généralement déconseillé, sauf avis contraire de votre médecin :

• En cas de risque connu de saignement.

• En cas d'insuffisance rénale sévère.

• En association avec :

- l'aspirine ou ses dérivés aux doses habituelles par voie orale,

- les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (sauf AINS pyrazolés),

- le fluoruracile et, par extrapolation, tegafur et capécitabine (médicaments anticancéreux).

#### Avant le traitement :

Il est recommandé que votre médecin puisse évaluer votre risque personnel de saignement avant le traitement. Ainsi, signallez-lui si vous êtes sujet à des saignements, notamment digestifs, ainsi que si vous prenez des médicaments qui peuvent entraîner des saignements.

sont pas interdits, à condition de les répartir dans votre alimentation de manière régulière et sans excès.

Durant le traitement par Sintrom, vous devrez éviter toute consommation excessive d'alcool, étant donné que l'alcool risque de modifier l'action de Sintrom sur votre organisme.

#### Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives utilisées :

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire cet anticoagulant pendant votre grossesse.

Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

• allaitement : Même si le Sintrom peut être absorbé par le lait maternel, il n'a pas été étudié dans l'allaitement. Il est donc préférable d'arrêter la lactation.

• sportifs : Évitez les traumatismes et les efforts physiques importants.

• alcool : Si vous devez prendre de l'alcool, faites-le avec modération.

• tabac : Ce médicament peut augmenter le risque de maladie cardiaque et de cancer.

• 3. COMM. : Instructi... Posologie et duré... Posologie Respectez... Mises en g... Autre indic... La posologie Puis la dos... pour équilibr... Les modific... possible ce... Mode d'adm... VOIE ORAL... Fréquence... La pos... ré... efficacité... Une prise p... puisse mod... Dans tous l... Durée du tr... Selon presc... Le temps... Symptômes... Vous ave... Consultez l... Un surdos... L'apparici... • un INR s... Dans ces si... suis... un cer... certain... traitement dev... Conduite à t... Si vous oubliez de... deux fois la dose prévue dans la même journée.

La prise médicamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8 heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est préférable de ne pas prendre la dose oubliée.

Il faut signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre carnet de suivi.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :

Si vous devrez, en aucun cas, arrêter de prendre Sintrom sans que votre

medicament autorisé N° : 512/11DMR21UNA ROSESSE DE VOTRE LISER UN

intrainer des achines : véhicules et coagulant, en

llée chez les lase de Lapp le (malades

'administra- la rubrique «

tre situation ats de l'INR, médecin, si

ante dans re médecin R.

rirez dû : fiales) ;

lui qui vous autres cas un

doses :

à tout jamais prendre

deux fois la dose prévue dans la même journée.

La prise médicamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8 heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est préférable de ne pas prendre la dose oubliée.

Il faut signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre carnet de suivi.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :

Si vous devrez, en aucun cas, arrêter de prendre Sintrom sans que votre

medicament autorisé N° : 512/11DMR21UNA ROSESSE DE VOTRE LISER UN

intrainer des achines : véhicules et coagulant, en

llée chez les lase de Lapp le (malades

'administra- la rubrique «

tre situation ats de l'INR, médecin, si

ante dans re médecin R.

rirez dû : fiales) ;

lui qui vous autres cas un

doses :

à tout jamais prendre

deux fois la dose prévue dans la même journée.

La prise médicamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8 heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est préférable de ne pas prendre la dose oubliée.

Il faut signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre carnet de suivi.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :

Si vous devrez, en aucun cas, arrêter de prendre Sintrom sans que votre

medicament autorisé N° : 512/11DMR21UNA ROSESSE DE VOTRE LISER UN

intrainer des achines : véhicules et coagulant, en

llée chez les lase de Lapp le (malades

'administra- la rubrique «

tre situation ats de l'INR, médecin, si

ante dans re médecin R.

rirez dû : fiales) ;

lui qui vous autres cas un

doses :

à tout jamais prendre

deux fois la dose prévue dans la même journée.

La prise médicamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8 heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est préférable de ne pas prendre la dose oubliée.

Il faut signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre carnet de suivi.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :

Si vous devrez, en aucun cas, arrêter de prendre Sintrom sans que votre

medicament autorisé N° : 512/11DMR21UNA ROSESSE DE VOTRE LISER UN

intrainer des achines : véhicules et coagulant, en

llée chez les lase de Lapp le (malades

'administra- la rubrique «

tre situation ats de l'INR, médecin, si

ante dans re médecin R.

rirez dû : fiales) ;

lui qui vous autres cas un

doses :

à tout jamais prendre

deux fois la dose prévue dans la même journée.

La prise médicamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8 heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est préférable de ne pas prendre la dose oubliée.

Il faut signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre carnet de suivi.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :

Si vous devrez, en aucun cas, arrêter de prendre Sintrom sans que votre

medicament autorisé N° : 512/11DMR21UNA ROSESSE DE VOTRE LISER UN

intrainer des achines : véhicules et coagulant, en

llée chez les lase de Lapp le (malades

'administra- la rubrique «

tre situation ats de l'INR, médecin, si

ante dans re médecin R.

rirez dû : fiales) ;

lui qui vous autres cas un

doses :

à tout jamais prendre

deux fois la dose prévue dans la même journée.

La prise médicamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8 heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est préférable de ne pas prendre la dose oubliée.

Il faut signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre carnet de suivi.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :

Si vous devrez, en aucun cas, arrêter de prendre Sintrom sans que votre

medicament autorisé N° : 512/11DMR21UNA ROSESSE DE VOTRE LISER UN

intrainer des achines : véhicules et coagulant, en

llée chez les lase de Lapp le (malades

'administra- la rubrique «

tre situation ats de l'INR, médecin, si

ante dans re médecin R.

rirez dû : fiales) ;

lui qui vous autres cas un

doses :

à tout jamais prendre

deux fois la dose prévue dans la même journée.

La prise médicamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8 heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est préférable de ne pas prendre la dose oubliée.

Il faut signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre carnet de suivi.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :

Si vous devrez, en aucun cas, arrêter de prendre Sintrom sans que votre

medicament autorisé N° : 512/11DMR21UNA ROSESSE DE VOTRE LISER UN

intrainer des achines : véhicules et coagulant, en

llée chez les lase de Lapp le (malades

'administra- la rubrique «

tre situation ats de l'INR, médecin, si

ante dans re médecin R.

rirez dû : fiales) ;

lui qui vous autres cas un

doses :

à tout jamais prendre

deux fois la dose prévue dans la même journée.

La prise médicamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8 heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est préférable de ne pas prendre la dose oubliée.

Il faut signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre carnet de suivi.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :

Si vous devrez, en aucun cas, arrêter de prendre Sintrom sans que votre

medicament autorisé N° : 512/11DMR21UNA ROSESSE DE VOTRE LISER UN

intrainer des achines : véhicules et coagulant, en

llée chez les lase de Lapp le (malades

'administra- la rubrique «

tre situation ats de l'INR, médecin, si

ante dans re médecin R.

rirez dû : fiales) ;

lui qui vous autres cas un

doses :

à tout jamais prendre

deux fois la dose prévue dans la même journée.

La prise médicamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8 heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est préférable de ne pas prendre la dose oubliée.

Il faut signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre carnet de suivi.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :

Si vous devrez, en aucun cas, arrêter de prendre Sintrom sans que votre

medicament autorisé N° : 512/11DMR21UNA ROSESSE DE VOTRE LISER UN

intrainer des achines : véhicules et coagulant, en

llée chez les lase de Lapp le (malades

'administra- la rubrique «

tre situation ats de l'INR, médecin, si

ante dans re médecin R.

rirez dû : fiales) ;

lui qui vous autres cas un

doses :

à tout jamais prendre

deux fois la dose prévue dans la même journée.

La prise médicamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8 heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est préférable de ne pas prendre la dose oubliée.

Il faut signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre carnet de suivi.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :

Si vous devrez, en aucun cas, arrêter de prendre Sintrom sans que votre

medicament autorisé N° : 512/11DMR21UNA ROSESSE DE VOTRE LISER UN

intrainer des achines : véhicules et coagulant, en

llée chez les lase de Lapp le (malades

'administra- la rubrique «

tre situation ats de l'INR, médecin, si

ante dans re médecin R.

rirez dû : fiales) ;

lui qui vous autres cas un

doses :

à tout jamais prendre

deux fois la dose prévue dans la même journée.

La prise médicamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8 heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est préférable de ne pas prendre la dose oubliée.

Il faut signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre carnet de suivi.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :

Si vous devrez, en aucun cas, arrêter de prendre Sintrom sans que votre

medicament autorisé N° : 512/11DMR21UNA ROSESSE DE VOTRE LISER UN

intrainer des achines : véhicules et coagulant, en

llée chez les lase de Lapp le (malades

'administra- la rubrique «

tre situation ats de l'INR, médecin, si

ante dans re médecin R.

rirez dû : fiales) ;

lui qui vous autres cas un

doses :

à tout jamais prendre

deux fois la dose prévue dans la même journée.

La prise médicamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 8 heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est préférable de ne pas prendre la dose oubliée.

Il faut signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre carnet de suivi.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :

Si vous devrez, en aucun cas, arrêter de prendre Sintrom sans que votre

medicament autorisé N° : 512/11DMR21UNA ROSESSE DE VOTRE LISER UN

intrainer des achines : véhicules et coagulant, en

llée chez les lase de Lapp le (malades

Id :07012020

Kassid, Mebarka

Indéfini --- (---) Indéfini

Taille :0 cm Poids :0 kg TA :0/0 mmHg

Méd. :

Technicien :

Commentaires :

07/01/2020 15:56:30

FC: 101 bpm

PR: --- ms

QRS: 86 ms

QT/QTcH: 324/396 ms

QTcB: 420 ms


QTcF: 385 ms

Rv5-Sv1 : 2.06/--- mV

Sok-Lyon : 2.06 mV

Axe: ---/68/52 °

\*RAPPORT NON CONFIRMÉ\*



Dép. :

25mm/s 10mm/mV 0.05-40Hz/50Hz Cardioline ECG200+ v.2.01.5558