

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| O Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| O Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| O Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W19-473578

TI SN

CA

<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent(e)			
Matricule : <b>5722</b>	Société : <b>RAM</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	
Nom & Prénom : <b>HARRAK KHALID</b>			
Date de naissance : <b>07 - m - 63</b>			
Adresse : <b>9 Rue du Perigord France 11 21 CASA</b>			
Tél. : <b>0661315241</b>	Total des frais engagés : ..... Dhs		

Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin :			
Date de consultation :			
Nom et prénom du malade : <b>YAHYA HACHEM BOUZIYA</b> Age : ..... <b>20 JAN 2004</b>			
Lien de parenté : <input type="checkbox"/> Lui-même <input checked="" type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant			
Nature de la maladie : <b>Affection</b>			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances : <b>ALD</b>			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : ..... Le : **15/01/2020**

Signature de l'adhérent(e) :

DOCTEUR HAMID ACHIBA  
Chirurgien Dentiste Prostéthiste  
N° 2212211 - Casablanca - Maroc

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Nature des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes INP : 365818618
29/10/19	Gastro Endoscopie Proctologie 101. observation Casablanca	365818618	500,10	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Signature	29/10/19	500,10

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
LABORATOIRE OTHMANI D'ANALYSES MEDICALES DT. Houda Othmani - Biologiste N°2, Bd El Qods, Realitate BI Qods Quarier Omaria - Ain Chock CASABLANCA AUXILIAIRES MEDICAUX INPE: 093061396	30/10/19	800	750,00 DH


CASABLANCA AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

**Important :**  
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : [ ]
				

COEFFICIENT DES TRAVAUX
[ ]

MONTANTS DES SOINS
[ ]

DEBUT D'EXECUTION
[ ]

FIN D'EXECUTION
[ ]

COEFFICIENT DES TRAVAUX
[ ]

MONTANTS DES SOINS
[ ]

DATE DU DEVIS
[ ]

DATE DE L'EXECUTION
[ ]

**O.D.F PROTHESES DENTAIRES**

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE	
H	25533412   21433552 00000000 00000000
D	00000000 00000000 35533411 11433553
B	G

[Création, remont, adjonction]  
Fonctionnel, Thérapeutique nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS
--

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION
---

# Docteur Mohamed ACHIBA

الدكتور محمد عشيبة

- Spécialiste des maladies de l'appareil digestif.
- Foie, Vésicule biliaire, estomac, intestins, hémorroïdes.
- Echographie-endoscopie digestive-proctologie.
- Ex Chef de Service de Gastro-entérologie  
Hôpital Mly Youssef à Casablanca.
- Membre de la société française de Gastro-entérologie.



• أخصائي في أمراض الجهاز الهضمي.  
الكبد، المريارة، المعدة، الأمعاء، البواسير.

• الفحص بالأمواج فوق الصوتية، الفحص بالمنظار الداخلي.

تشخيص

و جراحة أمراض المخرج.

• رئيس مصلحة الجهاز الهضمي سابقا بمستشفى  
مولاي يوسف الدار البيضاء.

• عضو الجمعية الفرنسية لأمراض الجهاز الهضمي.

Casablanca, le : ..... 29 OCT 2019

Yann whale le - for 3-40

86,90

Milk 200 ml (buk ke 14)

AS

45,90

1 ml - 1 ml - 1 ml - 1 ml

AS

AS

- Tribukine

Tel

Pharmacie ProjecTalma  
Casablanca

44,80

1 sa 7

102

AS

AS

AS

48,50

2 ml - 1

16L

AS

500,00

274,00

17 ml - 1 ml - 226

AS

AS

AS

دار جورج 10، تجزئي مولاي التهامي، الطابق الأول، الشقة رقم 1 - الولفة - الدار البيضاء

10, Lotissement Moulay Thami (Rond point George) 1<sup>er</sup> étage, N° 1 - Quartier Oulfa - Casablanca

الهاتف : 0661 33 57 80 - المستعجلات : Tél.: 0522 89 62 69

Urgence : 0661 33 57 80 - المستعجلات : Tél.: 0522 89 62 69

# Docteur Mohamed ACHIBA

الدكتور محمد عشيبة

- Spécialiste des maladies de l'appareil digestif.
- Foie, Vésicule biliaire, estomac, intestins, hémorroïdes.
- Echographie-endoscopie digestive-proctologie.
- Ex Chef de Service de Gastro-entérologie  
Hôpital Mly Youssef à Casablanca.
- Membre de la société française de Gastro-entérologie.



- أخصائي في أمراض الجهاز الهضمي.
- الكبد، المريء، المعدة، الأمعاء، البواسير.
- الفحص بالأمواج فوق الصوتية، الفحص بالمنظار الداخلي.
- تشخيص و جراحة أمراض المخرج.
- رئيس مصلحة الجهاز الهضمي ساينتا بمستشفى مولاي يوسف الدار البيضاء.
- عضو الجمعية الفرنسية لأمراض الجهاز الهضمي.

Casablanca, le : ..... 29 OCT 2019

Yannick habber - fax 310

- Spécialiste de Gastro-entérologie

- Tbc, Hm, veille

LABORATOIRE OTHMANI D'ANALYSES CRM  
Dr. Houda Othmani - Biologiste  
N°2, Bd El Qods, Résidence El Qods  
Quartier Ouarzazate - Ain Chock - CASABLANCA  
Tél: 05 22 21 22 11 Fax: 05 22 21 22 39

Dr. Mohamed ACHIBA  
GASTRO-ENTEROLOGIE ET PROCTOLOGIE  
10 Lotossetment Moulay Thami - Casablanca - Tel: 0661 33 57 80  
Urgence : 0661 33 57 80 - المستعجلات : Tél.: 0522 89 62 69

# Laboratoire OTHMANI D'Analyses Médicales

Dr. Houda OTHMANI

N°2 Res El Qods, Bd El Qods Quartier Omaria, Ain Chock - Casablanca

Tél : 0522212211 - Fax : 0522212239 - E-mail : othmani.laboratoire@gmail.com

## Facture

N° facture : 2019-3735

Édité le : 31/10/2019

Patient : Mme YAMNAHAKKI Fouzia

Date prélèvement : 30/10/2019

N° Dossier : 96131330

Analyses	Valeur en B	Montant
Ferritine	250	300,00
Triglycérides	60	72,00
HDL-Cholestérol	50	60,00
VLDL-Cholestérol	50	60,00
Protéine C Réactive (CRP )	100	120,00
Sérologie Hélicobacter pylori	250	300,00
Total B	760	912,00
APB	1,0	15,00
Majoration de garde		
Total		750,00

LABORATOIRE OTHMANI D'ANALYSES  
Dr. Houda Othmani - Biologiste  
N°2, Bd El Qods, Résidence El Qods  
Quartier Omaria - Ain Chock - CASABLANCA  
Tél: 05 22 21 22 11 - Fax: 05 22 21 22 39  
INPE: 093061596



# PACKAGE LEAFLET

## CARBOSYLANE, capsule

Activated charcoal, simeticone

Sothema  
L. Tazi, Pharmacien Resp.  
CARBOSYLANE - 24 doses  
PPV 44.80 DH



6118001070886

**Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it  
Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor or phar**

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
  - Ask your pharmacist if you need more information or advice.
  - If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.
  - You must talk to a doctor if you do not feel better or if you feel worse.
- Keep out of the reach of children.

### In this leaflet:

1. WHAT CARBOSYLANE, capsule IS AND WHEN IT IS USED FOR
2. WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU TAKE CARBOSYLANE, capsule
3. HOW TO TAKE CARBOSYLANE, capsule
4. POSSIBLE SIDE EFFECTS
5. HOW TO STORE CARBOSYLANE, capsule
6. CONTENTS OF THE PACK AND OTHER INFORMATION

### 1. WHAT CARBOSYLANE, capsule IS AND WHEN IT IS USED FOR

Pharmacotherapeutic group – ATC code: A07BA51,  
ANTIFLATULENT/ INTESTINAL ADSORBENT

This medicine is indicated in adults and children over 6 years of age  
for the symptomatic treatment of dyspeptic states (indigestion) and  
meteorism (intestinal distension).

### 2. WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU TAKE CARBOSYLANE, capsule

#### Do not take CARBOSYLANE, capsule:

- if you are allergic (hypersensitive) to the active substances or any of the other ingredients of this medicine listed in section 6.
- In children under 6 years of age due to the risk of choking.

#### Warnings and precautions

If you take digitalis-type drugs, allow an interval between taking CARBOSYLANE and digitalis-type drugs (more than 2 hours, if possible).

Talk to your doctor or pharmacist before taking CARBOSYLANE,

#### If you take more CARBOSYLANE, capsule, than you should:

The use of high dose levels can result in dark colouration of the stools.  
Contact your doctor or pharmacist immediately.

#### If you forget to take CARBOSYLANE, capsule

Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

### 4. POSSIBLE SIDE EFFECTS

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them:

- dark discolouration of the stools may occur.
- some cases of allergic reactions (urticaria, generalised allergic reaction) have been reported after the administration of CARBOSYLANE, capsule.

#### Reporting of side effects:

If you get any side effect, talk to your doctor or your pharmacist or your nurse. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. You can also report side effects directly via the national reporting system: National Agency for safety of medicines and health products (ANSM) and network of the Regional Centers of Pharmacovigilance. Web site: [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr). By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this medicine.

### 5. HOW TO STORE CARBOSYLANE, capsule

Keep this medicine out of the sight and reach of children.

Do not use this medicine after the expiry date which is stated on

# MEZOR® 20mg & 40mg

Esomeprazole  
Gélules gastro-résistantes

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement et votre maladie.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien.  
Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

## COMPOSITION:

Chaque gélule gastro-résistante contient soit 20mg soit 40mg de substance active, esomeprazole. La quantité exacte est indiquée sur la boîte de MEZOR.

Excipients : sphères de sucre (saccharose et amidon de maïs), hypromélose, émulsion de diméthoxyéthanol, eau purifiée et propylène glycol), polysorbate 80, mannitol, Monoglycéride Méthacrylique - éthyle acrylate (1/1) (contenant copolymère d'acide méthacrylique et d'acide polysorbate 80), Citrate de Triethyl Macroglycérides stériques.

Composition de l'enveloppe de la gélule : gélatine, oxyde de fer jaune E172, dioxyde de titane.

## FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATIONS :

MEZOR 20mg et 40mg est disponible en boîtes de 7, 14 et 28 gélules gastro-résistantes.

## DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est un inhibiteur de la pompe à protons.

MEZOR 20mg est utilisé dans :

- Le traitement de l'œsophagite érosive
- La prévention des rechutes de certaines maladies
- Le traitement des symptômes du reflux par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*
- Le traitement des ulcères de l'estomac
- La prévention des ulcères de l'estomac
- Le traitement du syndrome de Zollinger-Ellison

MEZOR 40mg est utilisé dans :

- Le traitement de l'œsophagite érosive.
- Le traitement du syndrome de Zollinger-Ellison.

## DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT :

Il est particulièrement important d'informer votre médecin si vous prenez d'autres médicaments, même ceux sans prescription médicale.

Ne prenez JAMAIS ce médicament dans ces cas suivants :

- Si vous êtes allergique à l'un des constituants de MEZOR.
- Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons.
- Si vous prenez un médicament contenant de l'atazanavir ou du neflifavir (utilisés dans le traitement du VIH).

## MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Faites attention avec MEZOR dans les cas suivants :

- Si vous prenez d'autres médicaments comme l'itraconazole ou le kétocozaole (pour les infections fongiques), le diazépam (contre l'anxiété), la phénytoïne (pour l'épilepsie), la warfarine (pour les troubles de coagulation sanguine) ou le cisapride (pour des troubles liés à un retard de l'évacuation gastrique).
- Si vous avez des problèmes hépatiques graves. Vous devez en discuter avec votre médecin. Il peut réduire la posologie.
- Si vous avez des problèmes rénaux graves. Vous devez en discuter avec votre médecin.
- Si une association de médicaments vous est prescrite pour l'éradication de *Helicobacter pylori* avec esomeprazole, ou si vous prenez esomeprazole dans le cadre d'un traitement à la demande, vous devez informer votre médecin des autres médicaments que vous prenez.
- Ce médicament peut masquer les symptômes d'autres maladies. Par conséquent, si vous ressentez l'un des symptômes suivants avant prise d'esomeprazole, ou pendant le traitement, prévenez votre médecin immédiatement :
- Perse des difficultés à avaler
- Douleur gastrique ou indigestion
- Vomissement de sang ou d'aliments
- Selles noires (selles tachées de sang)

En cas de traitement à la demande, vous devez prévenir votre médecin de toutes modifications des symptômes.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Il est important d'indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment un autre médicament notamment l'itraconazole, le kétocozaole ou voriconazole, le diazépam, la phénytoïne, la warfarine ou autres dérivés coumariniques, le citalopram, l'imipramine ou la clomipramine, l'atazanavir, la clarithromycine, l'amoxicilline ou le cisapride, même si s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Si vous êtes enceinte ou susceptible de l'être ou si vous allaitez, dites-le à votre médecin avant de prendre esomeprazole.

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Ce médicament ne doit pas être utilisé au cours de l'allaitement.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

## CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

Esomeprazole n'est pas susceptible d'affecter l'aptitude de conduire ou d'utiliser des outils ou des machines.

## LISTE DES EXCIPIENTS À EFFETS NOTOIRS

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, du syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en sucrase isomaltase (maladies métaboliques rares).

Ce médicament contient du « Parahydroxybenzoate » : propyl-p-hydroxybenzoate (E216), methyl-p-hydroxybenzoate (E218), et peut provoquer des réactions allergiques.

## EFFETS NON SOUHAITÉS OU GÉNANTS

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants.

### Effets indésirables fréquents (chez 1 à 10 % des sujets traités) :

Maux de tête, diarrhée, constipation, nausées, vomissement, douleurs abdominales, flatulence.

### Effets indésirables peu fréquents (chez moins de 1 % des patients traités) :

Sensation vertigineuse, céphalée périphérique, paresthésie (sensation anormale dans une région cutanée ou profonde), somnolence, insomnie, augmentation des enzymes du foie, réactions cutanées (dermatite, rash, prurit, urticaire), malaise.

### Effets indésirables rares (chez moins de 0,1 % des patients traités) :

Confusion mentale réversible, agitation, agressivité, dépression et hallucinations, particulièrement chez des patients présentant des pathologies sévères, gynécomastie (gonflement des seins chez l'homme), sécheresse de la bouche, stomatite (inflammation de la bouche), candidose gastro-intestinale (infection due à un champignon), diminution du nombre des cellules sanguines (globules rouges, globules blancs, plaquettes), encéphalopathie chez les patients ayant une insuffisance hépatique sévère préexistante, hépatite avec ou sans ictere (jaunisse).

MEZOR® 20mg  
Esomeprazole (DCI)

14 gélules



6 118000 340294

LOT N°: 190944

PER : 01 - 2021

PPV : 86,90 DH

# Tibéra

## Ornidazole

Ornidazole

Anti-infectieux pour traiter la trichomonase

### Composition

Comprimés : ornidazole 500 mg; excipients

Ampoules (3 ml) : ornidazole 500 mg; éthanol

Forme et présentation pharmaceutique

Comprimés à 500 mg : boîte de 10

Ampoule de 3 ml à 500 mg pour perfusion

### Propriétés, effets

L'absorption de l'ornidazole dans la cellule est 5 fois plus élevée que celle des imidazoles.

La réduction de l'ornidazole par la cellule entraîne une augmentation de la concentration intracellulaire toxicité pour la cellule concernée qui se libère. En ce qui concerne les protozoaires, le mécanisme est différent.

Le spectre d'action de l'ornidazole englobe

A : sont sensibles : CMI 0,5 à 8 mg/l; Peptostreptococcus spp., insensibles à la

B : sont résistantes : CMI ≥ 16 mg/l : toutes les bactéries

Eubactérum spp. ainsi que les champignons

La sensibilité des bactéries anaérobies peut être déterminée par la dilution en série et (M100-S3 performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing) peuvent être classées parmi les germes sensibles.

Classification Valeur limite (CMI en µg/ml)

Sensible (S) ≤ 8

Résistant (R) ≥ 16

Il n'est pas judicieux de déterminer la sensibilité des protozoaires.

Le spectre d'action de l'ornidazole englobe

Sont sensibles : CMI ≤ 8 mg/l : Trichomonas vaginalis

Les autres protozoaires sont tous résistants.

La détermination de la sensibilité des protozoaires

in vivo de l'ornidazole à l'égard des protozoaires cités ci-dessus a tant l'objet d'une documentation universelle.

Il existe une résistance croisée entre l'ornidazole et d'autres nitro-5 imidazoles; on ne connaît pas de résistance croisée avec d'autres substances chimiquement non apparentées.

Il est rare que des bactéries anaérobies soient résistantes à l'ornidazole : une telle résistance n'a été décrite que dans des cas isolés.

Plus de 99% des bactéries anaérobies normalement sensibles peuvent toujours être considérées comme sensibles à l'ornidazole.

Indications

Elles procèdent de l'activité antibactérienne et antiparasitaire de l'ornidazole et de ses caractéristiques pharmacocinétiques. Elles tiennent compte à la fois des études cliniques auxquelles à donner lieu ce médicament, et de sa place dans l'éventail des produits anti-infectieux actuellement disponibles.

Elles sont limitées aux infections dues aux germes définis comme sensibles en pharmacodynamie.

Indications générales :

- Traitement curatif des infections médicochirurgicales à germes anaérobies sensibles.

- Traitement préventif des infections à germes anaérobies sensibles lors des interventions chirurgicales comportant un haut risque de survenue de ce type d'infection.

- Amibiases sévères de localisation intestinale ou hépatique (solution injectable 500mg)

Spécifique à la forme comprimé :

- amibiase, qu'elle qu'en soit l'expression clinique (amibiases intestinales et extra-intestinales).

- Trichomonases urogénitales.

- Lambiasis

- Relais des traitements par voie injectable des infections à germes anaérobies sensibles, à titre curatif ou préventif.

Posologie, mode d'emploi

Les comprimés doivent toujours être pris après les repas. La solution contenue dans les ampoules doit être administrée en perfusion brève, elle doit toujours être diluée avant l'injection. En ce qui concerne la préparation de la solution à perfuser, voir paragraphe 5.

Posologie usuelle

1. Trichomonases

deux schémas thérapeutiques peuvent être recommandés :

Nature du traitement Dose journalière

Adultes et enfants de plus de 35 kg

Enfants jusqu'à 35 kg

a. Traitement par dose unique 3 comprimés le soir

b. Traitement de 5 jours 2 comprimés

(1 le matin, 1 le soir)

25 mg par kg de poids corporel

non recommandé

Pour éviter une réinfection, le partenaire doit toujours être également traité par la même dose orale.

Chez l'enfant, le traitement consiste à l'administration d'une dose unique de 25 mg par Kg de poids corporel et par jour.

2. Amibiase

a. Traitement de 3 jours lors de dysenterie amibiennne.

b. Traitement de 5-10 jours pour toutes les formes d'amibiase.

Durée du Traitement Dose journalière

Adultes et enfants de plus de 35 kg

Enfants jusqu'à 35 kg

a. 3 jours 3 comprimés le soir à prendre en une fois. Au-dessus de 60 kg de poids corporel : 4 comprimés (2 le matin, 2 le soir)

40 mg/kg. à prendre en une fois

b. 5-10 jours 2 comprimés (1 le matin, 1 le soir)

25 mg/kg. à prendre en une fois

c. Traitement de l'abcès amibienn du foie et de dysenterie amibiennne

Adultes: perfuser par voie intraveineuse 500-1000 mg en tant que dose initiale, puis 500 mg toutes les 12 heures pendant 3-6 jours

en moyenne.

La posologie pour enfants est de 20-30 mg/kg/jour.

## RESPECTER LES DOSES PRÉSCRITES

Liste I : A ne délivrer que sur ordonnance

### Composition par comprimé :

Ornidazole (DCI)..... 500 mg

Excipients q.s.p ..... 1 Comprimé

## Tibéral® 500 mg



10 comprimés pelliculés



6 118000 280231

LOT : 19101 PER : 07/2024

PPV : 48,50 DH

# TRIBUTINE®

Trimébutine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable, non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

## PRÉSENTATION

TRIBUTINE® 0,787% granulés pour suspension buvable, flacon de 250 ml.

TRIBUTINE® 150 mg sachets, boîte de 20.

TRIBUTINE® 150 mg gélule, boîte de 20.

## COMPOSITION

Nom du médicament	Substance active	Excipients
TRIBUTINE® 0,787% granulés pour suspension buvable	Trimébutine base.....0,787g	q.s.p. 100 g
TRIBUTINE® 150 mg sachets	Trimébutine base.....150 mg par sachet	q.s.p. 1 sachet
TRIBUTINE® 150 mg gélule	Trimébutine maléate.....150 mg par gélule	q.s.p. 1 gél.

## CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antispasmodique musculotrope.

## INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique des douleurs, des troubles du transit et de l'inconfort intestinal liés aux troubles fonctionnels intestinaux.

## CONTRE-INDICATIONS

Né prenez jamais TRIBUTINE® :

- Chez l'enfant de moins de 2 ans.

- En cas d'hypersensibilité à la trimébutine ou à l'un des autres composants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Mises en garde spéciales

TRIBUTINE® 0,787% granulés pour suspension buvable et TRIBUTINE® 150 mg sachets

## LISTE DES EXCIPENTS A EFFET NOTOIRE

TRIBUTIN  
TRIBUTIN  
saccharos

POSOL  
Posolog  
DANS TO  
TRIBUTI  
Chez l'ad  
Exceptio  
Le traite

Tributine 150 mg  
boîte de 20 sachets



6 118000 310334

NRQ

LOT : 5203

UT. AV : 09 - 24

P.P.V : 45 DH 90

## INTRODUCEZ

Voie orale.

## PRÉPARATION DE LA SUSPENSION BUVALE INSTANTANÉE

- Introduire de l'eau minérale non gazeuse ou bouillie refroidie par étapes jusqu'au col du flacon.
- Fermer et agiter le flacon au fur et à mesure jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
- La suspension est prête à l'emploi.
- Il convient d'agiter le flacon avant chaque utilisation.

## SURDOSSAGE

Si vous avez pris plus de TRIBUTINE® que vous n'auriez dû, consultez votre médecin.

## INSTRUCTIONS EN CAS D'OMISSION D'UNE OU DE PLUSIEURS DOSES

Sans objet.

## RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE

Sans objet.

# I.B.S.

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Complément alimentaire avec des bactéries probiotiques

I.B.S constitue une nouvelle approche dans le traitement des troubles intestinaux.

I.B.S convient aux personnes présentant des symptômes de diarrhée et/ou constipation sujets à des troubles intestinaux fréquents.

L'innovation de I.B.S. réside au niveau de la souche LP299V® qui est utilisée comme probiotique.

La souche LP299V® répond à des critères de qualité qui sont :

- Innocuité
- Résistance naturelle élevée à l'acidité gastrique et aux sels biliaires
- Adhésion aux cellules de la muqueuse intestinale et colonisation transitoire de l'intestin
- Etudes cliniques rigoureuses démontrant ses effets.

### Dose recommandée :

1 capsule par jour, une cure de 30 jours est recommandée pour un effet optimal, à renouveler si nécessaire.

L'apport journalier recommandé ne doit pas être dépassé.

#### Conseils d'utilisation :

1 capsule à avaler avec un verre d'eau de préférence le matin avant le petit déjeuner.  
Ne pas donner aux enfants de moins de 36 mois sans avis médical.



6 11126 750086

PPC : 274 DH

Distributeur : Botanic Pharma S.A.R.L., Lotissement ZAHRE II, Lot n°4, Sidi Maarouf, Casablanca-Maroc

**BOTANIC** ➤  
PHARMA