

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Prothétique :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 [LG] - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

 Maladie Dentaire Optique Autres

17659

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2772

Société : MAM

 Actif Pensionné(e) Autre :

Nom &amp; Prénom : KADRI HASSANI - Nafie

Date de naissance : 8.1.1913

Adresse :

Tél. : 066 711 7245

Total des frais engagés : 2093,62 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Docteur ARAI HOUSSAINI Najib  
Médecine Générale  
16, Rue Othba Benou Nafie  
BERRECHID - Tel. 33.73.21

Date de consultation : 26 NOV 2019

Nom et prénom du malade : KADRI HASSANI Nafie

Lien de parenté :  Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Adénome de la prostate + co. Wacker

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : Prostate + co. Wacker

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :



#### **BELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
26 NOV 2019	1	C	150	 Docteur ARAQI HOSSAIN Médecin Généraliste 16, Rue Orbaoui Nafie TÉRECHTIN 03 73.21

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<p style="text-align: right; transform: rotate(-15deg);"><b>ASMOUN S.A.S.</b> Docteur en Pharmacie Rue ASSOUM Hay Al Houda BERRECHID Tél : 05 22 32 84 04</p>	26/11/19	944,70

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Mohammed V MEDICAL SINA IBN SERRECHID Tel : 05 22 33 66 43	29/11/19	B738	898,92

## AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### **Important:**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H	25533412 00000000 D ————— 00000000 35533411	G	21433552 00000000 00000000 11433553
	B			COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

الدكتور عراقي حسيني نجيب

الطب العام  
الفحص بالصدى

طبيب رئيسي سابق بالقوات  
الجوية الملكية بالدار البيضاء  
خبير محلف لدى المحاكم

16، زنقة عقبة بن نافع - برشيد  
الهاتف: 05 22 33 73 21  
المحمول: 06 62 07 65 56

## MEDECINE GENERALE

### Echographie Générale

Ex. Médecin Chef des Forces  
Royales Airs de Casablanca  
Expert Assermenté auprès des Tribunaux

16, Rue Okba Bnou Nafie - Berrechid  
Tél. : 05 22 33 73 21  
GSM : 06 62 07 65 56

PHARMACIE ARAFAT  
ASMOUN Samir  
Docteur en Pharmacie  
2, Rue AS-SALAH Hay Al Houde  
BERRECHID  
Tél: 05 22 32 84 04

26 NOV. 2019

3 x 98,00 - KADRI HASSANI  
Mokamed.

① Tauvelosine Mui. 1 cpl le  
112, -  
112, -  
112, -  
② Oxyfflor 200 1/20  
87, -  
87, -  
③ Relaxium. 300  
69, -  
69, -  
④ Doloran crème 3  
3 x 115, -  
3 x 115, -  
⑤ Hivajol 100 mg 3/18  
46,70  
46,70  
⑥ Syilonac 100 mg 1/11  

---

T/ 944,70

**DOLORAN**  
POMADE CHAUFFANTE  
PPC:60,00DH

Docteur ARAFI HOUBSAI Najib  
Médecine Générale  
16, Rue Okba Bnou Nafie  
BERRECHID  
Tél: 05 22 33 73 21  
2, Rue AS-SALAH Hay Al Houde  
BERRECHID  
Tél: 05 22 32 84 04

# Tamsulosine Win® L.P.

## Tamsulosine

0,4 mg

### Gélule à libération prolongée

Voie Orale

#### 1. QU'EST-CE QUE TAMSULOSINE WIN L.P. 0,4 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL

Classe pharmacothérapeutique

ALPHA-BLOQUANTS / MEDICAMENTS UTILISÉS DANS L'HYPERTROPHIE BENIGNE DE

Indications thérapeutiques

Ce médicament est préconisé dans le traitement de certains symptômes d'  
volume bénigne de la prostate.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TAMSUL

Contre-indications

Ne prenez jamais TAMSULOSINE WIN L.P. 0,4 mg, gélule dans les cas suivants :

- allergie connue à ce médicament ou à des médicaments de la même classe thérapeutique
- antécédent d'œdème (gonflement du visage, des lèvres, des muqueuses) suite à la prise de ce médicament,
- antécédents d'hypotension orthostatique (baisse de la pression artérielle lors du passage de la position couchée à la position verticale pouvant s'accompagner de vertiges et de malaises),
- insuffisance hépatique sévère.

Ce médicament est généralement déconseillé en association avec des médicaments de la même classe, les alpha 1-bloquants, ainsi qu'en cas d'antécédent de syncope mictionnelle.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec TAMSULOSINE WIN L.P. 0,4 mg, gélule :

Mises en garde spéciales

Si vous ressentez une impression de malaise, de vertiges, fatigue ou sueurs (à cause d'une chute de tension lors d'un changement de position): dans ce cas adopter la position allongée, les manifestations devront cesser alors rapidement. Tout symptôme de gonflement du visage, des lèvres, des muqueuses peuvent être le signe d'une réaction allergique au médicament nécessitant l'arrêt du traitement. Vous devez le signaler immédiatement à votre médecin.

Si vous devez prochainement vous faire opérer de la cataracte, informez votre ophtalmologiste si vous avez été ou êtes actuellement traité par TAMSULOSINE WIN L.P. 0,4 mg, gélule. Il pourra alors prendre des précautions appropriées en fonction de votre traitement au moment de l'intervention chirurgicale. Demandez à votre médecin si vous devez ou non remettre à plus tard ou interrompre provisoirement votre traitement, en cas d'opération de la cataracte.

Précautions d'emploi

La prudence s'impose chez les sujets traités par des médicaments antihypertenseurs, chez l'insuffisant rénal chronique, chez le sujet âgé de plus de 65 ans et chez le patient coronarien.

Hygiène de vie: il est recommandé de vous astreindre à une certaine hygiène de vie durant ce traitement et notamment au maintien d'une activité physique, à la surveillance d'un régime alimentaire (éviter les repas riches, trop épiciés, trop alcoolisés); ne pas trop boire le soir, maintenir un transit intestinal régulier.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment si vous êtes déjà traité par un antihypertenseur alpha-bloquant, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

L'indication thérapeutique de ce médicament ne concerne pas la femme.

La tolérance de ce médicament au cours de la grossesse et son passage dans le lait maternel ne sont pas connus.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Une prudence particulière devra être observée par les conducteurs automobiles et les utilisateurs de machines en raison du risque d'hypotension orthostatique (avec possibilité de vertiges ou de malaise), surtout en début de traitement.

#### 3. COMMENT PRENDRE TAMSULOSINE WIN L.P. 0,4 mg, gélule ?

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

En règle générale, une gélule par jour.

SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MEDICALE.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

La gélule doit être avalée avec un verre d'eau sans être croquée ni mâchée.

SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MEDICALE

LOT : 0MA017  
PER.: 08/2021  
TAMSULOSINE WIN LP  
0,4 MG GELU B30  
P.P.V : 98DH00



6 118000 062257

# MYNAZOL® 150 mg

boîte de 1, 4 et 8 gélules  
Fluconazole

Avez la plus  
même heure c  
Adultes

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice médicamenteuse.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit par quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable devient grave ou si vous remarquez un effet dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à vot

## 1. DEMONINATION DU MEDICAMENT :

MYNAZOL 150 mg, boîte de 1, 4 et 8 gélules

## 2. COMPOSITION DU MEDICAMENT :

Fluconazole (DCI)

Excipients : Lactose monohydraté, amidon pré-magnésium, silice colloïdale anhydre.

Excipients à effet notoire : Lactose monohydraté.

## 3. CLASSE PHARMACO THERAPEUTIQUE :

Classe pharmaco-thérapeutique - code ATC : J1. Mynazol fait partie d'un groupe de médicaments actifs est le fluconazole.

Mynazol 150 mg est utilisé pour traiter les infections fongiques. Il peut également être utilisé pour vous empêcher de développer une infection à Candida. La cause la plus fréquente des infections fongiques est une levure appelée Candida.

## 4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Mynazol 150 mg est utilisé pour traiter les infections dues à des champignons et peut également être utilisé pour vous empêcher de développer une infection à Candida. La cause la plus fréquente des infections fongiques est une levure appelée Candida.

Adultes

Votre médecin pourra vous prescrire ce médicament pour traiter les infections fongiques suivantes :

- Méningite à cryptococcose - infection fongique du cerveau.
- Coccidioidomycose - une maladie du système bronchopulmonaire.
- Infections à Candida, retrouvées dans le sang, infections des organes (ex. cœur, poumons) ou des voies urinaires,
- Mycose de la muqueuse - infection de la muqueuse buccale, de la gorge et de plaies dues à une prothèse dentaire.
- Mycose génitale - infection du vagin ou du pénis.
- Infections cutanées - ex. pied d'athlète, herpès circiné, eczème marginé de Hebra, infection des ongles.

Vous pourriez aussi recevoir du Mynazol 150 mg pour :

- Éviter la récidive d'une méningite à cryptococcose.
- Éviter la récidive d'une mycose de la muqueuse.
- Diminuer le risque de récidive de mycose vaginale.
- Éviter de développer une infection à Candida (si votre système immunitaire est affaibli et ne fonctionne pas correctement).

## Enfants et adolescents (0 à 17 ans)

Votre médecin pourra vous prescrire ce médicament pour traiter les types suivants d'infections fongiques :

- Mycose de la muqueuse - infection de la muqueuse buccale, de la gorge.
- Infections à Candida, retrouvées dans le sang, infections des organes (p. ex. cœur, poumons) ou des voies urinaires,
- Méningite à cryptococcose - infection fongique du cerveau.

Vous pourriez aussi recevoir du Mynazol 150 mg pour :

- Vous empêcher de développer une infection à Candida (si votre système immunitaire est affaibli et ne fonctionne pas correctement),
- Éviter la récidive d'une méningite à cryptococcose.

## 5. POSOLOGIE :

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les gélules ne sont pas indiquées chez l'enfant de moins de 6 ans, en raison de la forme pharmaceutique.

**Mynazol® 150 mg**

8 gélules

FLUCONAZOLE

PROMOPHARM S.A.



6 118000 242017

115,00

Pour diminuer  
de mycose v

Pour traiter t  
de la peau e

Pour éviter d  
infection à C  
système imm  
ne fonctionne

Adolescents  
Respectez la  
posologie de l'  
Enfants jusqu'à  
La posologie n

## Affection

Mycose de la  
gorge dues à  
dépendant de  
sa localisation

Méningite à  
longiques int

Pour empêcher  
une infection  
immunitaire

Enfants âgés  
Enfants âgés  
Même posolog  
posologie ma  
Enfants âgés  
Même posolog  
La posologie n

# MYNAZOL® 150 mg

boîte de 1, 4 et 8 gélules  
Fluconazole

Avez la plus  
même heure c  
Adultes

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice médicamenteuse.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit par quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable devient grave ou si vous remarquez un effet dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à vot

## 1. DEMONINATION DU MEDICAMENT :

MYNAZOL 150 mg, boîte de 1, 4 et 8 gélules

## 2. COMPOSITION DU MEDICAMENT :

Fluconazole (DCI)

Excipients : Lactose monohydraté, amidon pré-magnésium, silice colloïdale anhydre.

Excipients à effet notoire : Lactose monohydraté.

## 3. CLASSE PHARMACO THERAPEUTIQUE :

Classe pharmaco-thérapeutique - code ATC : J1. Mynazol fait partie d'un groupe de médicaments actifs est le fluconazole.

Mynazol 150 mg est utilisé pour traiter les infections fongiques. Il peut également être utilisé pour vous empêcher de développer une infection à Candida. La cause la plus fréquente des infections fongiques est une levure appelée Candida.

## 4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Mynazol 150 mg est utilisé pour traiter les infections dues à des champignons et peut également être utilisé pour vous empêcher de développer une infection à Candida. La cause la plus fréquente des infections fongiques est une levure appelée Candida.

Adultes

Votre médecin pourra vous prescrire ce médicament pour traiter les infections fongiques suivantes :

- Méningite à cryptococcose - infection fongique du cerveau.
- Coccidioidomycose - une maladie du système bronchopulmonaire.
- Infections à Candida, retrouvées dans le sang, infections des organes (ex. cœur, poumons) ou des voies urinaires,
- Mycose de la muqueuse - infection de la muqueuse buccale, de la gorge et de plaies dues à une prothèse dentaire.
- Mycose génitale - infection du vagin ou du pénis.
- Infections cutanées - ex. pied d'athlète, herpès circiné, eczème marginé de Hebra, infection des ongles.

Vous pourriez aussi recevoir du Mynazol 150 mg pour :

- Éviter la récidive d'une méningite à cryptococcose.
- Éviter la récidive d'une mycose de la muqueuse.
- Diminuer le risque de récidive de mycose vaginale.
- Éviter de développer une infection à Candida (si votre système immunitaire est affaibli et ne fonctionne pas correctement).

## Enfants et adolescents (0 à 17 ans)

Votre médecin pourra vous prescrire ce médicament pour traiter les types suivants d'infections fongiques :

- Mycose de la muqueuse - infection de la muqueuse buccale, de la gorge.
- Infections à Candida, retrouvées dans le sang, infections des organes (p. ex. cœur, poumons) ou des voies urinaires,
- Méningite à cryptococcose - infection fongique du cerveau.

Vous pourriez aussi recevoir du Mynazol 150 mg pour :

- Vous empêcher de développer une infection à Candida (si votre système immunitaire est affaibli et ne fonctionne pas correctement),
- Éviter la récidive d'une méningite à cryptococcose.

## 5. POSOLOGIE :

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les gélules ne sont pas indiquées chez l'enfant de moins de 6 ans, en raison de la forme pharmaceutique.

**Mynazol® 150 mg**

8 gélules

FLUCONAZOLE

PROMOPHARM S.A.



6 118000 242017

115,00

Pour diminuer  
de mycose v

Pour traiter t  
de la peau e

Pour éviter c  
infection à C  
système imm  
ne fonctionne

Adolescents  
Respectez la  
posologie de l'  
Enfants jusqu'à  
La posologie n

## Affection

Mycose de la  
gorge dues à  
dépendant de  
sa localisation

Méningite à  
longiques int

Pour empêcher  
une infection  
immunitaire

Enfants âgés  
Enfants âgés  
Même posolog  
posologie ma  
Enfants âgés  
Même posolog  
La posologie n

# MYNAZOL® 150 mg

boîte de 1, 4 et 8 gélules  
Fluconazole

Avez la plus  
même heure c  
Adultes

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice médicamenteuse.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit par quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable devient grave ou si vous remarquez un effet dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à vot

## 1. DEMONINATION DU MEDICAMENT :

MYNAZOL 150 mg, boîte de 1, 4 et 8 gélules

## 2. COMPOSITION DU MEDICAMENT :

Fluconazole (DCI)

Excipients : Lactose monohydraté, amidon pré-magnésium, silice colloïdale anhydre.

Excipients à effet notoire : Lactose monohydraté.

## 3. CLASSE PHARMACO THERAPEUTIQUE :

Classe pharmaco-thérapeutique - code ATC : J1. Mynazol fait partie d'un groupe de médicaments actifs est le fluconazole.

Mynazol 150 mg est utilisé pour traiter les infections fongiques. Il peut également être utilisé pour vous empêcher de développer une infection à Candida. La cause la plus fréquente des infections fongiques est une levure appelée Candida.

## 4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Mynazol 150 mg est utilisé pour traiter les infections dues à des champignons et peut également être utilisé pour vous empêcher de développer une infection à Candida. La cause la plus fréquente des infections fongiques est une levure appelée Candida.

Adultes

Votre médecin pourra vous prescrire ce médicament pour traiter les infections fongiques suivantes :

- Méningite à cryptococcose - infection fongique du cerveau.
- Coccidioidomycose - une maladie du système bronchopulmonaire.
- Infections à Candida, retrouvées dans le sang, infections des organes (ex. cœur, poumons) ou des voies urinaires,
- Mycose de la muqueuse - infection de la muqueuse buccale, de la gorge et de plaies dues à une prothèse dentaire.
- Mycose génitale - infection du vagin ou du pénis.
- Infections cutanées - ex. pied d'athlète, herpès circiné, eczème marginé de Hebra, infection des ongles.

Vous pourriez aussi recevoir du Mynazol 150 mg pour :

- Éviter la récidive d'une méningite à cryptococcose.
- Éviter la récidive d'une mycose de la muqueuse.
- Diminuer le risque de récidive de mycose vaginale.
- Éviter de développer une infection à Candida (si votre système immunitaire est affaibli et ne fonctionne pas correctement).

## Enfants et adolescents (0 à 17 ans)

Votre médecin pourra vous prescrire ce médicament pour traiter les types suivants d'infections fongiques :

- Mycose de la muqueuse - infection de la muqueuse buccale, de la gorge.
- Infections à Candida, retrouvées dans le sang, infections des organes (p. ex. cœur, poumons) ou des voies urinaires,
- Méningite à cryptococcose - infection fongique du cerveau.

Vous pourriez aussi recevoir du Mynazol 150 mg pour :

- Vous empêcher de développer une infection à Candida (si votre système immunitaire est affaibli et ne fonctionne pas correctement),
- Éviter la récidive d'une méningite à cryptococcose.

## 5. POSOLOGIE :

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les gélules ne sont pas indiquées chez l'enfant de moins de 6 ans, en raison de la forme pharmaceutique.

**Mynazol® 150 mg**

8 gélules

FLUCONAZOLE

PROMOPHARM S.A.



6 118000 242017

115,00

Pour diminuer  
de mycose v

Pour traiter t  
de la peau e

Pour éviter c  
infection à C  
système imm  
ne fonctionne

Adolescents  
Respectez la  
posologie de l'  
Enfants jusqu'à  
La posologie n

## Affection

Mycose de la  
gorge dues à  
dépendant de  
sa localisation

Méningite à  
longiques int

Pour empêcher  
une infection  
immunitaire

Enfants âgés  
Enfants âgés  
Même posolog  
posologie ma  
Enfants âgés  
Même posolog  
La posologie n

# Tamsulosine Win® L.P.

0,4 mg

Tamsulosine

LOT : 9MA21  
PER.: 08/2021

Gélule à li-

TAMSULOSINE WIN LP.  
0,4 MG GELU-830

P.P.V : 98DHO:



6 118000 062257

Voie Orale

1. QU'EST-CE QUE

Classe pharmacologique

ALPHA-BLOQUANT

Indications thérapeutiques

Ce médicament est

bénigne de la prostate.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TAMSULOSINE WIN LP 0,4 mg, gélule ?

Contre-indications

Ne prenez jamais TAMSULOSINE WIN LP 0,4 mg, gélule dans les cas suivants :

- allergie connue à ce médicament ou à des médicaments de la même classe thérapeutique

- antécédent d'œdème (gonflement du visage, des lèvres, des muqueuses) suite à la prise de ce médicament,

- antécédents d'hypotension orthostatique (baisse de la pression artérielle lors du passage de la position couchée à la position verticale pouvant s'accompagner de vertiges et de malaises);

- insuffisance hépatique sévère.

Ce médicament est généralement déconseillé en association avec des médicaments de la même classe, les alpha-1-bloquants, ainsi qu'en cas d'antécédent de syncope mictionnelle.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec TAMSULOSINE WIN LP 0,4 mg, gélule :

Mises en garde spéciales

Si vous ressentez une impression de malaise, de vertiges, fatigue ou sueurs (à cause d'une chute de tension lors d'un changement de position): dans ce cas adopter la position allongée, les manifestations devront cesser alors rapidement. Tout symptôme de gonflement du visage, des lèvres, des muqueuses peuvent être le signe d'une réaction allergique au médicament nécessitant l'arrêt du traitement. Vous devez le signaler immédiatement à votre médecin.

Si vous devez prochainement vous faire opérer de la cataracte, informez votre ophtalmologiste si vous avez été ou êtes actuellement traité par TAMSULOSINE WIN LP 0,4 mg, gélule. Il pourra alors prendre des précautions appropriées en fonction de votre traitement au moment de l'intervention chirurgicale. Demandez à votre médecin si vous devez ou non remettre à plus tard ou interrompre provisoirement votre traitement, en cas d'opération de la cataracte.

Précautions d'emploi

La prudence s'impose chez les sujets traités par des médicaments antihypertenseurs, chez l'insuffisant rénal chronique, chez le sujet âgé de plus de 65 ans et chez le patient coronarien.

Hygiène de vie: il est recommandé de vous astreindre à une certaine hygiène de vie durant ce traitement et notamment: au maintien d'une activité physique, à la surveillance d'un régime alimentaire (éviter les repas riches, trop épices, trop alcoolisés); ne pas trop boire le soir; maintenir un transit intestinal régulier.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment si vous êtes déjà traité par un antihypertenseur alpha-bloquant, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

L'indication thérapeutique de ce médicament ne concerne pas la femme.

La tolérance de ce médicament au cours de la grossesse et son passage dans le lait maternel ne sont pas connus. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Une prudence particulière devra être observée par les conducteurs automobiles et les utilisateurs de machines en raison du risque d'hypotension orthostatique (avec possibilité de vertiges ou de malaise), surtout en début de traitement.

3. COMMENT PRENDRE TAMSULOSINE WIN LP 0,4 mg, gélule ?

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

En règle générale, une gélule par jour.

SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MEDICALE.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

La gélule doit être avalée avec un verre d'eau sans être croquée ni mâchée.

SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MEDICALE

# Tamsulosine Win® L.P.

0,4 mg

Tamsulosine

LOT : 9MA21  
PER.: 08/2021

Gélule à li-

TAMSULOSINE WIN LP.  
0,4 MG GELU-830

P.P.V : 98DHO:



6 118000 062257

Voie Orale

1. QU'EST-CE QUE

Classe pharmacologique

ALPHA-BLOQUANT

Indications thérapeutiques

Ce médicament est

bénigne de la prostate.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TAMSULOSINE WIN LP 0,4 mg, gélule ?

Contre-indications

Ne prenez jamais TAMSULOSINE WIN LP 0,4 mg, gélule dans les cas suivants :

- allergie connue à ce médicament ou à des médicaments de la même classe thérapeutique

- antécédent d'œdème (gonflement du visage, des lèvres, des muqueuses) suite à la prise de ce médicament,

- antécédents d'hypotension orthostatique (baisse de la pression artérielle lors du passage de la position couchée à la position verticale pouvant s'accompagner de vertiges et de malaises);

- insuffisance hépatique sévère.

Ce médicament est généralement déconseillé en association avec des médicaments de la même classe, les alpha-1-bloquants, ainsi qu'en cas d'antécédent de syncope mictionnelle.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec TAMSULOSINE WIN LP 0,4 mg, gélule :

Mises en garde spéciales

Si vous ressentez une impression de malaise, de vertiges, fatigue ou sueurs (à cause d'une chute de tension lors d'un changement de position): dans ce cas adopter la position allongée, les manifestations devront cesser alors rapidement. Tout symptôme de gonflement du visage, des lèvres, des muqueuses peuvent être le signe d'une réaction allergique au médicament nécessitant l'arrêt du traitement. Vous devez le signaler immédiatement à votre médecin.

Si vous devez prochainement vous faire opérer de la cataracte, informez votre ophtalmologiste si vous avez été ou êtes actuellement traité par TAMSULOSINE WIN LP 0,4 mg, gélule. Il pourra alors prendre des précautions appropriées en fonction de votre traitement au moment de l'intervention chirurgicale. Demandez à votre médecin si vous devez ou non remettre à plus tard ou interrompre provisoirement votre traitement, en cas d'opération de la cataracte.

Précautions d'emploi

La prudence s'impose chez les sujets traités par des médicaments antihypertenseurs, chez l'insuffisant rénal chronique, chez le sujet âgé de plus de 65 ans et chez le patient coronarien.

Hygiène de vie: il est recommandé de vous astreindre à une certaine hygiène de vie durant ce traitement et notamment: au maintien d'une activité physique, à la surveillance d'un régime alimentaire (éviter les repas riches, trop épices, trop alcoolisés); ne pas trop boire le soir; maintenir un transit intestinal régulier.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment si vous êtes déjà traité par un antihypertenseur alpha-bloquant, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

L'indication thérapeutique de ce médicament ne concerne pas la femme.

La tolérance de ce médicament au cours de la grossesse et son passage dans le lait maternel ne sont pas connus. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Une prudence particulière devra être observée par les conducteurs automobiles et les utilisateurs de machines en raison du risque d'hypotension orthostatique (avec possibilité de vertiges ou de malaise), surtout en début de traitement.

3. COMMENT PRENDRE TAMSULOSINE WIN LP 0,4 mg, gélule ?

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

En règle générale, une gélule par jour.

SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MEDICALE.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

La gélule doit être avalée avec un verre d'eau sans être croquée ni mâchée.

SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MEDICALE



Gélule  
Voie orale

# Relaxium

---

## B6

Deva  
Pharmaceutique

### COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

#### Relaxium B6 150

Oxyde de magnésium marin.....	260 mg
équivalent en magnésium .....	150 mg
Vitamine B6.....	1 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

#### Relaxium B6 300

Oxyde de magnésium marin.....	520 mg
équivalent en Magnésium.....	300 mg
Vitamine B6 .....	2 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

### FORME ET PRESENTATIONS

Relaxium B6 150 : Gélule. Boîte de 20 et 60

Relaxium B6 300 : Gélule. Boîte de 15 et 30

### PROPRIÉTÉS



# OXIFLOR®

(Ofloxacin)

OXIFLOR®

20 comprimés

200 mg



6 118000 032632

## FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATIONS

Boîtes de 10 et 20 comprimés dosés à 200 mg d'ofloxacin

## COMPOSITION

Ofloxacin .....

Excipient : amidon de maïs, povidone, stéarate de magnésium, croscarmellose.

lactose .....

## CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antibiotique de la famille des quinolones.

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

- Infections urinaires hautes et basses, aiguës
- Infections prostatiques
- Infections gynécologiques
- Infections gastro-intestinales et hépatobiliaires
- Infections ostéo-articulaires
- Infections bronchopulmonaires
- Infections ORL (sinusites chroniques, poussées de surinfection des otites chroniques, préparation pré-opératoire)
- Septicémies

OXIFLOR® 200 mg

20 comprimés

PPV 112D/00

EXP 05/2022

LOT 92030 1

## CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Antécédent de tendinopathie avec une fluoroquinolone
- Hypersensibilité à l'ofloxacin ou à un produit de la famille des quinolones
- Epilepsie
- Déficit en G6PD
- Grossesse et allaitement, sauf avis contraire du médecin traitant (Cf. Grossesse et allaitement)
- Chez l'enfant jusqu'à la fin de la période de croissance
- Intolérance au lactose, en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## MISES EN GARDE

- Eviter l'exposition au soleil et aux rayonnements ultraviolets pendant la durée du traitement en raison du risque de photosensibilisation
- Tendinites : l'apparition de signes de tendinite demande un arrêt du traitement, la mise au repos des deux tendons d'Achille, et un avis en milieu spécialisé.

La rupture du tendon d'Achille semble être favorisée par l'âge (sujets âgés) et par la corticothérapie au long cours.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Prévenez votre médecin en cas de :

- Antécédents de convulsions ou de myasthénie
- Gonflement du tendon d'Achille.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.



Docteur ARAOI HOUSSAINI Najib  
Médecin Général  
16, Rue Oukar Benou Nafie  
BERRECHID Tel.: 33.73.21

Le : 26 NOV. 2019

KADRI HOUSSAINI  
Mohamed  
ORDONNANCE

- NFS
- VS.
- uricémie a 19
- urée
- créatinine.
- œuvre urinaire
- cholestérol. LDL c  
LDL c
- TCO -
- Transaminases (GSO, GTP).
- PSA -

Docteur ARAOI HOUSSAINI Najib  
Médecin Général  
16, Rue Oukar Benou Nafie  
BERRECHID Tel.: 33.73.21

LABORATOIRE IBN SINA

Bd Mohammed V

Tel : 05.22.33.66.43

Tel.: 05.22.33.66.43 Fax : 05.22.33.66.42

BERRECHID

ICE : 001761756000030

INPE : 063000509

Patente : N° 40700369 C.N.S.S : N°2229541 IGR : 40195644

FACTURE : 68893

IB 12515 B

**Nom et Prénom : Mr. KADRI HASSANI Mohamed**

**Prescripteur : Dr. ARAQI HOUSSAINI Naiib**

Référence : 291119 020

Date : 29/11/2019

## BILAN :

NFS B 73	+	VS B 22	+	GLY B 15	+	UREE B 22	+
CREA B 22	+	AUR B 23	+	CHOL B 23	+	HDL2 B 56	+
TRIG B 56	+	LDLM B 56	+	TGO B 45	+	TGP B 45	+
PSA B 280	+						

**MONTANT NET : 998.92 Dhs Soit 738 B**

**ARRETE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :**

*Neuf cent quatre-vingt dix huit Dh et quatre-vingt douze cts*

RECORDED AND INDEXED  
IBM SINCE  
RECORDED BY V. BERRECHID  
05-22-33 66 43



Berrechid le : 29/11/2019

CIN : B38048

Résultats complets

Edité le: 30/11/2019

Medecin Dr. ARAQI HOUSSAINI Najib

Mr. KADRI HASSANI Mohamed  
IB 12515 BRF: 291119020

## HEMATOLOGIE

VALEURS DE REFERENCE

ANTECEDENTS

## HEMOGRAMME

(Technique SYSMEX KX-21N)

## NUMERATION GLOBULAIRE

Leucocytes.....	<b>4 500</b>	/mm <sup>3</sup>	(N : 4 000 à 10 000)
Hématies.....	<b>4,93</b>	M/mm <sup>3</sup>	(N : 4,5 à 5,7)
Hémoglobine.....	<b>14,9</b>	g/dl	(N : 13,0 à 17,0)
Hématocrite.....	<b>45,1</b>	%	(N : 42 à 54)
V.G.M.....	<b>91</b>	fl	(N : 80 à 100)
T.G.M.H.....	<b>30,2</b>	pg	(N : 27 à 32)
C.C.M.H.....	<b>33,0</b>	g/dl	(N : 32 à 35)
PLAQUETTES.....	<b>236</b>	Milles/mm <sup>3</sup>	(150 à 450 Milles)

## FORMULE LEUCOCYTAIRE

Polynucléaires Neutrophiles :	<b>55</b>	%	
Soit	2 475	/mm <sup>3</sup>	(N : 2 000 à 7 500)
Polynucléaires Eosinophiles :	<b>0</b>	%	
Soit	0	/mm <sup>3</sup>	(N : 400 à 500)
Polynucléaires Basophiles.. :	<b>0</b>	%	
Soit	0	/mm <sup>3</sup>	(N : < 100)
Lymphocytes .....	<b>39</b>	%	
Soit	1 755	/mm <sup>3</sup>	(N : 1000 à 4000)
Monocytes.....	<b>6</b>	%	
Soit	270	/mm <sup>3</sup>	(N : 200 à 1 000)

## VITESSE DE SEDIMENTATION

(Technique VES Static)

1ère heure.....	<b>2</b>	mm	(N : 2 à 10)
2ème heure.....	<b>6</b>	mm	(N : 8 à 20)

Le Biologiste  
 LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES IBN SINA  
 DR. ARAQI HOUSSAINI FADJALA  
 Tél. : 05 22 33 66 43

1 / 3



Berrechid le : 29/11/2019

CIN : B38048

Résultats complets

Edité le: 30/11/2019

Medecin Dr. ARAQI HOUSSAINI Najib

Mr. KADRI HASSANI Mohamed  
9A 12515  
RF: 291119020

## BIOCHIMIE

## VALEURS DE REFERENCE

## ANTECEDENTS

<b>GLYCEMIE A JEUN .....</b> (Technique HITACHI 704)	<b>0,95</b> Soit 5,28	<b>g/l</b> mmol/l	(N : 0.70 à 1.10) (N : 3.89 à 6.11)	19/01/16 : 1,05
<b>UREE.....</b> (Technique HITACHI 704)	<b>0,36</b> Soit 5,98	<b>g/l</b> mmol/l	(N : 0.15 à 0.45) (N : 2.5 à 7.5)	
<b>CREATININE.....</b> (Technique HITACHI 704)	<b>11,50</b> Soit 101,20	<b>mg/l</b> μmol/l	(N : 7 à 12.5)	
<b>ACIDE URIQUE .....</b> (Technique HITACHI 704)	<b>70,40</b> Soit 418,88	<b>mg/l</b> μmol/l	(N : 35 à 70)	
<b>CHOLESTEROL TOTAL .....</b> (Technique HITACHI 704)	<b>2,32</b> Soit 6,0	<b>g/l</b> mmol/l	(N : 1.6 à 2.00) (N : 4.10 à 5.20)	
<b>CHOLESTEROL HDL .....</b> (Technique HITACHI 704)	<b>0,49</b>	<b>g/l</b>	(N : > 0.40)	
<b>TRIGLYCERIDES.....</b> (Technique HITACHI 704)	<b>1,16</b> Soit 1,33	<b>g/l</b> mmol/l	(N : < 1.50) (N : < 1.70)	
<b>CHOLESTEROL LDL .....</b> Soit 4,08	<b>1,58</b> mmol/l	<b>g/l</b>	(N : < 1.60)	
<b>TRANSAMINASE T.G.O (ASAT) ...</b> (Technique HITACHI 704)	<b>22,0</b>	<b>UI/l</b>	(N : < 42)	
<b>TRANSAMINASE T.G.P (ALAT) ...</b> (Technique HITACHI 704)	<b>29,0</b>	<b>UI/l</b>	(N : < 41)	

## IMMUNOLOGIE

## VALEURS DE REFERENCE

## ANTECEDENTS

Le Biologiste  
Laboratoires Ibn Sina  
Berrechid - Casablanca  
Tél. : 05 22 33 66 43

2 / 3



Berrechid le : 29/11/2019

CIN : B38048

Résultats complets

Édité le: 30/11/2019

Medecin Dr. ARAQI HOUSSAINI Najib

**Mr. KADRI HASSANI Mohamed**

**9A 12515**

**RF: 291119020**

P.S.A ..... 1,98 µg/l

(Technique MINI VIDAS)

< à 40 ans : <1.72  
40 à 49 ans : <2.19  
50 à 59 ans : <3.42  
60 à 69 ans : <6.16  
> à 70 ans : <6.77

LABORATOIRE IBN SINA  
MEDICALES IBN SINA  
Dr. KADRI HASSANI  
Tél. : 05 22 33 66 43