

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

Maladie

Dentaire

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1008 Société : RAM

Actif  Pensionné(e)  Autre :

Nom & Prénom : BAGASS Lahcen

Date de naissance : 01-01-1935

Adresse : Attadhaman Chelam Rue A. Idrissi 82 n° 1 et 2 el oued

2840 Casablanca

Tél. : 06.66.89.66.16 Total des frais engagés : 3885,60 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 17.01.2019

Nom et prénom du malade : BAGASS Lahcen Age :

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Signature de l'adhérent(e) :

Le : 31/01/2020

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
17/12/2019		2 x 100	200	Indéhak M. Boubakeur 01 29 76 97
20/12/2019		3 x 100	300	00 400

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Y	17/12/19	52440
Y	17/12/19	1352,00

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	
<i>CENTRE KINE</i> <i>Nadia LAJ MIDA</i> <i>Kinéthérapeute</i> <i>et Oued Daoura - El Oued</i> <i>0522-938233</i>	<i>Deux</i> <i>22/12/19</i>	<i>15</i>	<i>Ar 772</i>			<i>2000D</i>

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan des

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				CŒFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
D	25533412   21433552
	00000000   00000000
D	00000000   00000000
	35533411   11433553

### [Création, remont, adjonct]

Fonctionnel. Thérapeutique, nécessaire à la profession.

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS**

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# الدكتور عبد الحق مودن

## Docteur Abdelhak Mouden

spécialiste en :

Médecine Physique - Ostéopathie.

Podologie - Mésothérapie.

Traumatologie du Sport

Lauréat de la Faculté de Médecine de Montpellier

Membre de la Société Française d'Ostéopathie



شارع بوركون - إقامة فنيسيا - الدار البيضاء  
119, Avenue de Bourgogne - Résidence Phénicia - Rez de Chaussée Casablanca

Tél.: 05 22 27 85 61 / 05 22 29 76 97 - Fax : 05 22 20 94 44

E-mail : osteopathecasablanca@gmail.com / Site web : www.osteopathe-casablanca.com

INP 091113860

17/11/2019

Progress Laike

HYALGAN (4 doses)



صيدلية سيف الدين  
PHARMACIE SIFEDDINE  
SIFDDINE  
17 Rue Abdellah Ben Haddou Casablanca - Rez de Chaussée  
Casablanca - Tel : 05 22 20 94 44

33800 x 4  
135200

Dr. Abdelhak MOUDEN  
Né le : 1961  
Avec : 1986  
Diplômé de la Faculté de Médecine de Montpellier  
Téléphone : 05 22 20 94 44  
Fax : 05 22 20 94 44



# Hyalgan®

Hyaluronic acid sodium salt

COOPER PHARMA

PPV: 338,00 DH

## COMPOSITION

*Active ingredient:* Hyaluronic acid sodium salt ( Hyalec

*Excipients:* Sodium chloride, Monobasic sodium phosphate dihydrate, Dibasic sodium phosphate dodecahydrate, Water for injections q.s. to 2 ml.

## SUPPLY

One 2 ml pre-filled syringe for intra-articular use

C 17430

03 2022

## THERAPEUTIC CATEGORY AND ACTIONS

The intra-articular administration of Hyalgan® into arthritic joints improves joint function, due to the normalization of synovial fluid viscoelasticity and the activation of tissue repair processes in articular cartilage.

## MARKETING AUTHORISATION HOLDER AND MANUFACTURER

Fidia Farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (PD) Italy

## INDICATIONS

Traumatic and degenerative joint disease.

Adjuvant in orthopaedic surgery.

## CONTRA-INDICATIONS

Individual hypersensitivity to the product. To date, no other contra-indications to the intra-articular administration of hyaluronic acid are known.

## WARNINGS AND PRECAUTIONS

It is necessary to follow a correct technique of intra-articular injection in accurately aseptic conditions.

# Hyalgan®

Hyaluronic acid sodium salt

COOPER PHARMA

PPV: 338,00 DH

## COMPOSITION

*Active ingredient:* Hyaluronic acid sodium salt ( Hyalec

*Excipients:* Sodium chloride, Monobasic sodium phosphate dihydrate, Dibasic sodium phosphate dodecahydrate, Water for injections q.s. to 2 ml.

## SUPPLY

One 2 ml pre-filled syringe for intra-articular use

C 17430

03 2022

## THERAPEUTIC CATEGORY AND ACTIONS

The intra-articular administration of Hyalgan® into arthritic joints improves joint function, due to the normalization of synovial fluid viscoelasticity and the activation of tissue repair processes in articular cartilage.

## MARKETING AUTHORISATION HOLDER AND MANUFACTURER

Fidia Farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (PD) Italy

## INDICATIONS

Traumatic and degenerative joint disease.

Adjuvant in orthopaedic surgery.

## CONTRA-INDICATIONS

Individual hypersensitivity to the product. To date, no other contra-indications to the intra-articular administration of hyaluronic acid are known.

## WARNINGS AND PRECAUTIONS

It is necessary to follow a correct technique of intra-articular injection in accurately aseptic conditions.

# Hyalgan®

Hyaluronic acid sodium salt

COOPER PHARMA

PPV: 338,00 DH

## COMPOSITION

*Active ingredient:* Hyaluronic acid sodium salt ( Hyalec

*Excipients:* Sodium chloride, Monobasic sodium phosphate dihydrate, Dibasic sodium phosphate dodecahydrate, Water for injections q.s. to 2 ml.

## SUPPLY

One 2 ml pre-filled syringe for intra-articular use

C 17430

03 2022

## THERAPEUTIC CATEGORY AND ACTIONS

The intra-articular administration of Hyalgan® into arthritic joints improves joint function, due to the normalization of synovial fluid viscoelasticity and the activation of tissue repair processes in articular cartilage.

## MARKETING AUTHORISATION HOLDER AND MANUFACTURER

Fidia Farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (PD) Italy

## INDICATIONS

Traumatic and degenerative joint disease.

Adjuvant in orthopaedic surgery.

## CONTRA-INDICATIONS

Individual hypersensitivity to the product. To date, no other contra-indications to the intra-articular administration of hyaluronic acid are known.

## WARNINGS AND PRECAUTIONS

It is necessary to follow a correct technique of intra-articular injection in accurately aseptic conditions.

# Hyalgan®

Hyaluronic acid sodium salt

COOPER PHARMA

PPV: 338,00 DH

## COMPOSITION

*Active ingredient:* Hyaluronic acid sodium salt ( Hyalec

*Excipients:* Sodium chloride, Monobasic sodium phosphate dihydrate, Dibasic sodium phosphate dodecahydrate, Water for injections q.s. to 2 ml.

## SUPPLY

One 2 ml pre-filled syringe for intra-articular use

C 17430

03 2022

## THERAPEUTIC CATEGORY AND ACTIONS

The intra-articular administration of Hyalgan® into arthritic joints improves joint function, due to the normalization of synovial fluid viscoelasticity and the activation of tissue repair processes in articular cartilage.

## MARKETING AUTHORISATION HOLDER AND MANUFACTURER

Fidia Farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (PD) Italy

## INDICATIONS

Traumatic and degenerative joint disease.

Adjuvant in orthopaedic surgery.

## CONTRA-INDICATIONS

Individual hypersensitivity to the product. To date, no other contra-indications to the intra-articular administration of hyaluronic acid are known.

## WARNINGS AND PRECAUTIONS

It is necessary to follow a correct technique of intra-articular injection in accurately aseptic conditions.

# الدكتور عبد الحق مودن

## Docteur Abdelhak Mouden

spécialiste en :

Médecine Physique - Ostéopathie.

Podologie - Mésothérapie.

Traumatologie du Sport

Lauréat de la Faculté de Médecine de Montpellier

Membre de la Société Française d'Ostéopathie



119, شارع بوركون - إقامة فنيسيا - الدار البيضاء

119, Avenue de Bourgogne - Résidence Phénicia - Rez de Chaussée Casablanca

Tél.: 05 22 27 85 61 / 05 22 29 76 97 - Fax : 05 22 20 94 44

E-mail : osteopathecasablanca@gmail.com / Site web : www.osteopathe-casablanca.com

INP 091113860

13/12/2019

M BAGASS Lahcen

79,00

① MERSAL 15ug 29

S.V

79,00

② BiFlex gel



LOT N°: 1219  
EXP: 09/2022  
PPC: 79 DH

2220x3

166,0

③

Coquille 100g



الدار  
PHARMACIE BIREDINE  
SIDI BOU  
الدار البيضاء - المغرب - 10000  
Tél: 03 22 20 94 44 - Fax: 03 22 20 94 44

84,70

④

LOT EVAN

S.V

5244,0

Unos

Dr. Abdelhak MOUDEN  
Médecine Physique  
119, Avenue de Bourgogne  
Résidence Phénicia  
Rez de Chaussée Casablanca  
Tél: 05 22 27 85 61 / 05 22 29 76 97  
Fax: 05 22 20 94 44

# Codoliprane®

PARACETAMOL ET CODEINE

PPV: 22DH20

uprimé sécable

PER: 06/21

LOT: I1517

## IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### COMPOSITION

Paracétamol	400,00 mg
Phosphate de codeïne hémihydraté	20,00 mg
(Quantité correspondant à codeïne base)	15,62 mg

Excipients : gélatine, acide stéarique, amidon de pomme de terre, povidone, pour un comprimé.

## FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé sécable - boîte de 16.

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTALGIQUE CENTRAL ET PERIPHERIQUE (N. Système nerveux central)

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Traitements chez l'adulte des douleurs d'intensité modérée à intense, qui ne sont pas soulagées par l'aspirine ou le paracétamol utilisé seul.

## DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- allergie connue au paracétamol ou à la codeïne,
- maladie grave du foie,
- chez l'asthmatique,
- en cas d'insuffisance respiratoire,
- allaitement.

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre médecin avec des médicaments contenant de la buprénorphine, de la nalbuphine ou de la pentazocine. EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## MISES EN GARDE SPECIALES

En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons s'accompagnant d'expectoration, en cas de maladie du foie ou d'insuffisance rénale ainsi que chez les sujets âgés, un avis médical est indispensable. Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée en raison du risque de dépendance.

## PRECAUTION D'EMPLOI

La prise de boissons alcoolisées durant le traitement est déconseillée.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, Notamment avec la buprénorphine, la nalbuphine ou la pentazocine, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient du paracétamol et de la codéine. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (cf. posologie).



# Codoliprane®

PARACETAMOL ET CODEINE

PPV: 22DH20

uprimé sécable

PER: 06/21

LOT: I1517

## IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### COMPOSITION

Paracétamol	400,00 mg
Phosphate de codeïne hémihydraté	20,00 mg
(Quantité correspondant à codeïne base)	15,62 mg

Excipients : gélatine, acide stéarique, amidon de pomme de terre, povidone, pour un comprimé.

## FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé sécable - boîte de 16.

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTALGIQUE CENTRAL ET PERIPHERIQUE (N. Système nerveux central)

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Traitements chez l'adulte des douleurs d'intensité modérée à intense, qui ne sont pas soulagées par l'aspirine ou le paracétamol utilisé seul.

## DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- allergie connue au paracétamol ou à la codeïne,
- maladie grave du foie,
- chez l'asthmatique,
- en cas d'insuffisance respiratoire,
- allaitement.

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre médecin avec des médicaments contenant de la buprénorphine, de la nalbuphine ou de la pentazocine. EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## MISES EN GARDE SPECIALES

En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons s'accompagnant d'expectoration, en cas de maladie du foie ou d'insuffisance rénale ainsi que chez les sujets âgés, un avis médical est indispensable. Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée en raison du risque de dépendance.

## PRECAUTION D'EMPLOI

La prise de boissons alcoolisées durant le traitement est déconseillée.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, Notamment avec la buprénorphine, la nalbuphine ou la pentazocine, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient du paracétamol et de la codéine. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (cf. posologie).



100

Ce médicament contient du paracétamol et de la codéine. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (cf. posologie).

ANOTHER PRACTITIONER'S PERSPECTIVE ON INTERACTIONS BETWEEN MEDICAL SYSTEMS AND INTERACTIONS WITH PATIENTS

UN CAS DE DOULEUR NE PAS HESITER A DEMANDER LAVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISSES EN GRANDE STÉRÉOLES

Il cas de maladie bronchique (au long cours) des poumons s'accompagne d'expectoration, en cas de maladie du foie ou d'insuffisance rénale ainsi que chez les sujets âgés, un avis médical est indispensable. Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée en raison du risque de dépendance.

CE médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ÊTRE UTILISÉ, sauf avis contrainte de votre médecin avec des médicaments contenant de la bupropiophrine, de la méthaphénidate ou de la pentazocine. EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MéDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

DANS QU'ELLES CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT  
Ce medicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :  
- allergie connue au paracétamol ou à la codeine.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT.  
Trinillement chez l'adulte des douleurs d'intensité modérée à intense, qui ne sont pas soulagées par l'aspirine ou le paracétamol utilisés seul.

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE ANTALGIQUE CENTRAL ET PERIPHERIQUE (N. système nerveux central)

400,00 mg	Phosphat	Paracétamol
400,00 mg	(Quanti)	Paracétamol à codeine base
20,00 mg		
15,62 mg		
		Exception : géluline, siège stable que, amidon de pomme de terre, povidone, pour un comprimé.

PARACETAMOL F11100 comprime siccabile

# Codilipane®

# OEDES® 20 m

Microgranules gastro-résistants

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de renseignements.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

LOT 181039  
EXP 02/2021  
PPV 52.80DH

## DENOMINATION DU MEDICAMENT :

OEDES® 20 mg

## COMPOSITION :

Chaque gélule contient 20mg de substance active : oméprazole.

Excipients : qsp 1 gélule.

## FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATIONS :

Microgranules gastro-résistants en gélules. Disponibles en boîtes de 7, 14, 28 et 56

## CLASSE PHARMACOLOGIQUE OU THERAPEUTIQUE :

Oedes 20mg, microgranules gastro-résistants en gélule contient une substance appelée oméprazole. C'est un médicament de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

## DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

### Indications :

#### Adulte :

- En association à une bithérapie antibiotique, éradication de Helicobacter pylori en cas de maladie ulcéruse gastro-duodénale.
- Ulcère duodénal évolutif.
- Ulcère gastrique évolutif.
- œsophagite érosive ou ulcération symptomatique par reflux gastro-œsophagien.
- Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien associé ou non à une œsophagite, en cas de résistance à la posologie de 10 mg d'oméprazole par jour.
- Traitement d'entretien des ulcères duodénaux chez les patients non infectés par Helicobacter pylori ou chez qui l'éradication n'a pas été possible.
- Traitement d'entretien des œsophagites par reflux gastro-œsophagien.
- Syndrome de Zollinger-Ellison.
- Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens lorsque la poursuite des anti-inflammatoires est indispensable.
- Traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients à risque (notamment âge supérieur à 65 ans, antécédents d'ulcère gastroduodénal) pour lesquels un traitement anti-inflammatoire est indispensable.

#### Enfant à partir de 1 an :

- œsophagite érosive ou ulcération symptomatique par reflux gastro-œsophagien.

## DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

### Contre-indications :

Ne prenez jamais Oedes 20mg, microgranules gastro-résistants en gélule:

- En cas d'allergie connue à l'un des composants de ce médicament.
- En association avec l'atazanavir associé au ritonavir (médicament anti-infectieux).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

# MEFSAL® 7.5 & 15 mg

Comprimés

## COMPOSITION :

MEFSAL 7.5 mg  
7.5 mg

La substance active est :

Méoxicam

Excipients : q.s.p un comprimé

Excipient à effet notoire : Lactose

79,00

## PROPRIETE :

MEFSAL contient une substance active dénommée méoxicam. Le méoxicam appartient aux stéroïdiens (AINS), qui sont utilisés pour réduire l'inflammation et la douleur dans les affections inflammatoires (polyarthrite rhumatoïde et spondylarthrite ankylosante).

## INDICATIONS :

MEFSAL est indiqué dans le traitement de courte durée des douleurs aiguës d'arthrose inflammatoire (polyarthrite rhumatoïde et spondylarthrite ankylosante).

## CONTRE INDICATION :

Ne pas utiliser MEFSAL, comprimé dans les cas suivants :

- pendant le 3ème trimestre de la grossesse,
- enfant et adolescents de moins de 16 ans
- allergie (hypersensibilité) au méoxicam
- allergie (hypersensibilité) à l'aspirine ou à d'autres médicaments anti-inflammatoires (AINS)
- allergie (hypersensibilité) à l'un des composants de MEFSAL
- si vous avez présenté l'un des signes suivants après avoir pris de l'aspirine ou d'autres AINS :
  - respiration sifflante, oppression respiratoire, difficulté à respirer (asthme)
  - obstruction nasale due à des petits renflements de la muqueuse nasale (polypes nasaux)
  - éruptions cutanées / urticaire
  - gonflement soudain des tissus sous la peau et les muqueuses, tel qu'un gonflement autour des yeux, du visage, des lèvres, de la bouche ou de la gorge, rendant éventuellement la respiration difficile (œdème de Quincke)
- si vous avez déjà présenté, après un traitement avec des AINS :
  - un saignement de l'estomac ou des intestins
  - des perforations de l'estomac ou des intestins
  - saignement de toute nature ou antécédents de saignements cérébrovasculaires (saignement dans le cerveau)
  - antécédents d'hémorragies gastro-intestinales ou d'ulcères liés à des traitements antérieurs par anti-inflammatoires non stéroïdiens
  - ulcères ou saignement de l'estomac ou des intestins
  - antécédents d'ulcères ou de saignements récidivants de l'estomac ou des intestins (ulcération ou saignement s'étant produit au moins deux fois)
  - insuffisance hépatique sévère
  - insuffisance rénale sévère non dialysée
  - saignements récents dans le cerveau (hémorragie cérébrovasculaire)
  - troubles hémorragiques de quelque type que ce soit
  - insuffisance cardiaque sévère
  - intolérance à certains sucrés étant donné que ce produit contient du lactose.

Si vous n'êtes pas certain à propos d'un des points ci-dessus, parlez-en à votre médecin.

## POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :

Réservez à l'adulte de plus de 15 ans.

Voie orale.

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La dose habituelle est :

**Poussées aiguës d'arthrose :**

7.5 mg une fois par jour. Elle peut être augmentée jusqu'à 15 mg une fois par jour.

**Polyarthrite rhumatoïde :**

15 mg une fois par jour. Elle peut être réduite à 7.5 mg une fois par jour.

**Spondylarthrite ankylosante :**

15 mg une fois par jour. Elle peut être réduite à 7.5 mg une fois par jour.

Les comprimés doivent être avalés avec de l'eau, ou un autre liquide, au cours d'un repas.

**NE PAS DEPASSER LA DOSE MAXIMALE DE 15 mg PAR JOUR.**

Si l'une des informations énumérées sous le titre "CONTRE INDICATION" s'applique à vous, votre médecin peut être amené à limiter la dose à 7.5 mg une fois par jour.

**MEFSAL ne doit pas être administré chez les enfants de moins de 16 ans.**

Si vous trouvez que l'effet de MEFSAL est trop fort ou trop faible, ou si après plusieurs jours vous ne ressentez aucune amélioration de votre état, panez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## MISES EN GARDES SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

### Mises en garde

Les médicaments tels que MEFSAL pourraient être associés à une légère augmentation du risque de crise cardiaque (« infarctus du myocarde ») ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées et la durée de traitement prolongée.

Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement (voir rubrique « POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI »).

Si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez eu un accident vasculaire cérébral ou si vous pensez avoir des facteurs de risque pour ce type de pathologie, vous devez discuter de votre traitement avec votre médecin ou avec votre pharmacien. Par exemple :

- si vous avez une pression artérielle élevée (hypertension)
- si vous avez un taux élevé de sucre dans le sang (diabète)
- si vous avez un taux élevé de cholestérol dans le sang (hypercholestérolémie)
- si vous fumez

Vous devez arrêter le traitement par MEFSAL dès la première apparition d'une éruption cutanée, de lésions des tissus mous (lésions des muqueuses), signes de réactions allergiques sévères ou de tout autre signe d'allergie, et prendre contact avec votre médecin.

Arrêtez immédiatement votre traitement avec MEFSAL dès que vous remarquez un saignement (donnant une coloration des selles en noir) ou une ulcération de votre appareil digestif (provocant des douleurs abdominales).

MEFSAL ne convient pas au traitement des douleurs aiguës.

MEFSAL peut masquer les symptômes d'une infection (par exemple la fièvre). Si vous pensez que vous avez une infection, vous devez consulter votre

# Lotevan® 5 mg/160 mg, 10 mg/160 mg, 5 mg/320 mg, 10 mg/320 mg

## Comprimés Pelliculés

### DCI: Amlodipine/Valsartan

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable, contactez votre pharmacien.

12/2020

12/2018

8H W163

AMM 460/15 DMPZ/NNP

pourrait lui  
declin ou à

1. Qu'est-ce que **Lotevan**, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **Lotevan**, comprimé pelliculé?
3. Comment prendre **Lotevan**, comprimé pelliculé?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver **Lotevan**, comprimé pelliculé?
6. Informations supplémentaires.

#### 4. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LOTEVAN, COMPRIME PELLICULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE?

Comme pour tous les médicaments, il est important de connaître les effets indésirables possibles.

**P.P.V. 247.00 MAD**

Si vous présentez l'un de ces effets, prévenez immédiatement votre médecin: Réaction allergique avec des symptômes tels que éruption, démangeaisons, gonflement du visage ou des lèvres ou de la langue, difficulté à respirer, tension artérielle basse (impression de s'évanouir, sensation de tête vide).

#### Autres effets indésirables possibles d'amiodipine/valsartan:

Fréquent (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10):  
grippe; nez bouché, mal de gorge et gêne pour avaler; maux de tête; gonflement des bras, des mains, des jambes, des chevilles ou des pieds; fatigue; asthénie (faiblesse); rougeur et sensation de chaleur du visage et/ou du cou.

Peu fréquent (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100):  
sensations vertigineuses; nausées et douleur abdominale; sécheresse de la bouche; somnolence, picotements ou engourdissement des mains ou des pieds; vertige; accélération des battements du cœur, y compris palpitations; sensations vertigineuses au passage en position debout; toux; diarrhée; constipation; éruption cutanée, rougeur de la peau; gonflement des articulations, mal de dos; douleurs articulaires.

Très peu fréquent (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000):

1. QU'EST-CE QUE LOTEVAN, COMPRIME PELLICULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LOTEVAN, COMPRIME PELLICULE?
3. COMMENT PRENDRE LOTEVAN, COMPRIME PELLICULE?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?
5. COMMENT CONSERVER LOTEVAN, COMPRIME PELLICULE?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

# الدكتور عبد الحق مودن

Docteur Abdelhak Mouden

Spécialiste

Médecine Physique - Ostéopathie.

Podologie - Mésothérapie.

Traumatologie du Sport

Lauréat de la Faculté de Médecine de Montpellier

Membre de la Société Française d'Ostéopathie



119 , شارع بوركون - إقامة فنيسيا - الدار البيضاء  
119, Avenue de Bourgogne - Résidence venezia - Rez de chaussée, Casablanca  
Tél.: 05 22 27 85 61 / 05 22 29 76 97 - Fax : 05 22 20 94 44  
E-mail : osteopathecasablanca@gmail.com / Site web : www.osteopathe-casablanca.com  
INP 091113860

26/01/2019

Dr. ABDELHAK MOUDEN



~~14300 x 6 99400~~  
0 Currents forte 3 mg


~~2880 x 4 @ 11520~~  
1 Cpt x 24 Ultimewell forte 3 mg  
2-0-2



FRANÇAISE BI-FDDIS  
SIFDDIS

AN de Casablanca & Abdellah Benyamin Bey Hospital  
Casablanca - Tél : 05 22 27 39 88

Dr. Abdelhak MOUDEN  
Médecine Physique - Ostéopathie  
Chirurgie Physique - Mésothérapie  
Podologie - Mésothérapie  
Tél : 05 22 27 85 61 / 05 22 29 76 97  
Fax : 05 22 20 94 44



1009,20

# VITANEVRIL FORT 100 mg,

## 1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITANEVRIL FORT 100 mg, Comprimé pelliculé boîte de 30  
(DCI) Benfotiamine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas des symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 2. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative en substance (s) active (s) par unité de prise

Benfotiamine ..... 100 mg

Composition qualitative en excipients

Excipients : Amidon de riz ; Lactose monohydrate ; Stéarate de magnésium ; Saccharose ; Talc ; Hypromellose ; Dioxyde de titane ; Macrogol 400 ; et l'eau purifiée ..... gsp un comprimé

Excipient à effet notoire : Saccharose ; Lactose monohydrate.

## 3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE

Antiasthénique (A : appareil digestif et métabolisme).

## 4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

- traitement du béri-béri.
- prophylaxie des états de carence vitaminique dus à une diminution des apports alimentaires (par exemple : malabsorption, régimes restrictifs riches en protéines non supplémentés, nutrition parentérale), en association avec les autres vitamines du groupe b.
- proposé chez l'alcoolique, notamment en cas de polynévrites.
- proposé dans d'autres polynévrites supposées d'origine toxicitairelle.
- utilisée, à forte dose, dans certains syndromes douloureux.

## 5. POSOLOGIE

- Mode et voies d'administration ;  
Voie orale.

- Durée du traitement ;  
so conformer à l'ordonnance de votre médecin.

- Fréquence d'administration ;  
2 à 4 comprimés par jour, à avaler sans croquer.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

## 6. CONTRE - INDICATIONS

ATTENTION !

### DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Intolérance connue à la vitamine B1.
- Ne pas administrer aux enfants de moins de 8 ans.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## 7. EFFETS INDESIRABLES

Sans objet.

N'HÉSitez PAS À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GENANT.

## 8. MISES EN GARDE, AVIS, SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS particulières

### D'EMP

syndrome

sucreasue

EN CAS

VOTRE

EXCIPIE

Saccharo

Parions

EN CAS

VOTRE

PPV

LOT

PER

2880

hydrate, ce  
tuctose, de  
le déficit en

L'AVIS DE

tfructose.  
L'AVIS DE

## 9. INTERACTIONS

- Interactions avec d'autres médicaments ;
- Interactions avec les aliments et les boissons ;
- Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapie alternatives.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

## 10. UTILISATIONS EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Allaitemt : ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

## 11. LES EFFETS POSSIBLES DU TRAITEMENT SUR LA CAPACITÉ A CONDUIRE UN VÉHICULE OU A UTILISER CERTAINES MACHINES

Sans objet,

## 12. SYMPTOMES ET CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

Sans objet,

## 13. CONDUITE A TENIR EN CAS D'OMISSION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES

Sans objet.

## 14. MENTION, SI NÉCESSAIRE, D'UN RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE

- Conditions de prescription et de délivrance
- Précautions particulières de conservation
- Tenir hors de la portée des enfants
- Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte
- Nom et adresse du fabricant quant celui-ci n'est pas le titulaire de l'AMM au Maroc

Sans objet

- Nom et adresse de l'EPI Titulaire de l'AMM au Maroc

SYNTHEMEDIC

20-22, Rue Zoubeir Ibou Al Aouam

Roches Noires

20300 Casablanca

Maroc

- la dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le : 03/2015

# VITANEVRIL FORT 100 mg,

## 1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITANEVRIL FORT 100 mg, Comprimé pelliculé boîte de 30  
(DCI) Benfotiamine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas des symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 2. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative en substance (s) active (s) par unité de prise

Benfotiamine ..... 100 mg

Composition qualitative en excipients

Excipients : Amidon de riz ; Lactose monohydrate ; Stéarate de magnésium ; Saccharose ; Talc ; Hypromellose ; Dioxyde de titane ; Macrogol 400 ; et l'eau purifiée ..... gsp un comprimé

Excipient à effet notoire : Saccharose ; Lactose monohydrate.

## 3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE

Antiasthénique (A : appareil digestif et métabolisme).

## 4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

- traitement du béri-béri.
- prophylaxie des états de carence vitaminique dus à une diminution des apports alimentaires (par exemple : malabsorption, régimes restrictifs riches en protéines non supplémentés, nutrition parentérale), en association avec les autres vitamines du groupe b.
- proposé chez l'alcoolique, notamment en cas de polynévrites.
- proposé dans d'autres polynévrites supposées d'origine toxicitairelle.
- utilisée, à forte dose, dans certains syndromes douloureux.

## 5. POSOLOGIE

- Mode et voies d'administration ;  
Voie orale.

- Durée du traitement ;  
so conformer à l'ordonnance de votre médecin.

- Fréquence d'administration ;  
2 à 4 comprimés par jour, à avaler sans croquer.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

## 6. CONTRE - INDICATIONS

ATTENTION !

### DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Intolérance connue à la vitamine B1.
- Ne pas administrer aux enfants de moins de 8 ans.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## 7. EFFETS INDESIRABLES

Sans objet.

N'HÉSitez PAS À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GENANT.

## 8. MISES EN GARDE, AVIS, SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS particulières

D'EMPLOI

syndrome de la

surcharge

EN CAS

VOTRE

EXCIPIE

Saccharose

Parions

EN CAS

VOTRE

PPV

LOT

PER

2880

hydrate, ce  
tuctose, de  
le déficit en

L'AVIS DE

tfructose.  
L'AVIS DE

## 9. INTERACTIONS

- Interactions avec d'autres médicaments ;
- Interactions avec les aliments et les boissons ;
- Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapie alternatives.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

## 10. UTILISATIONS EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Allaitemt : ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

## 11. LES EFFETS POSSIBLES DU TRAITEMENT SUR LA CAPACITÉ A CONDUIRE UN VÉHICULE OU A UTILISER CERTAINES MACHINES

Sans objet.

## 12. SYMPTOMES ET CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

Sans objet.

## 13. CONDUITE A TENIR EN CAS D'OMISSION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES

Sans objet.

## 14. MENTION, SI NÉCESSAIRE, D'UN RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE

- Conditions de prescription et de délivrance
- Précautions particulières de conservation
- Tenir hors de la portée des enfants
- Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte
- Nom et adresse du fabricant quant celui-ci n'est pas le titulaire de l'AMM au Maroc

Sans objet

- Nom et adresse de l'EPI Titulaire de l'AMM au Maroc

SYNTHEMEDIC

20-22, Rue Zoubeir Ibou Al Aouam

Roches Noires

20300 Casablanca

Maroc

- la dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le : 03/2015

# VITANEVRIL FORT 100 mg,

## 1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITANEVRIL FORT 100 mg, Comprimé pelliculé boîte de 30  
(DCI) Benfotiamine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas des symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 2. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative en substance (s) active (s) par unité de prise

Benfotiamine ..... 100 mg

Composition qualitative en excipients

Excipients : Amidon de riz ; Lactose monohydrate ; Stéarate de magnésium ; Saccharose ; Talc ; Hypromellose ; Dioxyde de titane ; Macrogol 400 ; et l'eau purifiée ..... gsp un comprimé

Excipient à effet notoire : Saccharose ; Lactose monohydrate.

## 3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE

Antiasthénique (A : appareil digestif et métabolisme).

## 4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

- traitement du béri-béri.
- prophylaxie des états de carence vitaminique dus à une diminution des apports alimentaires (par exemple : malabsorption, régimes restrictifs riches en protéines non supplémentés, nutrition parentérale), en association avec les autres vitamines du groupe b.
- proposé chez l'alcoolique, notamment en cas de polynévrites.
- proposé dans d'autres polynévrites supposées d'origine toxicitairelle.
- utilisée, à forte dose, dans certains syndromes douloureux.

## 5. POSOLOGIE

- Mode et voies d'administration :

Voie orale.

- Durée du traitement :

so conformer à l'ordonnance de votre médecin.

- Fréquence d'administration :

2 à 4 comprimés par jour, à avaler sans croquer.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

## 6. CONTRE - INDICATIONS

ATTENTION !

### DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Intolérance connue à la vitamine B1.
  - Ne pas administrer aux enfants de moins de 8 ans.
- EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## 7. EFFETS INDESIRABLES

Sans objet.

N'HÉSitez PAS À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GENANT.

## 8. MISES EN GARDE, AVIS, SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS particulières

### D'EMP

### syndrome

### sucreas

### EN CAS

### VOTRE

### EXCIPI

### Sacchar

### Parions

### EN CAS

### VOTRE

## 9. INTERACTIONS

- Interactions avec d'autres médicaments ;
- Interactions avec les aliments et les boissons ;
- Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapie alternatives.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

## 10. UTILISATIONS EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Allaitemt : ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

## 11. LES EFFETS POSSIBLES DU TRAITEMENT SUR LA CAPACITÉ A CONDUIRE UN VÉHICULE OU A UTILISER CERTAINES MACHINES

Sans objet.

## 12. SYMPTOMES ET CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

Sans objet.

## 13. CONDUITE A TENIR EN CAS D'OMISSION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES

Sans objet.

## 14. MENTION, SI NÉCESSAIRE, D'UN RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE

- Conditions de prescription et de délivrance
- Précautions particulières de conservation
- Tenir hors de la portée des enfants
- Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte
- Nom et adresse du fabricant quant celui-ci n'est pas le titulaire de l'AMM au Maroc

Sans objet

- Nom et adresse de l'EPI Titulaire de l'AMM au Maroc

SYNTHEMEDIC

20-22, Rue Zoubeir Ibou Al Aouam

Roches Noires

20300 Casablanca

Maroc

- la dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le : 03/2015

PPV

LOT

PER

2880

hydrate, ce  
tuctose, ce  
le déficit en

L'AVIS DE

fructose.  
L'AVIS DE



# VITANEVRIL FORT 100 mg,

## 1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITANEVRIL FORT 100 mg, Comprimé pelliculé boîte de 30  
(DCI) Benfotiamine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas des symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 2. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative en substance (s) active (s) par unité de prise

Benfotiamine ..... 100 mg

Composition qualitative en excipients

Excipients : Amidon de riz ; Lactose monohydrate ; Stéarate de magnésium ; Saccharose ; Talc ; Hypromellose ; Dioxyde de titane ; Macrogol 400 ; et l'eau purifiée ..... gsp un comprimé

Excipient à effet notoire : Saccharose ; Lactose monohydrate.

## 3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE

Antiasthénique (A : appareil digestif et métabolisme).

## 4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

- traitement du béri-béri.
- prophylaxie des états de carence vitaminique dus à une diminution des apports alimentaires (par exemple : malabsorption, régimes restrictifs riches en protéines non supplémentés, nutrition parentérale), en association avec les autres vitamines du groupe b.
- proposé chez l'alcoolique, notamment en cas de polynévrites.
- proposé dans d'autres polynévrites supposées d'origine toxicitairelle.
- utilisée, à forte dose, dans certains syndromes douloureux.

## 5. POSOLOGIE

- Mode et voies d'administration :

Voie orale.

- Durée du traitement :

so conformer à l'ordonnance de votre médecin.

- Fréquence d'administration :

2 à 4 comprimés par jour, à avaler sans croquer.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

## 6. CONTRE - INDICATIONS

ATTENTION !

### DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Intolérance connue à la vitamine B1.
  - Ne pas administrer aux enfants de moins de 8 ans.
- EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## 7. EFFETS INDESIRABLES

Sans objet.

N'HÉSitez PAS À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GENANT.

## 8. MISES EN GARDE, AVIS, SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS particulières

### D'EMP

### syndrome

### sucrassé

### EN CAS

### VOTRE

### EXCIPIE

### Sacchar

### Parions

### EN CAS

### VOTRE

## 9. INTERACTIONS

- Interactions avec d'autres médicaments ;
- Interactions avec les aliments et les boissons ;
- Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapie alternatives.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

## 10. UTILISATIONS EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Allaitemt : ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

## 11. LES EFFETS POSSIBLES DU TRAITEMENT SUR LA CAPACITÉ A CONDUIRE UN VÉHICULE OU A UTILISER CERTAINES MACHINES

Sans objet.

## 12. SYMPTOMES ET CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

Sans objet.

## 13. CONDUITE A TENIR EN CAS D'OMISSION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES

Sans objet.

## 14. MENTION, SI NÉCESSAIRE, D'UN RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE

- Conditions de prescription et de délivrance
- Précautions particulières de conservation
- Tenir hors de la portée des enfants
- Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte
- Nom et adresse du fabricant quant celui-ci n'est pas le titulaire de l'AMM au Maroc

Sans objet

- Nom et adresse de l'EPI Titulaire de l'AMM au Maroc

SYNTHEMEDIC

20-22, Rue Zoubeir Ibou Al Aouam

Roches Noires

20300 Casablanca

Maroc

- la dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le : 03/2015

PPV

LOT

PER

2880

hydrate, ce  
tuctose, ce  
le déficit en

L'AVIS DE

fructose.  
L'AVIS DE





Comprimé  
Voie orale

curarti®  
forte

PPC : 149,50 DH

Lot :  
À consommer de  
préférence avant le :

## FORME ET PRÉSENTATION :

Comprimé, boîtes de 15 et de 30.

## COMPOSITION (par comprimé) :

Agents de charge (cellulose, phosphate de calcium), Complexe soluble de beta-cyclodextrine (humectant) et curcumine (extrait de rhizomes de Curcuma -Curcuma longa - standardisé), Acide ascorbique (vitamine C), Anti-agglomérant (dioxyde de silicium), Stabilisant (carboxyméthylcellulose sodique réticulée), Anti-agglomérant (sels de magnésium d'acides gras végétaux) et Molybdate. d'ammonium. Agent d'enrobage : Hydroxypropylméthylcellulose, Cellulose, Acides. gras et Colorants (dioxyde de titane et oxyde de fer).



Comprimé  
Voie orale

curarti®  
forte

PPC : 149,50 DH

Lot :  
À consommer de  
préférence avant le :

## FORME ET PRÉSENTATION :

Comprimé, boîtes de 15 et de 30.

## COMPOSITION (par comprimé) :

Agents de charge (cellulose, phosphate de calcium), Complexe soluble de beta-cyclodextrine (humectant) et curcumine (extrait de rhizomes de Curcuma -Curcuma longa - standardisé), Acide ascorbique (vitamine C), Anti-agglomérant (dioxyde de silicium), Stabilisant (carboxyméthylcellulose sodique réticulée), Anti-agglomérant (sels de magnésium d'acides gras végétaux) et Molybdate. d'ammonium. Agent d'enrobage : Hydroxypropylméthylcellulose, Cellulose, Acides. gras et Colorants (dioxyde de titane et oxyde de fer).



Comprimé  
Voie orale

curarti®  
forte

PPC : 149,50 DH

Lot :  
À consommer de  
préférence avant le :

## FORME ET PRÉSENTATION :

Comprimé, boîtes de 15 et de 30.

## COMPOSITION (par comprimé) :

Agents de charge (cellulose, phosphate de calcium), Complexe soluble de beta-cyclodextrine (humectant) et curcumine (extrait de rhizomes de Curcuma -Curcuma longa - standardisé), Acide ascorbique (vitamine C), Anti-agglomérant (dioxyde de silicium), Stabilisant (carboxyméthylcellulose sodique réticulée), Anti-agglomérant (sels de magnésium d'acides gras végétaux) et Molybdate. d'ammonium. Agent d'enrobage : Hydroxypropylméthylcellulose, Cellulose, Acides. gras et Colorants (dioxyde de titane et oxyde de fer).



Comprimé  
Voie orale

curarti®  
forte

PPC : 149,50 DH

Lot :  
À consommer de  
préférence avant le :

## FORME ET PRÉSENTATION :

Comprimé, boîtes de 15 et de 30.

## COMPOSITION (par comprimé) :

Agents de charge (cellulose, phosphate de calcium), Complexe soluble de beta-cyclodextrine (humectant) et curcumine (extrait de rhizomes de Curcuma -Curcuma longa - standardisé), Acide ascorbique (vitamine C), Anti-agglomérant (dioxyde de silicium), Stabilisant (carboxyméthylcellulose sodique réticulée), Anti-agglomérant (sels de magnésium d'acides gras végétaux) et Molybdate. d'ammonium. Agent d'enrobage : Hydroxypropylméthylcellulose, Cellulose, Acides. gras et Colorants (dioxyde de titane et oxyde de fer).



Comprimé  
Voie orale

curarti®  
forte

PPC : 149,50 DH

Lot :  
À consommer de  
préférence avant le :

## FORME ET PRÉSENTATION :

Comprimé, boîtes de 15 et de 30.

## COMPOSITION (par comprimé) :

Agents de charge (cellulose, phosphate de calcium), Complexe soluble de beta-cyclodextrine (humectant) et curcumine (extrait de rhizomes de Curcuma -Curcuma longa - standardisé), Acide ascorbique (vitamine C), Anti-agglomérant (dioxyde de silicium), Stabilisant (carboxyméthylcellulose sodique réticulée), Anti-agglomérant (sels de magnésium d'acides gras végétaux) et Molybdate. d'ammonium. Agent d'enrobage : Hydroxypropylméthylcellulose, Cellulose, Acides. gras et Colorants (dioxyde de titane et oxyde de fer).



Comprimé  
Voie orale

curarti®  
forte

PPC : 149,50 DH

Lot :  
À consommer de  
préférence avant le :

## FORME ET PRÉSENTATION :

Comprimé, boîtes de 15 et de 30.

## COMPOSITION (par comprimé) :

Agents de charge (cellulose, phosphate de calcium), Complexe soluble de beta-cyclodextrine (humectant) et curcumine (extrait de rhizomes de Curcuma -Curcuma longa - standardisé), Acide ascorbique (vitamine C), Anti-agglomérant (dioxyde de silicium), Stabilisant (carboxyméthylcellulose sodique réticulée), Anti-agglomérant (sels de magnésium d'acides gras végétaux) et Molybdate. d'ammonium. Agent d'enrobage : Hydroxypropylméthylcellulose, Cellulose, Acides. gras et Colorants (dioxyde de titane et oxyde de fer).

الدكتور عبد الحق مودن

Docteur Abdelhak Mouden

Spécialiste

Médecine Physique - Ostéopathie.

Podologie - Mésothérapie.

Traumatologie du Sport

Lauréat de la Faculté de Médecine de Montpellier

Membre de la Société Française d'Ostéopathie



119 , شارع بوركون - إقامة فنيسيا - الدار البيضاء  
119, Avenue de Bourgogne - Résidence venezia - Rez de chaussée. Casablanca  
Tél.: 05 22 27 85 61 / 05 22 29 76 97 - Fax : 05 22 20 94 44  
E-mail : osteopathecasablanca@gmail.com / Site web : www.osteopathe-casablanca.com  
INP 091113860

26/02/2019

Mr BASSI Lamine

15 séances de rééduq. pull  
les 2 premières

polyarthrite en cours  
- renforcement musculaire postural

- bobinage

**CENTRE KINE-FORME**  
Nadia Lamine  
Kinésithérapeute Physiothérapeute  
299, Bd Oued Daoud - 93 82 35  
Tél: 03 22 93 82 35

Dr. Abdelhak MOUDEN  
Médecine Physique - Ostéopathie  
Podologie - Mésothérapie  
Traumatologie du Sport  
Tél: 05 22 27 85 61 / 05 22 29 76 97  
Fax: 05 22 20 94 44

Inséance / semaine

ST

# الدكتور عبد الحق مودن

## Docteur Abdelhak Mouden

spécialiste en :

Médecine Physique - Ostéopathie.

Podologie - Mésothérapie.

Traumatologie du Sport

Lauréat de la Faculté de Médecine de Montpellier

Membre de la Société Française d'Ostéopathie



119, شارع بوركون - إقامة فنيسيا - الدار البيضاء

119, Avenue de Bourgogne - Résidence Phénicia - Rez de Chaussée Casablanca

Tél.: 05 22 27 85 61 / 05 22 29 76 97 - Fax : 05 22 20 94 44

E-mail : osteopathecasablanca@gmail.com / Site web : www.osteopathe-casablanca.com

INP 091113860

26/12/2019

Dr.  
Abdelhak Mouden

BAGASS LAHEEN

Kif Moudin à 2000

400 -

Dr. Abdelhak MOUDEN  
Medecin Rééducateur  
119, Bd Bourgogne, Casablanca  
Tel: 05 22 27 85 61 / 05 22 29 76 97  
Fax: 05 22 20 41 39

# الدكتور عبد الحق مودن

## Docteur Abdelhak Moudan

spécialiste en :

Médecine Physique - Ostéopathie.

Podologie - Mésothérapie.

Traumatologie du Sport

Lauréat de la Faculté de Médecine de Montpellier

Membre de la Société Française d'Ostéopathie



119, شارع بوركون - إقامة فنيسيا - الدار البيضاء  
119, Avenue de Bourgogne - Résidence Phénicia - Rez de Chaussée Casablanca  
Tél.: 05 22 27 85 61 / 05 22 29 76 97 - Fax : 05 22 20 94 44  
E-mail : osteopathecasablanca@gmail.com / Site web : www.osteopathe-casablanca.com  
INP 091113860

See  
Bacasse Lahcen

17/12/2019

BACASSE LAHCEEN

Consultation = 300.-

Visite = 300.-

TOPIA = 600.-

Si x Cent dirhams

Dr. Abdelhak MOUDEN  
Médecin Rééducateur - Podologue  
119, Bd Bourgogne - Casablanca  
Tel: 0522 27 85 61 29 76 97  
Fax: 0522 29 41 93

# Centre Kiné-Forme

Nadia LAHMIDI

Kinésithérapeute

Physiothérapeute

Casablanca, le : 04/10/2020

## Note d'honoraires

Nom : Nadia BAGASS... la P. S. M.

Type séances : Rééducation fonctionnelle - des 2 genoux  
Nombre séances : 15  
P.U : 180 DT  
Montant : 2700 DT

Facture arrêtée à la somme de : 2000 mille Sept cent DT

**CENTRE KINE-FORME**  
Nadia LAHMIDI  
Kinésithérapeute/Physiothérapeute  
299, Bd Oued Daoura-El Oulfa  
Tél: 05 22 93 82 33



# Centre Kiné-Forme

Kinésithérapie - Amincissement - Bien Etre

---

Nadia LAHMIDI

Kinésithérapeute - Physiothérapeute

Nom : MR. BGASS LEHSAN

---

299, Bd Oued Daoura El Oulfa (en face rond point Chahdia) - Casablanca

Tél.: 05 22 93 82 33 / GSM : 06 62 55 65 19

Séance	Jour	Date	Heure	Type séance
1 <sup>ère</sup>	Jeudi	02/01/20	à 11h00	
2 <sup>ème</sup>	Samedi	04/01/20	à 11h30	
3 <sup>ème</sup>	Lundi	06/01/20	à 15h00	
4 <sup>ème</sup>	Mercredi	08/01/20	à 11h00	
5 <sup>ème</sup>	Vendredi	10/01/20	à 10h00	
6 <sup>ème</sup>	Lundi	13/01/20	à 11h30	
7 <sup>ème</sup>	Mercredi	15/01/20	à 15h00	
8 <sup>ème</sup>	Vendredi	17/01/20	à 11h00	
9 <sup>ème</sup>	Lundi	20/01/20	à 10h30	
10 <sup>ème</sup>	Mercredi	22/01/20	à 11h00	

Séance	Jour	Date	Heure	Type séance
1 <sup>ère</sup>	Vendredi	24/01/20	à 10h30	
2 <sup>ème</sup>	Lundi	27/01/20	à 15h00	
3 <sup>ème</sup>	Mercredi	29/01/20	à 16h30	
4 <sup>ème</sup>	Samedi	03/02/20	à 12h00	
5 <sup>ème</sup>	Mardi	05/02/20	à 15h00	
6 <sup>ème</sup>				
7 <sup>ème</sup>				
8 <sup>ème</sup>				
9 <sup>ème</sup>				
10 <sup>ème</sup>				

**CENTRE KINÉ-FORME**  
**Madi LAHMIDI**  
 Kinésithérapeute Physiothérapeute  
 299, Bd Oued Daoura - El Oulfa  
 Tél: 0522 93 82 33