

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
				INP : [REDACTED]

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>PHARMACIE DU BLOC CASA D'ALBA</i>	30.12.14.	110,50 X

ANALYSES - RADIGRAPHIES


Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F PROTHESES DENTAIRES



DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
	00000000	00000000
D	00000000	00000000
	35533411	11433553
B		

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

MONTANTS
DES SOINS

DEBUT
D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DATE DU
DEVIS

DATE DE
L'EXECUTION



- Diplôme universitaire en échographie
- Gynécologie et suivi de grossesse
- Electrocardiogramme
- Ancien Médecin à Moroccan Heart Institute

دبلوم الفحص بالصدى
أمراض النساء و تتبع الحمل
الخطيط الكهربائي للقلب
طبيبة سابقة بالمعهد المغربي
لأمراض و جراحة القلب

ORDONNANCE

Berrechid le : 30.12.2015 برشيد في :

Meunahir

Fatima

PHARMACIE DU BLOC
BLOC 63 N° 4 Sidi Othmane
CASABLANCA

1. Bronchofluide 100 ml 3x3



2. Azix 100 ml 3x3



3. Doliphan 500 mg x 3



PHARMACIE DU BLOC
BLOC 63 N° 4 Sidi Othmane
CASABLANCA

Dr. Sarah BELCAIDA
Médecin Généraliste
20, Rue Souk ba Mohamed V
2^{ème} Etage Bureau n° 8
Tél.: 0522 33 68 30

Bronchofluide®

Carbocisteine

FORMES ET PRÉSENTATIONS

- BRONCHOFLUIDE SIROP
 - Sirop enfants Flacon de 125 ml.
 - Sirop adultes Flacon de 125 ml.
 - Flacon de 300 ml.
- BRONCHOFLUIDE SANS SUCRE, solution buvable.
 - Solution buvable adultes Flacon de 125 ml.
 - Flacon de 300 ml.

COMPOSITION

BRONCHOFLUIDE SIROP

	Sirop enfants	Sirop adultes
Carbocisteine	2 g	5 g
Excipient q.s.p	100 ml	100 ml

- Excipients à effet notoire : Parahydroxybenzoate de méthyle, Saccharose et Alcool éthylique.

BRONCHOFLUIDE SANS SUCRE

	Solut.buv. adultes
Carbocisteine	5 g
Excipient q.s.p	100 ml

- Excipients à effet notoire : Parahydroxybenzoate de méthyle et Alcool éthylique.

INDICATIONS

BRONCHOFLUIDE est un fluidifiant des sécrétions de la muqueuse des voies respiratoires. (La forme sans sucre est destinée aux patients soumis à des régimes hypoglucidiques).

- Pneumologie
 - Bronchites aiguës et chroniques.
 - Dilatation des bronches.
 - Bronchorrhee.
 - Insuffisance respiratoire chronique.
- O.R.L.
 - Trachéites.
 - Laryngites aiguës ou subaiguës.
 - Rhinopharyngites.
 - Catarrhes tubaires compliqués ou non d'otites.
 - Sinusites.

CONTRE-INDICATIONS

Ulcères gastro-duodénaux.

☒ Contre indiqué chez le nourrisson de moins de 2 ans.

EFFETS INDESIRABLES

A fortes doses, on peut parfois observer l'apparition de phénomènes diarrhéiques. Il est alors conseillé de réduire la posologie.

POSÉOLOGIE

- Enfants
 - De 2 à 5 ans : 1 cuillère à café 2 fois par jour.
 - Au dessus de 5 ans : 1 cuillère à café 3 fois par jour.
 - La durée de traitement est de 8 à 10 jours.
- Adultes
 - En moyenne 3 cuillères à soupe par jour (Du sirop ou de la solution buvable).
 - La durée de traitement ne doit pas dépasser 5 jours.

CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite figurant sur le conditionnement extérieur.



NOVOPHARMA	281
UTAV	LOT
NO 20	20-40



Laboratoires NOVOPHARMA
Z.I.I₂ Tit Mellil - Casablanca

Doliprane® 500 mg

PARACÉTAMOL

comprimé

COMPOSITION ET PRÉSENTATION :

- Paracétamol 500 mg
- Excipients: qsp 1 comprimé
Boîte de 20 comprimés.

PROPRIÉTÉS :

Ce médicament est un **antalgique**. Il calme la douleur.
Il est **antipyrétique**. Il fait baisser la température en cas de fièvre.

INDICATIONS :

Ce médicament contient du paracétamol.

Il est indiqué dans les maladies avec douleur et/ou fièvre, telle que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses, **chez l'adulte et l'enfant à partir de 27kg : (environ 8 ans)**.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne pas utiliser en cas :

- d'allergie connue au paracétamol.
- maladie grave du foie.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Il existe des dosages plus adaptés pour l'enfant de moins de 27 kg : (moins de 8 ans environ).
- Compte-tenu des posologies recommandées, il est inutile d'alterner la prise d'aspirine et de paracétamol.

Avant de prendre du paracétamol, il est nécessaire de consulter votre médecin en cas de maladie grave des reins ou du foie.

- Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou si elles s'aggravent, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose recommandée.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Doliprane® 500 mg comprimé p

© 10,30

F.P.V. 10D H 30
PER 09/22
LOT 12071



AZIX®

Azithromycine

COMPOSITION ET PRÉSENTATION :

Comprimé 500 mg sécable, boîte de 3

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Traitements des infections dues aux germes sensibles telles que :

- infections respiratoires hautes : otite moyenne, sinusite, angine et pharyngite;
- infections respiratoires basses (y compris bronchite et pneumonie);
- infections odontostomatologiques;
- infections cutanées;
- infections des tissus mous;
- urétrites et cervicites non gonococciques (chlamydia trachomatis).

CONTRE-INDICATIONS :

- Antécédents d'allergie à l'azithromycine et aux macrolides.
- Insuffisance hépatique sévère.

MISES EN GARDE :

- Toute manifestation allergique (éruption cutanée, démangeaison ...) en cours de traitement doit être signalée immédiatement à votre médecin.
- Signaler au médecin traitant toute allergie ou manifestation allergique survenue lors de traitements par les antibiotiques de la famille des macrolides.
- Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une maladie hépatique.
- En l'absence de données, l'association aux dérivés de l'ergot de seigle n'est pas recommandée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Prévenir le médecin traitant en cas de :

Insuffisance hépatique, antécédents allergiques, manifestations cutanées d'origine allergique, prise concomitante d'autres médicaments, grossesse, allaitement.

EFFETS INDESIRABLES :

- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées et douleurs abdominales.
- Manifestations allergiques; prurit, oedème de Quincke.

POSOLOGIE :

Se conformer à la prescription médicale.
Adulte et enfant de plus de 45 kg
en une prise par jour pendant 3 jours.

MODE D'ADMINISTRATION :

Azix peut être pris pendant ou

TABLEAU A (LISTE I).



82, Allée des Casuarinas - Ain Sébaâ - Casablanca

S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

79,70
PPV 790H70
PER 65722
LOT 11251



idemco