

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19-0039198

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 6601 Société :

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : ELYOUSSEFI Mohammed

Date de naissance : 01/11/1952

Adresse : C.T. WAFI R N°25 PASS 1 BERCHID

Tél. : 0661 650595 Total des frais engagés 2139,40 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Leila BEKKAI
134, Bd. El Fida Hay Yasmine
Tél. : 0661 56 93 14

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : ELYOUSSEFI LEJANE Age: 20

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☒ Enfant

Nature de la maladie : Anémie clinique / adhémo

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : / /


Signature de l'adhérent(e) :

ACCUEIL

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
21/04 2020	C	1	1500H	
25/04 2020	Contrôle	G		

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	25.01.2020	1989,40

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE H 25533412 00000000 D 21433552 00000000 G 00000000 35533411 B			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur BEKKAI Laila

Médecine Générale

Diplômée de l'Université de DAKAR

الدكتورة البكاي ليلي

الطب العام

خريجة كلية الطب بـ دكار

Dr. Leila BEKKAI

134, Bd. El Fida Hay Yasmina
Tél.: 0661 56 93 14

ORDONNANCE

Melle

ELYOUSSEFI LEJANE

94,00 x 18

(1)

FERPlex fl. buv.

(S.V)

49,60 x 4

1 - 0 - 1 x 03 mois

(2)

D-CURE Route AB

(S.V)

99,00 1 AB / 15 jrs x 06 mois

(3)

RELAXIUM B6 375 mg fl

(S.V)

Traitement de
de mois

1 : 1989, 40

Pharmacie AL MOUNA
Dr. NASR Mouna
Rue Ibn Roumi Hay Al Wahda
Tél.: 0661 56 93 14

Dr. Leila BEKKAI
134, Bd. El Fida Hay Yasmina
Tél.: 0661 56 93 14

134, شارع الفداء، حي ياسمينه الطابق الأول - برشيد الهاتف: 06 61 56 93 14

134, Bd El Fida, Hay Yasmina, 1^{er} Etage - Berrechid - Tél: 06 61 56 93 14

Notice

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT :

**D-CURE® FORTE 100.000 U.I.,
solution buvable en ampoule, boîtes de 3.**

Substance active : **Cholécalférol** (Vitamine D3).

PPV: 49,60 DH
LOT: 19LD2/B
EXP: 12/2022

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toutes autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. COMPOSITION DU MÉDICAMENT :

Ampoules buvables de 1 ml de solution huileuse :

Principe actif : Cholécalférol 100.000 U.I.

Excipients :

Acétate d'alpha-Tocophérol – Essence d'écorce d'orange douce – Oléate de Polyglycérol (E475) – Huile d'olive raffinée pour faire 1 ml (= une ampoule).

3. CLASSE PHARMACEUTIQUE :

Vitamines.

4. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :

D-CURE FORTE 100.000 UI est utilisé en tant que traitement d'attaque pour la carence en vitamine D.

5. POSOLOGIE :

Mode et voies d'administration :

Administration orale.

Les ampoules doivent être prises ou administrées conformément aux instructions de dosage.

La dose sera prise telle quelle ou en mélange avec des liquides.

Fréquence d'administration-durée du traitement :

Utilisez toujours D-CURE FORTE conformément aux instructions de votre médecin. En cas de doute, consultez à nouveau votre médecin ou pharmacien.

Le dosage doit être déterminé au cas par cas par le médecin traitant. S'il ne vous a pas été prescrit, il est recommandé de prendre une dose unique ou une dose cumulée de 100.000 UI sur 1 semaine.

Il est possible d'administrer 1 ampoule de D-CURE FORTE 100 000 U.I. en une seule dose ou 4 ampoules de D-CURE 25.000 U.I. par semaine. (100.000 U.I.).

6. CONTRE INDICATION :

N'utilisez pas D-CURE FORTE :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au cholécalférol ou à tout autre excipient de D-CURE FORTE.
- si vous avez moins de 18 ans.
- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou
- si vous souffrez d'hypercalciurie (augmentation du taux de calcium dans les urines).
- si vous souffrez de pseudo-hypoparathyroïdisme (perturbation du métabolisme de l'hormone parathyroïdienne), puisque le besoin en vitamine D peut être réduit lors de phases de sensibilité normale à la vitamine D. Dans ce cas, il y a un risque de surdosage prolongé. Des dérivés de la vitamine D qui se régulent mieux sont disponibles dans ces cas.
- si vous avez une prédisposition à la formation de calculs rénaux contenant du calcium.
- si vous avez une hypervitaminose D.

7. EFFETS INDÉSIRABLES :

Comme tous les médicaments, D-CURE FORTE peut provoquer des effets indésirables, même si toutes les personnes ne les développent pas.

Effets indésirables possibles :



Gélule
Voie orale

Relaxium[®] B6

Deva
Pharmaceutique

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Relaxium B6 150

Oxyde de magnésium marin.....260 mg

équivalent en Magnésium150 mg

Vitamine B6.....1 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

Relaxium B6 300

Oxyde de magnésium marin.....520 mg

équivalent en Magnésium.....300 mg

Vitamine B6.....2 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

Relaxium B6 375

Oxyde de magnésium marin.....650 mg

équivalent en Magnésium.....375 mg

Vitamine B6.....2 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.



FORME ET PRESENTATIONS

Relaxium B6 150 : Gélule. Boite de 20 et 60

Relaxium B6 300 : Gélule. Boite de 15 et 30

Relaxium B6 375 : Gélule. Boite de 30 et 60

PROPRIETES

Relaxium B6 contient du magnésium et de la vitamine B6.

Le magnésium intervient dans le fonctionnement neuromusculaire. Son déficit peut causer nervosité, irritabilité, fatigabilité, crampes musculaires ainsi que les difficultés d'endormissement et de concentration, notamment en cas de surmenage.

La vitamine B6 complète l'activité relaxante et équilibrante du magnésium.

VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

Relaxium B6 150

Prendre 2 gélules par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

Relaxium B6 300

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

Relaxium B6 375

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Garder hors de portée des enfants.

A conserver dans un endroit sec et frais.

Relaxium B6 150 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805321DMP/20UCAVI

Relaxium B6 300 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805322DMP/20UCAVI

Relaxium B6 375 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20191812093DMP/20UCAVI

Deva
Pharmaceutique

100-107 Zone Industrielle 131000 - CROISSANT

الأطفال : يأخذ 1.5 ملل/كغ/يوم حسب وصفة طبيبك مقسمة في جرعتين، ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.
النزاع: حلقة السلامة لمخزون الغطاء، اضغط على غطاء المخزون بشدة حتى يسحب السمحاق بالمحلول.
 حرك جيداً، اخرج غطاء المخزون ثم اشرب المحلول مباشرة أو مخففاً مع الماء.



مدة العلاج :

يجب الحفاظ على مدة العلاج بفيرليكس فول حتى استعادة احتياطي الجسم من الحديد العادي، وبالتالي فمدة العلاج ستستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر.

6. موانع الاستعمال :

- فرط الحساسية للمواد الفعالة أو أحد السواغات.
- هيموسيديريني، داء ترسب الأصبغة الدموية، فقر الدم اللاتنسجي، فقر الدم الإنحلالي أو فقر الدم الناتج عن تعدد إستعمال الحديد،
- التهاب فقر الدم الضخم الأرومات نتيجة نقص فيتامين B12 (على الأقل فيريلكس فول لا يمكن إستعماله بالإشتراك مع فيتامين B12)
- التهاب البنكرياس المزمن. تشمع الأصبغة الدموية.

7. التأثيرات الغير مرغوب فيها :

نادراً ما تحدث اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال، الإمساك، الغثيان وآلم شرشوفي وخصوصاً عند تناول جرعات عالية جداً. يمكن تقليل هذه التأثيرات الغير مرغوب فيها بخفض الجرعة أو وقف العلاج المنتجات التي تحتوي على الحديد يمكن أن تلون البراز بالأسود أو الرمادي الداكن.
 إذا لاحظت أي تأثيرات الغير مرغوب فيها غير مدرجة في هذه النشرة، أخبر طبيبك أو الصيدلاني.

8. احتياطات الإستعمال و احتياطات خاصة :

احتياطات الإستعمال:

ليس هناك حاجة إلى تحذيرات خاصة التحمل أو الإدمان. العلاج لا يجب أن يتجاوز 6 أشهر إلا في حالات النزيف المستمر. غزارة الطمث والحمل.

احتياطات خاصة:

يحتوي هذا الدواء على بروتين الحليب، يجب أخذه بحذر عند المرضى الذين يعانون من عدم تحمل بروتينات الحليب التي قد يكون لهم تفاعل أرجي.

فيرليكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على السوربيتول، المرضى الذين يعانون من مشاكل وراثية نادرة للفركتوز لا يجب أن يأخذوا هذا الدواء.

فيرليكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على بارابين (ميتيل

Lot N°: 19019-2
 EXP: 07-2021

ل محلول للشرب.

تسمية عالمية مشتركة حديد بروتين سيكسينيلات + كالسيوم فولينانت.

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو صيدلانيك.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

2. التعريف بالمنتج :

كل قنبنة من جرعة واحدة تحتوي على :

العنصر الفعال (محلول)

بروتين سيكسينيلات الحديد 800 ملغ (ما يعادل 40 ملغ)

سواغات :

سوربيتول E 420، بروويلين غليكول، ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروويل باراهيدروكسي ملح الصوديوم، نكهة موزال، سكرين الصوديوم والماء المنقى.

العنصر الفعال (غطاء المخزون)

كالسيوم فولينات خماسي التمييه 0.235 ملغ (ما يعادل 0.185 من حمض الفوليك).

سواغ :

مانيتول E 420

سواغات ذات تأثير ملحوظ :

ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروويل باراهيدروكسي ملح الصوديوم.

3. المجموعة الصيدلانية العلاجية :

أدوية مضادة لفقر الدم، تحتوي على الحديد في تركيبة مع حامض الفوليكينك.

رمز ATC: B03AD49

4. دواعي الاستعمال :

الوقاية و العلاج لحالات نقص الحديد وحمض الفوليك، فقر الدم ناقص الصباغ، فقر الدم الضخم الأرومات و فقر الدم الكبير الكريات عند الأطفال، ثانوي لكمية غير كافية أو نقص إمتصاص الحديد أو الفولات، فقر الدم ناتج عن الحمل، الولادة و الرضاعة الطبيعية.

5. المقادير :

الكبار: 1 إلى 2 قنبتات في اليوم وفقاً لوصفة طبيبك، مقسمة في جرعتين ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.

الأطفال : يأخذ 1.5 ملل/كغ/يوم حسب وصفة طبيبك مقسمة في جرعتين، ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.
النزاع: حلقة السلامة لمخزون الغطاء، اضغط على غطاء المخزون بشدة حتى يسحب السمحاق بالمحلول.
 حرك جيداً، اخرج غطاء المخزون ثم اشرب المحلول مباشرة أو مخففاً مع الماء.



مدة العلاج :

يجب الحفاظ على مدة العلاج بفيرليكس فول حتى استعادة احتياطي الجسم من الحديد العادي، وبالتالي فمدة العلاج ستستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر.

6. موانع الاستعمال :

- فرط الحساسية للمواد الفعالة أو أحد السواغات.
- هيموسيديريني، داء ترسب الأصبغة الدموية، فقر الدم اللاتنسجي، فقر الدم الإنحلالي أو فقر الدم الناتج عن تعذر إستعمال الحديد،
- التهاب فقر الدم الضخم الأرومات نتيجة نقص فيتامين B12 (على الأقل فيريلكس فول لا يمكن إستعماله بالإشتراك مع فيتامين B12)
- التهاب البنكرياس المزمن. تشمع الأصبغة الدموية.

7. التأثيرات الغير مرغوب فيها :

نادراً ما تحدث اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال، الإمساك، الغثيان وآلم شرشوفي وخصوصاً عند تناول جرعات عالية جداً. يمكن تقليل هذه التأثيرات الغير مرغوب فيها بخفض الجرعة أو وقف العلاج المنتجات التي تحتوي على الحديد يمكن أن تلون البراز بالأسود أو الرمادي الداكن.
 إذا لاحظت أي تأثيرات الغير مرغوب فيها غير مدرجة في هذه النشرة، أخبر طبيبك أو الصيدلاني.

8. احتياطات الإستعمال و احتياطات خاصة :

احتياطات الإستعمال:

ليس هناك حاجة إلى تحذيرات خاصة التحمل أو الإدمان. العلاج لا يجب أن يتجاوز 6 أشهر إلا في حالات النزيف المستمر، غزارة الطمث والحمل.

احتياطات خاصة:

يحتوي هذا الدواء على بروتين الحليب، يجب أخذه بحذر عند المرضى الذين يعانون من عدم تحمل بروتينات الحليب التي قد يكون لهم تفاعل أرجي.

فيرليكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على السوربيتول، المرضى الذين يعانون من مشاكل وراثية نادرة للفركتوز لا يجب أن يأخذوا هذا الدواء.

فيرليكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على بارابين (ميتيل

Lot N°: 19019-2
 EXP: 07-2021

ل محلول للشرب.

تسمية عالمية مشتركة حديد بروتين سيكسينيلات + كالسيوم فولينانت.

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو صيدلانيك.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

2. التعريف بالمنتج :

كل قنبنة من جرعة واحدة تحتوي على :

العنصر الفعال (محلول)

بروتين سيكسينيلات الحديد 800 ملغ (ما يعادل 40 ملغ)

سواغات :

سوربيتول E 420، بروويلين غليكول، ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروويل باراهيدروكسي ملح الصوديوم، نكهة موزال، سكرين الصوديوم والماء المنقى.

العنصر الفعال (غطاء المخزون)

كالسيوم فولينات خماسي التمييه 0.235 ملغ (ما يعادل 0.185 من حمض الفوليك).

سواغ :

مانيتول E 420

سواغات ذات تأثير ملحوظ :

ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروويل باراهيدروكسي ملح الصوديوم.

3. المجموعة الصيدلانية العلاجية :

أدوية مضادة لفقر الدم، تحتوي على الحديد في تركيبة مع حامض الفوليكينك.

رمز B03AD49 : ATC

4. دواعي الاستعمال :

الوقاية و العلاج لحالات نقص الحديد وحمض الفوليك، فقر الدم ناقص الصباغ، فقر الدم الضخم الأرومات و فقر الدم الكبير الكريات عند الأطفال، ثانوي لكمية غير كافية أو نقص إمتصاص الحديد أو الفولات، فقر الدم ناتج عن الحمل، الولادة و الرضاعة الطبيعية.

5. المقادير :

الكبار: 1 إلى 2 قنبتات في اليوم وفقاً لوصفة طبيبك، مقسمة في جرعتين ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.

الأطفال : يأخذ 1.5 ملل/كغ/يوم حسب وصفة طبيبك مقسمة في جرعتين، ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.
النزاع: حلقة السلامة لمخزون الغطاء، اضغط على غطاء المخزون بشدة حتى يسحب السمحاق بالمحلول.
 حرك جيداً، اخرج غطاء المخزون ثم اشرب المحلول مباشرة أو مخففاً مع الماء.



مدة العلاج :

يجب الحفاظ على مدة العلاج بفيرليكس فول حتى استعادة احتياطي الجسم من الحديد العادي، وبالتالي فمدة العلاج ستستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر.

6. موانع الاستعمال :

- فرط الحساسية للمواد الفعالة أو أحد السواغات.
- هيموسيديريني، داء ترسب الأصبغة الدموية، فقر الدم اللاتنسجي، فقر الدم الإنحلالي أو فقر الدم الناتج عن تعذر إستعمال الحديد،
- التهاب فقر الدم الضخم الأرومات نتيجة نقص فيتامين B12 (على الأقل فيريلكس فول لا يمكن إستعماله بالإشتراك مع فيتامين B12)
- التهاب البنكرياس المزمن. تشمع الأصبغة الدموية.

7. التأثيرات الغير مرغوب فيها :

نادراً ما تحدث اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال، الإمساك، الغثيان و ألم شرشوفي وخصوصاً عند تناول جرعات عالية جداً. يمكن تقليل هذه التأثيرات الغير مرغوب فيها بخفض الجرعة أو وقف العلاج المنتجات التي تحتوي على الحديد يمكن أن تلون البراز بالأسود أو الرمادي الداكن.
 إذا لاحظت أي تأثيرات الغير مرغوب فيها غير مدرجة في هذه النشرة، أخبر طبيبك أو الصيدلاني.

8. احتياطات الإستعمال و احتياطات خاصة :

احتياطات الإستعمال:

ليس هناك حاجة إلى تحذيرات خاصة التحمل أو الإدمان. العلاج لا يجب أن يتجاوز 6 أشهر إلا في حالات النزيف المستمر. غزارة الطمث والحمل.

احتياطات خاصة:

يحتوي هذا الدواء على بروتين الحليب، يجب أخذه بحذر عند المرضى الذين يعانون من عدم تحمل بروتينات الحليب التي قد يكون لهم تفاعل أرجي.
 فيريلكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على السوربيتول، المرضى الذين يعانون من مشاكل وراثية نادرة للفركتوز لا يجب أن يأخذوا هذا الدواء.
 فيريلكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على بارابين (ميتيل

Lot N°: 19019-2
 EXP: 07-2021

ل محلول للشرب.

تسمية عالمية مشتركة حديد بروتين سيكسينيلات + كالسيوم فولينانت.

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو صيدلانيك.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

2. التعريف بالمنتج :

كل قنبنة من جرعة واحدة تحتوي على :

العنصر الفعال (محلول)

بروتين سيكسينيلات الحديد 800 ملغ (ما يعادل 40 ملغ)

سواغات :

سوربيتول E 420، بروويلين غليكول، ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروويل باراهيدروكسي ملح الصوديوم، نكهة موزال، سكرين الصوديوم والماء المنقى.

العنصر الفعال (غطاء المخزون)

كالسيوم فولينات خماسي التمييه 0.235 ملغ (ما يعادل 0.185 من حمض الفوليك).

سواغ :

مانيتول E 420

سواغات ذات تأثير ملحوظ :

ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروويل باراهيدروكسي ملح الصوديوم.

3. المجموعة الصيدلانية العلاجية :

أدوية مضادة لفقر الدم، تحتوي على الحديد في تركيبة مع حامض الفوليكينك.

رمز B03AD49 : ATC

4. دواعي الاستعمال :

الوقاية و العلاج لحالات نقص الحديد وحمض الفوليك، فقر الدم ناقص الصباغ، فقر الدم الضخم الأرومات و فقر الدم الكبير الكريات عند الأطفال، ثانوي لكمية غير كافية أو نقص إمتصاص الحديد أو الفولات، فقر الدم ناتج عن الحمل، الولادة و الرضاعة الطبيعية.

5. المقادير :

الكبار: 1 إلى 2 قنبتات في اليوم وفقاً لوصفة طبيبك، مقسمة في جرعتين ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.

الأطفال : يأخذ 1.5 ملل/كغ/يوم حسب وصفة طبيبك مقسمة في جرعتين، ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.
النزاع: حلقة السلامة لمخزون الغطاء، اضغط على غطاء المخزون بشدة حتى يسحب السمحاق بالمحلول.
 حرك جيدا، **اغرس غطاء** المخزون ثم اشرب المحلول مباشرة أو مخفقا مع الماء.



مدة العلاج :

يجب الحفاظ على مدة العلاج بفيرليكس فول حتى استعادة احتياطي الجسم من الحديد العادي، وبالتالي فمدة العلاج ستستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر.

6. موانع الاستعمال :

- فرط الحساسية للمواد الفعالة أو أحد السواغات.
- هيموسيديريتي، داء ترسب الأصبغة الدموية، فقر الدم اللاتنسجي، فقر الدم الإنحلالي أو فقر الدم الناتج عن تعذر إستعمال الحديد،
- التهاب فقر الدم الضخم الأرومات نتيجة نقص فيتامين B12 (على الأقل فيريلكس فول لا يمكن إستعماله بالإشتراك مع فيتامين B12)
- التهاب البنكرياس المزمن. تشمع الأصبغة الدموية.

7. التأثيرات الغير مرغوب فيها :

نادراً ما تحدث اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال، الإمساك، الغثيان وآلم شرشوفي وخصوصاً عند تناول جرعات عالية جداً. يمكن تقليل هذه التأثيرات الغير مرغوب فيها بخفض الجرعة أو وقف العلاج المنتجات التي تحتوي على الحديد يمكن أن تلون البراز بالأسود أو الرمادي الداكن.
 إذا لاحظت أي تأثيرات الغير مرغوب فيها غير مدرجة في هذه النشرة، أخبر طبيبك أو الصيدلاني.

8. احتياطات الإستعمال و احتياطات خاصة :

احتياطات الإستعمال:

ليس هناك حاجة إلى تحذيرات خاصة التحمل أو الإدمان. العلاج لا يجب أن يتجاوز 6 أشهر إلا في حالات النزيف المستمر. غزارة الطمث والحمل.

احتياطات خاصة:

يحتوي هذا الدواء على بروتين الحليب، يجب أخذه بحذر عند المرضى الذين يعانون من عدم تحمل بروتينات الحليب التي قد يكون لهم تفاعل أرجي.

فيرليكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على السوربيتول، المرضى الذين يعانون من مشاكل وراثية نادرة للفركتوز لا يجب أن يأخذوا هذا الدواء.

فيرليكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على بارابين (ميتيل

Lot N°: 19019-2
 EXP: 07-2021

ل محلول للشرب.

تسمية عالمية مشتركة حديد بروتين سيكسينيلات + كالسيوم فولينانت.

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو صيدلانيك.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

2. التعريف بالمنتج :

كل قنبنة من جرعة واحدة تحتوي على :

العنصر الفعال (محلول)

بروتين سيكسينيلات الحديد 800 ملغ (ما يعادل 40 ملغ)

سواغات :

سوربيتول E 420، بروبولين غليكول، ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروبول باراهيدروكسي ملح الصوديوم، نكهة موزال، سكرين الصوديوم والماء المنقى.

العنصر الفعال (غطاء المخزون)

كالسيوم فولينات خماسي التمييه 0.235 ملغ (ما يعادل 0.185 من حمض الفوليك).

سواغ :

مانيتول E 420

سواغات ذات تأثير ملحوظ :

ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروبول باراهيدروكسي ملح الصوديوم.

3. المجموعة الصيدلانية العلاجية :

أدوية مضادة لفقر الدم، تحتوي على الحديد في تركيبة مع حامض الفوليكينك.

رمز B03AD49 : ATC

4. دواعي الاستعمال :

الوقاية و العلاج لحالات نقص الحديد وحمض الفوليك، فقر الدم ناقص الصباغ، فقر الدم الضخم الأرومات و فقر الدم الكبير الكريات عند الأطفال، ثانوي لكمية غير كافية أو نقص إمتصاص الحديد أو الفولات، فقر الدم ناتج عن الحمل، الولادة و الرضاعة الطبيعية.

5. المقادير :

الكبار: 1 إلى 2 قنبتات في اليوم وفقاً لوصفة طبيبك، مقسمة في جرعتين ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.

الأطفال : يأخذ 1.5 ملل/كغ/يوم حسب وصفة طبيبك مقسمة في جرعتين، ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.
النزاع: حلقة السلامة لمخزون الغطاء، اضغط على غطاء المخزون بشدة حتى يسحب السمحاق بالمحلول.
 حرك جيداً، **اغرق غطاء** المخزون ثم اشرب المحلول مباشرة أو مخففاً مع الماء.



مدة العلاج :

يجب الحفاظ على مدة العلاج بفيرليكس فول حتى استعادة احتياطي الجسم من الحديد العادي، وبالتالي فمدة العلاج ستستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر.

6. موانع الاستعمال :

- فرط الحساسية للمواد الفعالة أو أحد السواغات.
- هيموسيديريني، داء ترسب الأصبغة الدموية، فقر الدم اللاتنسجي، فقر الدم الإنحلالي أو فقر الدم الناتج عن تعذر إستعمال الحديد،
- التهاب فقر الدم الضخم الأرومات نتيجة نقص فيتامين B12 (على الأقل فيريلكس فول لا يمكن إستعماله بالإشتراك مع فيتامين B12)
- التهاب البنكرياس المزمن. تشمع الأصبغة الدموية.

7. التأثيرات الغير مرغوب فيها :

نادراً ما تحدث اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال، الإمساك، الغثيان وآلم شرشوفي وخصوصاً عند تناول جرعات عالية جداً. يمكن تقليل هذه التأثيرات الغير مرغوب فيها بخفض الجرعة أو وقف العلاج المنتجات التي تحتوي على الحديد يمكن أن تلون البراز بالأسود أو الرمادي الداكن.
 إذا لاحظت أي تأثيرات الغير مرغوب فيها غير مدرجة في هذه النشرة، أخبر طبيبك أو الصيدلاني.

8. احتياطات الإستعمال و احتياطات خاصة :

احتياطات الإستعمال:

ليس هناك حاجة إلى تحذيرات خاصة التحمل أو الإدمان. العلاج لا يجب أن يتجاوز 6 أشهر إلا في حالات النزيف المستمر. غزارة الطمث والحمل.

احتياطات خاصة:

يحتوي هذا الدواء على بروتين الحليب، يجب أخذه بحذر عند المرضى الذين يعانون من عدم تحمل بروتينات الحليب التي قد يكون لهم تفاعل أرجي.

فيرليكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على السوربيتول، المرضى الذين يعانون من مشاكل وراثية نادرة للفركتوز لا يجب أن يأخذوا هذا الدواء.

فيرليكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على بارابين (ميتيل

Lot N°: 19019-2
 EXP: 07-2021

ل محلول للشرب.

تسمية عالمية مشتركة حديد بروتين سيكسينيلات + كالسيوم فولينانت.

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو صيدلانيك.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

2. التعريف بالمنتج :

كل قنبنة من جرعة واحدة تحتوي على :

العنصر الفعال (محلول)

بروتين سيكسينيلات الحديد 800 ملغ (ما يعادل 40 ملغ)

سواغات :

سوربيتول E 420، بروبولين غليكول، ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروبول باراهيدروكسي ملح الصوديوم، نكهة موزال، سكرين الصوديوم والماء المنقى.

العنصر الفعال (غطاء المخزون)

كالسيوم فولينات خماسي التمييه 0.235 ملغ (ما يعادل 0.185 من حمض الفوليك).

سواغ :

مانيتول E 420

سواغات ذات تأثير ملحوظ :

ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروبول باراهيدروكسي ملح الصوديوم.

3. المجموعة الصيدلانية العلاجية :

أدوية مضادة لفقر الدم، تحتوي على الحديد في تركيبة مع حامض الفوليكينك.

رمز B03AD49 : ATC

4. دواعي الاستعمال :

الوقاية و العلاج لحالات نقص الحديد وحمض الفوليك، فقر الدم ناقص الصباغ، فقر الدم الضخم الأرومات و فقر الدم الكبير الكريات عند الأطفال، ثانوي لكمية غير كافية أو نقص إمتصاص الحديد أو الفولات، فقر الدم ناتج عن الحمل، الولادة و الرضاعة الطبيعية.

5. المقادير :

الكبار: 1 إلى 2 قنبتات في اليوم وفقاً لوصفة طبيبك، مقسمة في جرعتين ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.

الأطفال : يأخذ 1.5 ملل/كغ/يوم حسب وصفة طبيبك مقسمة في جرعتين، ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.
النزاع: حلقة السلامة لمخزون الغطاء، اضغط على غطاء المخزون بشدة حتى يسحب السمحاق بالمحلول.
 حرك جيدا، **اغرس غطاء** المخزون ثم اشرب المحلول مباشرة أو مخفقا مع الماء.



مدة العلاج :

يجب الحفاظ على مدة العلاج بفيرليكس فول حتى استعادة احتياطي الجسم من الحديد العادي، وبالتالي فمدة العلاج ستستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر.

6. موانع الاستعمال :

- فرط الحساسية للمواد الفعالة أو أحد السواغات.
- هيموسيديريني، داء ترسب الأصبغة الدموية، فقر الدم اللاتنسجي، فقر الدم الإنحلالي أو فقر الدم الناتج عن تعذر إستعمال الحديد،
- التهاب فقر الدم الضخم الأرومات نتيجة نقص فيتامين B12 (على الأقل فيريلكس فول لا يمكن إستعماله بالإشتراك مع فيتامين B12)
- التهاب البنكرياس المزمن. تشمع الأصبغة الدموية.

7. التأثيرات الغير مرغوب فيها :

نادراً ما تحدث اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال، الإمساك، الغثيان وآلم شرشوفي وخصوصاً عند تناول جرعات عالية جداً. يمكن تقليل هذه التأثيرات الغير مرغوب فيها بخفض الجرعة أو وقف العلاج المنتجات التي تحتوي على الحديد يمكن أن تلون البراز بالأسود أو الرمادي الداكن.
 إذا لاحظت أي تأثيرات الغير مرغوب فيها غير مدرجة في هذه النشرة، أخبر طبيبك أو الصيدلاني.

8. احتياطات الإستعمال و احتياطات خاصة :

احتياطات الإستعمال:

ليس هناك حاجة إلى تحذيرات خاصة التحمل أو الإدمان. العلاج لا يجب أن يتجاوز 6 أشهر إلا في حالات النزيف المستمر. غزارة الطمث والحمل.

احتياطات خاصة:

يحتوي هذا الدواء على بروتين الحليب، يجب أخذه بحذر عند المرضى الذين يعانون من عدم تحمل بروتينات الحليب التي قد يكون لهم تفاعل أرجي.

فيرليكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على السوربيتول، المرضى الذين يعانون من مشاكل وراثية نادرة للفركتوز لا يجب أن يأخذوا هذا الدواء.

فيرليكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على بارابين (ميتيل

Lot N°: 19019-2
 EXP: 07-2021

ل محلول للشرب.

تسمية عالمية مشتركة حديد بروتين سيكسينيلات + كالسيوم فولينانت.

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو صيدلانيك.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

2. التعريف بالمنتج :

كل قنبنة من جرعة واحدة تحتوي على :

العنصر الفعال (محلول)

بروتين سيكسينيلات الحديد 800 ملغ (ما يعادل 40 ملغ)

سواغات :

سوربيتول E 420، بروويلين غليكول، ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروويل باراهيدروكسي ملح الصوديوم، نكهة موزال، سكرين الصوديوم والماء المنقى.

العنصر الفعال (غطاء المخزون)

كالسيوم فولينات خماسي التمييه 0.235 ملغ (ما يعادل 0.185 من حمض الفوليك).

سواغ :

مانيتول E 420

سواغات ذات تأثير ملحوظ :

ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروويل باراهيدروكسي ملح الصوديوم.

3. المجموعة الصيدلانية العلاجية :

أدوية مضادة لفقر الدم، تحتوي على الحديد في تركيبة مع حامض الفوليكينك.

رمز B03AD49 : ATC

4. دواعي الاستعمال :

الوقاية و العلاج لحالات نقص الحديد وحمض الفوليك، فقر الدم ناقص الصباغ، فقر الدم الضخم الأرومات و فقر الدم الكبير الكريات عند الأطفال، ثانوي لكمية غير كافية أو نقص إمتصاص الحديد أو الفولات، فقر الدم ناتج عن الحمل، الولادة و الرضاعة الطبيعية.

5. المقادير :

الكبار: 1 إلى 2 قنبتات في اليوم وفقاً لوصفة طبيبك، مقسمة في جرعتين ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.

الأطفال : يأخذ 1.5 ملل/كغ/يوم حسب وصفة طبيبك مقسمة في جرعتين، ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.
النزاع: حلقة السلامة لمخزون الغطاء، اضغط على غطاء المخزون بشدة حتى يسحب السمحاق بالمحلول.
 حرك جيدا، **اغرس غطاء** المخزون ثم اشرب المحلول مباشرة أو مخفقا مع الماء.



مدة العلاج :

يجب الحفاظ على مدة العلاج بفيرليكس فول حتى استعادة احتياطي الجسم من الحديد العادي، وبالتالي فمدة العلاج ستستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر.

6. موانع الاستعمال :

- فرط الحساسية للمواد الفعالة أو أحد السواغات.
- هيموسيديريني، داء ترسب الأصبغة الدموية، فقر الدم اللاتنسجي، فقر الدم الإنحلالي أو فقر الدم الناتج عن تعدد إستعمال الحديد،
- التهاب فقر الدم الضخم الأرومات نتيجة نقص فيتامين B12 (على الأقل فيريلكس فول لا يمكن إستعماله بالإشتراك مع فيتامين B12)
- التهاب البنكرياس المزمن. تشمع الأصبغة الدموية.

7. التأثيرات الغير مرغوب فيها :

نادراً ما تحدث اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال، الإمساك، الغثيان وآلم شرشوفي وخصوصاً عند تناول جرعات عالية جداً. يمكن تقليل هذه التأثيرات الغير مرغوب فيها بخفض الجرعة أو وقف العلاج المنتجات التي تحتوي على الحديد يمكن أن تلون البراز بالأسود أو الرمادي الداكن.
 إذا لاحظت أي تأثيرات الغير مرغوب فيها غير مدرجة في هذه النشرة، أخبر طبيبك أو الصيدلاني.

8. احتياطات الإستعمال و احتياطات خاصة :

احتياطات الإستعمال:

ليس هناك حاجة إلى تحذيرات خاصة التحمل أو الإدمان. العلاج لا يجب أن يتجاوز 6 أشهر إلا في حالات النزيف المستمر، غزارة الطمث والحمل.

احتياطات خاصة:

يحتوي هذا الدواء على بروتين الحليب، يجب أخذه بحذر عند المرضى الذين يعانون من عدم تحمل بروتينات الحليب التي قد يكون لهم تفاعل أرجي.

فيرليكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على السوربيتول، المرضى الذين يعانون من مشاكل وراثية نادرة للفركتوز لا يجب أن يأخذوا هذا الدواء.

فيرليكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على بارابين (ميتيل

Lot N°: 19019-2
 EXP: 07-2021

ل محلول للشرب.

تسمية عالمية مشتركة حديد بروتين سيكسينيلات + كالسيوم فولينانت.

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو صيدلانيك.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

2. التعريف بالمنتج :

كل قنبنة من جرعة واحدة تحتوي على :

العنصر الفعال (محلول)

بروتين سيكسينيلات الحديد 800 ملغ (ما يعادل 40 ملغ)

سواغات :

سوربيتول E 420، بروويلين غليكول، ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروويل باراهيدروكسي ملح الصوديوم، نكهة موزال، سكرين الصوديوم والماء المنقى.

العنصر الفعال (غطاء المخزون)

كالسيوم فولينات خماسي التمييه 0.235 ملغ (ما يعادل 0.185 من حمض الفوليك).

سواغ :

مانيتول E 420

سواغات ذات تأثير ملحوظ :

ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروويل باراهيدروكسي ملح الصوديوم.

3. المجموعة الصيدلانية العلاجية :

أدوية مضادة لفقر الدم، تحتوي على الحديد في تركيبة مع حامض الفوليكينك.

رمز B03AD49 : ATC

4. دواعي الاستعمال :

الوقاية و العلاج لحالات نقص الحديد وحمض الفوليك، فقر الدم ناقص الصباغ، فقر الدم الضخم الأرومات و فقر الدم الكبير الكريات عند الأطفال، ثانوي لكمية غير كافية أو نقص إمتصاص الحديد أو الفولات، فقر الدم ناتج عن الحمل، الولادة و الرضاعة الطبيعية.

5. المقادير :

الكبار: 1 إلى 2 قنبتات في اليوم وفقاً لوصفة طبيبك، مقسمة في جرعتين ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.

الأطفال : يأخذ 1.5 ملل/كغ/يوم حسب وصفة طبيبك مقسمة في جرعتين، ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.
النزاع: حلقة السلامة لمخزون الغطاء، اضغط على غطاء المخزون بشدة حتى يسحب السمحاق بالمحلول.
 حرك جيداً، اخرج غطاء المخزون ثم اشرب المحلول مباشرة أو مخففاً مع الماء.



مدة العلاج :

يجب الحفاظ على مدة العلاج بفيرليكس فول حتى استعادة احتياطي الجسم من الحديد العادي، وبالتالي فمدة العلاج ستستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر.

6. موانع الاستعمال :

- فرط الحساسية للمواد الفعالة أو أحد السواغات.
- هيموسيديريني، داء ترسب الأصبغة الدموية، فقر الدم اللاتنسجي، فقر الدم الإنحلالي أو فقر الدم الناتج عن تعذر إستعمال الحديد،
- التهاب فقر الدم الضخم الأرومات نتيجة نقص فيتامين B12 (على الأقل فيريلكس فول لا يمكن إستعماله بالإشتراك مع فيتامين B12)
- التهاب البنكرياس المزمن. تشمع الأصبغة الدموية.

7. التأثيرات الغير مرغوب فيها :

نادراً ما تحدث اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال، الإمساك، الغثيان وآلم شرشوفي وخصوصاً عند تناول جرعات عالية جداً. يمكن تقليل هذه التأثيرات الغير مرغوب فيها بخفض الجرعة أو وقف العلاج المنتجات التي تحتوي على الحديد يمكن أن تلون البراز بالأسود أو الرمادي الداكن.
 إذا لاحظت أي تأثيرات الغير مرغوب فيها غير مدرجة في هذه النشرة، أخبر طبيبك أو الصيدلاني.

8. احتياطات الإستعمال و احتياطات خاصة :

احتياطات الإستعمال:

ليس هناك حاجة إلى تحذيرات خاصة التحمل أو الإدمان. العلاج لا يجب أن يتجاوز 6 أشهر إلا في حالات النزيف المستمر. غزارة الطمث والحمل.

احتياطات خاصة:

يحتوي هذا الدواء على بروتين الحليب، يجب أخذه بحذر عند المرضى الذين يعانون من عدم تحمل بروتينات الحليب التي قد يكون لهم تفاعل أرجي.

فيرليكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على السوربيتول، المرضى الذين يعانون من مشاكل وراثية نادرة للفركتوز لا يجب أن يأخذوا هذا الدواء.

فيرليكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على بارابين (ميتيل

Lot N°: 19019-2
 EXP: 07-2021

ل محلول للشرب.

تسمية عالمية مشتركة حديد بروتين سيكسينيلات + كالسيوم فولينانت.

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو صيدلانيك.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

2. التعريف بالمنتج :

كل قنبنة من جرعة واحدة تحتوي على :

العنصر الفعال (محلول)

بروتين سيكسينيلات الحديد 800 ملغ (ما يعادل 40 ملغ)

سواغات :

سوربيتول E 420، بروويلين غليكول، ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروويل باراهيدروكسي ملح الصوديوم، نكهة موزال، سكرين الصوديوم والماء المنقى.

العنصر الفعال (غطاء المخزون)

كالسيوم فولينات خماسي التمييه 0.235 ملغ (ما يعادل 0.185 من حمض الفوليك).

سواغ :

مانيتول E 420

سواغات ذات تأثير ملحوظ :

ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروويل باراهيدروكسي ملح الصوديوم.

3. المجموعة الصيدلانية العلاجية :

أدوية مضادة لفقر الدم، تحتوي على الحديد في تركيبة مع حامض الفوليكينك.

رمز B03AD49 : ATC

4. دواعي الاستعمال :

الوقاية و العلاج لحالات نقص الحديد وحمض الفوليك، فقر الدم ناقص الصباغ، فقر الدم الضخم الأرومات و فقر الدم الكبير الكريات عند الأطفال، ثانوي لكمية غير كافية أو نقص إمتصاص الحديد أو الفولات، فقر الدم ناتج عن الحمل، الولادة و الرضاعة الطبيعية.

5. المقادير :

الكبار: 1 إلى 2 قنبتات في اليوم وفقاً لوصفة طبيبك، مقسمة في جرعتين ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.

الأطفال : يأخذ 1.5 ملل/كغ/يوم حسب وصفة طبيبك مقسمة في جرعتين، ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.
النزاع: حلقة السلامة لمخزون الغطاء، اضغط على غطاء المخزون بشدة حتى يسحب السمحاق بالمحلول.
 حرك جيداً، اخرج غطاء المخزون ثم اشرب المحلول مباشرة أو مخففاً مع الماء.



مدة العلاج :

يجب الحفاظ على مدة العلاج بفيرليكس فول حتى استعادة احتياطي الجسم من الحديد العادي، وبالتالي فمدة العلاج ستستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر.

6. موانع الاستعمال :

- فرط الحساسية للمواد الفعالة أو أحد السواغات.
- هيموسيديريني، داء ترسب الأصبغة الدموية، فقر الدم اللاتنسجي، فقر الدم الإنحلالي أو فقر الدم الناتج عن تعدد إستعمال الحديد،
- التهاب فقر الدم الضخم الأرومات نتيجة نقص فيتامين B12 (على الأقل فيريلكس فول لا يمكن إستعماله بالإشتراك مع فيتامين B12)
- التهاب البنكرياس المزمن. تشمع الأصبغة الدموية.

7. التأثيرات الغير مرغوب فيها :

نادراً ما تحدث اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال، الإمساك، الغثيان وآلم شرشوفي وخصوصاً عند تناول جرعات عالية جداً. يمكن تقليل هذه التأثيرات الغير مرغوب فيها بخفض الجرعة أو وقف العلاج المنتجات التي تحتوي على الحديد يمكن أن تلون البراز بالأسود أو الرمادي الداكن.
 إذا لاحظت أي تأثيرات الغير مرغوب فيها غير مدرجة في هذه النشرة، أخبر طبيبك أو الصيدلاني.

8. احتياطات الإستعمال و احتياطات خاصة :

احتياطات الإستعمال:

ليس هناك حاجة إلى تحذيرات خاصة التحمل أو الإدمان. العلاج لا يجب أن يتجاوز 6 أشهر إلا في حالات النزيف المستمر. غزارة الطمث والحمل.

احتياطات خاصة:

يحتوي هذا الدواء على بروتين الحليب، يجب أخذه بحذر عند المرضى الذين يعانون من عدم تحمل بروتينات الحليب التي قد يكون لهم تفاعل أرجي.

فيرليكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على السوربيتول، المرضى الذين يعانون من مشاكل وراثية نادرة للفركتوز لا يجب أن يأخذوا هذا الدواء.

فيرليكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على بارابين (ميتيل

Lot N°: 19019-2
 EXP: 07-2021

ل محلول للشرب.

تسمية عالمية مشتركة حديد بروتين سيكسينيلات + كالسيوم فولينانت.

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو صيدلانيك.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

2. التعريف بالمنتج :

كل قنبنة من جرعة واحدة تحتوي على :

العنصر الفعال (محلول)

بروتين سيكسينيلات الحديد 800 ملغ (ما يعادل 40 ملغ)

سواغات :

سوربيتول E 420، بروبييل غليكول، ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروبييل باراهيدروكسي ملح الصوديوم، نكهة موزال، سكرين الصوديوم والماء المنقى.

العنصر الفعال (غطاء المخزون)

كالسيوم فولينات خماسي التمييه 0.235 ملغ (ما يعادل 0.185 من حمض الفوليك).

سواغ :

مانيتول E 420

سواغات ذات تأثير ملحوظ :

ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروبييل باراهيدروكسي ملح الصوديوم.

3. المجموعة الصيدلانية العلاجية :

أدوية مضادة لفقر الدم، تحتوي على الحديد في تركيبة مع حامض الفوليكينك.

رمز B03AD49 : ATC

4. دواعي الاستعمال :

الوقاية و العلاج لحالات نقص الحديد وحمض الفوليك، فقر الدم ناقص الصباغ، فقر الدم الضخم الأرومات و فقر الدم الكبير الكريات عند الأطفال، ثانوي لكمية غير كافية أو نقص إمتصاص الحديد أو الفولات، فقر الدم ناتج عن الحمل، الولادة و الرضاعة الطبيعية.

5. المقادير :

الكبار: 1 إلى 2 قنبتات في اليوم وفقاً لوصفة طبيبك، مقسمة في جرعتين ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.

الأطفال : يأخذ 1.5 ملل/كغ/يوم حسب وصفة طبيبك مقسمة في جرعتين، ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.
النزاع: حلقة السلامة لمخزون الغطاء، اضغط على غطاء المخزون بشدة حتى يسحب السمحاق بالمحلول.
 حرك جيدا، **اغرق غطاء** المخزون ثم اشرب المحلول مباشرة أو مخفقا مع الماء.



مدة العلاج :

يجب الحفاظ على مدة العلاج بفيرليكس فول حتى استعادة احتياطي الجسم من الحديد العادي، وبالتالي فمدة العلاج ستستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر.

6. موانع الاستعمال :

- فرط الحساسية للمواد الفعالة أو أحد السواغات.
- هيموسيديريتي، داء ترسب الأصبغة الدموية، فقر الدم اللاتنسجي، فقر الدم الإنحلالي أو فقر الدم الناتج عن تعدد إستعمال الحديد،
- التهاب فقر الدم الضخم الأرومات نتيجة نقص فيتامين B12 (على الأقل فيريلكس فول لا يمكن إستعماله بالإشتراك مع فيتامين B12)
- التهاب البنكرياس المزمن. تشمع الأصبغة الدموية.

7. التأثيرات الغير مرغوب فيها :

نادراً ما تحدث اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال، الإمساك، الغثيان وآلم شرشوفي وخصوصاً عند تناول جرعات عالية جداً. يمكن تقليل هذه التأثيرات الغير مرغوب فيها بخفض الجرعة أو وقف العلاج المنتجات التي تحتوي على الحديد يمكن أن تلون البراز بالأسود أو الرمادي الداكن.
 إذا لاحظت أي تأثيرات الغير مرغوب فيها غير مدرجة في هذه النشرة، أخبر طبيبك أو الصيدلاني.

8. احتياطات الإستعمال و احتياطات خاصة :

احتياطات الإستعمال:

ليس هناك حاجة إلى تحذيرات خاصة التحمل أو الإدمان. العلاج لا يجب أن يتجاوز 6 أشهر إلا في حالات النزيف المستمر. غزارة الطمث والحمل.

احتياطات خاصة:

يحتوي هذا الدواء على بروتين الحليب، يجب أخذه بحذر عند المرضى الذين يعانون من عدم تحمل بروتينات الحليب التي قد يكون لهم تفاعل أرجي.

فيرليكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على السوربيتول، المرضى الذين يعانون من مشاكل وراثية نادرة للفركتوز لا يجب أن يأخذوا هذا الدواء.

فيرليكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على بارابين (ميتيل

Lot N°: 19019-2
 EXP: 07-2021

ل محلول للشرب.

تسمية عالمية مشتركة حديد بروتين سيكسينيلات + كالسيوم فولينانت.

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو صيدلانيك.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

2. التعريف بالمنتج :

كل قنبنة من جرعة واحدة تحتوي على :

العنصر الفعال (محلول)

بروتين سيكسينيلات الحديد 800 ملغ (ما يعادل 40 ملغ)

سواغات :

سوربيتول E 420، بروبولين غليكول، ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروبول باراهيدروكسي ملح الصوديوم، نكهة موزال، سكرين الصوديوم والماء المنقى.

العنصر الفعال (غطاء المخزون)

كالسيوم فولينات خماسي التمييه 0.235 ملغ (ما يعادل 0.185 من حمض الفوليك).

سواغ :

مانيتول E 420

سواغات ذات تأثير ملحوظ :

ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروبول باراهيدروكسي ملح الصوديوم.

3. المجموعة الصيدلانية العلاجية :

أدوية مضادة لفقر الدم، تحتوي على الحديد في تركيبة مع حامض الفوليكينك.

رمز B03AD49 : ATC

4. دواعي الاستعمال :

الوقاية و العلاج لحالات نقص الحديد وحمض الفوليك، فقر الدم ناقص الصباغ، فقر الدم الضخم الأرومات و فقر الدم الكبير الكريات عند الأطفال، ثانوي لكمية غير كافية أو نقص إمتصاص الحديد أو الفولات، فقر الدم ناتج عن الحمل، الولادة و الرضاعة الطبيعية.

5. المقادير :

الكبار: 1 إلى 2 قنبتات في اليوم وفقاً لوصفة طبيبك، مقسمة في جرعتين ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.

الأطفال : يأخذ 1.5 ملل/كغ/يوم حسب وصفة طبيبك مقسمة في جرعتين، ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.
النزاع: حلقة السلامة لمخزون الغطاء، اضغط على غطاء المخزون بشدة حتى يسحب السمحاق بالمحلول.
 حرك جيدا، **اغرس غطاء** المخزون ثم اشرب المحلول مباشرة أو مخففا مع الماء.



مدة العلاج :

يجب الحفاظ على مدة العلاج بفيرليكس فول حتى استعادة احتياطي الجسم من الحديد العادي، وبالتالي فمدة العلاج ستستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر.

6. موانع الاستعمال :

- فرط الحساسية للمواد الفعالة أو أحد السواغات.
- هيموسيديريني، داء ترسب الأصبغة الدموية، فقر الدم اللاتنسجي، فقر الدم الإنحلالي أو فقر الدم الناتج عن تعذر إستعمال الحديد،
- التهاب فقر الدم الضخم الأرومات نتيجة نقص فيتامين B12 (على الأقل فيريلكس فول لا يمكن إستعماله بالإشتراك مع فيتامين B12)
- التهاب البنكرياس المزمن. تشمع الأصبغة الدموية.

7. التأثيرات الغير مرغوب فيها :

نادراً ما تحدث اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال، الإمساك، الغثيان وآلم شرشوفي وخصوصاً عند تناول جرعات عالية جداً. يمكن تقليل هذه التأثيرات الغير مرغوب فيها بخفض الجرعة أو وقف العلاج المنتجات التي تحتوي على الحديد يمكن أن تلون البراز بالأسود أو الرمادي الداكن.
 إذا لاحظت أي تأثيرات الغير مرغوب فيها غير مدرجة في هذه النشرة، أخبر طبيبك أو الصيدلاني.

8. احتياطات الإستعمال و احتياطات خاصة :

احتياطات الإستعمال:

ليس هناك حاجة إلى تحذيرات خاصة التحمل أو الإدمان. العلاج لا يجب أن يتجاوز 6 أشهر إلا في حالات النزيف المستمر. غزارة الطمث والحمل.

احتياطات خاصة:

يحتوي هذا الدواء على بروتين الحليب، يجب أخذه بحذر عند المرضى الذين يعانون من عدم تحمل بروتينات الحليب التي قد يكون لهم تفاعل أرجي.

فيرليكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على السوربيتول، المرضى الذين يعانون من مشاكل وراثية نادرة للفركتوز لا يجب أن يأخذوا هذا الدواء.

فيرليكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على بارابين (ميتيل

Lot N°: 19019-2
 EXP: 07-2021

ل محلول للشرب.

تسمية عالمية مشتركة حديد بروتين سيكسينيلات + كالسيوم فولينانت.

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو صيدلانيك.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

2. التعريف بالمنتج :

كل قنبنة من جرعة واحدة تحتوي على :

العنصر الفعال (محلول)

بروتين سيكسينيلات الحديد 800 ملغ (ما يعادل 40 ملغ)

سواغات :

سوربيتول E 420، بروبولين غليكول، ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروبول باراهيدروكسي ملح الصوديوم، نكهة موزال، سكرين الصوديوم والماء المنقى.

العنصر الفعال (غطاء المخزون)

كالسيوم فولينانت خماسي التمييه 0.235 ملغ (ما يعادل 0.185 من حمض الفوليك).

سواغ :

مانيتول E 420

سواغات ذات تأثير ملحوظ :

ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروبول باراهيدروكسي ملح الصوديوم.

3. المجموعة الصيدلانية العلاجية :

أدوية مضادة لفقر الدم، تحتوي على الحديد في تركيبة مع حامض الفوليكينك.

رمز B03AD49 : ATC

4. دواعي الاستعمال :

الوقاية و العلاج لحالات نقص الحديد وحمض الفوليك، فقر الدم ناقص الصباغ، فقر الدم الضخم الأرومات و فقر الدم الكبير الكريات عند الأطفال، ثانوي لكمية غير كافية أو نقص إمتصاص الحديد أو الفولات، فقر الدم ناتج عن الحمل، الولادة و الرضاعة الطبيعية.

5. المقادير :

الكبار: 1 إلى 2 قنبتات في اليوم وفقاً لوصفة طبيبك، مقسمة في جرعتين ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.

الأطفال : يأخذ 1.5 ملل/كغ/يوم حسب وصفة طبيبك مقسمة في جرعتين، ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.
النزاع: حلقة السلامة لمخزون الغطاء، اضغط على غطاء المخزون بشدة حتى يسحب السمحاق بالمحلول.
 حرك جيداً، **اغرق غطاء المخزون ثم اشرب المحلول مباشرة أو مخففاً مع الماء.**



مدة العلاج :

يجب الحفاظ على مدة العلاج بفيرليكس فول حتى استعادة احتياطي الجسم من الحديد العادي، وبالتالي فمدة العلاج ستستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر.

6. موانع الاستعمال :

- فرط الحساسية للمواد الفعالة أو أحد السواغات.
- هيموسيديريتي، داء ترسب الأصبغة الدموية، فقر الدم اللاتنسجي، فقر الدم الإنحلالي أو فقر الدم الناتج عن تعدد إستعمال الحديد،
- التهاب فقر الدم الضخم الأرومات نتيجة نقص فيتامين B12 (على الأقل فيريلكس فول لا يمكن إستعماله بالإشتراك مع فيتامين B12)
- التهاب البنكرياس المزمن. تشمع الأصبغة الدموية.

7. التأثيرات الغير مرغوب فيها :

نادراً ما تحدث اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال، الإمساك، الغثيان وآلم شرشوفي وخصوصاً عند تناول جرعات عالية جداً. يمكن تقليل هذه التأثيرات الغير مرغوب فيها بخفض الجرعة أو وقف العلاج المنتجات التي تحتوي على الحديد يمكن أن تلون البراز بالأسود أو الرمادي الداكن.
 إذا لاحظت أي تأثيرات الغير مرغوب فيها غير مدرجة في هذه النشرة، أخبر طبيبك أو الصيدلاني.

8. احتياطات الإستعمال و احتياطات خاصة :

احتياطات الإستعمال:

ليس هناك حاجة إلى تحذيرات خاصة التحمل أو الإدمان. العلاج لا يجب أن يتجاوز 6 أشهر إلا في حالات النزيف المستمر. غزارة الطمث والحمل.

احتياطات خاصة:

يحتوي هذا الدواء على بروتين الحليب، يجب أخذه بحذر عند المرضى الذين يعانون من عدم تحمل بروتينات الحليب التي قد يكون لهم تفاعل أرجي.

فيرليكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على السوربيتول، المرضى الذين يعانون من مشاكل وراثية نادرة للفركتوز لا يجب أن يأخذوا هذا الدواء.

فيرليكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على بارابين (ميتيل

Lot N°: 19019-2
 EXP: 07-2021

ل محلول للشرب.

تسمية عالمية مشتركة حديد بروتين سيكسينيلات + كالسيوم فولينانت.

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو صيدلانيك.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

2. التعريف بالمنتج :

كل قنبنة من جرعة واحدة تحتوي على :

العنصر الفعال (محلول)

بروتين سيكسينيلات الحديد 800 ملغ (ما يعادل 40 ملغ)

سواغات :

سوربيتول E 420، بروويلين غليكول، ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروويل باراهيدروكسي ملح الصوديوم، نكهة موزال، سكرين الصوديوم والماء المنقى.

العنصر الفعال (غطاء المخزون)

كالسيوم فولينات خماسي التمييه 0.235 ملغ (ما يعادل 0.185 من حمض الفوليك).

سواغ :

مانيتول E 420

سواغات ذات تأثير ملحوظ :

ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروويل باراهيدروكسي ملح الصوديوم.

3. المجموعة الصيدلانية العلاجية :

أدوية مضادة لفقر الدم، تحتوي على الحديد في تركيبة مع حامض الفوليكينك.

رمز B03AD49 : ATC

4. دواعي الإستعمال :

الوقاية و العلاج لحالات نقص الحديد وحمض الفوليك، فقر الدم ناقص الصباغ، فقر الدم الضخم الأرومات و فقر الدم الكبير الكريات عند الأطفال، ثانوي لكمية غير كافية أو نقص إمتصاص الحديد أو الفولات، فقر الدم ناتج عن الحمل، الولادة و الرضاعة الطبيعية.

5. المقادير :

الكبار: 1 إلى 2 قنبتات في اليوم وفقاً لوصفة طبيبك، مقسمة في جرعتين ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.

الأطفال : يأخذ 1.5 ملل/كغ/يوم حسب وصفة طبيبك مقسمة في جرعتين، ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.
النزاع: حلقة السلامة لمخزون الغطاء، اضغط على غطاء المخزون بشدة حتى يسحب السمحاق بالمحلول.
 حرك جيداً، اخرج غطاء المخزون ثم اشرب المحلول مباشرة أو مخففاً مع الماء.



مدة العلاج :

يجب الحفاظ على مدة العلاج بفيرليكس فول حتى استعادة احتياطي الجسم من الحديد العادي، وبالتالي فمدة العلاج ستستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر.

6. موانع الاستعمال :

- فرط الحساسية للمواد الفعالة أو أحد السواغات.
- هيموسيديريني، داء ترسب الأصبغة الدموية، فقر الدم اللاتنسجي، فقر الدم الإنحلالي أو فقر الدم الناتج عن تعذر إستعمال الحديد،
- التهاب فقر الدم الضخم الأرومات نتيجة نقص فيتامين B12 (على الأقل فيريلكس فول لا يمكن إستعماله بالإشتراك مع فيتامين B12)
- التهاب البنكرياس المزمن. تشمع الأصبغة الدموية.

7. التأثيرات الغير مرغوب فيها :

نادراً ما تحدث اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال، الإمساك، الغثيان وآلم شرشوفي وخصوصاً عند تناول جرعات عالية جداً. يمكن تقليل هذه التأثيرات الغير مرغوب فيها بخفض الجرعة أو وقف العلاج المنتجات التي تحتوي على الحديد يمكن أن تلون البراز بالأسود أو الرمادي الداكن.
 إذا لاحظت أي تأثيرات الغير مرغوب فيها غير مدرجة في هذه النشرة، أخبر طبيبك أو الصيدلاني.

8. احتياطات الإستعمال و احتياطات خاصة :

احتياطات الإستعمال:

ليس هناك حاجة إلى تحذيرات خاصة التحمل أو الإدمان. العلاج لا يجب أن يتجاوز 6 أشهر إلا في حالات النزيف المستمر. غزارة الطمث والحمل.

احتياطات خاصة:

يحتوي هذا الدواء على بروتين الحليب، يجب أخذه بحذر عند المرضى الذين يعانون من عدم تحمل بروتينات الحليب التي قد يكون لهم تفاعل أرجي.

فيرليكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على السوربيتول، المرضى الذين يعانون من مشاكل وراثية نادرة للفركتوز لا يجب أن يأخذوا هذا الدواء.

فيرليكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على بارابين (ميتيل

Lot N°: 19019-2
 EXP: 07-2021

ل محلول للشرب.

تسمية عالمية مشتركة حديد بروتين سيكسينيلات + كالسيوم فولينانت.

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو صيدلانيك.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

2. التعريف بالمنتج :

كل قنبنة من جرعة واحدة تحتوي على :

العنصر الفعال (محلول)

بروتين سيكسينيلات الحديد 800 ملغ (ما يعادل 40 ملغ)

سواغات :

سوربيتول E 420، بروبولين غليكول، ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروبول باراهيدروكسي ملح الصوديوم، نكهة موزال، سكرين الصوديوم والماء المنقى.

العنصر الفعال (غطاء المخزون)

كالسيوم فولينات خماسي التمييه 0.235 ملغ (ما يعادل 0.185 من حمض الفوليك).

سواغ :

مانيتول E 420

سواغات ذات تأثير ملحوظ :

ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروبول باراهيدروكسي ملح الصوديوم.

3. المجموعة الصيدلانية العلاجية :

أدوية مضادة لفقر الدم، تحتوي على الحديد في تركيبة مع حامض الفوليكينك.

رمز B03AD49 : ATC

4. دواعي الاستعمال :

الوقاية و العلاج لحالات نقص الحديد وحمض الفوليك، فقر الدم ناقص الصباغ، فقر الدم الضخم الأرومات و فقر الدم الكبير الكريات عند الأطفال، ثانوي لكمية غير كافية أو نقص إمتصاص الحديد أو الفولات، فقر الدم ناتج عن الحمل، الولادة و الرضاعة الطبيعية.

5. المقادير :

الكبار: 1 إلى 2 قنبتات في اليوم وفقاً لوصفة طبيبك، مقسمة في جرعتين ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.

الأطفال : يأخذ 1.5 ملل/كغ/يوم حسب وصفة طبيبك مقسمة في جرعتين، ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.
النزاع: حلقة السلامة لمخزون الغطاء، اضغط على غطاء المخزون بشدة حتى يسحب السمحاق بالمحلول.
 حرك جيداً، اخرج غطاء المخزون ثم اشرب المحلول مباشرة أو مخففاً مع الماء.



مدة العلاج :

يجب الحفاظ على مدة العلاج بفيرليكس فول حتى استعادة احتياطي الجسم من الحديد العادي، وبالتالي فمدة العلاج ستستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر.

6. موانع الاستعمال :

- فرط الحساسية للمواد الفعالة أو أحد السواغات.
- هيموسيديريني، داء ترسب الأصبغة الدموية، فقر الدم اللاتنسجي، فقر الدم الإنحلالي أو فقر الدم الناتج عن تعذر إستعمال الحديد،
- التهاب فقر الدم الضخم الأرومات نتيجة نقص فيتامين B12 (على الأقل فيريلكس فول لا يمكن إستعماله بالإشتراك مع فيتامين B12)
- التهاب البنكرياس المزمن. تشمع الأصبغة الدموية.

7. التأثيرات الغير مرغوب فيها :

نادراً ما تحدث اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال، الإمساك، الغثيان وآلم شرشوفي وخصوصاً عند تناول جرعات عالية جداً. يمكن تقليل هذه التأثيرات الغير مرغوب فيها بخفض الجرعة أو وقف العلاج المنتجات التي تحتوي على الحديد يمكن أن تلون البراز بالأسود أو الرمادي الداكن. إذا لاحظت أي تأثيرات الغير مرغوب فيها غير مدرجة في هذه النشرة، أخبر طبيبك أو الصيدلاني.

8. احتياطات الإستعمال و احتياطات خاصة :

احتياطات الإستعمال:

ليس هناك حاجة إلى تحذيرات خاصة التحمل أو الإدمان. العلاج لا يجب أن يتجاوز 6 أشهر إلا في حالات النزيف المستمر. غزارة الطمث والحمل.

احتياطات خاصة:

يحتوي هذا الدواء على بروتين الحليب، يجب أخذه بحذر عند المرضى الذين يعانون من عدم تحمل بروتينات الحليب التي قد يكون لهم تفاعل أرجي. فيريلكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على السوربيتول، المرضى الذين يعانون من مشاكل وراثية نادرة للفركتوز لا يجب أن يأخذوا هذا الدواء. فيريلكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على بارابين (ميتيل

Lot N°: 19019-2
 EXP: 07-2021

ل محلول للشرب.

تسمية عالمية مشتركة حديد بروتين سيكسينيلات + كالسيوم فولينانت.

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو صيدلانيك.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

2. التعريف بالمنتج :

كل قنبنة من جرعة واحدة تحتوي على :

العنصر الفعال (محلول)

بروتين سيكسينيلات الحديد 800 ملغ (ما يعادل 40 ملغ)

سواغات :

سوربيتول E 420، بروبولين غليكول، ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروبول باراهيدروكسي ملح الصوديوم، نكهة موزال، سكرين الصوديوم والماء المنقى.

العنصر الفعال (غطاء المخزون)

كالسيوم فولينات خماسي التمييه 0.235 ملغ (ما يعادل 0.185 من حمض الفوليك).

سواغ :

مانيتول E 420

سواغات ذات تأثير ملحوظ :

ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروبول باراهيدروكسي ملح الصوديوم.

3. المجموعة الصيدلانية العلاجية :

أدوية مضادة لفقر الدم، تحتوي على الحديد في تركيبة مع حامض الفوليكينك.

رمز B03AD49 : ATC

4. دواعي الإستعمال :

الوقاية و العلاج لحالات نقص الحديد وحمض الفوليك، فقر الدم ناقص الصباغ، فقر الدم الضخم الأرومات و فقر الدم الكبير الكريات عند الأطفال، ثانوي لكمية غير كافية أو نقص إمتصاص الحديد أو الفولات، فقر الدم ناتج عن الحمل، الولادة و الرضاعة الطبيعية.

5. المقادير :

الكبار: 1 إلى 2 قنبتات في اليوم وفقاً لوصفة طبيبك، مقسمة في جرعتين ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.

الأطفال : يأخذ 1.5 ملل/كغ/يوم حسب وصفة طبيبك مقسمة في جرعتين، ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.
النزاع: حلقة السلامة لمخزون الغطاء، اضغط على غطاء المخزون بشدة حتى يسحب السمحاق بالمحلول.
 حرك جيداً، اخرج غطاء المخزون ثم اشرب المحلول مباشرة أو مخففاً مع الماء.



مدة العلاج :

يجب الحفاظ على مدة العلاج بفيرليكس فول حتى استعادة احتياطي الجسم من الحديد العادي، وبالتالي فمدة العلاج ستستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر.

6. موانع الاستعمال :

- فرط الحساسية للمواد الفعالة أو أحد السواغات.
- هيموسيديريني، داء ترسب الأصبغة الدموية، فقر الدم اللاتنسجي، فقر الدم الإنحلالي أو فقر الدم الناتج عن تعدد إستعمال الحديد،
- التهاب فقر الدم الضخم الأرومات نتيجة نقص فيتامين B12 (على الأقل فيريلكس فول لا يمكن إستعماله بالإشتراك مع فيتامين B12)
- التهاب البنكرياس المزمن. تشمع الأصبغة الدموية.

7. التأثيرات الغير مرغوب فيها :

نادراً ما تحدث اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال، الإمساك، الغثيان وآلم شرشوفي وخصوصاً عند تناول جرعات عالية جداً. يمكن تقليل هذه التأثيرات الغير مرغوب فيها بخفض الجرعة أو وقف العلاج المنتجات التي تحتوي على الحديد يمكن أن تلوث البراز بالأسود أو الرمادي الداكن. إذا لاحظت أي تأثيرات الغير مرغوب فيها غير مدرجة في هذه النشرة، أخبر طبيبك أو الصيدلاني.

8. احتياطات الإستعمال و احتياطات خاصة :

احتياطات الإستعمال:

ليس هناك حاجة إلى تحذيرات خاصة التحمل أو الإدمان. العلاج لا يجب أن يتجاوز 6 أشهر إلا في حالات النزيف المستمر. غزارة الطمث والحمل.

احتياطات خاصة:

يحتوي هذا الدواء على بروتين الحليب، يجب أخذه بحذر عند المرضى الذين يعانون من عدم تحمل بروتينات الحليب التي قد يكون لهم تفاعل أرجي.

فيرليكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على السوربيتول، المرضى الذين يعانون من مشاكل وراثية نادرة للفركتوز لا يجب أن يأخذوا هذا الدواء.

فيرليكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على بارابين (ميتيل

Lot N°: 19019-2
EXP: 07-2021

ل محلول للشرب.

تسمية عالمية مشتركة حديد بروتين سيكسينيلات + كالسيوم فولينانت.

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو صيدلانيك.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

2. التعريف بالمنتج :

كل قنبنة من جرعة واحدة تحتوي على :

العنصر الفعال (محلول)

بروتين سيكسينيلات الحديد 800 ملغ (ما يعادل 40 ملغ)

سواغات :

سوربيتول E 420، بروبولين غليكول، ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروبول باراهيدروكسي ملح الصوديوم، نكهة موزال، سكرين الصوديوم والماء المنقى.

العنصر الفعال (غطاء المخزون)

كالسيوم فولينات خماسي التمييه 0.235 ملغ (ما يعادل 0.185 من حمض الفوليك).

سواغ :

مانيتول E 420

سواغات ذات تأثير ملحوظ :

ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروبول باراهيدروكسي ملح الصوديوم.

3. المجموعة الصيدلانية العلاجية :

أدوية مضادة لفقر الدم، تحتوي على الحديد في تركيبة مع حامض الفوليكينك.

رمز B03AD49 : ATC

4. دواعي الاستعمال :

الوقاية و العلاج لحالات نقص الحديد وحمض الفوليك، فقر الدم ناقص الصباغ، فقر الدم الضخم الأرومات و فقر الدم الكبير الكريات عند الأطفال، ثانوي لكمية غير كافية أو نقص إمتصاص الحديد أو الفولات، فقر الدم ناتج عن الحمل، الولادة و الرضاعة الطبيعية.

5. المقادير :

الكبار: 1 إلى 2 قنبتات في اليوم وفقاً لوصفة طبيبك، مقسمة في جرعتين ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.

الأطفال : يأخذ 1.5 ملل/كغ/يوم حسب وصفة طبيبك مقسمة في جرعتين، ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.
النزاع: حلقة السلامة لمخزون الغطاء، اضغط على غطاء المخزون بشدة حتى يسحب السمحاق بالمحلول.
 حرك جيداً، اخرج غطاء المخزون ثم اشرب المحلول مباشرة أو مخففاً مع الماء.



مدة العلاج :

يجب الحفاظ على مدة العلاج بفيرليكس فول حتى استعادة احتياطي الجسم من الحديد العادي، وبالتالي فمدة العلاج ستستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر.

6. موانع الاستعمال :

- فرط الحساسية للمواد الفعالة أو أحد السواغات.
- هيموسيديريني، داء ترسب الأصبغة الدموية، فقر الدم اللاتنسجي، فقر الدم الإنحلالي أو فقر الدم الناتج عن تعدد إستعمال الحديد،
- التهاب فقر الدم الضخم الأرومات نتيجة نقص فيتامين B12 (على الأقل فيريلكس فول لا يمكن إستعماله بالإشتراك مع فيتامين B12)
- التهاب البنكرياس المزمن. تشمع الأصبغة الدموية.

7. التأثيرات الغير مرغوب فيها :

نادراً ما تحدث اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال، الإمساك، الغثيان وآلم شرشوفي وخصوصاً عند تناول جرعات عالية جداً. يمكن تقليل هذه التأثيرات الغير مرغوب فيها بخفض الجرعة أو وقف العلاج المنتجات التي تحتوي على الحديد يمكن أن تلون البراز بالأسود أو الرمادي الداكن.
 إذا لاحظت أي تأثيرات الغير مرغوب فيها غير مدرجة في هذه النشرة، أخبر طبيبك أو الصيدلاني.

8. احتياطات الإستعمال و احتياطات خاصة :

احتياطات الإستعمال:

ليس هناك حاجة إلى تحذيرات خاصة التحمل أو الإدمان. العلاج لا يجب أن يتجاوز 6 أشهر إلا في حالات النزيف المستمر. غزارة الطمث والحمل.

احتياطات خاصة:

يحتوي هذا الدواء على بروتين الحليب، يجب أخذه بحذر عند المرضى الذين يعانون من عدم تحمل بروتينات الحليب التي قد يكون لهم تفاعل أرجي.

فيرليكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على السوربيتول، المرضى الذين يعانون من مشاكل وراثية نادرة للفركتوز لا يجب أن يأخذوا هذا الدواء.

فيرليكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على بارابين (ميتيل

Lot N°: 19019-2
 EXP: 07-2021

ل محلول للشرب.

تسمية عالمية مشتركة حديد بروتين سيكسينيلات + كالسيوم فولينانت.

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو صيدلانيك.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

2. التعريف بالمنتج :

كل قنبنة من جرعة واحدة تحتوي على :

العنصر الفعال (محلول)

بروتين سيكسينيلات الحديد 800 ملغ (ما يعادل 40 ملغ)

سواغات :

سوربيتول E 420، بروويلين غليكول، ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروويل باراهيدروكسي ملح الصوديوم، نكهة موزال، سكرين الصوديوم والماء المنقى.

العنصر الفعال (غطاء المخزون)

كالسيوم فولينات خماسي التمييه 0.235 ملغ (ما يعادل 0.185 من حمض الفوليك).

سواغ :

مانيتول E 420

سواغات ذات تأثير ملحوظ :

ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروويل باراهيدروكسي ملح الصوديوم.

3. المجموعة الصيدلانية العلاجية :

أدوية مضادة لفقر الدم، تحتوي على الحديد في تركيبة مع حامض الفوليكينك.

رمز B03AD49 : ATC

4. دواعي الاستعمال :

الوقاية و العلاج لحالات نقص الحديد وحمض الفوليك، فقر الدم ناقص الصباغ، فقر الدم الضخم الأرومات و فقر الدم الكبير الكريات عند الأطفال، ثانوي لكمية غير كافية أو نقص إمتصاص الحديد أو الفولات، فقر الدم ناتج عن الحمل، الولادة و الرضاعة الطبيعية.

5. المقادير :

الكبار: 1 إلى 2 قنبتات في اليوم وفقاً لوصفة طبيبك، مقسمة في جرعتين ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.

الأطفال : يأخذ 1.5 ملل/كغ/يوم حسب وصفة طبيبك مقسمة في جرعتين، ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.
النزاع: حلقة السلامة لمخزون الغطاء، اضغط على غطاء المخزون بشدة حتى يسحب السمحاق بالمحلول.
 حرك جيداً، اخرج غطاء المخزون ثم اشرب المحلول مباشرة أو مخففاً مع الماء.



مدة العلاج :

يجب الحفاظ على مدة العلاج بفيرليكس فول حتى استعادة احتياطي الجسم من الحديد العادي، وبالتالي فمدة العلاج ستستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر.

6. موانع الاستعمال :

- فرط الحساسية للمواد الفعالة أو أحد السواغات.
- هيموسيديريني، داء ترسب الأصبغة الدموية، فقر الدم اللاتنسجي، فقر الدم الإنحلالي أو فقر الدم الناتج عن تعدد إستعمال الحديد،
- التهاب فقر الدم الضخم الأرومات نتيجة نقص فيتامين B12 (على الأقل فيريلكس فول لا يمكن إستعماله بالإشتراك مع فيتامين B12)
- التهاب البنكرياس المزمن. تشمع الأصبغة الدموية.

7. التأثيرات الغير مرغوب فيها :

نادراً ما تحدث اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال، الإمساك، الغثيان وآلم شرشوفي وخصوصاً عند تناول جرعات عالية جداً. يمكن تقليل هذه التأثيرات الغير مرغوب فيها بخفض الجرعة أو وقف العلاج المنتجات التي تحتوي على الحديد يمكن أن تلون البراز بالأسود أو الرمادي الداكن.
 إذا لاحظت أي تأثيرات الغير مرغوب فيها غير مدرجة في هذه النشرة، أخبر طبيبك أو الصيدلاني.

8. احتياطات الإستعمال و احتياطات خاصة :

احتياطات الإستعمال:

ليس هناك حاجة إلى تحذيرات خاصة التحمل أو الإدمان. العلاج لا يجب أن يتجاوز 6 أشهر إلا في حالات النزيف المستمر. غزارة الطمث والحمل.

احتياطات خاصة:

يحتوي هذا الدواء على بروتين الحليب، يجب أخذه بحذر عند المرضى الذين يعانون من عدم تحمل بروتينات الحليب التي قد يكون لهم تفاعل أرجي.
 فيريلكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على السوربيتول، المرضى الذين يعانون من مشاكل وراثية نادرة للفركتوز لا يجب أن يأخذوا هذا الدواء.
 فيريلكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على بارابين (ميتيل

Lot N°: 19019-2
 EXP: 07-2021

ل محلول للشرب.

تسمية عالمية مشتركة حديد بروتين سيكسينيلات + كالسيوم فولينانت.

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو صيدلانيك.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

2. التعريف بالمنتج :

كل قنبنة من جرعة واحدة تحتوي على :

العنصر الفعال (محلول)

بروتين سيكسينيلات الحديد 800 ملغ (ما يعادل 40 ملغ)

سواغات :

سوربيتول E 420، بروبولين غليكول، ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروبول باراهيدروكسي ملح الصوديوم، نكهة موزال، سكرين الصوديوم والماء المنقى.

العنصر الفعال (غطاء المخزون)

كالسيوم فولينات خماسي التمييه 0.235 ملغ (ما يعادل 0.185 من حمض الفوليك).

سواغ :

مانيتول E 420

سواغات ذات تأثير ملحوظ :

ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروبول باراهيدروكسي ملح الصوديوم.

3. المجموعة الصيدلانية العلاجية :

أدوية مضادة لفقر الدم، تحتوي على الحديد في تركيبة مع حامض الفوليكينك.

رمز ATC: B03AD49

4. دواعي الاستعمال :

الوقاية و العلاج لحالات نقص الحديد وحمض الفوليك، فقر الدم ناقص الصباغ، فقر الدم الضخم الأرومات و فقر الدم الكبير الكريات عند الأطفال، ثانوي لكمية غير كافية أو نقص إمتصاص الحديد أو الفولات، فقر الدم ناتج عن الحمل، الولادة و الرضاعة الطبيعية.

5. المقادير :

الكبار: 1 إلى 2 قنبتات في اليوم وفقاً لوصفة طبيبك، مقسمة في جرعتين ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.

الأطفال : يأخذ 1.5 ملل/كغ/يوم حسب وصفة طبيبك مقسمة في جرعتين، ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.
النزاع: حلقة السلامة لمخزون الغطاء، اضغط على غطاء المخزون بشدة حتى يسحب السمحاق بالمحلول.
 حرك جيداً، اخرج غطاء المخزون ثم اشرب المحلول مباشرة أو مخففاً مع الماء.



مدة العلاج :

يجب الحفاظ على مدة العلاج بفيرليكس فول حتى استعادة احتياطي الجسم من الحديد العادي، وبالتالي فمدة العلاج ستستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر.

6. موانع الاستعمال :

- فرط الحساسية للمواد الفعالة أو أحد السواغات.
- هيموسيديريني، داء ترسب الأصبغة الدموية، فقر الدم اللاتنسجي، فقر الدم الإنحلالي أو فقر الدم الناتج عن تعذر إستعمال الحديد،
- التهاب فقر الدم الضخم الأرومات نتيجة نقص فيتامين B12 (على الأقل فيريلكس فول لا يمكن إستعماله بالإشتراك مع فيتامين B12)
- التهاب البنكرياس المزمن. تشمع الأصبغة الدموية.

7. التأثيرات الغير مرغوب فيها :

نادراً ما تحدث اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال، الإمساك، الغثيان وآلم شرشوفي وخصوصاً عند تناول جرعات عالية جداً. يمكن تقليل هذه التأثيرات الغير مرغوب فيها بخفض الجرعة أو وقف العلاج المنتجات التي تحتوي على الحديد يمكن أن تلون البراز بالأسود أو الرمادي الداكن.
 إذا لاحظت أي تأثيرات الغير مرغوب فيها غير مدرجة في هذه النشرة، أخبر طبيبك أو الصيدلاني.

8. احتياطات الإستعمال و احتياطات خاصة :

احتياطات الإستعمال:

ليس هناك حاجة إلى تحذيرات خاصة التحمل أو الإدمان. العلاج لا يجب أن يتجاوز 6 أشهر إلا في حالات النزيف المستمر، غزارة الطمث والحمل.

احتياطات خاصة:

يحتوي هذا الدواء على بروتين الحليب، يجب أخذه بحذر عند المرضى الذين يعانون من عدم تحمل بروتينات الحليب التي قد يكون لهم تفاعل أرجي.

فيرليكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على السوربيتول، المرضى الذين يعانون من مشاكل وراثية نادرة للفركتوز لا يجب أن يأخذوا هذا الدواء.

فيرليكس فول قنبنة أحادية الجرعة تحتوي على بارابين (ميتيل

Lot N°: 19019-2
 EXP: 07-2021

ل محلول للشرب.

تسمية عالمية مشتركة حديد بروتين سيكسينيلات + كالسيوم فولينانت.

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو صيدلانيك.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصياً. لا تناوله شخصاً آخر أبداً ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

2. التعريف بالمنتج :

كل قنبنة من جرعة واحدة تحتوي على :

العنصر الفعال (محلول)

بروتين سيكسينيلات الحديد 800 ملغ (ما يعادل 40 ملغ)

سواغات :

سوربيتول E 420، بروويلين غليكول، ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروويل باراهيدروكسي ملح الصوديوم، نكهة موزال، سكرين الصوديوم والماء المنقى.

العنصر الفعال (غطاء المخزون)

كالسيوم فولينانت خماسي التمييه 0.235 ملغ (ما يعادل 0.185 من حمض الفوليك).

سواغ :

مانيتول E 420

سواغات ذات تأثير ملحوظ :

ميتيل باراهيدروكسي بنزوات ملح الصوديوم، بروويل باراهيدروكسي ملح الصوديوم.

3. المجموعة الصيدلانية العلاجية :

أدوية مضادة لفقر الدم، تحتوي على الحديد في تركيبة مع حامض الفوليكينك.

رمز B03AD49 : ATC

4. دواعي الإستعمال :

الوقاية و العلاج لحالات نقص الحديد وحمض الفوليك، فقر الدم ناقص الصباغ، فقر الدم الضخم الأرومات و فقر الدم الكبير الكريات عند الأطفال، ثانوي لكمية غير كافية أو نقص إمتصاص الحديد أو الفولات، فقر الدم ناتج عن الحمل، الولادة و الرضاعة الطبيعية.

5. المقادير :

الكبار: 1 إلى 2 قنبتات في اليوم وفقاً لوصفة طبيبك، مقسمة في جرعتين ويفضل أخذه قبل وجبة الطعام.