

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| ■ Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| ■ Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| ■ Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W19-477523

N° = 20475

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 9952

Société : RSM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : Fouïna Hafid

Date de naissance : 21/03/1972

Adresse : 78, Rue M.Fay el Nouria Berrechid

Tél. : 066 444 3586

Total des frais engagés Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 27/12/2018

Nom et prénom du malade : Landam

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous plconfidential à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.


J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Signature de l'adhérent(e) :

Le : 27/12/2018

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Frais
23/10/19 Contrôle			gratuit	<p>Dr. KHADIDJA MOHAMED SALLAL INP 1. Bd Med 1<sup>er</sup> Etage, Bureau N°16 BERRECHID Tél: 05 22 32 83 03-05 22 32 83 33</p>

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	27/12/19	169.20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

**Dr. KHADRE MOHAMED FOUAD**

**Cardiologue**

Lauréat de la faculté de médecine de Casablanca

Ancien Médecin à l'hôpital Cheikh Khalifa de Casablanca

Ancien Médecin praticien à Klinikum Lüdenscheid Allemagne

Diplômé en Echocardiographie Doppler de l'université Bordeaux II



**د. خضر محمد فؤاد**

أخصائي أمراض القلب والشرايين

خريج كلية الطب بالدار البيضاء

طبيب سلامة مستشفى الشيخ زايد بالدار البيضاء

طبيب سلامة مستشفى لوديشاند بالمقابلين

حاصل على شهادة الفحص بالصكوك من جامعة بوردو بفرنسا

## **Ordonnance**

Berrechid, le : .....

Berrechid le : **27 Décembre 2019**

**Mme FOUINA HAYAT**

1/ REGIME PAUVRE EN SEL

*18 v. 90*

2/ SULIAT 160/5 MG

*84100* 1 Cp/J matin à jeun

3/ THERAMAG

1 gel/J le soir

4/ BELMAZOL 20MG

1 gel/J le soir

Traitement pendant : 3 Mois



DR KHADRE MOHAMED FOUD  
CARDIOLOGUE  
11 - Bd Med V 1<sup>er</sup> Etage, Bureau N°15 BERRECHID  
Tél: 05.22.32.83.03-05.22.32.83.33

Lot :  
A consommer de  
préférence avant le :  
PPC : 84,00 DH



R6



# تيراماك

الشكل والتقديم :

كبسولة، علبة 30 كبسولة.

الخصائص :

تيراماك® B6 يحتوي على مغنتزيوم من أصل بحري وفيتامين B6.

تيراماك® B6 يساعد على تحسين الوظائف العصبية والعضلية، بتلبية 100% من الاحتياجات اليومية.

تيراماك® B6 يساهم في الحد من التعب الجسدي والنفسي (نرفة، عصبية، توتر، إرهاق، صعوبة في النوم والتركيز) كما يساهم في الحفاظ على وظائف العضلات (قد يؤدي نقص المغنتزيوم إلى حدوث تشنجات عضلية وتنمّلات).

نصائح الإستعمال :

كبسولة واحدة (1) في اليوم، مع كوب كبير من الماء.

احتياطات الإستعمال :

- إحترام الكمية المنشوحة بها.
- يوضع بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.
- يستعمل كمكمل لتغذية متنوعة.
- يحفظ بعيداً عن الرطوبة والحرارة.

مكمل غذائي ليس بدواء

صنع من طرف مختبر أدب - فوكريس - فرنسا.  
مستورد إلى المغرب من طرف طيرافارم.

رخصة وزارة الصحة رقم : DA20171710550DMP/20UCA/v1

رخصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية رقم : ES.5.230.16

SULIAT® 160 mg / 5 mg  
28 comprimés pelliculés



6 118000 072409

LOT 197086  
EXP 06/22  
PPV 185DH20

د. كيف يستعمل سوليات؟  
تحل محلات الاستعمال الآسيوية  
يجب أخذ هذا الدواء باتباع إرشادات  
الجرعة طريقة تردد أخذ الدواء  
الطريقة ونوعية الاستعمال  
يؤخذ هذا الدواء عن طريق الفم في  
تناول الأقراص بأكملها مع كوب من  
الماء  
يمكنك أن تأخذ سوليات طوال دار  
الجرعة تردد أخذ الدواء ومدة العلاج  
الجرعة المعتادة من سوليات هي قرص واحد في اليوم  
• الشخص المعنوس أكثر من 65 سنة سأخذ طبتك الاحتياطات اللازمة عند رفع الجرعة  
• احتراز عن الجرعة الموصوفة  
اعتماداً على طريقة استجابتكم للعلاج قد يقترح الطبيب درجة أعلى أو درجة  
جرعة أدنى وهذا يختلف من أفالازتان وأموديبين يعذر أن تسبب التناقض في ضغط الدم مع دوحة توسيع الأوعية المحيطية وربما عدم  
النظام في دقات القلب  
إذا أخذت جرعة زائدة من أفالازتان، أذكر مما يجب أخبار طببك أو الصيدلي على الفور  
• الاحتياطات الضرورية في حال تناول أفالازتان  
إذا تسببت أفالازتان في ارتفاع درجة حرارة جسمك  
إذا نسبت لذك درجة حرارة جسمك اكتظافاً بالعرق انتداباً ملتصقاً بالجلد  
فقط  
قم بأخذ القرص في الوقت المعتاد  
• لا تأخذ جرعة مضاعفة أفرزرين دفعه واحدة فيعطي العرضة المنسنة  
إذا كان لديك اسلنة حول أسفل جسمك اطلب طببك أو الصيدلي  
إرشادات عند الحاجة متغيرة بخط الالتباس  
إذا توقفت عن أفالازتان  
وقف العلاج سوليات قد يتسبب في تفاقم حالتك  
إلا تتوقف عن تناول هذا الدواء إذا لاحظ طببك بذلك  
• ما هي الآثار الجانبية المترتبة؟  
مثل جميع الأدوية، هذه الدواء يمكن أن يتسبب في آثار جانبية، على الرغم من أن الجميع غير معرض لهذه الآثار  
الآثار الجانبية الشائعة وردت بشكل متعدد ذو أهمية أو بشكل خاص مع شراكة فالازتان، أموديبين  
يمكن أن تكون بعض الآثار الجانبية خطيرة وتحتاج لشراف طبي فوري راجع الطبيب فوراً إذا كنت تواجه أي من الآثار الجانبية  
الاتية، بعد تناول بعض العرضة المنسنة  
الاتية، بعد تناول بعض العرضة المنسنة  
يتسبب العرض المرضي قد يتراوح بين هذه الآثار الجانبية الشديدة واللتين قد تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من 1000 شخص  
إذا ظهرت لديك أي من هذه الآثار، اطلب طببك فوراً  
إذا فعلت نفسك قد تظهر عوارض مثل طفح جلدي، حكة، تورم في الوجه أو الشفتين أو اللسان، صعوبة في التنفس، انخفاض  
ضغط الدم الشديد، الشعور بالدوار، الدizziness، الشعور بالغثيان، القيء، القيء، القيء، القيء، القيء،  
الآثار الجانبية الأخرى المترتبة تؤثر على أقل من شخص واحد من 10 أشخاص، الشكاوى اتسداد الأنف، التهاب الحلق وعدم الرادة  
أثناء النوم، صداع، تورم الدراجين، الهدوء، الهدوء، الهدوء، الهدوء، الهدوء، الهدوء، الهدوء،  
أو الرقيقة،  
الآثار الجانبية قليلة التردد تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من 100 شخص، الدوخة، الغثيان، والآلام في البطن، حفاف الفم،  
الآلام، وخدر أو درد الدین، والدوخة، تسارع ضربات القلب، بما في ذلك المفتقان، الآيسان بالدوحة عند الموقف، السعال،  
السعال، الإمساك، طفح جلدي، احمرار في الوجه، تورم المفاصل، الالم، الظهير، الملم، المفتقان،  
الآثار الجانبية الشديدة تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من 1000 شخص، الشعور بالقلق، الشعور بالقلق، الشعور بالقلق،  
على التبول أكثر من المعتاد أو الشعور بألم الحساسية، الشعور بالقلق، الشعور بالقلق، الشعور بالقلق،  
وانتفاخ العضلات،  
تشنجات العضلات،  
إذا كنت تعاني من هذه الآثار في سكلها الحاد، يرجى إلغاء الطبيب  
الآثار الجانبية المدورة مع الأموديبين ودوده أو فالازتان وددها والغير الملاحة مع المزيج الثاني فالازتان، أموديبين أو  
أموديبين  
الاضطرابات،  
استخدام طببك فوراً إذا كنت تعاني من أي من الآثار الجانبية التالية، والتي هي الحادة والنادرة جداً بعد تناول هذا الدواء  
الصغير المقاييس، ألم في الصدر، ترقق أو صعوبة في التنفس  
• تورم في الجيوب، الوجه، والشفاه  
• تورم اللسان والحلق مما يسبب صعوبات في التنفس  
• تقلّبات دائمة على مستوى الجلد، خاصة الخطوط الحدية الحادة، شرى، احمرار الجلد في جميع أنحاء الجسم، الحكة الحادة، ظهور  
دودوصلات، تغير لونه، وtorم على مستوى الجلد، التهاب العضلة المخاطية (متلازمة سينيستر جوسون)، أو حساسية أخرى  
• تورم قليلة، هربات القلب غير طبيعية  
• تحسينات خاصة والاحتياطات المقدورة أعلاه، لا تستعمل سوليات وآخر طبيب  
تحذيرات

## سوليات

80 ملغم / 5 ملغم  
160 ملغم / 5 ملغم  
160 ملغم / 10 ملغم

### أفالازتان، على من فئة 14، 28 و 56 أفالازتان، أموديبين

المرجو قراءة هذه النشرة بأكملها قبل بدء استعمال هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة  
بال بالنسبة لكم  
• احتفظوا بطبعكم أو الصيدلي لطلب أي تضييف أو معلومة أخرى  
• إن هذا الدواء قد وصف لكم فيما يلي سحب آخر حتى ولو كانت تدو على نفس الأعراض لأن ذلك قد يضر به  
• يجب دائماً أخذ هذا الدواء بالتابع المعلومات المقدمة في هذه النشرة بدقة أو من طبعكم أو الصيدلي  
إذا زادت دose أخذ الآثار الجانبية أو لاحظت آثار جانبية أخرى لم تذكر في هذه النشرة ابلغوا طببك أو الصيدلي بها

- في هذه النشرة  
1. ما هو سوليات، وما هي حالات استعماله؟  
2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال سوليات؟  
3. كم يجب تناول سوليات؟  
4. ما هي الآثار الجانبية المترتبة؟  
5. كم يجب حفظ سوليات؟  
6. معلومات إضافية

1. ما هو سوليات، وما هي حالات استعماله؟  
2. C09DB01 ATC

تحتوي أفالازتان وأموديبين تساهم هذه المواد في السيطرة على ضغط الدم عندما يكون  
ارتفاعها،  
• ينتهي فالازتان إلى الفئة العلاجية: مصادمات مستقبلات أنتيبيوتيسين، يتم إنتاج أنتيبيوتيسين في الجسم وبسبب تضييف الأوعية  
الدم، يزيد ارتفاع ضغط الدم يعمل فالازتان عن طريق معان تأثير أنتيبيوتيسين في  
• ينتهي أموديبين إلى الفئة العلاجية: حاصرات قناة الكالسيوم.  
• ينتهي أموديبين إلى الكالسيوم من عبر الأوعية الدموية، وبالتالي يمنع هذه الأوعية الدموية من التضيق  
تساهم هذه المواد في منع تضيق الأوعية الدموية وبالتالي تساعد في إبطاء ارتفاع ضغط الدم لدى المرضى البالغين الذين لم يتم التحكم في ضغط الدم لديهم بشكل كافي  
• يستعمل سوليات لعلاج ارتفاع ضغط الدم لدى المرضى البالغين الذين لم يتم التحكم في ضغط الدم في  
• يستعمل فالازتان أو أموديبين كل واحد على حدى  
2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال سوليات؟  
للتوجه بالمعلومات الضرورية قبل استعمال الدواء  
• ملحوظات الاستعمال

• استعمال سوليات، هي الحالات التالية:  
إذا كان لديك حساسية لفالازتان، أو أموديبين، للبيهيدروبريزدين أو أي من المكونات الأخرى لهذا دواء إذا كنت تعتقد أن سوليات قد تسبب لديك في حساسية، لا تأخذ و استفسر طببك  
إذا كان لديك مسكنات حادة في الكبد، والصرف على كل تليف الكبد المفراوي أو الراكود صفراوي  
إذا كنت ملوكاً أكثر من 3 أشهر من المستحسن أيضاًتجنب استعمال سوليات في مرحلة مبكرة من الحمل  
إذا كان لديك انخفاض ضغط الدم شديد  
إذا كان لديك مشكلات شديدة في الكلى أو إذا كنت تقوم بتصفية الكلى  
إذا كان لديك مرض السكري أو المقصو الكلوبي DFG معنون 60 مل، دقة 1.73، وكانت تأخذ سوليات مع الأدوية التي  
إذا كان لديك حمدة بما في ذلك صدمة قلبية إصابة تحمل القلب غير قادر على توفير ما يكفي من الدم إلى الجسم  
إذا كان لديك مسكنات في مسكنات التندفع للبطين الأيسر على سبيل العمال، اعتلال عضل القلب الضامني الالسيادي وتضيق  
الarteries يرجعه غالباً  
إذا كنت تعاني من فصوص في القلب بعد احتشاء داد لعضلة القلب  
إذا كنت أحد الحالات المذكورة أعلاه، لا تستعمل سوليات وآخر طبيب