

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR CTRIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Réditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 [LG] - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 0750

Société : REBRAHIMI Mohamed

Actif

Pensionné(e)

Autre

Nom & Prénom : REBRAHIMI Mohamed

Date de naissance : 04/01/1944

Adresse : 47 MUS (Opht. EL HANAFI), - env.

Tél. : 0522297467

Total des frais engagés : 819,10 DH

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

24 FEV. 2020

DR. EL ALAOUI Saida
Ophtalmologiste
207, Bd. Zerkouni - Casablanca
Tél. : 05 22 94 91 66

Date de consultation : 24/02/2020

Nom et prénom du malade : REBRAHIMI Mohamed

ACCUEIL

Age : 76

Lien de parenté : **Lui-même**

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : AFFECTATION Oculaire

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CELSA

Signature de l'adhérent(e) : REBRAHIMI Mohamed

ACCUEIL
Le : 24/02/2020

24/02/20

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

EXECUTION DES ORDONNANCES

EXÉCUTION DES CHÈQUESSANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<p>PHARMACIE ROUDANI Mme LEBBAR Khadija El Minaoui 26, Bd Brahim Roudani Vers M'tly Youssef Maârif - Casablanca.</p> <p>Tél. : 05 22 27 23 86 / 05 22 27 12 24</p>	15/12/2020	591,75

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 D 00000000 B 35533411	G 21433552 00000000 00000000 11433553		COEFFICIENT DES TRAVAUX
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Saida EL ALAOUI

Ophtalmologiste

Ancienne interne et attachée au
CHNO des QUINZE-VINGTS Paris

Diplômée de l'Université P. et M. Curie Paris VI

الدكتورة سعيدة العلوي

طب العيون

طبيبة سابقة بالمركز الإستشفائي الوطني

لطب العيون 15-20 بباريس

خريج جامعة باريس 6

Casablanca, le samedi 15 février 2020

Monsieur IBRAHIMI Mohamed

صيدلية الرودانى
PHARMACIE ROUDANI
Mme LEBBAR Khadija Ep MIKOU
26, Bd Brahim Roudani Vers Mly Youssef
Maârif - Casablanca
Tél. : 05 22 27 23 86 / 05 22 27 12 24

- XOLA

95,20

1 goutte x 2 / j

- FLUCON COLLYRE fl

22,60
x 2

1 goutte, 3 fois par jour,

- VISMED n°3

3 x 144,10

1 goutte x 4 / j < 207,16 > DANS LES DEUX YEUX

- DI A DI A

صيدلية الرودانى
PHARMACIE ROUDANI
Mme LEBBAR Khadija Ep. MIKOU
26, Bd Brahim Roudani Vers Mly Youssef
Maârif - Casablanca
Tél. : 05 22 27 23 86 / 05 22 27 12 24

Dr. EL ALAOUI Saida
Ophtalmologiste
207, Bd. Zerkouni - Casablanca
Tél : 05 22 94 91 66

207, Bd. Zerkouni 3ème étage - Casablanca - Tél./Fax : 05 22 94 91 66

E-mail : saidaelalaoui@yahoo.fr

a) DENOMINATION

FLUCON®, collyre

Fluorométholone

- N[®], collyre**

 - Réagissements immuns contre la toxine de l'agent cholérique
 - Avec un effet bupropion, gênes dépendants de voltage
 - Peut être utilisé pour les symptômes de la grippe
 - Taux de succès élevé dans le traitement de la grippe
 - Dévisez le patient de la grippe
 - Aides pour le repos et la nutrition
 - Lavez-vous les mains avant de commencer

b) COMPOSITION

Fluorométholone	0,1 g
Chlorure de benzalkonium	0,01 g
Phosphate monosodique, phosphate disodique anhydre, polysorbate 80, chlorure de sodium, tétracétate de sodium, alcool polyvinylelique, méthylhydroxypropylcellulose, acide chlorhydrique et/ou hydroxyde de sodium pour ajuster le pH, eau purifiée	q.s.p. 100 ml

c) FORME PHARMACEUTIQUE

Collyre, flacon compte-gouttes de 3 ml.

d) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

CLASSE II CORTICOÏDES

e) NOM ET ADRESSE DU TITUL AIRE / EXPLOITANT

Laboratoires ALCON

Laboratoires AEGON
4, Rue Henri Sainte-Claire Deville

F-92563 RUEII -MAI MAISON CEDEX

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

ALCON GLISÍ SA

E-08320 El Masnou-Barcelone

**2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?
(INDICATIONS THERAPEUTIQUES)**

La fluorométholone est un anti-inflammatoire qui appartient au groupe des corticoïdes.
Ce médicament est indiqué pour traiter certaines maladies de l'œil.

3. ATTENTION !

a) DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?
(CONTRE-INDICATIONS)

a) DENOMINATION

FLUCON®, collyre

Fluorométholone

- N[®], collyre**

 - Réagissements immuns contre la toxine de l'agent cholérique
 - Avec un effet bupropion, gênes dépendants de voltage
 - Peut être utilisé pour les symptômes de la grippe
 - Taux de succès élevé dans le traitement de la grippe
 - Dévisez le patient de la grippe
 - Aides pour le repos et la nutrition
 - Lavez-vous les mains avant l'utilisation

b) COMPOSITION

Fluorométholone	0,1 g
Chlorure de benzalkonium	0,01 g
Phosphate monosodique, phosphate disodique anhydre, polysorbate 80, chlorure de sodium, tétracétate de sodium, alcool polyvinylique, méthylhydroxypropylcellulose, acide chlorhydrique et/ou hydroxyde de sodium pour ajuster le pH, eau purifiée	q.s.p. 100 ml

c) FORME PHARMACEUTIQUE

Collyre, flacon compte-gouttes de 3 ml

d) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

**CEPOSEPTA
CORTICOÏDES**

e) NOM ET ADRESSE DU TITUL AIRE / EXPLOITANT

Laboratoires ALCON

Laboratoires REGON
4 Rue Henri Sainte-Claire Deville

E-92563 BLIEU - MAI MAISON CEDEX

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

ALCON CUSÍ S A

E-08320 El Masnou-Barcelona

ADMINSITRE FREQUENCE ET MOWENT AUXOUDS ELSUZ-ETRE
Sous opérations de SEDIS VILLE DE L'ADMINISTRATION

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ? (INDICATIONS THERAPEUTIQUES)

La fluorométholone est un anti-inflammatoire qui appartient au groupe des corticoides.
Ce médicament est indiqué pour traiter certaines maladies de l'œil.

3. ATTENTION !

a) DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?
(CONTRE-INDICATIONS)

Diamox® 250 mg

Acétzolamide

Comprimé sécable

SANOFI

1. QU'EST-CE QUE DIAMOX 250 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient une substance active, l'acétzolamide, qui appartient à la famille des sulfamides, inhibiteurs de l'anhydrase carbonique.

Ce médicament permet de :

- diminuer rapidement la pression au niveau de l'œil,
 - diminuer le taux de gaz carbonique dans le sang chez les patients ayant une maladie grave des poumons (insuffisance respiratoire) ou chez les personnes séjournant en haute altitude.
- DIAMOX 250 mg, comprimé sécable est utilisé pour :**
- traiter rapidement une pression élevée au niveau de l'œil (glaucomes),
 - traiter certains troubles de l'organisme (alcaloses), en particulier du cours de certains troubles respiratoires (décompensations respiratoires aiguës nécessitant le recours à la ventilation mécanique) chez les patients ayant une maladie des poumons (insuffisance respiratoire chronique),
 - traiter le mal des montagnes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DIAMOX 250 mg, comprimé sécable ?

Ne prenez jamais DIAMOX 250 mg, comprimé sécable

- Si vous êtes allergique à la substance active (l'acétzolamide) ou à l'un des autres composants contenus dans DIAMOX mentionnés à la rubrique 6.
- Si vous êtes allergique à un médicament de la famille des sulfamides. Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si vous n'êtes pas sûr de ce qu'est un sulfamide.
- Si vous avez une maladie du foie (insuffisance hépatique sévère), des reins (insuffisance rénale sévère) ou des glandes situées au-dessus des reins (insuffisance surrenale sévère).
- Si vous avez eu, dans le passé, des crises douloureuses en bas du dos dues à un blocage des organes qui vous permettent d'uriner (coliques néphrétiques).
- Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, car ce médicament contient de l'amidon de blé.

Mises en garde et précautions d'emploi

Si vous faites partie des sujets à risque : âgé, diabétique, avec des troubles de l'organisme : acidose, goutte (excès d'acide urique dans le sang) ou si vous prenez ce médicament de façon prolongée, votre médecin pourra vous demander de faire une prise de sang pour surveiller :

- votre taux de sucre dans le sang (glycémie),
- votre taux d'acide urique,
- votre composition chimique du sang (ionogramme sanguin), incluant votre taux de potassium,
- votre formule sanguine.

Si vous souffrez d'une maladie des reins (insuffisance rénale chronique), votre médecin surveillera également le fonctionnement de vos reins au cours du traitement.

Si vous présentez des symptômes incluant une douleur à l'œil avec une baisse de la vue, ceux-ci nécessitent un traitement en urgence car ils peuvent conduire à la perte de la vue.

Le traitement par DIAMOX doit être arrêté et il convient de demander conseil à votre médecin.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Grossesse

Ce médicament est généralement déconseillé pendant la grossesse, sauf avis contraire de votre médecin.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament sur une longue période si vous êtes enceinte.

Cependant, dans certaines situations d'urgence ou en l'absence d'alternative, votre médecin pourra vous prescrire ce médicament de manière brève.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. Par conséquent, l'allaitement est déconseillé si vous prenez ce médicament.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors de contrôles antidopage, chez les sportifs.

DIAMOX 250 mg, comprimé sécable contient de l'amidon de blé

L'amidon de blé peut contenir du gluten, mais seulement à l'état de trace, et est donc considéré comme sans danger pour les personnes intolérantes au gluten.

peut être pris

19,00

de 6 ans
n cas de

ir. Dans

comprimés

Enfant à partir de 6 ans : la dose habituelle est de 5 à 10 mg/kg/jour.

Mode d'administration

Ce médicament est à prendre par voie orale.



chlorhydrate de dorzolamide

Solution Ophthalmique Stérile

COMPOSITION :

Chaque ml de Xola® contient 22,26 mg de chlorhydrate de dorzolamide équivalent à 20 mg de dorzolamide, conservateur : chlorure de benzalkonium et eau pour injection.

MECANISMES D'ACTION :

Le chlorhydrate de dorzolamide est un puissant inhibiteur de l'anhydrase carbonique humaine, de type II. L'inhibition de l'anhydrase carbonique dans les procès ciliaires de l'œil diminue la sécrétion d'humeur aqueuse, en ralentissant probablement la formation des ions bicarbonates, avec une diminution secondaire du transport du sodium et des liquides.

INDICATIONS ET MODE D'EMPLOI :

Xola® est indiqué dans le traitement de la pression intraoculaire élevée (PIO) chez les patients présentant un glaucome à angle ouvert ou une hypertonie oculaire.

En monothérapie, la dose de Xola® est d'une goutte dans le cul de sac conjonctival de l'œil (les yeux) atteint(s), 3 fois par jour. En association à un bêta-bloquant à usage ophtalmique, la dose est d'une goutte de Xola® dans le cul de sac conjonctival de l'œil (les yeux) atteint(s), 2 fois par jour.

CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients.
- Le dorzolamide n'a pas été étudié chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min) ou une acidose hyperchlорémique. Le dorzolamide et ses métabolites étant excrétés principalement par le rein, le dorzolamide est, en conséquence, contre-indiqué chez de tels patients.
- Acidose hyperchlорémique.

MISES EN GARDE :

Ne pas injecter dans l'œil.

PRECAUTIONS :

Grossesse: aucun effet tératogène, lié eu

Il n'existe pas de données suffisamment pe chez la femme enceinte. Le dorzolamide n si le rapport bénéfice-maman / risque-fœtus

Allaitement: On ne sait pas si le dorza

Chez des rates allaitantes, on a observé une diminution de

Si le traitement par dorzolamide est nécessaire, l'allaitement n'est pas

Utilisation chez l'enfant: La sécurité et l'efficacité n'ont pas été établies.

PPV : 95 DH 20

VISMED® MULTI

INSTRUCTIONS FOR USE

VISMED® MULTI

Sodium hyaluronate from fermentation 0.18%.

Lubricant eye drops.

Sterile, free from preservatives.

Composition:

1 ml solution contains sodium hyaluronate 1.8 mg, sodium chloride, potassium chloride, disodium phosphate, sodium citrate, magnesium chloride, calcium chloride and purified water. The solution is hypotonic.

Indications:

For lubrication of the eyes in case of sensation of dryness, burning and ocular fatigue and other minor complaints of no pathological significance induced, for example, by dust, smoke, dry heat, air conditioning, wind, cold, extended computer screen use or contact lens wear (rigid or soft).

Contra-indications:

Individual hypersensitivity to any constituent of the product.

Interactions:

Do not use VISMED® MULTI at the same time as any drug or other product applied to the eye since it may modify their effects.

Side effects:

On very rare occasions transient disorders such as the conjunctiva, foreign body sensation, redness, burning sensation of the eye, short-term blurred vision.

Dosage and administration:

Tear off the tamper-evident seal before the first administration.

Remove the protective cap. Tilt the head backwards and position the tip of the container above the eye to be treated.

Lubricant eye drops

often as needed. After application, gently close the eyelids to form a transparent adhesive film over the eye. VISMED® MULTI can be used up to 4 times daily. Do not use if not used within 3 months of opening.

Precautions:

Do not touch the tip of the container to any surface other than the surface of the eye. Do not touch the protective cap before use. VISMED® MULTI is a sterile product. VISMED® MULTI can be used up to 4 times daily. Do not use if not used within 3 months of opening. Otherwise the sterility may be compromised, associated with a risk of infection.

Store below 30 °C! Expiry date indicated on the label. If discomfort persists, consult your physician. Keep out of reach of children.

Characteristics and composition:

VISMED® MULTI contains 0.18% sodium hyaluronate, which is also present in tears. The particular physicochemical properties of VISMED® MULTI are due to VISMED® MHA, a polymer which is a derivative of hyaluronic acid.



VISMED®
eye drops
144.10
ort. VI
sition. V

: 10 ml

Last revision date: 20/06/2010

Legend to the illustrations:

1. Remove the tamper-evident seal.

VISMED® MULTI

INSTRUCTIONS FOR USE

VISMED® MULTI

Sodium hyaluronate from fermentation 0.18%.

Lubricant eye drops.

Sterile, free from preservatives.

Composition:

1 ml solution contains sodium hyaluronate 1.8 mg, sodium chloride, potassium chloride, disodium phosphate, sodium citrate, magnesium chloride, calcium chloride and purified water. The solution is hypotonic.

Indications:

For lubrication of the eyes in case of sensation of dryness, burning and ocular fatigue and other minor complaints of no pathological significance induced, for example, by dust, smoke, dry heat, air conditioning, wind, cold, extended computer screen use or contact lens wear (rigid or soft).

Contra-indications:

Individual hypersensitivity to any constituent of the product.

Interactions:

Do not use VISMED® MULTI at the same time as any drug or other product applied to the eye since it may modify their effects.

Side effects:

On very rare occasions transient disorders such as the conjunctiva, foreign body sensation, redness, burning sensation of the eye, short-term blurred vision.

Dosage and administration:

Tear off the tamper-evident seal before the first administration.

Remove the protective cap. Tilt the head backwards and position the tip of the container above the eye to be treated.

Lubricant eye drops

often as needed. After application, gently close the eyelids to form a transparent adhesive film over the eye. VISMED® MULTI can be used up to 4 times daily. Do not use if not used within 3 months of opening.

Precautions:

Do not touch the tip of the container to any surface other than the surface of the eye. Do not touch the protective cap before use. VISMED® MULTI is a sterile product. VISMED® MULTI can be used up to 4 times daily. Do not use if not used within 3 months of opening. Otherwise the sterility may be compromised, associated with a risk of infection.

Store below 30 °C! Expiry date indicated on the label. If discomfort persists, consult your physician. Keep out of reach of children.

Characteristics and composition:

VISMED® MULTI contains 0.18% sodium hyaluronate, which is also present in tears. The particular physicochemical properties of VISMED® MULTI are due to VISMED® MHA, a polymer which is a derivative of hyaluronic acid.



VISMED®
eye drops
144.10
ort. VI
sition. V

: 10 ml

Last revision date: 20/06/2010

Legend to the illustrations:

1. Remove the tamper-evident seal.

VISMED® MULTI

INSTRUCTIONS FOR USE

VISMED® MULTI

Sodium hyaluronate from fermentation 0.18%.

Lubricant eye drops.

Sterile, free from preservatives.

Composition:

1 ml solution contains sodium hyaluronate 1.8 mg, sodium chloride, potassium chloride, disodium phosphate, sodium citrate, magnesium chloride, calcium chloride and purified water. The solution is hypotonic.

Indications:

For lubrication of the eyes in case of sensation of dryness, burning and ocular fatigue and other minor complaints of no pathological significance induced, for example, by dust, smoke, dry heat, air conditioning, wind, cold, extended computer screen use or contact lens wear (rigid or soft).

Contra-indications:

Individual hypersensitivity to any constituent of the product.

Interactions:

Do not use VISMED® MULTI at the same time as any drug or other product applied to the eye since it may modify their effects.

Side effects:

On very rare occasions transient disorders such as the conjunctiva, foreign body sensation, redness, burning sensation of the eye, short-term blurred vision.

Dosage and administration:

Tear off the tamper-evident seal before the first administration.

Remove the protective cap. Tilt the head backwards and position the tip of the container above the eye to be treated.

Lubricant eye drops

often as needed. After application, gently close the eyelids to form a transparent adhesive film over the eye. VISMED® MULTI can be used up to 4 times daily. Do not use if contact lenses (rigid or soft) are worn.

Precautions:

Do not touch the tip of the container to any surface, including the surface of the eye. Do not touch the protective cap before use. VISMED® MULTI is a sterile product. VISMED® MULTI can be used up to 4 times daily. Do not use within 3 months of opening. Otherwise the sterility of the product is not guaranteed. Associated with a risk of infection.

Store below 30 °C! Expiry date indicated on the label. If discomfort persists, consult your physician. Keep out of reach of children.

Characteristics and composition:

VISMED® MULTI contains 0.18% sodium hyaluronate, which is also present in tears. The particular physico-chemical properties of VISMED® MULTI are due to VISMED® MHA, a polymer which is also present in tears.



VISMED®
eye drops
144.10
ort. VI
sition. V

: 10 ml

Last revision date: 20/09/2010

Legend to the illustrations:

1. Remove the tamper-evident seal.