

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES À LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Réclamation | : contact@mupras.com |
| Prise en charge | : pec@mupras.com |
| Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

22556

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3105

Société : R.A.M

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : HOUARI mohamed

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 0653990282 Total des frais engagés : 2861,30 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 21/02/2020

Nom et prénom du malade : HAFID HABIB Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Hypertension artérielle


En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :



Le : 25/02/2020

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Nature des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le paiement des Actes
27/02/2017	consultation visite de suivi examen	5- 272	200100 1200100 200100 <u>1600100</u>	M. Mohammed EL Bouamoini Ibnou Babik - 22-94-46-05-22-02 Signature

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>ARMÉE DE TERRE BISMARCK L'AILLEURS</i>	21.02.20	210,-,70

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODT.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient																
				Coefficient des travaux															
				Montants des soins															
				Début d'exécution															
				Fin d'exécution															
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																		
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">H</td> <td style="text-align: left;">25533412</td> <td style="text-align: right;">G</td> <td style="text-align: left;">21433552</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">D</td> <td style="text-align: left;">00000000</td> <td style="text-align: right;">B</td> <td style="text-align: left;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">B</td> <td style="text-align: left;">00000000</td> <td style="text-align: right;">G</td> <td style="text-align: left;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">H</td> <td style="text-align: left;">35533411</td> <td style="text-align: right;">G</td> <td style="text-align: left;">11433553</td> </tr> </table>		H	25533412	G	21433552	D	00000000	B	00000000	B	00000000	G	00000000	H	35533411	G	11433553	Coefficient des travaux
H	25533412	G	21433552																
D	00000000	B	00000000																
B	00000000	G	00000000																
H	35533411	G	11433553																
	<p>[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>			Montants des soins															
				Date du devis															
				Date de l'exécution															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



CMR
EXPLORATION ET TRAITEMENT DES MALADIES
RESPIRATOIRES DU SOMMEIL ET DU RONFLEMENT

Consultations :
Pneumophysiologie
Allergologie - Asthme
Sommeil et ronflement
Sevrage tabagique
Réhabilitation respiratoire
Oncologie

Laboratoire de physiologie clinique
Pléthysmographie
Spiromtrie - Oscilling
Polysomnographie
Gaz du sang artériel
Epreuve d'effort cardio-respiratoire

Endoscopie diagnostique et interventionnelle
Fibroscopie bronchique
Bronchoscopie rigide
Thoracoscopie

الدكتور محمد إبراهيم

Dr. Mohammed EL IBRAHIMI
Pneumophysiologue

الدكتور ع. الناصري

Dr. Arabi NACIRI
Professeur agrégé
Pneumophysiologue

Casablanca le 21/02/2020

Madame MTALSI KHADIJA

42,80

15.1

Étrouex cp : 1cp x4/j

70,90

15.2

Fitorax: 1 cas x3/j

47,80

15.3

Dasen : 2cp. x3/j

15.4

febrex: 1sx4/ (N°2)

15.5

20,00 x 2.

Prendre rendez-vous sur : casasouffle@gmail.com

80

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

Consultations :
 Pneumophysiologie
 Allergologie - Asthme
 Sommeil et ronflement
 Sevrage tabagique
 Réhabilitation respiratoire
 Oncologie

Laboratoire de physiologie clinique
 Pléthysmographie
 Spiromtrie - Oscillling
 Polysomnographie
 Gaz du sang artériel
 Epreuve d'effort cardio-respiratoire

Endoscopie diagnostique et interventionnelle
 Fibroscopie bronchique
 Bronchoscopie rigide
 Thoracoscopie

الدكتور محمد للبر (ابي)

Dr. Mohammed EL IBRAHIMI
Pneumophysiologue

الدكتور ع. الناصري

Dr. Arabi NACIRI
Professeur agrégé
Pneumophysiologue

Casablanca le 24/02/2020

Madame MTALSI KHADIJA

132.00 aclav 1g: 1 sx2/j

45.80 cortancyl 20: 3cp le matinx 03j puis 2cp le matinx 05j

291.00x3 foster : 2 inh x2/j (N°3)

45,80

Prendre rendez-vous sur : casasouffle@gmail.com

Foster 100/6µg, solution pour inhalation en flacon pressurisé

Distribué par PROMOPHARM G.M.
Z.I. du Sahel - Had Soualem

PPV : 291DH00

Foster 100/6µg, solution pour inhalation en flacon pressurisé

Distribué par PROMOPHARM G.M.
Z.I. du Sahel - Had Soualem

PPV : 291DH00

Distribué par PROMOPHARM G.M.
Z.I. du Sahel - Had Soualem

PPV : 291DH00

مکرر، زنقة ابن يعليك - راسيني - سرير - 05 22 94 91 47 / 05 22 94 92 46 - الفاكس : 05 22 94 93 47

5 bis rue Ibnou Babik - Quartier Racine - Maârif - CASABLANCA. Téléphone 05 22 94 92 46 / 05 22 94 93 47 - Fax : 05 22 94 91 23 - E-mail : soufflemaroc@gmail.com - Site web:cmr-maroc.com



CMR
EXPLORATION ET TRAITEMENT DES MALADIES
RESPIRATOIRES DU SOMMEIL ET DU RONFLEMENT

Consultations :
Pneumophysiologie
Allergologie - Asthme
Sommeil et ronflement
Sevrage tabagique
Réhabilitation respiratoire
Oncologie

Laboratoire de physiologie clinique
Pléthysmographie
Spiromtrie - Oscilling
Polysomnographie
Gaz du sang artériel
Epreuve d'effort cardio-respiratoire

Endoscopie diagnostique et interventionnelle
Fibroscopie bronchique
Bronchoscopie rigide
Thoracoscopie

الدكتور محمد للبرابسي

Dr. Mohammed EL IBRAHIMI
Pneumophysiologue

الدكتور ع. الناصري

Dr. Arabi NACIRI
Professeur agrégé
Pneumophysiologue

21/02/2020

MTALSI KHADIJA

*COMPTE RENDU
Radiographie du thorax face*

Indication : toux spastique .

- Silhouette cardio-médiastinale normale
- Culs-de-sac pleuraux sans anomalie
- Structure osseuse normale

Conclusion : pas d'anomalies parenchymateuses évolutives.

Dr. Mohammed EL IBRAHIMI
Pneumophysiologue
5 Bis, Rue Ibnou Babik - Casablanca
Télé 05 22 94 92 46 - 05 22 94 93 47

الدكتور ع. النصري

Dr. Arabi NACIRI
Professeur agrégé
Pneumophtisiologue



CMR

الدكتور مصطفى العبراني

DOCTEUR M. EL IBRAHIMI
PNEUMOPHTSILOGUE

5 bis rue Ibnou Babik - Quartier Racine - Maârif - CASABLANCA

Téléphone : 05 22 94 92 46 / 05 22 94 93 47 - Fax : 05 22 94 91 23

E-mail : soufflemaroc@gmail.com - Site web : www.cmr-maroc.com

Casablanca, le

٢١/٠٢/٢٠١٤.

M.....

نرجو منكم اجراء:

FAIRE

- Radiographie Pulmonaire Face :
- Radiographie Pulmonaire Profil
- Pléthysmographie / DLCO
- Spirometrie - Oscilling
- Polysomnographie + Polygraphie
- Polygraphie sous VNI
- Gaz du Sang Artériel
- Mise en Place de VNI
- Epreuve d'Effort Cardio-Respiratoire
- Tests Cutanes
- Fibroscopie Bronchique
- Aerosol + Injection
- Ponction "Pleurale - Biopsie"
- Ponction "Pleurale - Simple"
- Echographie de reperage
- Exsufflation

Dr. MOHAMMED EL IBRAHIMI
Fonctionnaire Bébik - Casablanca
Tél. 05 22 92 46 - 05 22 93 47

الدكتور عصير النصري

Dr. Arabi NACIRI
Professeur agrégé
Pneumophtisiologue



CMR

الدكتور عصير العبراهيمي
DOCTEUR M. EL IBRAHIMI
PNEUMOPHTISIOLOGUE

5 bis rue Ibnou Babik - Quartier Racine - Maârif - CASABLANCA

Téléphone : 05 22 94 92 46 / 05 22 94 93 47 - Fax : 05 22 94 91 23

E-mail : soufflemaroc@gmail.com - Site web : www.cmr-maroc.com

Casablanca, le

21.02.2024

M..... NTALG: URGENT

Honoraires versés

Le	Consultation	5 -	200,- DH
Le	Radiographie Pulmonaire Face:	11	200,- DH
Le	Radiographie Pulmonaire Profil		DH
Le	Pléthysmographie / DLCO	11	100,- DH
Le	Spirometrie - Oscilling		DH
Le	Polysomnographie + Polygraphie		DH
Le	Polygraphie sous VNI		DH
Le	Gaz du Sang Artériel		DH
Le	Mise en Place de VNI		DH
Le	Epreuve d'Effort Cardio-Respiratoire		DH
Le	Tests Cutanes		DH
Le	Fibroscopie Bronchique / LBA		DH
Le	Aerosol + Injection		DH
Le	Ponction "Pleurale - Biopsie"		DH
Le	Ponction "Pleurale - Simple"		DH
Le	Echographie de reperage		DH
Le	Exstrophation		DH

TOTAL : 1600,- DH

FEBREX® Adulte

COMPOSITION :

Phénylephrine	25 mg
Paracétamol	500 mg
Acide ascorbique	200 mg
Excipients	1 sachet
Excipients	
Granulés	
Granulés	

PROPRIÉTÉS :

- Une action adrénergique,
- Une action antitussive (céphalées, mal de tête),
- Une compensation thermique.

INDICATIONS :

- Traitement symptomatique des affections ORL aiguës : rhumes, rhinites allergiques, rhinopharyngites.
- Traitement symptomatique des états grippaux.
- En cas d'affection bactérienne, une antibiothérapie peut être nécessaire.

CONTRE-INDICATIONS :

Ce médicament **NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ** dans les cas suivants :

- Hypersensibilité à l'un des constituants.
- Insuffisance hépatocellulaire.
- Risque de glaucome par fermeture de l'angle.
- Adénome prostatique.
- Enfant de moins de 15 ans.
- Phénylcétonurie pour FEBREX® sans sucre (présence d'aspartam).
- Granulés avec sucre : En raison de la présence du sucre de sucre, ce médicament est contre-indiqué en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou de déficit en sucre isomaltase.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

En cas de fièvre élevée ou persistante, ou survenue de signes de surinfection ou de persistance des symptômes au-delà de 5 jours, une réévaluation du traitement doit être faite.

Mises en garde :

- Le risque de dépendance essentiellement psychique n'apparaît que pour des posologies supérieures à celles recommandées et pour des traitements au long cours.
- Pour éviter un risque de surdosage, vérifier l'absence de paracétamol dans la composition d'autres médicaments. Chez l'adulte de plus de 50 kg : la dose totale de paracétamol ne doit pas excéder 4 g par jour.


Précautions d'emploi :

- L'absorption de boissons alcoolisées ou de sédatifs (barbituriques en particulier) qui potentiaisaient l'effet sédatif des antihistaminiques est à éviter pendant le traitement.
- Granulés avec sucre : tenir compte, dans la ration journalière, de la teneur en saccharose.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

L'absorption de boissons alcoolisées ou de sédatifs est déconseillée pendant le traitement.

AFIN D'EVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.



Les et les larmoiements souvent
des éternuements en salve.
de la fièvre et de la douleur

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

En l'absence de données, par mesure de prudence, l'utilisation de ce médicament est à éviter en cas de grossesse ou d'allaitement.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES :

L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament, surtout en début de traitement. Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées, de médicaments contenant de l'alcool ou de médicaments sédatifs.

EFFETS INDÉSIRABLES :

CE MÉDICAMENT PEUT ENTRAINER CHEZ CERTAINES PERSONNES DES EFFETS PLUS OU MOINS GÉNANTS :

- Sédatrice ou somnolence, plus marquée en début de traitement.
- Sécheresse des muqueuses, constipation, troubles de l'accommodation, mydriase, palpitations, risque de rétention urinaire.
- Hypotension orthostatique.
- Troubles de l'équilibre, vertiges, baisse de la mémoire ou de la concentration, plus fréquents chez le sujet âgé.
- Incoordination motrice, tremblements.
- Confusion mentale, hallucinations.
- Plus rarement, des effets sont à type d'excitation : agitation, nervosité, insomnie.
- Effets hématologiques : leucopénie, neutropénie, thrombocytopénie et anémie hémolytique.
- Quelques rares cas de réactions d'hypersensibilité à type de choc anaphylactique, œdème de quincke, érythème, urticaire, rash cutané ont été rapportées. Leur survenue impose l'arrêt définitif de ce médicament et des médicaments apparentés.

SIGNALEZ A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

POSÉOLOGIE :

Adulte et enfant (à partir de 15 ans) : 1 sachet 2 ou 3 fois par jour.

MODE D'ADMINISTRATION :

Vale orale

Les prises doivent être espacées d'au moins 4 heures.

Les saches doivent être pris dans une quantité suffisante d'eau froide ou tiède.

Lors d'affections grippales, il est préférable de prendre ce médicament dans de l'eau tiède le soir, à l'apparition des premiers symptômes. En effet, la boisson tiède ainsi constituée favorise la diurèse et la transpiration propices à une élimination plus rapide des toxines.

En cas d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine inférieure à 10 ml/min) : l'intervalle entre 2 prises sera au minimum de 8 heures.

DUREE DE TRAITEMENT :

Ne pas utiliser de façon prolongée sans l'avis du médecin et en particulier si les troubles persistent au-delà de 5 jours.

FORMES ET PRÉSENTATIONS :

Granulés (avec sucre) pour solution buvable : Boîte de 8 sachets.

Granulés (sans sucre) pour solution buvable : Boîte de 8 sachets.

**A CONSERVER A UNE TEMPERATURE NE DÉPASSANT PAS 25°C ET A L'ABRI DE L'HUMIDITÉ.
NE PAS DÉPASSER LA DATE DE PÉREMPTION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.**

NE PAS LAISSER A LA PORTÉE DES ENFANTS.

FEBREX® Adulte

COMPOSITION :

Phéniramine
Paracétamol
Acide ascorbique
Excipients
Excipients
Granulés :

PROPRIÉTÉS :

- Une action associée, et c.
- Une action (céphalées, m...)
- Une compense

INDICATIONS :

- Traitement symptomatique des affections ORL aigües : rhumes, rhinites allergiques, rhinopharyngites.
- Traitement symptomatique des états grippaux.
- En cas d'affection bactérienne, une antibiothérapie peut être nécessaire.

CONTRE-INDICATIONS :

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- Hypersensibilité à l'un des constituants.
- Insuffisance hépatocellulaire.
- Risque de glaucome par fermeture de l'angle.
- Adénome prostate.
- Enfant de moins de 15 ans.
- Phénylcétoneurie pour FEBREX® sans sucre (présence d'aspartam).
- Granulés avec sucre : En raison de la présence du saccharose, ce médicament est contre-indiqué en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou de déficit en sucrose isomaltase.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

En cas de fièvre élevée ou persistante, de survenue de signes de surinfection ou de persistance des symptômes au-delà de 5 jours, une réévaluation du traitement doit être faite.

Mises en garde :

- Le risque de dépendance essentiellement psychique n'apparaît que pour des posologies supérieures à celles recommandées et pour des traitements au long cours.
- Pour éviter un risque de surdosage, vérifier l'absence de paracétamol dans la composition d'autres médicaments. Chez l'adulte de plus de 50 kg : la dose totale de paracétamol ne doit pas excéder 4 g par jour.

Précautions d'emploi :

- L'absorption de boissons alcoolisées ou de sédatifs (barbituriques en particulier) qui potentient l'effet sédatif des antihistaminiques est à éviter pendant le traitement.
- Granulés avec sucre : tenir compte, dans la ration journalière, de la teneur en saccharose.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

L'absorption de boissons alcoolisées ou de sédatifs est désconseillée pendant le traitement.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.



GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

En l'absence de données, par mesure de prudence, l'utilisation de ce médicament est à éviter en cas de grossesse ou d'allaitement.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES :

L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament, surtout en début de traitement. Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées, de médicaments contenant de l'alcool ou de médicaments sédatifs.

EFFETS INDÉSIRABLES :

CE MÉDICAMENT PEUT ENTRAINER CHEZ CERTAINES PERSONNES DES EFFETS PLUS OU MOINS GÉNÉANTS :

- Sédaton ou somnolence, plus marquée en début de traitement.
- Sécheresse des muqueuses, constipation, troubles de l'accommodation, mydriase, palpitations, risque de rétention urinaire.
- Hypotension orthostatique.
- Troubles de l'équilibre, vertiges, baisse de la mémoire ou de la concentration, plus fréquents chez le sujet âgé.
- Incordination motrice, tremblements.
- Confusion mentale, hallucinations.
- Plus rarement, des effets sont à type d'excitation : agitation, nervosité, insomnie.
- Effets hématologiques : leucopénie, neutropénie, thrombocytopénie et anémie hémolytique.
- Quelques rares cas de réactions d'hypersensibilité à type de choc anaphylactique, œdème de quinque, érythème, urticaire, rash cutané ont été rapportés. Leur survenue impose l'arrêt définitif de ce médicament et des médicaments apparentés.

SIGNALEZ A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

POSOLOGIE :

Adulte et enfant (à partir de 15 ans) : 1 sachet 2 ou 3 fois par jour.

MODE D'ADMINISTRATION :

Les prises doivent être espacées d'au moins 4 heures.

Les sachets doivent être pris dans une quantité suffisante d'eau froide ou tiède. Lors d'affections grippales, il est préférable de prendre ce médicament dans de l'eau tiède le soir, à l'apparition des premiers symptômes. En effet, la boisson tiède ainsi constituée favorise la diurèse et la transpiration propices à une élimination plus rapide des toxines.

En cas d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine inférieure à 10 ml/min) : l'intervalle entre 2 prises sera au minimum de 8 heures.

DUREE DE TRAITEMENT :

Ne pas utiliser de façon prolongée sans l'avis du médecin et en particulier si les troubles persistent au-delà de 5 jours.

FORMES ET PRÉSENTATIONS :

Granulés (avec sucre) pour solution buvable : Boîte de 8 sachets.

Granulés (sans sucre) pour solution buvable : Boîte de 8 sachets.

A CONSERVER A UNE TEMPERATURE NE DÉPASSANT PAS 25°C ET A L'ABRI DE L'HUMIDITÉ. NE PAS DÉPASSER LA DATE DE PEREMPTION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

أنرويكس® أقراص للucus

ENROUEX

Eucalyptus - Propolis - Echinacea - Gingembre
LOT 18319/FC4
11/2021 PPC 42,80

Propriétés :

ENROUEX est composé de plantes dont les propriétés sont bénéfiques pour la gorge et les voies respiratoires.

الشكل والتقديم : طبلة من 10 أقراص تمتلك التركيب : البروبيلين (80ملغ خلروروب)، حمض أسكوربيك (فيتامين س) (60ملغ اي)، الأوكالبتيون (50ملغ-أوكالبتيوس كلويتون)، مستخلص جاف من مادة مستخلص الزنجبيل (12ملغ زنجبير أوفيساليس، مالطوديسكرين) مادة مقومة : التوربيتون، مسحوق الصلب، مادة مكثفة، استabilات المتفاوت غرواني ملون : ثومعن، الموكر الوز، الأسيسلنام K والأسبراتام، تكهة اللاتيك

المكونات الفعالة	الفعالة
مستخلص البروبيلين	مستخلص البروبيلين
مستخلص الأوكالبتيون	مستخلص الأوكالبتيون
مستخلص المادة المقذفية	مستخلص المادة المقذفية
مستخلص الزنجبيل	مستخلص الزنجبيل
فيتامين س (فيتامين س)	فيتامين س (فيتامين س)

أنرويكس أقراص يشكل مجموعة متكاملة من مستخلصات النباتات الم وللتهابات

الحنجرة والمسلك التنفسية.

المقدار : قرص واحد يمتص ثلاث مرات في اليوم.

تحذيرات الاستعمال : يحتوي على مصدر الفينيلالالات.

تم صنعه من طرف سترافارم - ويوفر من طرف "راموفارم".

ENROUEX®
10 comprimés à sucer



ENROUEX® tablettes

Acide ascorbique (60 mg soit 100% des AJR), extrait d'eucalyptus (Eucalyptus globulus, maltodextrine), extrait sec d'echinacée (50 mg), extrait d'echinacée (Echinacea, maltodextrine), extrait de gingembre (12 mg-Zinziger officinalis, maltodextrine), agent de charge : sorbitol, poudre au miel, agent agglomérant : stéarate de magnésium et silice colloïdale, édulcorant : thaumatin, sucralose, acésulfame K et aspartame, arôme citron menthol.

INGREDIENTS	PROPRIETES
Extrait de Propolis	Antiseptique
Extrait d'Eucalyptus	Décongestionnant
Extrait d'Echinacée	Stimulant des défenses de l'organisme
Extrait de Gingembre	Antiseptique, analgésique et expectorant
Acide ascorbique	Stimulant énergétique et antioxydant

ENROUEX® tablettes est une association synergique d'extraits de plantes médicinales, reconnues pour leurs actions bénéfiques sur les défenses de l'organisme, les irritations de la gorge et des voies respiratoires.

Posologie :

1 comprimé à sucer 3 fois par jour.

Précautions d'utilisation :

Contient une source de phénylalanine.

Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.

Ne dispense pas une alimentation équilibrée.

Fabriqué en France par Les Laboratoires STRAPHARM

Pour RAMO-PHARM

Complément Alimentaire n'est pas un médicament.

DASEN® 10 000 UI
Serrapeptase
40 Comprimés enrobés gastro-résistants



6 118000 181064

IDEN
DENO
DASE
COMI
SERR
Excipi
cellula
Pour l.
*1 unité

PPV:

EXP:

Lot N°:

® 10.000 UI

gastro-résistant

ANTITAT

..... 10 000 unités*
maïs, lactose, acétophthalate de
loxiomère 188.

..... par 5 ml de substrat (caséine)

47,80

ante

La.

20-24, soubéir Bnou Al aouam. Roches Noires - Casablanca

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament, modificateur des sécrétions bronchiques, est indiqué en cas d'affection respiratoire récente avec difficulté d'évacuer les crachats.

Il est également utilisé pour traiter les œdèmes consécutifs à un traumatisme ou une intervention chirurgicale.

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas d'allergie connue à l'un des constituants notamment à la serrapeptase (enzyme).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPÉCIALES

En cas de réaction allergique, le traitement doit être arrêté immédiatement et définitivement.

Un avis médical est nécessaire :

- en cas de fièvre, de crachats gras ou purulents,
- si vous êtes atteint d'une maladie chronique (au long cours) des bronches et des poumons.

Ce traitement doit toujours être accompagné d'efforts volontaires de toux permettant de cracher. La prise simultanée d'un médicament destiné à calmer la toux est donc illégale.

Ne pas prendre de médicament asséchant les sécrétions bronchiques durant la période de traitement.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS,

فيبركس للكبار

استعملوا الآلات:

FARMAMED
LOT : 2782
UT.AV : 04-22
PPV: 20DH00



التركيب:	فيبريكين ملابس
براسيتامول	براسيتامول
حمض اسكوربيك	حمض اسكوربيك
سواء كافية	سواء كافية
لأنه موزع ذات تأثير معلوم:	لأنه موزع ذات تأثير معلوم:
فيبريكين بدون سكر: اميراتم	فيبريكين بدون سكر: اميراتم
فيبريكين مع السكر: السكاروز 7.9 غرام.	فيبريكين مع السكر: السكاروز 7.9 غرام.

الخصائص:

- فيبريكين للبالغين له فعالية ثلاثة :
- فعالية مضادة للمهستامين تقلل من سيلان الأنف وإدرار الدموع.
- فعالية مضادة للحمى والآلام.
- يهدى الجسم بمحاضن الأسكوربيك.

دواعي الاستعمال:

- لعلاج اعراض امراض الأنف والحنجرة: الزكام، حساسية الأنف، التهاب الأنف والبلغم.
- اعراض الانفلونزا.
- في حالة التعن يجبأخذ دوارة مضادة للبكتيريا.

موقع الاستعمال:

- لا يستعمل هذا الدواء في الحالات التالية:
- حساسية لأحد مكوناته هذا الدواء.

الucusor في خلايا الكبد.

رثى العين مع انسداد الزاوية.

تضخم البروستات.

الأطفال أقل من 15 سنة.

حيبيات بدون سكر: فيلسوسنوري نظر الوجود الأسيترات.

- حبيبات تخفى على السكر: ظهرت الأجزاء هذا الدواء على السكاروز، لا يستعمل عند المرضى الذين لا يتحملون الفريكتوز، عند ظهور أعراض مسؤو امتصاص الكلورز والمكليلوز أو نقص في السكرياز إذرو-ناناز.
- في حالة الشك يجب اختيار الطبيب أو الصيدلي.

احتياطات الاستعمال:

- في حالة الحمى أو استمرار هذه الأعراض أكثر من 5 أيام، ينبغي إعادة تقديم العلاج.
- يمكن الاعتماد الكلي على هذا الدواء في حالة أخذ جرعات زائدة وحينما تطول مدة العلاج.

- لتجنب الرغبة الزائدة، يجب التأكد من عدم وجود الباراسيتامول في تركيب الأدوية الأخرى، بالنسبة للبالغين أكثر من 50 كلغ : الجرعة الإجمالية للباراسيتامول يجب الـ تتجاوز 4 غرام في اليوم.
- يجب تجنب المشروبات الكحولية والمهنئات خلال فترة العلاج.

- حبيبات مع السكر: يأخذ بعدين الاكتثار كمية السكاروز في الحصة اليومية.

التفاعلات الطارئية:

- لا ينصح بشرب المشروبات الكحولية والمهنئات خلال فترة العلاج.
- تفادى الفاعلات المحتملة بين عدة أدوية يجب إشعار الطبيب أو الصيدلي في حال تلقى علاج آخر

الحمل والرضاعة:

- لا يستعمل هذا الدواء خلال فترة الحمل والرضاعة.
- تفادى الفاعلات المحتملة بين عدة أدوية يجب إشعار الطبيب أو الصيدلي في حال تلقى علاج آخر

فارميد

مستلزمات الصيدلانية

21 - جي بورجي - الدار البيضاء - المغرب



محلول للشرب

فيتوراكس®



8 032578 479515

Lot :
À consommer
avant le :

190818
12/2022

PPC : 79,90 DH

الشكل و التقديم :

فيتوراكس® للكبار - محلول للشرب - قارورة تحتوي على 200 مل
فيتوراكس® للصغار - محلول للشرب - قارورة تحتوي على 200

الخصائص :

فيتوراكس® محلول طبيعي للشرب مُكون من مستخلصات صم أخرى تساعد على تخلص الشعب الهوائية من البُلْغُم المترافق الطبيعية للجسم مما يساعد على الإحساس بالراحة في الجهاز التنفسي.

حالات الإستعمال :

- تراكم المخاط في الشعب الهوائية.
- إلتهاب الحنجرة.
- الـَّبَحَّة.

نصائح الإستعمال :

- فيتوراكس® للكبار : ملعقة كبيرة واحدة (1) ثلث (3) إلى أربع (4) مرات في اليوم.
فيتوراكس® للصغار : - أقل من 4 سنوات : ملعقة صغيرة واحدة (1) ثلث (3) مرات في اليوم.
- من 4 إلى 12 سنة : ملعقة كبيرة واحدة (1) ثلث (3) مرات في اليوم.

إحتياطات الإستعمال :

- لا ينصحتناوله من طرف الأشخاص ذوي حساسية لمستخلصات خلية النحل.
- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- يحفظ في مكان بارد ويستهلك في مدة لا تتجاوز شهرا بعد فتحه.
- قد يحتوي المحلول على رواسب ناتجة عن طبيعة مكوناته دون المس بجودته أو فعاليته.
- لا ينصح إستعمال فيتوراكس® للكبار عند الحامل.
- مكمل غذائي ليس بدواء.

صنع من طرف فارمالايف - ليكو - إيطاليا.
مستورد و موزع في المغرب من طرف مدير و فارما

رخص وزارة الصحة رقم:

فيتوراكس® للكبار / DA 20151405347DMP/20UCA/v1

فيتوراكس® للصغار / DA 20161405271DMP/20UCA/v1

رخصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية رقم: ES.5.229.16

ACLAV®

LOT : 6441
PER : 11-21

P.P.V : 132DH00

Amoxicilline + Acide clavulanique

STATIONS :

UIT :	Aclav 1g/125mg -Boîte de 12 sachets -Boîte de 14 sachets -Boîte de 16 sachets -Boîte de 24 sachets	Aclav 500mg/62,5mg -Boîte de 12 sachets -Boîte de 16 sachets -Boîte de 24 sachets	Aclav Enfant 100mg/12,5mg/1ml Flacon de 60 ml	Aclav Nourrisson 100mg/12,5mg/1ml Flacon de 30 ml
COMPOSITION :	Amoxicilline-trihyclorure d'amoxicilline et d'acide clavulanique	quantité anhydre	1 g	500 mg
ACLAV 1g/125mg	Poudre pour suspension buvable, 16 sachets	quantité anhydrique	125 mg	62,5 mg
6 118000 091769		q.s.p 1 sachet	q.s.p 1 sachet	750 mg 10,30 g de poudre 375 mg 5,15 g de poudre

PROPRIETES :

Antibiotiques antibactériens de la famille des bétalactamines, du groupe des aminopénicillines.

Aclav est une formulation associant l'amoxicilline et l'acide clavulanique puissant inhibiteur de bétalactamases.

INDICATIONS :

Elles sont limitées aux infections dues aux germes reconnus sensibles, notamment dans :

- Les otites moyennes aiguës, otites récidivantes.
- Les sinusites maxillaires aiguës et autres formes de sinusites.
- Les angines récidivantes, amygdalites chroniques.
- Les surinfections de bronchites aiguës du patient à risque.
- Les exacerbations de bronchopneumopathies chroniques.
- Les pneumopathies aiguës du patient à risque.
- Les cystites aiguës récidivantes, cystites non compliquées de la femme et pyélonéphrites aiguës non compliquées dues à des germes sensibles.
- Les infections gynécologiques hautes, en association à un autre antibiotique actif sur les chlamydiae.
- Les parodontites.
- Les infections stomatologiques sévères : abcès, phlegmons, cellulites.
- Traitemennt de relais de la voie injectable.
- Infections respiratoires basses chez le nourrisson et l'enfant de moins de 5 ans.
- Infections urinaires chez le nourrisson.

CONTRE INDICATIONS :

-Absolues :

- Allergie aux antibiotiques du groupe des bétalactamines (pénicillines, céphalosporines)
- Mononucléose infectieuse.
- Antécédent d'atteinte hépatique liée à l'association amoxicilline -acide clavulanique.
- Phénylcétonurie (en raison de la présence de l'aspartam)

-Relatives :

Le méthotrexate

POSOLOGIE :

Les Posologies sont exprimées en Amoxicilline

Adulte normorénal (poids ≥ 40 kg)

2 à 3g/jour en 2 à 3 prises selon la prescription médicale et l'infection concernée.

Adulte insuffisant rénal (poids ≥ 40 kg)

Clairance de la créatinine	Schéma posologique
Supérieur à 30 ml / min	pas d'adaptation nécessaire
Entre 10 et 30 ml / min	1 g /125 mg toute les 12 à 24h
Inférieur à 10 ml / min	Pour les patients traités ou non par hémodialyse les conditions d'utilisation n'ont pas été établies.

Chez les patients âgés : pas d'adaptation posologique sauf si la clairance de la créatinine est ≤ 30 ml / min (même posologie chez l'insuffisant rénal)






Nom: KHADIJA MTALSI

Taille: 157 cm Age: 62 Ans Date Naissance: 18/10/1951

ID: KHAMTA18101957

Poids: 85 kg Genre: Féminin BMI: 34,5 kg/m²

Medication: Post: Salbutamol



Paramètre	Unité	Ref	Pré	%Ref	Post	%Ref	%Pré	ZScore
VEMS	l	2,05	1,90	92	1,95	95	3	
CVFex	l	2,45	2,21	90	2,31	94	5	
VEMS/CVF	%	77	86		84		-2	
DEP	l/s	5,67	6,41	113	6,40	113	0	
DEM25	l/s	1,21	0,75	62	0,76	63	1	
DEM50	l/s	3,46	3,44	99	3,31	96	-4	
DEM75	l/s	5,11	6,35	124	6,35	124	0	
DEM 25-75	l/s	2,77	2,30	83	2,30	83	0	
tex	s		3,1		3,6		16	
VEMS/CV	%	77	82	107	84	109	2	
Paramètre	Unité	Ref	Pré	%Ref	Post	%Ref	%Pré	ZScore
CV	l	2,42	2,31	95	2,32	96	0	
CI	l	2,02	2,52	125	2,26	112	-10	
VC	l		0,56		0,71		27	
VRE	l	0,75	-0,79		-0,02			

Paramètre	Unité	Ref	Pré	%Ref	ZScore
VGT	l	2,58	2,27	88	
CPT	l	4,57	5,38	118	
VR	l	1,83	3,06	167	

Paramètre	Unité	Ref	Pré	%Ref	ZScore
sRAW	kPa*s	0,52	1,33	257	
RVA	kPa/(l/s)	0,20	0,58	292	
GAW	(l/s)/kPa	6,66	1,71	26	

Commentaire: Coopération moyenne. fonction respiratoire normale

Date: 21/02/2020

Température ambiante:

22 °C

Temps: 11:49

Pression ambiante:

1018 hPa

Dr. Mohammed EL IBRAHIM
Pneumophtisiologue
5 Bd. Rue Ibnou Babt - Casablanca
Tél: 05 22 94 92 46 - 03 22 94 93 47
Technic