

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
 Prise en charge : pec@mupras.com
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 9947 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : MALIKA Chihab

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 066249956 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté : Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :



VOLET ADHÉRENT

Déclaration de maladie

Nº P19-051376

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.
 Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule :

Nom de l'adhérent(e) :

Total des frais engagés :

Date de dépôt :

MUPRAS

FORME D'ORDRE DES SOINS

Le praticien est prié de présenter la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins.

Veuillez fournir une facture

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

Couvert

PDF file

SOINS DENTAIRES			Dents Traitées	Nature des soins	Coefficient	Coefficient des travaux
						Montant des soins
						Début d'exécution
						Fin d'exécution
						Coefficient des travaux
			H 25533412 00000000 00000000 35533411	G 21433552 00000000 00000000 11433553		Montant des soins
			(Création, Remont, adjonction) Fonctionnel, thérapeutique, nécessaire à la profession			
						Date du devis
						Fin de l'exécution

Visa et cachet du praticien attestant le devis

Visa et cachet du praticien attestant l'exécution

VOLET ADHERENT		NOM		Mle :
DECLARATION N°				
Date de Dépot	Montant engagé	Nbre de pièces jointes		
Durée de validité de cette feuille est de [3] trois mois				
Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle				

MUPRAS		DATE DE DEPOT	
A REMPLIR PAR L'ADHERENT		Mle :	
Nom & Prénom : MALIKA chiba B		Signature de l'adhérent	
Fonction : Phones. 0662499456		Signature de l'adhérent	
eMail :			
MEDECIN		Prénom du patient	
Adhérent <input type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant <input type="checkbox"/> Age		Date : 10/01/2020	
Nature de la maladie : Diabète Hypo 2		Date 1ère visite	
S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances			
Nature des actes		Nbre de Coefficient	Montant détaillé des honoraires
10/01/2020 G		1	25000
10/02/2020 H		1	90
PHARMACIE		Date : 13/01/2020	
Montant de la facture		1169.20	
ANALYSES - RADIOGRAPHIES Date : 10/01/2020			
Désignation des Coefficients		Montant détaillé des Honoraires	
B 280		280.00 DH	
B 120		120 DH	
AUXILIAIRES MEDICAUX Date :			
Nombre		Montant détaillé des Honoraires	
AM	PC	IM	IV

CACHET
LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES
ABDELMOUNEN
DI ASMAE LAB JOUN
Résidence Saidi OUJDA
Tél: 0536 68 74 74 - Fax: 0536 68 74 75



CABINET EL MEKKAOUI
Endocrinologie & Diabétologie

الدكتورة المكاوي صفاء

Doctor ELMEKKAOUI Safae
احصائية في أمراض الغدد والسكري وأمراض الأيض
Spécialiste en endocrinologie, diabétologie
et maladies métaboliques

وَجْدَةُ فِي : ٢٣/٠١/٢٠٢٠ : Oujda Le :

$$92,10 \times 3 = 276,30$$

- Auerel Zug

Sur cette, M2P le sei avant

Rosa Broir

-Janinet 50/1000 4/8

Top side, top view shows

46.00

- Zyloric losuff **SV**

If lesson after 7pm £10

$$208,000 \times 3 =$$

Coveram Sug (Sug)

69

Se hetsi apsiga & ūo.

92803

$T^2 \wedge \wedge G$

Агломерату **S1** сір
жичка 20 кг
з.п. 1000 кг
МГМ

شارع يوسف بن تاشفين، إقامة بن تاشفين رقم 5، الطابق الأول شقة رقم 7
Boulevard Youssef ibn Tachfine, N5 Résidence ibn Tachfine, 1er étage N7

Tél : 05 36 70 77 75

LABORATOIRE ABDELMOUMEN D'ANALYSES MEDICALES

Docteur Asmae LAMJOUN
INPE :083060640
ICE : 001636557000050
IF:40122309

Angle rue Jakarta et rue Lieutenant Belhoucine
Résidence Saidi, Appartement N° 2
OUJDA
Taxe professionnelle:10837042

Oujda le 31 janvier 2020

Mme CHIHAB MALIKA

FACTURE N°	75558
Analyses :	
Examen Cytobactériologique des urines -----	B 120 Total : B 120
TOTAL DOSSIER	120,00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Cent Vingt Dirhams

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES
ABDELMOUMEN
Dr Asmae LAMJOUN
Résidence Saidi - OUJDA
Tél: 0536 68 74 74 - Fax: 0536 68 74 75

LABORATOIRE ABDELMOUMEN D'ANALYSES MÉDICALES

Docteur Asmae LAMJOUN
INPE :083060640
ICE : 001636557000050
IF:40122309

Angle rue Jakarta et rue Lieutenant Belhoucine
Résidence Saidi, Appartement N° 2
OUJDA
Taxe professionnelle:10837042

Oujda le 10 janvier 2020

Mme CHIHAB MALIKA

FACTURE N°	74032		
Analyses :			
Cholestérol total -----	B	30	
Acide urique -----	B	30	
Hémoglobine glycosylée HBA1C -----	B	100	
Examen Cytobactériologique des urines -----	B	120	
Prélèvements :			
Sang-----	Pc	1,5	
TOTAL DOSSIER		280,00 DH	

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Deux Cent Quatre vingt Dirhams

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES
ABDELMOUMEN
Dr Asmae LAMJOUN
Résidence Saidi - OUJDA
Tél: 0536 68 74 74 - Fax: 0536 68 74 75



مختبر التحاليل الطبية عبد المؤمن

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES ABDELMOUMEN

Biochimie - Hématologie - Bactériologie - Virologie - Parasitologie - Mycologie - Immunologie

Dr Asmae LAMJOUN
Spécialiste en Biologie Clinique

الدكتورة أسماء لمجون
أخصائية في البيولوجيا السريرية

Diplômée de l'Université de Pharmacie de MONASTIR
Ex - Attachée aux CHU de SOUSSE et MONASTIR

Dossier créé le : 10/01/20

Édité le : 13/01/20

Prélèvement effectué à 09:49

Mme CHIHAB MALIKA


Dossier : 20A788

Docteur Safae EL Mekkaoui


Page : 1/5

BIOCHIMIE

		Normales	Antériorités
Cholestérol total ----- :	1,60	g/l	1,3 - 2
Soit -----:	4,12	mmol/l	3,35 - 5,15



		Normales	Antériorités
Acide Urique -----:	52	mg/l	30 - 70
Soit -----:	310	μmol/l	179 - 417



LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES
ABDELMOUMEN
Dr ASMAE LAMJOUN
Résidence Saidi - Oujda
Tél: 0536 68 74 74 - Fax: 0536 68 74 75



مختبر التحاليل الطبية عبد المؤمن

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES ABDELMOUMEN

Biochimie - Hématologie - Bactériologie - Virologie - Parasitologie - Mycologie - Immunologie

Dr Asmae LAMJOUN
Spécialiste en Biologie Clinique

الدكتورة أسماء لمجون
أخصائية في البيولوجيا السريرية

Diplômée de l'Université de Pharmacie de MONASTIR
Ex - Attachée aux CHU de SOUSSE et MONASTIR

Dossier créé le : 10/01/20

Édité le : 13/01/20

Prélèvement effectué à 09:49

Mme CHIHAB MALIKA

Dossier : 20A788

Docteur Safae EL Mekkaoui

Page : 2/5

Antériorités


Hémoglobine glycosylée (HbA1C) ----- : **8,30** % 7,60
(Technique H.P.L.C)

Interprétation:

Sujet non diabétique: 4 < HbA1c < 6,2

Sujet diabétique:

HbA1c < 7	: Excellent équilibre glycémique.
7 < HbA1c < 9	: Assez bon équilibre glycémique.
9 < HbA1c < 10	: Equilibre glycémique médiocre.
HbA1c > 10	: Mauvais équilibre glycémique.



LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES
ABDELMOUMEN
Dr Asmae LAMJOUN
Résidence Saidi - Oujda
Tél: 0536 68 74 74 - Fax: 0536 68 74 75



مختبر التحاليلات الطبية عبد المؤمن

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES ABDELMOUMEN

Biochimie - Hématologie - Bactériologie - Virologie - Parasitologie - Mycologie - Immunologie

Dr Asmae LAMJOUN

Spécialiste en Biologie Clinique

Diplômée de l'Université de Pharmacie de MONASTIR

Ex - Attachée aux CHU de SOUSSE et MONASTIR

الدكتورة أسماء لمجون

أخصائية في البيولوجيا السريرية

Dossier créé le : 10/01/20

Édité le : 13/01/20

Prélèvement effectué à 09:49

Mme CHIHAB MALIKA

Dossier : 20A788

Docteur Safae EL Mekkaoui

Page : 3/5

BACTERIOLOGIE EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES URINES (ECBU)

EXAMEN MACROSCOPIQUE

Aspect ----- : Trouble.
Couleur ----- : Jaune paille.

EXAMEN CHIMIQUE

Glucose ----- :	Absence.
Corps cétoniques ----- :	Absence.
Sang ----- :	+
Protéines ----- :	Trace.
Nitrites ----- :	+
pH ----- :	6,0 N: 5,4-7,2

EXAMEN MICROSCOPIQUE

Leucocytes ----- :	> 1000000 /ml N < 10 000
Hématies ----- :	15 000 /ml N < 5000
Cellules épithéliales ----- :	Quelques.
Cristaux ----- :	Absence.
Cylindres ----- :	Absence.
Levures ----- :	Absence.
Parasites ----- :	Absence.
Flore bactérienne ----- :	Présence de bacilles à Gram négatif à l'examen direct.

CULTURES BACTERIOLOGIQUES

Culture ----- : **Positive.**
Numération des germes ----- : 1000000 UFC/ml.
Identification ----- : **Escherichia coli.**

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES
ABDELMOUMEN
Dr Asmae LAMJOUN
Résidence Saidi - Oujda
Tél: 0536 68 74 74 - Fax: 0536 68 74 75

Angle rue Jakarta et rue Lieutenant Belhocine, Résidence Saidi 1^{er} étage, Appt. N°2 (en face Lycée ABDELMOUMEN) - Oujda

Tél : 05 36 68 74 74 - Fax : 05 36 68 74 75 - Urgence/Prélèvement à domicile : 06 62 55 71 77



مختبر التحاليل الطبية عبد المؤمن

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES ABDELMOUMEN

Biochimie - Hématologie - Bactériologie - Virologie - Parasitologie - Mycologie - Immunologie

Dr Asmae LAMJOUN
Spécialiste en Biologie Clinique

الدكتورة أسماء لمجون
أخصائية في البيولوجيا السريرية

Diplômée de l'Université de Pharmacie de MONASTIR
Ex - Attachée aux CHU de SOUSSE et MONASTIR

Dossier créé le : 10/01/20

Édité le : 13/01/20

Prélèvement effectué à 09:49

Mme CHIHAB MALIKA

Dossier : 20A788

Docteur Safae EL Mekkaoui

Page : 4/5

ANTIBIOGRAMME

Nature du germe : *Escherichia coli* Prélèvement URINES

BETA-LACTAMINES

Ampicilline	Résistant	<i>Amblosin, Magnipen, Totapen ...</i>
Amoxicilline	Résistant	<i>Amoxil, Clamox, Agram, Hiconcil, Amodox, Bristamox ...</i>
Amoxi + Ac.clavulanique	SENSIBLE	<i>Augmentin, Amoclavin, Clavulin</i>
Ticarcilline	Résistant	<i>Ticaren</i>
Ampicilline + Sulbacatam	Résistant	<i>Unasyn</i>
Ticartil. ac. clavul.	SENSIBLE	<i>Claventin</i>
Imipénème	SENSIBLE	<i>Tiénam</i>

AMIDINOPENICILLINES

Mecillinam	SENSIBLE	<i>selexid</i>
------------	----------	----------------

BETA-LACTAMINES

Cefalotine	SENSIBLE	<i>Kéflin, Céfalotine</i>
Céfaclor	SENSIBLE	<i>Alfatil</i>
Céfuroxime	SENSIBLE	<i>Zinacef, Curoxime, Zinnat</i>
Cefoxitine	SENSIBLE	<i>Méfoxin</i>
Ceftriaxone	SENSIBLE	<i>Rocéphine, Triaxon</i>
Ceftazidime	SENSIBLE	<i>Fortum, Kafadim</i>
Céfotaxime	SENSIBLE	<i>Clasforan</i>
Cefixime	SENSIBLE	<i>Oroken</i>

AMINOSIDES

Amikacine	SENSIBLE	<i>Amiklin</i>
Gentamicine	SENSIBLE	<i>Gentalline, Gentamen, Cidomycine</i>
Tobramycine	SENSIBLE	<i>Nebcine</i>

QUINOLONES

Ciprofloxacine	Résistant	<i>Ciproxine, Ciflox, Catex, Sepcen</i>
Acide nalidixique	Résistant	<i>Apurone, Negram, Nalixine</i>
Norfloxacine	Résistant	<i>Noroxine</i>
Ofloxacine	Résistant	<i>Oflocef</i>

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES

ABDELMOUMEN

Dr Asmae Lamjoun

Résidence Saidi - Oujda

Tél: 0536 68 74 74 - Fax: 0536 68 74 75

Angle rue Jakarta et rue Lieutenant Belhoucine, Résidence Saidi 1^{er} étage, Appt. N°2 (en face Lycée ABDELMOUMEN) - Oujda

Tél : 05 36 68 74 74 - Fax : 05 36 68 74 75 - Urgence/Prélèvement à domicile : 06 62 55 71 77



مختبر التحاليلات الطبية عبد المؤمن

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES ABDELMOUMEN

Biochimie - Hématologie - Bactériologie - Virologie - Parasitologie - Mycologie - Immunologie

Dr Asmae LAMJOUN

Spécialiste en Biologie Clinique

Diplômée de l'Université de Pharmacie de MONASTIR

Ex - Attachée aux CHU de SOUSSE et MONASTIR

الدكتورة أسماء لمجون

أخصائية في البيولوجيا السريرية

Dossier créé le : 10/01/20

Édité le : 13/01/20

Prélèvement effectué à 09:49

Mme CHIHAB MALIKA

Dossier : 20A788

Docteur Safae EL Mekkaoui

Page : 5/5

SULFAMIDES

Triméthoprime + Sulfamide	Résistant	<i>Bactrim, Eusaprim, Microcetim</i>
---------------------------	-----------	--------------------------------------

POLYPEPTIDES

Colistine	SENSIBLE	<i>Colimycine</i>
-----------	----------	-------------------

AUTRES

Furanes	SENSIBLE	<i>Antinal, Ercéfuril, Furatandine, Furadoïne</i>
---------	----------	---

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES
ABDELMOUMEN
Dr ASMAE LAMJOUN
Résidence Saidi - Oujda
Tél: 0535 68 74 74 - Fax: 0536 68 74 75

Angle rue Jakarta et rue Lieutenant Belhoccine, Résidence Saidi, 1^{er} étage, Appt. N°2 (en face Lycée ABDELMOUMEN) - Oujda

Tél : 05 36 68 74 74 - Fax : 05 36 68 74 75 - Urgence/Prélèvement à domicile : 06 62 55 71 77



مختبر التحاليل الطبية عبد المؤمن

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES ABDELMOUNEN

Biochimie - Hématologie - Bactériologie - Virologie - Parasitologie - Mycologie - Immunologie

Dr Asmae LAMJOUN
Spécialiste en Biologie Clinique

الدكتورة أسماء لمجون
أخصائية في البيولوجيا السريرية

Diplômée de l'Université de Pharmacie de MONASTIR
Ex - Attachée aux CHU de SOUSSE et MONASTIR

Dossier créé le : 31/01/20

Mme CHIHAB MALIKA

Édité le : 01/02/20

Dossier : 20A18AE

Prélèvement effectué à 08:50

Docteur Safae EL Mekkaoui

Page : 1/1

BACTERIOLOGIE

EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES URINES (ECBU)

EXAMEN MACROSCOPIQUE

Aspect ----- : Clair.
Couleur ----- : Jaune paille.

EXAMEN CHIMIQUE

Glucose ----- :	Absence.
Corps cétoniques ----- :	Absence.
Sang ----- :	Trace.
Protéines ----- :	Absence.
Nitrites ----- :	Absence.
pH ----- :	6,0
	N: 5,4-7,2

EXAMEN MICROSCOPIQUE

Leucocytes ----- :	4 000 /ml	N < 10 000
Hématies ----- :	6 000 /ml	N < 5000
Cellules épithéliales ----- :	Rares.	
Cristaux ----- :	Absence.	
Cylindres ----- :	Absence.	
Levures ----- :	Absence.	
Parasites ----- :	Absence.	

CULTURES BACTERIOLOGIQUES

Culture ----- : Négative.

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES
ABDELMOUNEN
Dr Asmae LAMJOUN
Résidence Saidi - Oujda
Tél: 0536 68 74 74 - Fax: 0536 68 74 75

Amarel® 1 mg, 2mg, 3mg, 4mg

Glimpiride

Comprimé

SANOFI

1. QU'EST-CE QUE AMAREL COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

AMAREL, comprimé est un antidiabétique oral, appartenant à la famille des sulfonylurées, qui diminue le taux de sucre dans le sang.

AMAREL, comprimé agit en augmentant la qualité d'insuline libérée par votre pancréas. L'insuline fait ensuite baisser votre taux de sucre dans le sang.

Dans quel cas AMAREL, comprimé est-il utilisé ?

AMAREL, comprimé est utilisé dans le traitement du diabète sucré de type 2, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la perte de poids ne sont pas suffisants pour contrôler à eux seuls les taux de sucre dans le sang.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A COMMUNIQUER ?

COMPRIME ?

Ne prenez jamais

- si vous êtes allergique (médicaments utilisés contre les bactéries, tels que certains antibiotiques) ;
- si vous avez un ulcère dans l'estomac ou dans l'intestin (cas de décompensation acido-alcalotique : complication du diabète lorsque votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains des signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et raideur musculaire) ;
- en cas de coma diabétique ;
- si vous avez une maladie grave des reins ;
- si vous avez une maladie grave du foie.

Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Faites attention

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin ou votre pharmacien si :

- Vous vous rétablissez d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, d'une infection avec fièvre, ou de tout autre forme de stress, informez votre médecin car un changement temporaire de votre traitement peut être nécessaire.
- Vous avez un problème grave au niveau de votre foie ou de vos reins.

Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (maladie héréditaire des globules rouges).

Les informations disponibles sur l'utilisation d'AMAREL, comprimé chez les patients de moins de 18 ans sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez ces patients n'est pas recommandée.

Informations importantes sur l'hypoglycémie (taux bas de sucre dans le sang)

Lorsque vous prenez AMAREL, comprimé, une hypoglycémie peut survenir (taux bas de sucre dans le sang). Veuillez lire les informations supplémentaires ci-dessous sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue d'une hypoglycémie : malnutrition, bagarres de repas irréguliers, saut de repas, retard dans la prise d'un repas, période de jeûne ;

modification du régime alimentaire ;

prise de plus d'AMAREL, comprimé que ce dont vous avez besoin ;

fonction rénale diminuée ;

maladie grave du foie ;

si vous souffrez de troubles hormonaux particuliers (troubles de la glande thyroïde, de la glande hypophysaire ou des glandes surrenales) ;

consommation d'alcool (en particulier en l'absence de repas) ;

si de certains autres médicaments (voir «Prise d'autres médicaments») ;

si votre activité physique est augmentée, si vous ne mangez pas suffisamment ou que vous mangez des aliments contenant moins de glucides qu'habituellement. Les signes de l'hypoglycémie incluent :

- faim intense, maux de tête, nausées, vomissement, apathie, somnolence, troubles du sommeil, agitation, agressivité, difficultés de concentration, diminution de la vigilance et des réactions, dépression, confusion, troubles visuels et de la parole, difficulté à articuler, tremblement, paralysie partielle, troubles sensitifs, vertiges, sensation de faiblesse.

- les signes suivants peuvent également survenir : sueurs abondantes, peau moite, anxiété, accélération du pouls, hypertension artérielle, palpitation, douleurs intenses, et soudaine dans la poitrine pouvant irradier dans les régions voisines (angine de poitrine et troubles de rythme cardiaque).

Si votre taux de sucre dans le sang continue de baisser, vous pouvez présenter un état confusionnel important (délire), des convulsions, une perte de la maîtrise de soi, une respiration courte et rapide, un ralentissement de votre rythme cardiaque, une perte de connaissance. Une hypoglycémie sévère peut également ressembler à une attaque cérébrale.

Traitement de l'hypoglycémie :

Dans la plupart des cas, les signes d'hypoglycémie disparaissent très rapidement après l'ingestion de sucre : par exemple morceaux de sucre, boisson sucrée ou thé sucré. Vous devez donc toujours avoir du sucre (morceaux de sucre) avec vous. Par contre, les édulcorants de synthèse ne sont pas efficaces.

Contactez votre médecin ou allez à l'hôpital si l'ingestion de sucre n'est pas efficace ou en cas de réapparition des symptômes.

Tests de laboratoire

Votre taux de sucre dans le sang ou dans les urines doit être contrôlé régulièrement. Votre médecin peut vous demander de faire des analyses de sang pour vérifier le nombre de cellules sanguines ainsi que votre fonction hépatique.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Votre médecin peut être amené à modifier la dose d'AMAREL, comprimé si vous prenez d'autres médicaments. En effet, ceux-ci peuvent diminuer ou augmenter l'effet d'AMAREL, comprimé sur votre taux de sucre dans le sang.

L'effet d'AMAREL, comprimé (diminution du taux de sucre dans le sang) peut être augmenté par les médicaments suivants et entraîner un risque d'hypoglycémie :

- autres médicaments pour traiter le diabète (tels que l'insuline ou la metformine) ;
- médicaments pour traiter la douleur ou l'inflammation (phénylbutazone, azopropazone, oxyphenbutazone, aspirine) ;
- médicaments pour traiter les infections urinaires (tels que certains sulfamides antibactériens à longue durée d'action) ;
- médicaments pour traiter les infections bactériennes et fongiques (tétracyclines, chloramphénicol, fluconazole, miconazole, les quinolones, clarithromycine) ;
- médicaments pour empêcher la coagulation du sang (antivitamines K de type dérivés coumariniques tels que la warfarine) ;
- médicaments favorisant le développement musculaire (anabolisants) ;
- médicaments utilisés pour la thérapie de substitution par hormones sexuelles masculines ;

Amarel® 1 mg, 2mg, 3mg, 4mg

Glimpiride

Comprimé

SANOFI

1. QU'EST-CE QUE AMAREL COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

AMAREL, comprimé est un antidiabétique oral, appartenant à la famille des sulfonylurées, qui diminue le taux de sucre dans le sang.

AMAREL, comprimé agit en augmentant la qualité d'insuline libérée par votre pancréas. L'insuline fait ensuite baisser votre taux de sucre dans le sang.

Dans quel cas AMAREL, comprimé est-il utilisé ?

AMAREL, comprimé est utilisé dans le traitement du diabète sucré de type 2, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la perte de poids ne sont pas suffisants pour contrôler à eux seuls les taux de sucre dans le sang.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A COMMUNIQUER ?

COMPRIME ?

Ne prenez jamais

- si vous êtes allergique (médicaments utilisés contre les bactéries, tels que certains antibiotiques) ;
- si vous avez un ulcère dans l'estomac ou dans l'intestin (cas de décompensation acido-alcalotique : complication du diabète lorsque votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains des signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et raideur musculaire) ;
- en cas de coma diabétique ;
- si vous avez une maladie grave des reins ;
- si vous avez une maladie grave du foie.

Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Faites attention

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin ou votre pharmacien si :

- Vous vous rétablissez d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, d'une infection avec fièvre, ou de tout autre forme de stress, informez votre médecin car un changement temporaire de votre traitement peut être nécessaire.
- Vous avez un problème grave au niveau de votre foie ou vos reins.

Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (maladie héréditaire des globules rouges).

Les informations disponibles sur l'utilisation d'AMAREL, comprimé chez les patients de moins de 18 ans sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez ces patients n'est pas recommandée.

Informations importantes sur l'hypoglycémie (taux bas de sucre dans le sang)

Lorsque vous prenez AMAREL, comprimé, une hypoglycémie peut survenir (taux bas de sucre dans le sang). Veuillez lire les informations supplémentaires ci-dessous sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue d'une hypoglycémie : malnutrition, bagarres de repas irréguliers, saut de repas, retard dans la prise d'un repas, période de jeûne ;

modification du régime alimentaire ;

prise de plus d'AMAREL, comprimé que ce dont vous avez besoin ;

fonction rénale diminuée ;

maladie grave du foie ;

si vous souffrez de troubles hormonaux particuliers (troubles de la glande thyroïde, de la glande hypophysaire ou des glandes surrenales) ;

consommation d'alcool (en particulier en l'absence de repas) ;

si de certains autres médicaments (voir «Prise d'autres médicaments») ;

si votre activité physique est augmentée, si vous ne mangez pas suffisamment ou que vous mangez des aliments contenant moins de glucides qu'habituellement.

Les signes de l'hypoglycémie incluent :

- faim intense, maux de tête, nausées, vomissement, apathie, somnolence, troubles du sommeil, agitation, agressivité, difficultés de concentration, diminution de la vigilance et des réactions, dépression, confusion, troubles visuels et de la parole, difficulté à articuler, tremblement, paralysie partielle, troubles sensitifs, vertiges, sensation de faiblesse.
- les signes suivants peuvent également survenir : sueurs abondantes, peau moite, anxiété, accélération du pouls, hypertension artérielle, palpitation, douleurs intenses, et soudaine dans la poitrine pouvant irradier dans les régions voisines (angine de poitrine et troubles de rythme cardiaque).

Si votre taux de sucre dans le sang continue de baisser, vous pouvez présenter un état confusionnel important (délire), des convulsions, une perte de la maîtrise de soi, une respiration courte et rapide, un ralentissement de votre rythme cardiaque, une perte de connaissance. Une hypoglycémie sévère peut également ressembler à une attaque cérébrale.

Traitement de l'hypoglycémie :

Dans la plupart des cas, les signes d'hypoglycémie disparaissent très rapidement après l'ingestion de sucre : par exemple morceaux de sucre, boisson sucrée ou thé sucré. Vous devez donc toujours avoir du sucre (morceaux de sucre) avec vous. Par contre, les édulcorants de synthèse ne sont pas efficaces.

Contactez votre médecin ou allez à l'hôpital si l'ingestion de sucre n'est pas efficace ou en cas de réapparition des symptômes.

Tests de laboratoire

Votre taux de sucre dans le sang ou dans les urines doit être contrôlé régulièrement. Votre médecin peut vous demander de faire des analyses de sang pour vérifier le nombre de cellules sanguines ainsi que votre fonction hépatique.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Votre médecin peut être amené à modifier la dose d'AMAREL, comprimé si vous prenez d'autres médicaments. En effet, ceux-ci peuvent diminuer ou augmenter l'effet d'AMAREL, comprimé sur votre taux de sucre dans le sang.

L'effet d'AMAREL, comprimé (diminution du taux de sucre dans le sang) peut être augmenté par les médicaments suivants et entraîner un risque d'hypoglycémie :

- autres médicaments pour traiter le diabète (tels que l'insuline ou la metformine) ;
- médicaments pour traiter la douleur ou l'inflammation (phénylbutazone, azopropazone, oxyphenbutazone, aspirine) ;
- médicaments pour traiter les infections urinaires (tels que certains sulfamides antibactériens à longue durée d'action) ;
- médicaments pour traiter les infections bactériennes et fongiques (tétracyclines, chloramphénicol, fluconazole, miconazole, les quinolones, clarithromycine) ;
- médicaments pour empêcher la coagulation du sang (antivitamines K de type dérivés coumariniques tels que la warfarine) ;
- médicaments favorisant le développement musculaire (anabolisants) ;
- médicaments utilisés pour la thérapie de substitution par hormones sexuelles masculines ;

كوفيرام® 5 ملغم / 10 ملغم

بيراتنوريل أرجينين / أملوديبين

كوفيرام® 5 ملغم / 5 ملغم

بيراتنوريل أرجينين / أملوديبين

كوفيرام® 10 ملغم / 10 ملغم

بيراتنوريل أرجينين / أملوديبين

كوفيرام® 10 ملغم / 5 ملغم

بيراتنوريل أرجينين / أملوديبين

اقرأ بدقة هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء . لأنها تحتوي على معلومات هامة لك .

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج لاستئناف إليها من جديد .
- إذا كانت لديك أستئناف أخرى إسأل الطبيب أو الصيدلاني .
- لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً . فلا يجوز إطلاقه على شخص آخر ، حتى وإن كانت الأعراض متشابهة ، فقد تلحق بهضرر .
- إذا شعرت بأي آثار جانبية غير المرغوب بها في هذه النشرة .
- إذا شعرت بأي آثار جانبية غير المرغوب بها في هذه النشرة .
- (أنظر إلى مقطعي)

COVERAM® 5mg/5mg

Péridopril arrière / amlodipine

30 comprimés



- في هذه النشرة :
1. ما هو كوفيرام ، وما هي المعلومات
2. كيف يؤخذ كوفيرام
3. ما في الآثار الجانبية
4. كيف يمكن تجنب الآثار الجانبية
5. محتوى العبوة

208,00

بكميات ضئيلة .
وذلك الإضطرار .

الوصفات ، ويمكن طلبك أن تخالط لك علاجاً إذا كنت
قد يزور كوفيرام حبة أو شفاف الآلات .

قد يزور كوفيرام حبة على قدر ذلك على قيمة السياحة أو تشغيل الآلات . إذا كانت الآفات تسب

لك الشعور بالدوار أو الصداع أو التعب ، أو تسب لك الصداع ، فيجب أن تتجنب السياحة أو تشغيل

الآلات وأن تصلط طبقيتك على الفور .

يمكنك كوفيرام حبة ، على سكر الطبيب

إذا كان طبقيتك قد سنت وأعلمك بذلك مصاف عدم تحمل بعض أنواع السكر ، فاصطل بالطبيب

1. ما الذي يفعله كوفيرام ، حيث وفي أي حالة يستعمل ؟

الفترة اللاحقة الصيدلانية : مثبط للعصير الغروية للأمليوتين (IIC) وحاصر للكلسوم .

C09BB04 / ATC

يوصف كوفيرام ، حبة لعلاج ارتفاع الضغط الشرياني / أو لعلاج الأمراض الإكليلية الثابتة (في حال

النافس أو قطاع الدم الوراء للقلب) .

فيما كان المرضى الذين يستخدمون بواسطة البيراتنوريل والأملوديبين أن ياخذوا كلاً المادتين في

حصة واحدة من كوفيرام ، حبة .

الدواء يستلزم صحة مراجعة من ماددين مقلعين : البيراتنوريل والأملوديبين .

كوفيرام® 5 ملغم / 10 ملغم

بيراتنوريل أرجينين / أملوديبين

كوفيرام® 5 ملغم / 5 ملغم

بيراتنوريل أرجينين / أملوديبين

كوفيرام® 10 ملغم / 10 ملغم

بيراتنوريل أرجينين / أملوديبين

كوفيرام® 10 ملغم / 5 ملغم

بيراتنوريل أرجينين / أملوديبين

اقرأ بدقة هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء . لأنها تحتوي على معلومات هامة لك .

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج لاستئناف إليها من جديد .
- إذا كانت لديك أستئناف أخرى إسأل الطبيب أو الصيدلاني .
- لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً . فلا يجوز إطلاقه على شخص آخر ، حتى وإن كانت الأعراض متشابهة ، فقد تلحق بهضرر .
- إذا شعرت بأي آثار جانبية غير المرغوب بها في هذه النشرة .
- إذا شعرت بأي آثار جانبية غير المرغوب بها في هذه النشرة .
- (أنظر إلى مقطعي)

COVERAM® 5mg/5mg

Péridopril arrière / amlodipine

30 comprimés



- في هذه النشرة :
1. ما هو كوفيرام ، وما هي المعلومات
2. كيف يؤخذ كوفيرام
3. ما في الآثار الجانبية
4. كيف يمكن تجنب الآثار الجانبية
5. محتوى العبوة

208,00

بكميات ضئيلة .
وذلك الإضطرار .

الوصفات ، ويمكن طلبك أن تخالط لك علاجاً إذا كنت
قد يزور كوفيرام حبة أو شفاف الآلات .

قد يزور كوفيرام حبة على قدر ذلك على قيمة السياحة أو تشغيل الآلات . إذا كانت الآفات تسب

لك الشعور بالدوار أو الصداع أو التعب ، أو تسب لك الصداع ، فيجب أن تتجنب السياحة أو تشغيل

الآلات وأن تصلط طبقيتك على الفور .

يمكنك كوفيرام حبة ، على سكر الطبيب

إذا كان طبقيتك قد سنت وأعلمك بذلك مصاف عدم تحمل بعض أنواع السكر ، فاصطل بالطبيب

1. ما الذي يفعله كوفيرام ، حيث وفي أي حالة يستعمل ؟

الفترة اللاحقة الصيدلانية : مثبط للعصير الغروية للأمليوتين (IIC) وحاصر للكلسوم .

C09BB04 / ATC

يوصف كوفيرام ، حبة لعلاج ارتفاع الضغط الشرياني / أو لعلاج الأمراض الإكليلية الثابتة (في حال

النافس أو قطاع الدم الوراء للقلب) .

فيما كان المرضى الذين يستخدمون بواسطة البيراتنوريل والأملوديبين أن ياخذوا كلاً المادتين في

حصة واحدة من كوفيرام ، حبة .

الدواء يستلزم صحة مراجعة من ماددين مقلعين : البيراتنوريل والأملوديبين .

كوفيرام® 5 ملغم / 10 ملغم

بيراتنوريل أرجينين / أملوديبين

كوفيرام® 5 ملغم / 5 ملغم

بيراتنوريل أرجينين / أملوديبين

كوفيرام® 10 ملغم / 10 ملغم

بيراتنوريل أرجينين / أملوديبين

كوفيرام® 10 ملغم / 5 ملغم

بيراتنوريل أرجينين / أملوديبين

اقرأ بدقة هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء . لأنها تحتوي على معلومات هامة لك .

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج لاستئناف إليها من جديد .
- إذا كانت لديك أستئناف أخرى إسأل الطبيب أو الصيدلاني .
- لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً . فلا يجوز إطلاقه على شخص آخر ، حتى وإن كانت الأعراض متشابهة ، فقد تلحق بهضرر .
- إذا شعرت بأي آثار جانبية غير المرغوب بها في هذه النشرة .
- إذا شعرت بأي آثار جانبية غير المرغوب بها في هذه النشرة .
- انتظر إلى مقطعي

COVERAM® 5mg/5mg

Péridopril arrière / amlodipine

30 comprimés



- في هذه النشرة :
1. ما هو كوفيرام ، وما هي المعلومات
2. كيف يؤخذ كوفيرام
3. ما في الآثار الجانبية
4. كيف يمكن تجنب الآثار الجانبية
5. محتوى العبوة

208.00

بكميات ضئيلة .
وذلك الإصداع .

الرسارات ، ويمكن طلبك أن تخالطك علاجاً إذا كنت
قد يزور كوفيرام حبة على قدر ذلك على قيمة السيارة أو تشغيل الآلات . إذا كانت الآفات تسب

ذلك الشعور بالدوار أو الصداع أو التعب ، أو تسب لك الصداع ، فيجب أن تتجنبقيادة السيارة أو تشغيل

الآلات وأن تصلط طبقيتك على الفور .

يمكنك كوفيرام حبة ، على سكر الطبيب

إذا كان طبقيك قد سنت وأعلمك بذلك مصاد ب عدم تحمل بعض أنواع السكر . فما يلي

1. ما هو كوفيرام ، حبة وفي أي حالة يستعمل ؟
الثانية الأدوية الصيدلانية : مثبط للعصير الغروية للأملاحين (IIC) وحاصر للكلسوم .

C09BB04 / ATC

يوصف كوفيرام ، حبة لعلاج ارتفاع الضغط الشرياني / أو لعلاج الأمراض الإكليلية الثابتة (في حال تناقص أو انقطاع الدم الوارد للقلب) .

فيما كان المرضى الذين يستخدمون بواسطة البيراتنوريل والأملوديبين أن يأخذوا كلاً المادتين في حبة واحدة من كوفيرام ، حبة .


الثانية الأدوية الصيدلانية : مثبط للعصير الغروية للأملاحين (IIC) .

ZYLORIC® 100 mg, 200 mg et 300 mg, comprimés
ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
 - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :



Le cas est-il utilisé ?
t de prendre ZYLORIC

1. Qu'est-ce
2. Quelles s
comprimés
3. Comment
4. Quels son
5. Comment c
6. Information

1. QU'EST-CE UTILISE ?

Les comprimés agit en ralentis organisme afin de ZYLORIC, comp d'urate/d'acide à une substance unique. Ces dépôts sont responsables de la goutte ou de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problème rénaux.



6 118000 022268

appelé l'allopurinol. chimiques dans votre sang et les urines. formation de dépôts trop grande quantité

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres

LOT 191660

EXP 07 2023

PPV 46,70 DH

Les diurétiques etou un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).

- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
 - Etes d'origine chinoise, ethnie Han, africaine ou indienne.
 - Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé:

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients prenant l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des ulcères au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctivite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont souvent précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, maux de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut évoluer vers une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. En cas d'éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez de prendre