

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Aïal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Aïal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W19-528867

☐ Maladie ☒ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e) **23901**

Matricule : **2932** Société : **R.A.M.**

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre : **RETRAITE**

Nom & Prénom : **ATICA M. Mohamed**

Date de naissance : **15-04-1958**

Adresse : **HAY EL ALA 1 89 REG EL OULFA CASA**

Tél. : **0664.662230** Total des frais engagés : **479,56** Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : **08/02/20**

Nom et prénom du malade : **Atica M. Mohamed**

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : **23901**

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : **CASA BLANCA**

Le : **03/03/2020**

Signature de l'adhérent(e) : **Atica M. Mohamed**

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
05/03/16	2	1		

Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
 INF: 09116 1711
 DE LA SANTE PUBLIQUE
 DE LA REGION PACA
 DE LA REGION PACA
 DE LA REGION PACA

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien
 ou du Fournisseur

Date

Montant de la Facture

Le 03/03/16

479,10

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du
 Laboratoire et du Radiologue

Date

Désignation des
 Coefficients

Montant
 des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature
 du Particien

Date des
 Soins

Nombre

AM

PC


IM

IV


Montant détaillé
 des Honoraires

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous
 les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F.
 PROTHESES DENTAIRES



DETERMINATION DU CCEFFICIENT
 MASTICATOIRE

H		G	
25533412	21433552		
00000000	00000000		
D			
00000000	00000000		
35533411	11433553		
	B		

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

CCEFFICIENT
 DES TRAVAUX

MONTANTS
 DES SOINS

DEBUT
 D'EXECUTION

FIN
 D'EXECUTION

CCEFFICIENT
 DES TRAVAUX

MONTANTS
 DES SOINS

DATE DU
 DEVIS

DATE DE
 L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

ORDONNANCE

Le: 03/03/20

American Home

79,80x2

2 - Opoid 4mg



x 2

2800x3

2 - Olayon M



48100

M 2



x 3

3 - Somach

15106

h - Penda



c - Zuit



19,40

1 - Aug

123,00

2 - Bio indant



BIOMARTIAL

Lipofer



Lot : BM11
Exp : 07/2022
PAC : 123Dh

AMM N° : 214 DAT/PH

P.P.V. : 15,50 DH

الإرشادات - حالات عدم الإستعمال
المقارن وكيفية الإستعمال
اقرأ البيان داخله.

Indications - Contre-indications

- Dermophyties cutanées.
- Pityriasis versicolor.
- Dysidrose.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :

Voie cutanée.

Appliquer la solution à l'aide d'un coton ou coton-tige 2 fois par jour en badigeonnant les lésions, tout en débordant largement la région atteinte.

Durée du traitement : traiter jusqu'à complète disparition des signes cutanés.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

- FONDERMA® peut être appliquée pendant la grossesse.
- En cas d'allaitement ne pas appliquer sur la poitrine.

En cas de doute, demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

FONDERMA® Solution est un médicament : ne pas laisser à la portée des enfants.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas avaler ;
- Ne pas appliquer sur les muqueuses ;
- D'application facile, FONDERMA ne tache pas le linge.

EFFETS INDESIRABLES :

FONDERMA® est généralement bien tolérée.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Signaler tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

AUTRE PRESENTATION :

FONDERMA® émulsion 0,5% : flacon de 60 ml.

AMM N° : 214 DAT/PH

Révision : Avril 2012

MA®
E 1 %)
N



LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES GALENICA
Z.I. Ouled Saleh - Casablanca - Maroc

GEPRID®

Glimépiride

Un comprimé contient :

GEPRID® 1 mg	GEPRID® 2 mg	GEPRID® 3 mg	GEPRID® 4 mg
Glimépiride	1 mg	2 mg	3 mg
Excipients	(dont lactose et E172) q.s.p.	(dont lactose et E172) q.s.p.	(dont lactose et E172) q.s.p.



P 08 06 19 00 1
P 03 03 22
P 06 09 00 00

08,67

Propriétés :

Antidiabétique oral (sulfamide hypoglycémiant appartenant à la classe du diabète sucré non-insulino-dépendant.

Indications thérapeutiques :

Diabète sucré non insulino-dépendants (de type II) chez l'adulte, lorsqu'il y a une insuffisance relative de l'insuline et la réduction pondérale pour rétablir l'équilibre.

Contre-indications :

Diabète insulino-dépendant, troubles rénaux ou hépatiques, hypersensibilité au glibépiride, et un traitement concomitant par des médicaments susceptibles d'entraîner une hypoglycémie.

Effets indésirables :

Possibilité de troubles digestifs, ou d'une éruption cutanée. En cas de douleur, signalez-le à votre médecin. Exceptionnellement, ce médicament peut provoquer une jaunisse. En cas d'hypoglycémie, on observe les manifestations secondaires suivantes : sueurs froides, pouls rapide, faim, anxiété et difficultés respiratoires. En cas de doute, consommez des sucres rapides. En cas d'hypoglycémie grave contactez votre médecin traitant ou les urgences médicales.

GEPRID®

Glimépiride

Un comprimé contient :

GEPRID® 1 mg	GEPRID® 2 mg	GEPRID® 3 mg	GEPRID® 4 mg
Glimépiride	1 mg	2 mg	3 mg
Excipients	(dont lactose et E172) q.s.p.	(dont lactose et E172) q.s.p.	(dont lactose et E172) q.s.p.



P 08 06 19 00 1
P 03 03 22
P 06 09 00 00

08,67

Propriétés :

Antidiabétique oral (sulfamide hypoglycémiant appartenant à la classe du diabète sucré non-insulino-dépendant.

Indications thérapeutiques :

Diabète sucré non insulino-dépendants (de type II) chez l'adulte, lorsqu'il y a une insuffisance relative de l'insuline et la réduction pondérale pour rétablir l'équilibre.

Contre-indications :

Diabète insulino-dépendant, troubles rénaux ou hépatiques, hypersensibilité au glibépiride, et un traitement concomitant par des médicaments susceptibles d'entraîner une hypoglycémie.

Effets indésirables :

Possibilité de troubles digestifs, ou d'une éruption cutanée. En cas de douleur, signalez-le à votre médecin. Exceptionnellement, ce médicament peut provoquer une jaunisse. En cas d'hypoglycémie, on observe les manifestations secondaires suivantes : sueurs froides, pouls rapide, faim, anxiété et difficultés respiratoires. En cas de doute, consommez des sucres rapides. En cas d'hypoglycémie grave contactez votre médecin traitant ou les urgences médicales.

Fucidine® 2% pommade

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce nouveau. Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ne le donnez à personne d'autre. Vous risqueriez de lui causer tort, même

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

DÉNOMINATION

FUCIDINE® 2%, pommade

COMPOSITION QUALITATIVE / QUANTITATIVE

COMPOSITION	
Fusidate de sodium	Excipients q.s.p.
2 g	100 g
Combi	
0 mg	15 g

Fucidine® 2%
pommade Tube de 15 g

02,20

Excipients : alcool cétylique, lanoline, vaseline, paraffine liquide.

FORME PHARMACEUTIQUE

Pommade, tube de 15 g.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

ANTI-INFECTIEUX

Antibiotiques-antibactériens / antibiotiques actifs sur la synthèse des protéines

(D : Dermatologie).

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Le médicament est un antibiotique.

Le médicament est préconisé dans les infections cutanées dues à des germes staphylocoques et streptocoques.

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Le médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

• allergie à l'acide fusidique ou à l'un des excipients.

• infections mammaires lors de traitement en raison du risque d'absorption du produit par le nouveau-né.

MISES EN GARDE SPÉCIALES

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

• La pommade ne doit pas être appliquée sur l'œil.

• Ne pas utiliser la pommade sur de trop grandes surfaces, en particulier chez le nourrisson.

• Ne pas utiliser la pommade sur les lésions superficielles macérées, ni dans les plaies, ni sur les ulcères de jambe.

• EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

ATTENTION : Les interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en

avoir besoin de la lire à
personnellement prescrit,



AMEPE® 5 mg, 10 mg Comprimés (Amlodipine béslate)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament ~~est~~ doit être soigneusement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

- 1- Où est ce que AMEPE® comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre AMEPE® comprimés ?
- 3- Comment prendre AMEPE® comprimés ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver AMEPE® comprimés ?
- 6- Informations supplémentaires ?
- 1- Où est ce que AMEPE® et dans quels cas est-il utilisé ?
- AMEPE® contient la substance active amlodipine qui appartient au groupe de médicaments appelé « AMEPE® » est utilisé pour traiter l'augmentation de la pression artérielle (hypertension), ou l'angor de Prinzmetal.
- Chez les patients présentant des valeurs élevées de la pression artérielle, votre médicament agit rapidement, de telle sorte que le sang les traverse plus facilement. Chez les patients atteints d'angor, l'apport sanguin au muscle cardiaque, qui reçoit ainsi plus d'oxygène, ce qui prévient l'apparition d'une crise cardiaque. Si vous présentez une douleur de poitrine, consultez immédiatement votre médecin.
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre AMEPE® ?
- a- Contre-indications :
- Ne prenez jamais AMEPE® comprimés dans les cas suivants :
 - Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'amlodipine ou à l'un des autres composants contenus dans la notice.
 - Si vous êtes atteint d'une maladie du cœur, d'un trouble du rythme cardiaque, d'une insuffisance cardiaque, d'une maladie du foie ou des difficultés respiratoires.
 - Si vous présentez une basse fréquence de la pression artérielle (hypotension).
 - Si vous présentez un rétrécissement de la valve aortique (sténose aortique) ou un choc cardiogénique (une affection dans laquelle votre cœur était incapable d'apporter suffisamment de sang à l'organisme).
- Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque hémodynamiquement instable après un infarctus aigu du myocarde.
- EN CAS DE DOULEUR, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
- b- Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

Vous devez informer votre médecin si vous présentez ou avez présenté l'une des conditions suivantes :

- Crise cardiaque récente
- Augmentation sévère de la pression artérielle (forte hypertension)
- Maladie du foie
- Vous êtes une personne âgée et votre dose a besoin d'être augmentée
- Insuffisance cardiaque
- EN CAS DE DOULEUR, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Enfants et adolescents

AMEPE® n'a pas été étudié chez l'enfant âgé de moins de 6 ans. AMEPE® ne doit être utilisé que pour le traitement de l'hypertension chez les enfants et les adolescents âgés de 6 à 17 ans (voir rubrique 3).

Pour des informations complémentaires, veuillez vous adresser à votre médecin.

c- Interactions médicamenteuses :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

AMEPE® peut affecter ou être affecté par d'autres médicaments, tel que :

- Le kétoconazole, l'itraconazole (médicaments antifongiques).
- Le rifampicine, l'indinavir, le névirapine (aspects antirétroviraux ou protéase utilisés pour traiter l'infection par le VIH).
- La rifampicine, l'érythromycine, la claritromycine (antibiotiques).
- Hypericum perforatum (millepertuis).
- Le verapamil, le diltazem (médicaments pour le cœur).
- La dantrolène (utilisée pour les augmentations sévères de la température corporelle).
- La simvastatine (médicament diminuant le taux de cholestérol).
- AMEPE® peut diminuer votre pression artérielle encore davantage si vous prenez déjà d'autres médicaments destinés à traiter l'augmentation de la pression artérielle.
- EN CAS DE DOULEUR, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

d- Interactions avec les aliments et les boissons :

Le jus de pamplemousse et le pamplemousse peuvent entraîner une augmentation des concentrations sanguines du médicament et l'amlodipine, ce qui peut entraîner une augmentation imprévisible de l'effet hypotenseur de AMEPE®.

e- Grossesse et allaitement :

La sécurité de l'amlodipine chez la femme enceinte n'a pas été établie. Si vous pensez être enceinte, ou si vous prévoyez d'être enceinte, vous devez en parler à votre médecin avant de prendre AMEPE®.

Il n'a pas été établi si l'amlodipine est excrétée dans le lait maternel. Si vous allaitez ou si vous êtes sur le point d'allaiter, vous devez en parler à votre médecin avant de prendre AMEPE®.

04/84

**GLUCOPHAGE 1000mg, comprimé pelliculé, boîte de 30
chlorhydrate de metformine.**

Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

LOT 191499
EXP 10/2022
PPV 28.00DH

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que GLUCOPHAGE 1000 ?

Cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à

GLUCOPHAGE 1000mg, comprimé pel-

3. Comment prendre GLUCOPHAGE 1000

4. Quels sont les effets indésirables évit-

5. Comment conserver GLUCOPHAGE

6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE GLUCOPHAGE ?

DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

GLUCOPHAGE contient de la metformine

pour traiter le diabète. Il appartient à la

biguanides.

Indications Thérapeutiques

L'insuline est une hormone produite par

corps de récupérer le glucose (sucre,

utilise le glucose pour produire de l'énergie.

Lorsque vous avez du diabète, votre pan-

d'insuline ou votre corps n'est pas capa-

qu'il produit. Ceci aboutit à un taux de

GLUCOPHAGE aide à faire baisser votre

un niveau aussi normal que possible.

Si vous êtes un adulte en surpoids, le

terme permet également d'aider à li-

associées au diabète. GLUCOPHAGE

pondérale ou une modeste perte de po-

GLUCOPHAGE est utilisé pour traiter le

diabète non insulino-dépendant ».

l'exercice physique seuls n'ont pas su-

sanguin ; il est particulièrement utilisé o-

Les patients adultes pourront prendre

d'autres médicaments contre le diabète

(l'insuline).

Les enfants de 10 ans et plus et

GLUCOPHAGE seul ou avec l'insuline.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS

PRENDRE GLUCOPHAGE 1000mg, co-

Contre-indications

Ne prenez jamais GLUCOPHAGE 1000

- Si vous êtes allergique (hypersensi-

autres composants contenus dans ce

GLUCOPHAGE 1000mg, comprimé pelliculé

- Si vous avez des problèmes hépatiques ou

glomulaire inférieur à 45 mL/min).

- Si vous avez un diabète non contrôlé,

hyperglycémie sévère (taux de sucre trop

de vomissements, d'une déshydratation,

d'une acidocétose. L'acidocétose est une

accumulation dans le sang de substances

et qui peut provoquer un précoma diabé-

particulièrement une douleur à l'estomac,

profonde. Une envie de dormir ou une

habituelle.

- Si vous avez perdu trop d'eau (déshydratation),

diarrhée persistante ou sévère ou si vous

La déshydratation peut entraîner des

mettre en danger d'acidose lactique (voir

- Si vous avez une infection grave, par

ou des bronches, ou une infection des

Des infections sévères peuvent entraîner

mettre en danger d'acidose lactique (voir

- Si vous prenez un traitement contre

vous avez récemment eu une crise

problèmes de circulation sanguine (tel

difficultés respiratoires. Ceci peut

oxygène des tissus, qui peut vous

Le que contient GLUCOPHAGE 1000mg, comprimé pelliculé dans la rubrique 6)

Si vous avez des problèmes hépatiques ou rénaux (débit de filtration glomulaire inférieur à 45 mL/min).

Si vous avez un diabète non contrôlé, s'accompagnant par exemple d'une hyperglycémie sévère (taux de sucre trop élevé dans le sang), de nausées, de vomissements, d'une déshydratation, d'une perte de poids rapide ou d'une acidocétose. L'acidocétose est une affection qui consiste en une accumulation dans le sang de substances appelées « corps cétoniques » et qui peut provoquer un précoma diabétique. Les symptômes sont plus particulièrement une douleur à l'estomac, une respiration rapide et profonde. Une envie de dormir ou une haleine ayant une odeur fruitée inhabituelle.

Si vous avez perdu trop d'eau (déshydratation), par exemple suite à une diarrhée persistante ou sévère ou si vous avez vomis plusieurs fois d'affilée. La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).

Si vous avez une infection grave, par exemple une infection des poumons ou des bronches, ou une infection des reins.

Des infections sévères peuvent entraîner des problèmes de reins qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).

Si vous prenez un traitement contre l'insuffisance cardiaque aigüe ou si vous avez récemment eu une crise cardiaque, si vous souffrez de graves problèmes de circulation sanguine (tel un choc) ou si vous avez des difficultés respiratoires. Ceci peut entraîner un manque d'apport en oxygène des tissus, qui peut vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).

GLUCOPHAGE 1000mg, comprimé pelliculé, boîte de 30
chlorhydrate de metformine.

Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Mentionnez dans la rubrique « Avertissement et précautions » :

- Garder cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, portez-en à votre médecin.

Cette notice a aussi à tout effet

Sommaire notice

Que contient cette notice :

1. Qu'est que GLUCOPHAGE 1000mg
2. Quelles sont les informations à GLUCOPHAGE 1000mg, comprimé pelliculé
3. Comment prendre GLUCOPHAGE 1000mg
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver GLUCOPHAGE 1000mg
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE GLUCOPHAGE 1000mg

DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique
GLUCOPHAGE contient de la metformine pour traiter le diabète. Il appartient à la classe des biguanides.

Indications Thérapeutiques

L'insuline est une hormone produite par le corps de récupérer le glucose (sucre) et utilise le glucose pour produire de l'énergie. Lorsque vous avez du diabète, votre pancréas ne produit pas assez d'insuline ou votre corps n'est pas capable d'utiliser l'insuline qu'il produit. Ceci aboutit à un taux de glucose dans le sang trop élevé. GLUCOPHAGE aide à faire baisser votre taux de glucose dans le sang. Si vous êtes un adulte en surpoids, le traitement par GLUCOPHAGE permet également d'aider à perdre du poids. GLUCOPHAGE est utilisé pour traiter le diabète non insulino-dépendant (DM2). L'exercice physique seul n'est pas suffisant ; il est particulièrement utile pour les patients adultes pour contrôler leur diabète. Les autres médicaments contre le diabète (l'insuline).

Les enfants de 10 ans et plus et les adultes peuvent également prendre GLUCOPHAGE seul ou avec l'insuline.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS IMPORTANTES À CONNAÎTRE ?

Contre-indications

Ne prenez jamais GLUCOPHAGE 1000mg

- Si vous êtes allergique (hypersensibilité) aux composants contenus dans ce médicament (voir la rubrique 6).
- Si vous avez des problèmes hépatiques ou rénaux (débit de filtration glomérulaire inférieur à 45 mL/min).
- Si vous avez un diabète non contrôlé, s'accompagnant par exemple d'une hyperglycémie sévère (taux de sucre trop élevé dans le sang), de nausées, de vomissements, d'une déshydratation, d'une perte de poids rapide ou d'une acidocétose. L'acidocétose est une affection qui consiste en une accumulation dans le sang de substances appelées « corps cétoniques » et qui peut provoquer un précoma diabétique. Les symptômes sont plus particulièrement une douleur à l'estomac, une respiration rapide et profonde. Une envie de dormir ou une haleine ayant une odeur fruitée inhabituelle.
- Si vous avez perdu trop d'eau (déshydratation), par exemple suite à une diarrhée persistante ou sévère ou si vous avez vomis plusieurs fois d'affilée.

La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).

- Si vous avez une infection grave, par exemple une infection des poumons ou des bronches, ou une infection des reins.

Des infections sévères peuvent entraîner des problèmes de reins qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).

- Si vous prenez un traitement contre l'insuffisance cardiaque aiguë ou si vous avez récemment eu une crise cardiaque, si vous souffrez de graves problèmes de circulation sanguine (tel un choc) ou si vous avez des difficultés respiratoires. Ceci peut entraîner un manque d'apport en oxygène des tissus, qui peut vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).

LOT 191499
EXP 10/2022
PPV 28.00DH

**GLUCOPHAGE 1000mg, comprimé pelliculé, boîte de 30
chlorhydrate de metformine.**

Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que GLUCOPHAGE 1000 ?

Ceci est-il utilisé ?

Quelles sont les informations à

GLUCOPHAGE 1000mg, comprimé pelliculé

3. Comment prendre GLUCOPHAGE 1000

4. Quels sont les effets indésirables éventuels

5. Comment conserver GLUCOPHAGE 1000

6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE GLUCOPHAGE ?

DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

GLUCOPHAGE contient de la metformine

pour traiter le diabète. Il appartient à la

biguanides.

Indications Thérapeutiques

L'insuline est une hormone produite par

corps de récupérer le glucose (sucre).

utilise le glucose pour produire de l'énergie.

Lorsque vous avez du diabète, votre pan-

d'insuline ou votre corps n'est pas capable

qu'il produit. Ceci aboutit à un taux de

GLUCOPHAGE aide à faire baisser votre

un niveau aussi normal que possible.

Si vous êtes un adulte en surpoids, le

terme permet également d'aider à limiter

associées au diabète. GLUCOPHAGE

pondérale ou une modeste perte de poids.

GLUCOPHAGE est utilisé pour traiter le

diabète non insulino-dépendant »

l'exercice physique seuls n'ont pas suffi

sanguin ; il est particulièrement utilisé chez

Les patients adultes pourront prendre

d'autres médicaments contre le diabète

(l'insuline).

Les enfants de 10 ans et plus et

GLUCOPHAGE seul ou avec l'insuline

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS

PRENDRE GLUCOPHAGE 1000mg, comprimé pelliculé

Contre-indications

Ne prenez jamais GLUCOPHAGE 1000

- Si vous êtes allergique (hypersensibilité

autres composants contenus dans ce médicament (voir la rubrique 6)

GLUCOPHAGE 1000mg, comprimé pelliculé » dans la rubrique 6)

- Si vous avez des problèmes hépatiques ou rénaux (débit de filtration

glomérulaire inférieur à 45 mL/min).

- Si vous avez un diabète non contrôlé, s'accompagnant par exemple d'une

hyperglycémie sévère (taux de sucre trop élevé dans le sang), de nausées,

de vomissements, d'une déshydratation, d'une perte de poids rapide ou

d'une acidocétose. L'acidocétose est une affection qui consiste en une

accumulation dans le sang de substances appelées « corps cétoniques »

et qui peut provoquer un précoma diabétique. Les symptômes sont plus

particulièrement une douleur à l'estomac, une respiration rapide et

profonde. Une envie de dormir ou une haleine ayant une odeur fruitée

inhabituelle.

- Si vous avez perdu trop d'eau (déshydratation), par exemple suite à une

diarrhée persistante ou sévère ou si vous avez vomis plusieurs fois d'affilée

La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins qui peuvent vous

mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).

- Si vous avez une infection grave, par exemple une infection des poumons

ou des bronches, ou une infection des reins.

Des infections sévères peuvent entraîner des problèmes de reins qui peuvent vous

mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).

- Si vous prenez un traitement contre l'insuffisance cardiaque aiguë ou si

vous avez récemment eu une crise cardiaque, si vous souffrez de graves

problèmes de circulation sanguine (tel un choc) ou si vous avez des

difficultés respiratoires. Ceci peut entraîner un manque d'apport en

oxygène des tissus, qui peut vous mettre en danger d'acidose lactique (voir

LOT 191499
EXP 10/2022
PPV 28.00DH

**GLUCOPHAGE 1000mg, comprimé pelliculé, boîte de 30
chlorhydrate de metformine.**

Ne lisez pas cette notice avant de prendre ce médicament et tout au long de votre traitement.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Attention : Ce médicament est un médicament à usage oral. Il ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que GLUCOPHAGE 1000 ?

Ceci est-il utilisé ?

Quelles sont les informations à

GLUCOPHAGE 1000mg, comprimé pelliculé

3. Comment prendre GLUCOPHAGE 1000

4. Quels sont les effets indésirables éventuels

5. Comment conserver GLUCOPHAGE 1000

6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE GLUCOPHAGE ?

DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

GLUCOPHAGE contient de la metformine

pour traiter le diabète. Il appartient à la

biguanides.

Indications Thérapeutiques

L'insuline est une hormone produite par

corps de récupérer le glucose (sucre).

utilise le glucose pour produire de l'énergie.

Lorsque vous avez du diabète, votre pan-

d'insuline ou votre corps n'est pas capable

qu'il produit. Ceci aboutit à un taux de

GLUCOPHAGE aide à faire baisser votre

un niveau aussi normal que possible.

Si vous êtes un adulte en surpoids, le

terme permet également d'aider à limiter

associées au diabète. GLUCOPHAGE

pondérale ou une modeste perte de poids.

GLUCOPHAGE est utilisé pour traiter le

diabète non insulino-dépendant »

l'exercice physique seuls n'ont pas suffi

sanguin ; il est particulièrement utilisé chez

Les patients adultes pourront prendre

d'autres médicaments contre le diabète

(l'insuline).

Les enfants de 10 ans et plus et

GLUCOPHAGE seul ou avec l'insuline

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS

PRENDRE GLUCOPHAGE 1000mg, comprimé pelliculé

Contre-indications

Ne prenez jamais GLUCOPHAGE 1000

- Si vous êtes allergique (hypersensibilité

autres composants contenus dans ce médicament (voir la rubrique 6)

GLUCOPHAGE 1000mg, comprimé pelliculé » dans la rubrique 6)

- Si vous avez des problèmes hépatiques ou rénaux (débit de filtration

glomérulaire inférieur à 45 mL/min).

- Si vous avez un diabète non contrôlé, s'accompagnant par exemple d'une

hyperglycémie sévère (taux de sucre trop élevé dans le sang), de nausées,

de vomissements, d'une déshydratation, d'une perte de poids rapide ou

d'une acidocétose. L'acidocétose est une affection qui consiste en une

accumulation dans le sang de substances appelées « corps cétoniques »

et qui peut provoquer un précoma diabétique. Les symptômes sont plus

particulièrement une douleur à l'estomac, une respiration rapide et

profonde. Une envie de dormir ou une haleine ayant une odeur fruitée

inhabituelle.

- Si vous avez perdu trop d'eau (déshydratation), par exemple suite à une

diarrhée persistante ou sévère ou si vous avez vomis plusieurs fois d'affilée

La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins qui peuvent vous

mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).

- Si vous avez une infection grave, par exemple une infection des poumons

ou des bronches, ou une infection des reins.

Des infections sévères peuvent entraîner des problèmes de reins qui peuvent vous

mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).

- Si vous prenez un traitement contre l'insuffisance cardiaque aiguë ou si

vous avez récemment eu une crise cardiaque, si vous souffrez de graves

problèmes de circulation sanguine (tel un choc) ou si vous avez des

difficultés respiratoires. Ceci peut entraîner un manque d'apport en

oxygène des tissus, qui peut vous mettre en danger d'acidose lactique (voir

LOT 191499
EXP 10/2022
PPV 28.00DH

SIMCOR® 40 mg
Surréaliste ché,hydrate

COMPOSITION

La substance active est

l'antipsychotique chlorhydrate (C2)

Les autres composants sont :

lactose monohydraté, amidon de maïs prémodifié, cellulose microcristalline, croscarmellose sodique (CC)

SIMCOR® 40 mg comprend environ 30 mg

de chlorhydrate de chlorhydrate de 30

EXEMPLE À EFFET NOTABLE

- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Si vous ne pouvez pas vous procurer le produit, contactez votre pharmacien.
- Le médicament vous a été prescrit pour un effet thérapeutique non habituel, dans ce cas, ne le prenez pas.
- Si un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non habituel, dans ce cas, contactez votre médecin.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.


Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

48,04



• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.

• Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis médical.