

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET ÉVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Réclamation | : contact@mupras.com |
| Prise en charge | : pec@mupras.com |
| Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent [e]

Matricule : 6986 Société : RAM

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : Serbouti Abdellah

Date de naissance : 15/07/1959

Adresse :

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.



J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) : 

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
		44,20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ORL.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

صيدلية سحنون PHARMACIE SAHNOUN SAHNOUN FATIHA



Docteur en Pharmacie

FACTURE

№ 700225

Casablanca le : Mr. Sabouti AbdellKader

Quantité	Désignation	Prix U.	Prix T.
01	Difof 50g	44.20	44.20
	celle facture Annette		
	adhésive 146.20		

Hay El Walaa Tranche 5 Imm 11 N° 1et3 Bd. Mohammed Zefzaf Sidi Moumen Casablanca
Patente : 33033336 - R.C. : 242846 - I.F. : 48333104 - CNSS : 2361989 - ICE : 001644641000032

DIFAL®

Diclofénac de sodium

Formes	Composition	Présentation
Diclofénac de sodium	Diclofénac sodique 50 mg Diclofénac de sodium 50 mg Boîte de 30 comprimés P.P.V. : 44,20 D	Diclofénac sodique 25 mg / 50 mg Diclofénac sodique 50 mg / 50 mg Boîte de 30

Diclofénac sodique 50 mg
Diclofénac de sodium 50 mg
Boîte de 30 comprimés

Diclofénac sodique 25 mg / 50 mg
Diclofénac sodique 50 mg / 50 mg
Boîte de 30

Diclofénac sodique 25 mg / 50 mg
Diclofénac sodique 50 mg / 50 mg
Boîte de 30

Diclofénac sodique 25 mg / 50 mg
Diclofénac sodique 50 mg / 50 mg
Boîte de 30

Diclofénac sodique 25 mg / 50 mg
Diclofénac sodique 50 mg / 50 mg
Boîte de 30

Diclofénac sodique 25 mg / 50 mg
Diclofénac sodique 50 mg / 50 mg
Boîte de 30

Diclofénac sodique 25 mg / 50 mg
Diclofénac sodique 50 mg / 50 mg
Boîte de 30

Diclofénac sodique 25 mg / 50 mg
Diclofénac sodique 50 mg / 50 mg
Boîte de 30

Diclofénac sodique 25 mg / 50 mg
Diclofénac sodique 50 mg / 50 mg
Boîte de 30

Diclofénac sodique 25 mg / 50 mg
Diclofénac sodique 50 mg / 50 mg
Boîte de 30

Diclofénac sodique 25 mg / 50 mg
Diclofénac sodique 50 mg / 50 mg
Boîte de 30

Diclofénac sodique 25 mg / 50 mg
Diclofénac sodique 50 mg / 50 mg
Boîte de 30

Diclofénac sodique 25 mg / 50 mg
Diclofénac sodique 50 mg / 50 mg
Boîte de 30

Diclofénac sodique 25 mg / 50 mg
Diclofénac sodique 50 mg / 50 mg
Boîte de 30

Diclofénac sodique 25 mg / 50 mg
Diclofénac sodique 50 mg / 50 mg
Boîte de 30

Diclofénac sodique 25 mg / 50 mg
Diclofénac sodique 50 mg / 50 mg
Boîte de 30

Diclofénac sodique 25 mg / 50 mg
Diclofénac sodique 50 mg / 50 mg
Boîte de 30

Diclofénac sodique 25 mg / 50 mg
Diclofénac sodique 50 mg / 50 mg
Boîte de 30

Diclofénac sodique 25 mg / 50 mg
Diclofénac sodique 50 mg / 50 mg
Boîte de 30

Diclofénac sodique 25 mg / 50 mg
Diclofénac sodique 50 mg / 50 mg
Boîte de 30

Diclofénac sodique 25 mg / 50 mg
Diclofénac sodique 50 mg / 50 mg
Boîte de 30

Diclofénac sodique 25 mg / 50 mg
Diclofénac sodique 50 mg / 50 mg
Boîte de 30

Diclofénac sodique 25 mg / 50 mg
Diclofénac sodique 50 mg / 50 mg
Boîte de 30

Diclofénac sodique 25 mg / 50 mg
Diclofénac sodique 50 mg / 50 mg
Boîte de 30

Diclofénac sodique 25 mg / 50 mg
Diclofénac sodique 50 mg / 50 mg
Boîte de 30

Effet thérapeutique : comme avec la plupart des AINS, on peut observer une augmentation du taux d'une ou plusieurs enzymes hépatiques. Intervalle entre les doses d'antalgiques ou d'antihistaminiques ou d'apprécier la fonction hépatique lors de signes cliniques d'hépatopathie ou d'autres manifestations.

Procédures d'emploi : le diclofénac, comme tout médicament inhibiteur de la synthèse des cyclo-oxygénases et des prostaglandines, peut altérer la fertilité. Son utilisation n'est pas recommandée lors des femmes qui souhaitent concevoir un enfant.

Au cours de traitement prolongé, il est recommandé de surveiller la formule sanguine, les fonctions hépatique et rénale.

Cytoprotecteurs résistants à 25 mg et à 50 mg : ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase ou Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Diclofénac 75 mg injectable contient de l'alcool benzylique. Il peut provoquer des réactions toxiques et allergiques chez les nourrissons et les enfants jusqu'à 3 ans.

Diclofénac 75 mg injectable contient du propylène glycol et peut provoquer des réactions semblables à celles provoquées par l'alcool.

Diclofénac 75 mg injectable contient du méthabisulfite de sodium et peut provoquer des réactions allergiques sévères, une réaction respiratoire.

GROSSESSE : jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée : l'utilisation de DIFAL® ne doit être envisagée que si nécessaire. Une prise prolongée est fortement déconseillée.

Un délai de 24 semaines d'aménorrhée toute prima, même ponctuelle, est contre-indiquée. Une prise par mégarapport (plus de 24 semaines d'aménorrhée) justifie une surveillance clinique et renale toute saison de l'expansion. La durée d'utilisation n'importe quel médicament ou scaphandre à la clé pour l'élimination de la molécule.

Altérité sur l'embryon : l'utilisation de l'embryon, par mesure de précaution, il convient d'éviter les médicaments chez la femme qui attend.

En cas de douleur ou de complications, demander l'avis de votre pharmacien et utilisez de MACHINES.

DIFAL® est un médicament. Ne pas donner à la portée des enfants.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES. Aucune étude spécifique n'a été effectuée sur l'efficacité de ces machines. Les patients doivent être informés sur ces machines et à utiliser des machines n'a été effectuée. Il est recommandé de se soumettre de vérifications ou autres troubles du système nerveux central. Il est recommandé de se soumettre de conduire ou d'utiliser des machines.

SURDOSEAGE : symptômes : céphalées, agitation nocturne, secousses musculaires, irritabilité accrue, ataxie, vertiges, convulsions surtout chez l'enfant en bas âge ; douleurs épigastriques, nausées, hépatite, coliques, diarrhée.

Conduite à tenir : transfert immédiat en milieu hospitalier spécialisé ; évacuation rapide du produit ingéré par lavage gastrique (pour les formes orales) ; traitement symptomatique d'acidose, d'ulcère, d'insuffisance rénale ou phénacétophen en cas de convulsions.

Instructions en cas d'administration d'une ou de plusieurs doses. Si vous souhaitez utiliser DIFAL, ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

EFFETS INDÉSIRABLES. Les personnes d'essais cliniques et d'études épidémiologiques indiquent constamment une augmentation du risque d'événements thrombotiques arteriels (par exemple infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral) associé à un traitement par le diclofénac.

Particulièrement à forte dose (150 mg/jour) et lors d'administration prolongée, les effets thrombotiques les plus fréquemment observés sont de nature gastro-intestinale. Des douleurs péristaltiques, perturbations ou anomalies gastro-intestinales, paroxysmatiques, peuvent être déclenchées par le diclofénac.

Des douleurs abdominales, diarrhées, flatulences, constipation, dispépsie, stomatite aigüe, ulcère gastroduodenal, perforation ou hématome digestif ; celles-ci sont d'autant plus fréquentes que la posologie utilisée est élevée.

Autres affections abdominales basses telles que colite hémorragique non spécifique, exacerbation de colite ulcérouse. On a été signalé des pancréatites discrètes de construction.

Effets gastro-intestinaux : au traitement, nausées, vomissements, diarrhées, crampes abdominaux, douleurs abdominales, dyspepsie anorexie, diarrhées, constipation, dispépsie, stomatite aigüe, ulcère gastroduodenal, perforation ou hématome digestif ; celles-ci sont d'autant plus fréquentes que la posologie utilisée est élevée.

Autres affections abdominales basses telles que colite hémorragique non spécifique, exacerbation de colite ulcérouse. On a été signalé des pancréatites discrètes de construction.

Effets gastro-intestinaux : au début de traitement, nausées, vomissements, diarrhées, crampes abdominaux, douleurs abdominales, dyspepsie anorexie, diarrhées, constipation, dispépsie, stomatite aigüe, ulcère gastroduodenal, perforation ou hématome digestif ; celles-ci sont d'autant plus fréquentes que la posologie utilisée est élevée.

Autres affections abdominales basses telles que colite hémorragique non spécifique, exacerbation de colite ulcérouse. On a été signalé des pancréatites discrètes de construction.

Effets gastro-intestinaux : au début de traitement, nausées, vomissements, diarrhées, crampes abdominaux, douleurs abdominales, dyspepsie anorexie, diarrhées, constipation, dispépsie, stomatite aigüe, ulcère gastroduodenal, perforation ou hématome digestif ; celles-ci sont d'autant plus fréquentes que la posologie utilisée est élevée.

Autres affections abdominales basses telles que colite hémorragique non spécifique, exacerbation de colite ulcérouse. On a été signalé des pancréatites discrètes de construction.

Effets gastro-intestinaux : au début de traitement, nausées, vomissements, diarrhées, crampes abdominaux, douleurs abdominales, dyspepsie anorexie, diarrhées, constipation, dispépsie, stomatite aigüe, ulcère gastroduodenal, perforation ou hématome digestif ; celles-ci sont d'autant plus fréquentes que la posologie utilisée est élevée.

Autres affections abdominales basses telles que colite hémorragique non spécifique, exacerbation de colite ulcérouse. On a été signalé des pancréatites discrètes de construction.