

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3106

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : Yousra Zolna

Date de naissance : 17/11/1969

Adresse : Cité El Mouna 5, Rue 11 Novembre

Tél. : 06 12 26 91 82

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté :

Lui-même


Conjoint

Age :

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :



Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le Bourg d'Oisans Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE LUMIERE Le Pharmacien : Kamal Adresse : INAFIA Tunisie : Ain Chok Tunisie : 32 44 32 52 44 32	6/31/2020	2059,50

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'odontologie.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

(Création, remont, adjonction)

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

Coefficient des travaux

MONTANTS DES SOINS

DATE DU
DEVIS

DATE DE
L'EXECUTION



PHARMACIE LUMIERES

MR LAHRICHI MED KAMAL

Casa, le 06/03/2020

FACTURE N° 02653

My Coastal Epitaph

QTE	Désignation	P.U	Total
4	Nootropylin	134,80	539,20
3	Kardogic 75	30,20	92,60
1	Kardogic 160	35,70	35,70
5	Kardinor	95,00	475,00
5	Zemovan 160	183,30	917,50

Accts la présente facture à la somme 2059,50
de Deux Ville Cingzate Neuf dit Cingzate
Cotizac

PHARIS
BY LATITUDE LUMINESCENCE
550 BOALAGH Maged Kamal
GOSALVAN RAO INAR
VER. 002 81

ICE: 001703254000036



Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

• Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la retrouver.

- Si vous avez toutes sortes d'effets indésirables, contactez immédiatement votre médecin ou un pharmacien.
- Ce médicament vous l'aidera à faire, même en cas de crise cardiaque.
- Si l'un des effets indésirables mentionnés dans cette notice vous dérange, contactez immédiatement votre médecin.

1. QU'EST-CE QUE ZENOVANA® ?

2. Quelles sont les indications ?

3. Comment prendre ZenoVana® ?

4. Quels sont les effets indésirables ?

5. Comment conserver ZenoVana® ?

6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ZENOVANA® ?

UTILISATION THÉRAPEUTIQUE

Classe pharmacothérapeutique

Zenovana®, comprimé

Il qui aide à contrôler

la pression dans l'organ

cardiaque et les arté

les artéries qui agit

en bloquant l'effet de l'angiotensine II, qui aide à réduire un ralentissement des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle.

Indications thérapeutiques :

Zenovana®, comprimé pelliculé, peut être utilisé pour traiter les affections suivantes :

• pour le traitement des patients adultes ayant récemment subi une crise cardiaque

• pour le traitement des patients adultes atteints d'insuffisance cardiaque symptomatique.

Zenovana®, comprimé pelliculé est utilisé quand les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) (qui sont des médicaments pour traiter l'insuffisance cardiaque) ne peuvent pas être utilisés. Zenovana®, comprimé pelliculé, peut être utilisé avec d'autres médicaments pour traiter l'insuffisance cardiaque si ces médicaments pour l'insuffisance cardiaque ne peuvent pas être utilisés. L'insuffisance cardiaque comprend les symptômes suivants : souffre court et profondément des pieds et des jambes par exemple à la circulation de la veine. Elle survient lorsque le muscle cardiaque ne peut pas pomper suffisamment de sang pour nourrir la quantité de sang nécessaire à l'organisme.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ZENOVANA®, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Contre-indications :

• Ne prenez jamais Zenovana®, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

• Si vous avez une maladie cardiaque grave ou si vous êtes atteint d'une affection cardiaque dans Zenovana®, comprimé pelliculé.

• Si vous avez une maladie grave du foie.

• Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre Zenovana®, comprimé pelliculé en début de grossesse).

• Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et que vous êtes traité par un antidiabétique appartenant à la classe des sulfonylureas.

Précautions d'emploi, mises en garde spéciales :

Faites attention avec Zenovana®, comprimé pelliculé :

Prévenez votre médecin avant de prendre Zenovana®, comprimé pelliculé :

• Si vous avez une maladie du foie.

• Si vous avez une grave maladie rénale ou si vous êtes dialysé.

• Si vous souffrez d'un ralentissement des artères du rein.

• Si vous avez récemment subi une transplantation rénale (vous avez reçu un nouveau rein).

• Si vous êtes traité après avoir subi une crise cardiaque ou pour une insuffisance cardiaque. Votre médecin prescrira, dans ce cas, de vérifier votre tension artérielle.

• Si vous avez une grave maladie cardiaque en dehors d'une insuffisance cardiaque ou d'une crise cardiaque.

• Si vous avez déjà présenté un gonflement, étiollement du visage et de la gorge en prenant d'autres médicaments (dont les IEC). Si vous présentez ces symptômes, arrêtez votre traitement et contactez immédiatement votre médecin. Vous ne devrez plus jamais prendre de Zenovana®.

- Si vous prenez des médicaments qui augmentent la quantité de potassium dans le sang (comme les suppléments potassiques ou des sels de potassium, des médicaments pour l'insuffisance cardiaque ou d'autres médicaments), il est nécessaire de vérifier régulièrement le niveau de potassium dans le sang.
- Si vous prenez de la diurétique (comme les sels de potassium, des médicaments pour l'insuffisance cardiaque ou d'autres médicaments), il est nécessaire de vérifier régulièrement le niveau de potassium dans le sang.
- Si vous prenez d'autres médicaments qui inhibent le système rénine-angiotensine-antagoniste (comme les médicaments diminuant la pression artérielle).

• Si vous prenez de la diurétique (comme les sels de potassium, des médicaments pour l'insuffisance cardiaque ou d'autres médicaments), il est nécessaire de vérifier régulièrement le niveau de potassium dans le sang.

• Si vous prenez d'autres médicaments qui inhibent le système rénine-angiotensine-antagoniste (comme les médicaments diminuant la pression artérielle).

Hypertension artérielle chez les patients adultes

La dose habituelle est de 80 mg par jour. Dans certains cas, votre médecin peut prescrire des doses plus fortes (ex. 160 mg). Il pourra également associer Zenovana®, comprimé pelliculé à un autre médicament (ex. un diurétique).

Hypertension chez les enfants et adolescents (âges de 6 à 13 ans)

Choisissez les patients de poids inférieur à 35 kg, la posologie habituelle est de 40 mg de Zenovana®, comprimé pelliculé par jour.

Choisir les patients pesant 35 kg ou plus, la posologie habituelle est de 80 mg de Zenovana®, comprimé pelliculé par jour.

Cette posologie peut être augmentée jusqu'à 160 mg.

Après une crise cardiaque récente chez les patients adultes :

Après une crise cardiaque, le traitement est généralement débuté dès la 12ème heure, généralement à la dose habituelle de 80 mg, deux fois par jour. Vous devrez prendre une dose supplémentaire de 80 mg au bout de 24 heures, puis une autre dose supplémentaire de 80 mg au bout de 48 heures, et ainsi de suite. Vous devrez prendre progressivement cette dose au cours des semaines suivantes jusqu'à une dose maximale de 160 mg, deux fois par jour.

La dose finale dépend de votre tolérance individuelle.

Zenovana®, comprimé pelliculé peut être donné avec un autre traitement de la crise cardiaque et votre médecin décider que ce traitement est approprié dans votre cas.

La traitements doivent généralement être donnés par 40 mg, deux fois par jour. Votre médecin augmentera progressivement cette dose au cours des semaines suivantes jusqu'à une dose maximale de 160 mg, deux fois par jour. La dose finale dépend de votre tolérance individuelle.

Zenovana®, comprimé pelliculé peut être donné avec un autre traitement de l'insuffisance cardiaque et votre médecin décider que ce traitement est approprié dans votre cas.

Mode d'administration

Vous pouvez prendre Zenovana®, comprimé pelliculé avec ou sans aliments. Prenez Zenovana®, comprimé pelliculé avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration

Prenez Zenovana®, comprimé pelliculé à peu près au même moment tous les jours.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de Zenovana®, comprimé pelliculé que vous n'avez dû prendre, contactez immédiatement votre médecin ou un service d'urgence.

Si vous avez pris plus de Zenovana®, comprimé pelliculé que vous n'avez dû prendre, contactez immédiatement votre médecin ou un service d'urgence.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez. Toutefois, ne prenez pas deux doses ensemble si le moment de votre prochaine prise est proche.

Ne prenez pas deux doses ensemble pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Interaction avec les aliments et les boissons

Vous pouvez prendre Zenovana®, comprimé pelliculé avec ou sans aliments.

Conseils d'entretien

Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

• Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou êtes susceptible de devenir) enceinte. Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre Zenovana®, comprimé pelliculé pendant la grossesse et de prendre d'autres médicaments pour traiter l'insuffisance cardiaque.

• Si vous êtes traité pour une insuffisance cardiaque, il est déconseillé d'associer Zenovana® à des IEC et des inhibiteurs de l'enzyme de conversion (médicament de l'insuffisance cardiaque). Interactions avec les aliments et les boissons

Vous pouvez prendre Zenovana®, comprimé pelliculé avec ou sans aliments.

Conseils d'entretien

Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

• Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou êtes susceptible de devenir) enceinte. Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre Zenovana®, comprimé pelliculé pendant la grossesse et de prendre d'autres médicaments pour traiter l'insuffisance cardiaque.

• Si vous êtes traité pour une insuffisance cardiaque, il est déconseillé d'associer Zenovana® à des IEC et des inhibiteurs de l'enzyme de conversion (médicament de l'insuffisance cardiaque).

Interactions avec les aliments et les boissons

Vous pouvez prendre Zenovana®, comprimé pelliculé avec ou sans aliments.

Conseils d'entretien

Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

• Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou êtes susceptible de devenir) enceinte. Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre Zenovana®, comprimé pelliculé pendant la grossesse et de prendre d'autres médicaments pour traiter l'insuffisance cardiaque.

• Si vous êtes traité pour une insuffisance cardiaque, il est déconseillé d'associer Zenovana® à des IEC et des inhibiteurs de l'enzyme de conversion (médicament de l'insuffisance cardiaque).

Interactions avec les aliments et les boissons

Vous pouvez prendre Zenovana®, comprimé pelliculé avec ou sans aliments.

Conseils d'entretien

Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

• Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou êtes susceptible de devenir) enceinte. Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre Zenovana®, comprimé pelliculé pendant la grossesse et de prendre d'autres médicaments pour traiter l'insuffisance cardiaque.

• Si vous êtes traité pour une insuffisance cardiaque, il est déconseillé d'associer Zenovana® à des IEC et des inhibiteurs de l'enzyme de conversion (médicament de l'insuffisance cardiaque).

Interactions avec les aliments et les boissons

Vous pouvez prendre Zenovana®, comprimé pelliculé avec ou sans aliments.

Conseils d'entretien

Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

• Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou êtes susceptible de devenir) enceinte. Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre Zenovana®, comprimé pelliculé pendant la grossesse et de prendre d'autres médicaments pour traiter l'insuffisance cardiaque.

• Si vous êtes traité pour une insuffisance cardiaque, il est déconseillé d'associer Zenovana® à des IEC et des inhibiteurs de l'enzyme de conversion (médicament de l'insuffisance cardiaque).

Interactions avec les aliments et les boissons

Vous pouvez prendre Zenovana®, comprimé pelliculé avec ou sans aliments.

Conseils d'entretien

Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

• Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou êtes susceptible de devenir) enceinte. Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre Zenovana®, comprimé pelliculé pendant la grossesse et de prendre d'autres médicaments pour traiter l'insuffisance cardiaque.

• Si vous êtes traité pour une insuffisance cardiaque, il est déconseillé d'associer Zenovana® à des IEC et des inhibiteurs de l'enzyme de conversion (médicament de l'insuffisance cardiaque).

Interactions avec les aliments et les boissons

Vous pouvez prendre Zenovana®, comprimé pelliculé avec ou sans aliments.

Conseils d'entretien

Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Fréquence indéterminée

• apparition de cloques sur la peau (signe de dermatite bulleuse)

• réactions allergiques avec éruption cutanée, démagrèse et urticaire, gonflement des articulations et douleur articulaire, douleur musculaire, gonflement des ganglions lymphatiques, et/ou symptômes grippeux peuvent survenir (signes de la maladie sérique).

• augmentation ou apparition de symptômes (signes d'inflammation des vaisseaux sanguins) également connue sous le nom de vasculite.

• éruptions cutanées (urticaire)

• fièvre, gonflement des articulations et douleur articulaire, douleur musculaire, gonflement des ganglions lymphatiques, et/ou symptômes grippeux peuvent survenir (signes de la maladie sérique).

• douleurs musculaires (myalgie)

• fièvre, mal de gorge ou symptômes causés par des infections (signes d'un taudis bulleux)

• diminution du taux d'hémoglobine et de taux de globulines rouges dans le sang (qui peut, dans certains cas, entraîner une anémie et une fatigue)

• gonflement des tissus sous la peau (signe qui peut, dans des cas sévères, provoquer des spasmes musculaires et une crise rythme cardiaque).

• augmentation des valeurs de fonction hépatique (qui peut indiquer une atteinte hépatique) et/ou augmentation du taux de bilirubine dans le sang (qui peut, dans certains cas, entraîner une crise rénale et une crise de convulsions).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

• augmentation de la taille d'un œil dans le sang (qui peut provoquer une fatigue, une confusion et des convulsions dans les deux œil).

CARDINOR® 6,25 & 25 mg

comprimés sécables (Carvédilol)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Cardinor cette notice vous.
Si vous avez toute
médecin ou à votre pharmacien.
Ce médicament vous a été
même en cas de symptômes.
Si l'un des effets indésirables
mentionné dans cette note.

CARDINOR® 6,25mg Co
CARDINOR® 25 mg Co

1. Composition du médicament

LOT: KA83736 PER: 09-2021
PPV: 95.00DH

Substance active

Carvédilol

Excipients: Lactose monohydraté, Cellulose microcristalline, Hypromellose faiblement substituée (L-HPC), Amidon de maïs, Oxyde de fer jaune, Silice colloïdale anhydre, Talc purifié, Stéarate de magnésium...q.s.p. 1 Comprimé sécable

Liste des excipients à effet notable : Lactose

2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

Alpha et bêtabloquant.

3. Indications thérapeutiques

Ce médicament est prescrit dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique symptomatique, en complément du traitement habituel de l'insuffisance cardiaque.

4. Posologie

- POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION:

La posologie est adaptée à chaque patient.

Le traitement est instauré par une dose initiale de 3,125 mg.

Si cette première administration est bien tolérée, la posologie est augmentée progressivement sur au moins 6 semaines à 3,125 mg 2 fois par jour puis 6,25 mg 2 fois par jour puis 12,5 mg 2 fois par jour et enfin 25 mg 2 fois par jour. Chaque palier de dose durera au minimum 2 semaines.

La posologie maximale habituellement recommandée est de 25 mg 2 fois par jour.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MEDICALE.

- Mode d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés avec une quantité suffisante d'eau.

- Fréquence d'administration :

CARDINOR doit être pris au moment des repas, chaque jour à la même heure.

- Durée du traitement :

SE CONFORMER A LA PRESCRIPTION MEDICALE.

5. Contre-indications

Ne prenez jamais CARDINOR, comprimé sécable dans les cas suivants:

• Si vous êtes allergique à la substance active (carvédilol) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (cf. Composition).

• Si vous avez déjà eu une réaction allergique grave.

• Si vous êtes asthmatique ou si vous avez un encorbellement sévère des bronches et des poumons (broncho-pneumopathie chronique obstructive) ou un rétrécissement des bronches (bronchospasme).

• Si vous souffrez fondamentalement très mal (insuffisance cardiaque sévère) malgré l'utilisation d'un traitement et que vous avez des gonflements (œdèmes), une présence anormale de liquide dans le ventre ou des difficultés à respirer. Dans ce cas, votre état peut nécessiter un traitement par voie veineuse.

• Si vous avez une défaillance grave du cœur (choc cardiaque).

• Si vous avez des troubles de l'activité électrique du cœur pouvant entraîner un ralentissement des battements du cœur (bloc auriculo-ventriculaire du second et troisième degré, bloc sino-auriculaire, sauf si vous avez un pacemaker).

• Si votre cœur bat trop lentement.

• Si vous avez des troubles de la circulation sanguine au niveau des doigts (de type phénomène de Raynaud) ou dans les artères des jambes (arthrite).

• Si vous avez une tension artérielle très basse (hypotension sévère).

• Si vous avez une maladie du foie (insuffisance hépatique).

• En même temps que certains médicaments :

- la cimétidine (médicament utilisé pour traiter un ulcère de l'estomac ou de l'intestin).

- les antiarythmiques de la classe I (médicament utilisé pour traiter les troubles du rythme cardiaque).

6. Effets indésirables

Description des effets indésirables :

Comme tous les médicaments, CARDINOR, comprimé sécable est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Les effets indésirables sont classés ci-dessous par fréquence :

Très fréquent (touche plus d'un patient sur 10) :

• perte de poids,

• douleur thoracique,

• douleur dans la poitrine,

• douleur dans la tête,

• douleur dans la poitrine,

• douleur dans la tête,

CARDINOR® 6,25 & 25 mg

comprimés sécables (Carvédilol)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Cardinor cette notice vous.
Si vous avez toute
médecin ou à
Ce médicament vous a
même en cas de symptômes
Si l'un des effets indésirables
mentionné dans cette note

CARDINOR® 6,25mg Co
CARDINOR® 25 mg Co

1. Composition du médicament

LOT: KA83736 PER: 09-2021
PPV: 95.00DH

Substance active

Carvédilol

Excipients: Lactose monohydraté, Cellulose microcristalline, Hypromellose faiblement substituée (L-HPC), Amidon de maïs, Oxyde de fer jaune, Silice colloïdale anhydre, Talc purifié, Stéarate de magnésium...q.s.p. 1 Comprimé sécable

Liste des excipients à effet notable : Lactose

2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

Alpha et bêtabloquant.

3. Indications thérapeutiques

Ce médicament est prescrit dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique symptomatique, en complément du traitement habituel de l'insuffisance cardiaque.

4. Posologie

- POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION:

La posologie est adaptée à chaque patient.

Le traitement est instauré par une dose initiale de 3,125 mg.

Si cette première administration est bien tolérée, la posologie est augmentée progressivement sur au moins 6 semaines à 3,125 mg 2 fois par jour puis 6,25 mg 2 fois par jour puis 12,5 mg 2 fois par jour et enfin 25 mg 2 fois par jour. Chaque palier de dose dure au minimum 2 semaines.

La posologie maximale habituellement recommandée est de 25 mg 2 fois par jour.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MEDICALE.

- Mode d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés avec une quantité suffisante d'eau.

- Fréquence d'administration :

CARDINOR doit être pris au moment des repas, chaque jour à la même heure.

- Durée du traitement :

SE CONFORMER A LA PRESCRIPTION MEDICALE.

5. Contre-indications

Ne prenez jamais CARDINOR, comprimé sécable dans les cas suivants:

• Si vous êtes allergique à la substance active (carvédilol) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (cf. Composition).

• Si vous avez déjà eu une réaction allergique grave.

• Si vous êtes asthmatique ou si vous avez un encorbellement sévère des bronches et des poumons (broncho-pneumopathie chronique obstructive) ou un rétrécissement des bronches (bronchospasme).

• Si vous souffrez d'insuffisance très mal (insuffisance cardiaque sévère) malgré l'utilisation d'un traitement et que vous avez des gonflements (œdèmes), une présence anormale de liquide dans le ventre ou des difficultés à respirer. Dans ce cas, votre état peut nécessiter un traitement par voie veineuse.

• Si vous avez une défaillance grave du cœur (choc cardiaque).

• Si vous avez des troubles de l'activité électrique du cœur pouvant entraîner un ralentissement des battements du cœur (bloc auriculo-ventriculaire du second et troisième degré, bloc sino-auriculaire, sauf si vous avez un pacemaker).

• Si votre cœur bat trop lentement.

• Si vous avez des troubles de la circulation sanguine au niveau des doigts (de type phénomène de Raynaud) ou dans les artères des jambes (arthrite).

• Si vous avez une tension artérielle très basse (hypotension sévère).

• Si vous avez une maladie du foie (insuffisance hépatique).

• En même temps que certains médicaments :

- la cimétidine (médicament utilisé pour traiter un ulcère de l'estomac ou de l'intestin).

- les antiarythmiques de la classe I (médicament utilisé pour traiter les troubles du rythme cardiaque).

6. Effets indésirables

Description des effets indésirables :

Comme tous les médicaments, CARDINOR, comprimé sécable est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Les effets indésirables sont classés ci-dessous par fréquence :

Très fréquent (touche plus d'un patient sur 10) :

• perte de poids,

• douleur thoracique,

• douleur dans la poitrine,

• douleur dans la tête,

• douleur dans la poitrine,

• douleur dans la tête,

CARDINOR® 6,25 & 25 mg

comprimés sécables (Carvédilol)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Cardinor cette notice vous.
Si vous avez toute
médecin ou à votre pharmacien.
Ce médicament vous a été
même en cas de symptômes.
Si l'un des effets indésirables
mentionné dans cette note.

CARDINOR® 6,25mg Co
CARDINOR® 25 mg Co

1. Composition du médicament

LOT: KA83736 PER: 09-2021
PPV: 95.00DH

Substance active

Carvédilol

Excipients: Lactose monohydraté, Cellulose microcristalline, Hypromellose faiblement substituée (L-HPC), Amidon de maïs, Oxyde de fer jaune, Silice colloïdale anhydre, Talc purifié, Stéarate de magnésium...q.s.p. 1 Comprimé sécable

Liste des excipients à effet notable : Lactose

2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

Alpha et bêtabloquant.

3. Indications thérapeutiques

Ce médicament est prescrit dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique symptomatique, en complément du traitement habituel de l'insuffisance cardiaque.

4. Posologie

- POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION:

La posologie est adaptée à chaque patient.

Le traitement est instauré par une dose initiale de 3,125 mg.

Si cette première administration est bien tolérée, la posologie est augmentée progressivement sur au moins 6 semaines à 3,125 mg 2 fois par jour puis 6,25 mg 2 fois par jour puis 12,5 mg 2 fois par jour et enfin 25 mg 2 fois par jour. Chaque palier de dose dure au minimum 2 semaines.

La posologie maximale habituellement recommandée est de 25 mg 2 fois par jour.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MEDICALE.

- Mode d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés avec une quantité suffisante d'eau.

- Fréquence d'administration :

CARDINOR doit être pris au moment des repas, chaque jour à la même heure.

- Durée du traitement :

SE CONFORMER A LA PRESCRIPTION MEDICALE.

5. Contre-indications

Ne prenez jamais CARDINOR, comprimé sécable dans les cas suivants:

• Si vous êtes allergique à la substance active (carvédilol) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (cf. Composition).

• Si vous avez déjà eu une réaction allergique grave.

• Si vous êtes asthmatique ou si vous avez un encorbellement sévère des bronches et des poumons (broncho-pneumopathie chronique obstructive) ou un rétrécissement des bronches (bronchospasme).

• Si vous souffrez d'insuffisance très mal (insuffisance cardiaque sévère) malgré l'utilisation d'un traitement et que vous avez des gonflements (œdèmes), une présence anormale de liquide dans le ventre ou des difficultés à respirer. Dans ce cas, votre état peut nécessiter un traitement par voie veineuse.

• Si vous avez une défaillance grave du cœur (choc cardiaque).

• Si vous avez des troubles de l'activité électrique du cœur pouvant entraîner un ralentissement des battements du cœur (bloc auriculo-ventriculaire du second et troisième degré, bloc sino-auriculaire, sauf si vous avez un pacemaker).

• Si votre cœur bat trop lentement.

• Si vous avez des troubles de la circulation sanguine au niveau des doigts (de type phénomène de Raynaud) ou dans les artères des jambes (arthrite).

• Si vous avez une tension artérielle très basse (hypotension sévère).

• Si vous avez une maladie du foie (insuffisance hépatique).

• En même temps que certains médicaments :

- la cimétidine (médicament utilisé pour traiter un ulcère de l'estomac ou de l'intestin).

- les antiarythmiques de la classe I (médicament utilisé pour traiter les troubles du rythme cardiaque).

6. Effets indésirables

Description des effets indésirables :

Comme tous les médicaments, CARDINOR, comprimé sécable est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Les effets indésirables sont classés ci-dessous par fréquence :

Très fréquent (touche plus d'un patient sur 10) :

• perte de poids, ion antérieure,

• 10 patients sur 100 :
- infection du nez et de la gorge, infection urinaire, de globule rouge dans le sang, augmentation ou diminution du sang chez les patients diabétiques, de l'humeur, vision, diminution du liquide lacrymal (yeux secs), irritation des yeux, a cardiaque, gonflement de certaines parties du corps, quantité d'eau trop importante débord, perturbations de la circulation périphérique (extrémités périphériques, augmentation des crampes douloureuses, phénomène

• res, asthme, vomissements, ballonnements, douleurs abdominales, utérin, et anomalies de la fonction rénale chez les patients présentant un trouble de la globo insuffisance rénale sous-jacente

Peu fréquent (touche 1 à 10 patients sur 1000) :

• trouble du sommeil, sensation vertigineuse, perte de conscience brutale, sensations anormales de picotements ou de fourmillements dans certaines parties du corps, trouble de la conduction cardiaque, angine de poitrine, réactions cutanées (tel que rougeur, inflammation de la peau, urticaire, démangeaisons, lésions cutanées type psoriasis ou lichen), chute des cheveux, trouble de l'érection.

Rare (touche 1 à 10 patients sur 10 000) :

• diminution du taux de plaquettes dans le sang, nez bouché, Troubles de la miction, Troubles de la miction, diminution du taux de globule blanc dans le sang, réaction allergique, augmentation des enzymes hépatiques, incontinence urinaire chez les femmes, réactions cutanées sévères (par exemple érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de Lyell).

Déclaration des effets indésirables :

La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament.

7. Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre CARDINOR, comprimé sécable en cas :

• D'aggravation des troubles cardiaques, d'œdèmes, de présence de liquide dans la ventre (retention hydrique), de difficultés respiratoires sévères (l'apparition de ces symptômes nécessite une adaptation par votre médecin de votre dose de carvédilol ou de votre traitement diurétique).

• De diabète (ce médicament pouvant masquer les symptômes précoces d'une hypoglycémie aiguë).

• De maladie rénale.

• D'extémités froides.

• De ralentissement du rythme cardiaque.

• Des réactions allergiques.

• De l'angor de Prinzmetal (variété d'angine de poitrine).

• De pheochromocytome (atteinte d'une glande surrénale provoquant une hypertension artérielle sévère).

• De trouble thyroïdiens.

• De psoriasis (maladie de peau).

• D'anévrismes de taux anormalement bas de plaquettes (éléments du sang importants dans la coagulation sanguine). Si vous devez subir une intervention chirurgicale, avertissez l'anesthésiste que vous prenez ce médicament.

• Des réactions cutanées.

Si vous portez des lentilles de contact, le traitement par ce médicament peut diminuer la sécrétion de larmes.

Si vous avez mal toléré ce médicament auparavant, avisez votre médecin.

• Si votre médicament vous a informé (e) d'une tolérance à certains sucre, comme le lactose et le saccharose, contactez-le avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les personnes souffrant d'une galactosémié ou de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou d'un déficit en lactase.

8. Interactions

- Interactions avec d'autres médicaments

• S'avis contre de votre médicament, n'utilisez pas CARDINOR avec :

- certains médicaments pour le cœur (les antagonistes du calcium),

- certains médicaments pour la tension artérielle élevée (les antihypertenseurs centraux),

- le furogilon.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Interactions avec les aliments et boissons

Sans objet

- Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet

9. Utilisation en cas de grossesse et d'allaitement

Grossesse

Ce médicament ne doit être pris pendant la grossesse qu'après avis médical.

Si ce traitement est pris en fin de grossesse, une surveillance médicale du nouveau-né est nécessaire pendant quelques jours, car certains effets du traitement se manifestent aussi chez le nouveau-né.

Prévenez votre médecin si vous êtes enceinte ou prévoyez de l'être.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. En conséquence l'allaitement est déconseillé. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament Sportif

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

10. Les effets possibles du traitement sur la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser certaines machines

Ne pas conduire de véhicule ni utiliser des machines en cas de fatigue, d'échaudements ou symptômes analogues sous traitement par carvédilol. Il convient d'être particulièrement attentif en début de traitement, en cas de modification de posologie et/ou d'absorption d'alcool.

11. Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de CARDINOR, comprimé sécable que vous n'auriez dû : Prévenez immédiatement le médecin traitant.

12. Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

13. MENTION, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :

Si vous arrêtez de prendre CARDINOR, comprimé sécable :

Ne jamais interrompre brutalement le traitement.

SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MEDICALE

- Conditions de prescription et de délivrance

Tableau A (Liste I)

- Précautions particulières de conservation

36 mois.

Conserver à température inférieure à 30°C et à l'abri de lumière et l'humidité.

Ne pas laisser à la portée et à la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Précautions particulières d'élimination des médicaments non utilisés ou des déchets provenant de ces médicaments :

Ne jetez aucun médicament au tout-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

- CONSEILS ET EDUCATION SANITAIRE :

Ceci est un médicament.

Un médicament n'est pas un produit comme les autres.

Il vous connaît, vous et votre santé.

Le médicament est un produit actif.

Une longue recherche a permis de découvrir son activité.

Mais, son absorption n'est pas toujours sans danger.

Il ne faut jamais abuser des médicaments.

Il ne faut utiliser les médicaments qu'à bon escient.

Utiliser les médicaments prescrits comme vous le dit votre médecin.

Il sait quels sont les médicaments dont vous avez besoin.

Exécutez exactement les prescriptions de son ordonnance : suivez le traitement prescrit, ne l'interrompez pas.

Ne le reprenez pas de votre initiative.

Votre pharmacien connaît les médicaments / suivre ses conseils.

Il ne s'agit pas pour vous de prendre beaucoup de médicaments.

Il y a peut pour vous de prendre les médicaments dont vous avez besoin.

COOPER

PHARMA

41, rue Mohamed Diouri 20 110 - Casablanca

• La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : Mai 2017

CARDINOR® 6,25 & 25 mg

comprimés sécables (Carvédilol)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Cardinor cette notice vous.
Si vous avez toute
médecin ou à
Ce médicament vous a
même en cas de symptômes
Si l'un des effets indésirables
mentionné dans cette note

CARDINOR® 6,25mg Co
CARDINOR® 25 mg Co

1. Composition du médicament

LOT: KA83736 PER: 09-2021
PPV: 95.00DH

Substance active

Carvédilol

Excipients: Lactose monohydraté, Cellulose microcristalline, Hypromellose faiblement substituée (L-HPC), Amidon de maïs, Oxyde de fer jaune, Silice colloïdale anhydre, Talc purifié, Stéarate de magnésium...q.s.p. 1 Comprimé sécable

Liste des excipients à effet notable : Lactose

2. Classe pharmaco thérapeutique ou le type d'activité
Alpha et bêtabloquant.

3. Indications thérapeutiques

Ce médicament est prescrit dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique symptomatique, en complément du traitement habituel de l'insuffisance cardiaque.

4. Posologie

- POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION:

La posologie est adaptée à chaque patient.

Le traitement est instauré par une dose initiale de 3,125 mg.

Si cette première administration est bien tolérée, la posologie est augmentée progressivement sur au moins 6 semaines à 3,125 mg 2 fois par jour puis 6,25 mg 2 fois par jour puis 12,5 mg 2 fois par jour et enfin 25 mg 2 fois par jour. Chaque palier de dose dure au minimum 2 semaines.

La posologie maximale habituellement recommandée est de 25 mg 2 fois par jour.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MEDICALE.

Mode d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés avec une quantité suffisante d'eau.

- Fréquence d'administration:

CARDINOR doit être pris au moment des repas, chaque jour à la même heure.

- Durée du traitement :

SE CONFORMER A LA PRESCRIPTION MEDICALE.

5. Contre-indications

Ne prenez jamais CARDINOR, comprimé sécable dans les cas suivants:

- Si vous êtes allergique à la substance active (carvédilol) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (cf. Composition).

- Si vous avez déjà eu une réaction allergique grave.

- Si vous êtes asthmatique ou si vous avez un encorbellement sévère des bronches et des poumons (broncho-pneumopathie chronique obstructive) ou un rétrécissement des bronches (bronchospasme).

- Si vous souffrez fondamentalement très mal (insuffisance cardiaque sévère) malgré l'utilisation d'un traitement et que vous avez des gonflements (œdèmes), une présence anormale de liquide dans le ventre ou des difficultés à respirer. Dans ce cas, votre état peut nécessiter un traitement par voie veineuse.

- Si vous avez une défaillance grave du cœur (choc cardiaque).

- Si vous avez des troubles de l'activité électrique du cœur pouvant entraîner un ralentissement des battements du cœur (bloc auriculo-ventriculaire du second et troisième degré, bloc sino-auriculaire, sauf si vous avez un pacemaker).

- Si votre cœur bat trop lentement.

- Si vous avez des troubles de la circulation sanguine au niveau des doigts (de type phénomène de Raynaud) ou dans les artères des jambes (arthrite).

- Si vous avez une tension artérielle très basse (hypotension sévère).

- Si vous avez une maladie du foie (insuffisance hépatique).

- En même temps que certains médicaments :

- la cimétidine (médicament utilisé pour traiter un ulcère de l'estomac ou de l'intestin).

- les antiarythmiques de la classe I (médicament utilisé pour traiter les troubles du rythme cardiaque).

6. Effets indésirables

Description des effets indésirables :

Comme tous les médicaments, CARDINOR, comprimé sécable est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Les effets indésirables sont classés ci-dessous par fréquence :

Très fréquent (touche plus d'un patient sur 10) :

ix de tête,

ion antérieure,

ix de la tête,

ion antérieure,

8. Interactions

- Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

- Saisi contre la contre-indication, n'utilisez pas CARDINOR avec :

- certains médicaments pour le cœur (les antagonistes du calcium),

- certains médicaments pour la tension artérielle élevée (les antihypertenseurs centraux),

- le fentanyl.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre pharmacien.

- Interactions avec les aliments et boissons

Sans objet

- Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives.

Sans objet

9. Utilisation en cas de grossesse et d'allaitement

Grossesse

Ce médicament ne doit être pris pendant la grossesse qu'après avis médical.

Si ce traitement est pris en fin de grossesse, une surveillance médicale du nouveau-né est nécessaire pendant quelques jours, car certains effets du traitement se manifestent aussi chez le nouveau-né.

Prévenez votre médecin si vous êtes enceinte ou prévoyez d'être.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. En conséquence l'allaitement est déconseillé.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sporif

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant entraîner une réaction positive des tests pratiqués.

10. Les effets possibles du traitement sur la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser certaines machines

Ne conduisez pas de véhicule ni utilisez des machines en cas de fatigue, d'échaudements ou

symptômes analogues sous traitement par cardinol. Il convient d'être particulièrement attentif en début de traitement, en cas de modification de posologie et/ou d'absorption d'alcool.

11. Symptômes et conduite à tenir en cas de sur

CARDINOR® 6,25 & 25 mg

comprimés sécables (Carvédilol)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Cardinor cette notice vous.
Si vous avez toute
médecin ou à votre pharmacien.
Ce médicament vous a été
même en cas de symptômes.
Si l'un des effets indésirables
mentionné dans cette note.

CARDINOR® 6,25mg Co
CARDINOR® 25 mg Co

1. Composition du médicament

LOT: KA83736 PER: 09-2021
PPV: 95.00DH

Substance active

Carvédilol

Excipients: Lactose monohydraté, Cellulose microcristalline, Hypromellose faiblement substituée (L-HPC), Amidon de maïs, Oxyde de fer jaune, Silice colloïdale anhydre, Talc purifié, Stéarate de magnésium... q.s.p. 1 Comprimé sécable

Liste des excipients à effet notable : Lactose

2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

Alpha et bêtabloquant.

3. Indications thérapeutiques

Ce médicament est prescrit dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique symptomatique, en complément du traitement habituel de l'insuffisance cardiaque.

4. Posologie

- POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION:

La posologie est adaptée à chaque patient.

Le traitement est instauré par une dose initiale de 3,125 mg.

Si cette première administration est bien tolérée, la posologie est augmentée progressivement sur au moins 6 semaines à 3,125 mg 2 fois par jour puis 6,25 mg 2 fois par jour puis 12,5 mg 2 fois par jour et enfin 25 mg 2 fois par jour. Chaque palier de dose durera au minimum 2 semaines.

La posologie maximale habituellement recommandée est de 25 mg 2 fois par jour.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MEDICALE.

- Mode d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés avec une quantité suffisante d'eau.

- Fréquence d'administration :

CARDINOR doit être pris au moment des repas, chaque jour à la même heure.

- Durée du traitement :

SE CONFORMER A LA PRESCRIPTION MEDICALE.

5. Contre-indications

Ne prenez jamais CARDINOR, comprimé sécable dans les cas suivants:

• Si vous êtes allergique à la substance active (carvédilol) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (cf. Composition).

• Si vous avez déjà eu une réaction allergique grave.

• Si vous êtes asthmatique ou si vous avez un encorbellement sévère des bronches et des poumons (broncho-pneumopathie chronique obstructive) ou un rétrécissement des bronches (bronchospasme).

• Si vous souffrez d'insuffisance très mal (insuffisance cardiaque sévère) malgré l'utilisation d'un traitement et que vous avez des gonflements (œdèmes), une présence anormale de liquide dans le ventre ou des difficultés à respirer. Dans ce cas, votre état peut nécessiter un traitement par voie veineuse.

• Si vous avez une défaillance grave du cœur (choc cardiogénique).

• Si vous avez des troubles de l'activité électrique du cœur pouvant entraîner un ralentissement des battements du cœur (bloc auriculo-ventriculaire du second et troisième degré, bloc sino-auriculaire, sauf si vous avez un pacemaker).

• Si votre cœur bat trop lentement.

• Si vous avez des troubles de la circulation sanguine au niveau des doigts (de type phénomène de Raynaud) ou dans les artères des jambes (arthrite).

• Si vous avez une tension artérielle très basse (hypotension sévère).

• Si vous avez une maladie du foie (insuffisance hépatique).

• En même temps que certains médicaments :

- la cimétidine (médicament utilisé pour traiter un ulcère de l'estomac ou de l'intestin).

- les antiarythmiques de la classe I (médicament utilisé pour traiter les troubles du rythme cardiaque).

6. Effets indésirables

Description des effets indésirables :

Comme tous les médicaments, CARDINOR, comprimé sécable est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Les effets indésirables sont classés ci-dessous par fréquence :

Très fréquent (touche plus d'un patient sur 10) :

• perte de poids, ion antérieure,

• 10 patients sur 100 :

• infection du nez et de la gorge, infection urinaire, de globule rouge dans le sang, augmentation du taux de cholestérol dans le sang, augmentation ou diminution du sang chez les patients diabétiques, de l'humeur, vision, diminution du liquide lacrymal (yeux secs), irritation des yeux, a cardiaque, gonflement de certaines parties du corps, quantité d'eau trop importante débord, perturbations de la circulation périphérique (extrémités périphériques, augmentation des crampes douloureuses, phénomène

• respiration, vomissements, ballonnements, douleurs abdominales, utérin, et anomalies de la fonction rénale chez les patients présentant un trouble de la globo insuffisance rénale sous-jacente

Peu fréquent (touche 1 à 10 patients sur 1000) :

• trouble du sommeil, sensation vertigineuse, perte de conscience brutale, sensations anormales de picotements ou de fourmillements dans certaines parties du corps, trouble de la conduction cardiaque, angine de poitrine, réactions cutanées (tel que rougeur, inflammation de la peau, urticaire, démangeaisons, lésions cutanées type psoriasis ou lichen), chute des cheveux, trouble de l'érection.

Rare (touche 1 à 10 patients sur 10 000) :

• diminution du taux de plaquettes dans le sang, nez bouché, Troubles de la miction, Troubles de la miction, diminution du taux de globule blanc dans le sang, réaction allergique, augmentation des enzymes hépatiques, incontinence urinaire chez les femmes, réactions cutanées sévères (par exemple érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de Lyell).

Déclaration des effets indésirables :

La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament.

7. Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre CARDINOR, comprimé sécable en cas :

• D'aggravation des troubles cardiaques, d'œdèmes, de présence de liquide dans la ventre (retention hydrique), de difficultés respiratoires sévères (l'apparition de ces symptômes nécessite une adaptation par votre médecin de votre dose de carvédilol ou de votre traitement diurétique).

• De diabète (ce médicament pouvant masquer les symptômes précoces d'une hypoglycémie aiguë).

• De maladie rénale, D'extrémement froides, D'enlentement du rythme cardiaque.

• Des réactions allergiques, D'angor de Prinzmetal (variété d'angine de poitrine).

• De pheochromocytome (atteinte d'une glande surrénale provoquant une hypertension artérielle sévère).

• De trouble thyroïdiens, D'œsophagite (maladie de peau).

• D'antécédents de taux anormalement bas de plaquettes (éléments du sang importants dans la coagulation sanguine). Si vous devez subir une intervention chirurgicale, avertissez l'anesthésiste que vous prenez ce médicament.

• Des réactions cutanées, Si vous portez des lentilles de contact, le traitement par ce médicament peut diminuer la sécrétion de larmes.

• Si vous avez mal toléré ce médicament auparavant, avérifiez votre médecin.

• Si votre médicament vous a informé (e) d'une tolérance à certains sucre, comme le lactose et le saccharose, contactez-le avant de prendre ce médicament.

• L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les personnes souffrant d'une galactosémié ou de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou d'un déficit en lactase.

8. Interactions

- Interactions avec d'autres médicaments

• Sauf avis contraire de votre médecin, n'utilisez pas CARDINOR avec :

• certains médicaments pour le cœur (les antagonistes du calcium), certains médicaments pour la tension artérielle élevée (les antihypertenseurs centraux), le furogilon.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Interactions avec les aliments et boissons

Sans objet

- Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet

9. Utilisation en cas de grossesse et d'allaitement

Grossesse

Ce médicament ne doit être pris pendant la grossesse qu'après avis médical.

Si ce traitement est pris en fin de grossesse, une surveillance médicale du nouveau-né est nécessaire pendant quelques jours, car certains effets du traitement se manifestent aussi chez le nouveau-né.

Prévenez votre médecin si vous êtes enceinte ou prévoyez d'être.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. En conséquence l'allaitement est déconseillé. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportif

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

10. Les effets possibles du traitement sur la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser certaines machines

Ne pas conduire de véhicule ni utiliser des machines en cas de fatigue, d'échaudements ou symptômes analogues sous traitement par carvédilol. Il convient d'être particulièrement attentif en début de traitement, en cas de modification de posologie et/ou d'absorption d'alcool.

11. Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de CARDINOR, comprimé sécable que vous n'auriez dû : Prévenez immédiatement le médecin traitant.

12. Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

13. MENTION, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :

Si vous arrêtez de prendre CARDINOR, comprimé sécable :

Ne jamais interrompre brutalement le traitement.

SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MEDICALE

- Conditions de prescription et de délivrance

Tableau A (Liste I)

- Précautions particulières de conservation

36 mois.

Conserver à température inférieure à 30°C et à l'abri de lumière et l'humidité.

Ne pas laisser à la portée et à la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Précautions particulières d'élimination des médicaments non utilisés ou des déchets provenant de ces médicaments :

Ne jetez aucun médicament au tout-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

CONSEILS ET EDUCATION SANITAIRE :

Ceci est un médicament.

Un médicament n'est pas un produit comme les autres.

Il vous connaît, vous et votre santé.

Le médicament est un produit actif.

Une longue recherche a permis de découvrir son activité.

Mais, son absorption n'est pas toujours sans danger.

Il ne faut jamais abuser des médicaments.

Il ne faut utiliser les médicaments qu'à bon escient.

Utiliser les médicaments prescrits comme vous le dit votre médecin.

Il sait quels sont les médicaments dont vous avez besoin.

Exécutez exactement les prescriptions de son ordonnance : suivez le traitement prescrit, ne l'interrompez pas.

Ne le reprenez pas de votre initiative.

Votre pharmacien connaît les médicaments / suivre ses conseils.

Il ne s'agit pas pour vous de prendre beaucoup de médicaments.

Il y a peut pour vous de prendre les médicaments dont vous avez besoin.

COOPER

PHARMA

41, rue Mohamed Diouri 20 110 - Casablanca

• La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : Mai 2017



KARDEGIC® 75mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine
poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) Dénomination

KARDEGIC 75 mg

PER :
LOT :
19E002
2021

KARDEGIC 75MG
SACHETS B30

P.P.V : 30DH70



6 18000 061847

b) Composito
ACETYLSALICYLIC
corresponda

Excipients :
d'ammonium

c) Forme pharmaceutique :

poudre pour solution buvable ; sachet-dose ; boîte à 30.

d) Classe pharmaco-thérapeutique :

ANTI-THROMBOTIQUE / INHIBITEUR DE L'AGREGATION
PLAQUETTAIRE, HEPARINE EXCLUE.

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT (Indications)

Ce médicament contient de l'aspirine, mais ce dosage est plus particulièrement destiné au traitement de certaines affections du cœur ou des vaisseaux, seul ou associé aux autres traitements prescrits par votre médecin.

Il ne devra pas être entrepris sans l'avis de celui-ci, seul juge de l'établissement et de la conduite de ce traitement.

3. ATTENTION

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament :

(Contre-indications)

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- En cas d'ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution, • En cas d'allergie connue à l'aspirine ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (telle qu'éruption cutanée ou asthme), • En cas de maladie hémorragique, • En cas de traitement concomitant par le méthotrexate, ou par les anticoagulants oraux (lorsque l'aspirine est prescrite à fortes doses (>3 g/j)), • En dehors d'utilisations extrêmement limitées, et qui justifient une

surveillance spécialisée, tout médicament à base d'aspirine est CONTRE-INDIQUE à partir du 6ème mois de la grossesse (cf. Grossesse et Allaitement).

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS être utilisé sauf avis contraire de votre médecin, en cas de : - goutte, - règles ou saignements gynécologiques anormaux, - traitement concomitant par les anticoagulants oraux (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à faibles doses) ou par l'héparine, les uricosuriques, ou d'autres anti-inflammatoires (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à des doses >3 g/j) (cf. Interactions médicamenteuses et autres interactions). L'allaitement est déconseillé pendant le traitement (cf. Grossesse et Allaitement).

b) Mises en garde spéciales :

Réservez à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur prescription médicale.

c) Précautions d'emploi :

Il est important de signaler à votre médecin certains problèmes de santé ou situations : - maladie des reins, - asthme, - antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, ou d'hémorragies digestives, hypertension artérielle, - diabète, - port de stérilet. L'aspirine augmente les risques hémorragiques et ceci dès les très faibles doses et même lorsque la prise date de plusieurs jours. Prévenir votre médecin traitant, le chirurgien, l'anesthésiste ou simplement votre dentiste au cas où un geste chirurgical, même mineur, est envisagé.

Ce médicament ne contenant pas de sodium (sel), il peut être administré en cas de régime désodé ou hyposodé.

d) Interactions médicamenteuses et autres interactions :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN notamment si vous prenez des anticoagulants oraux (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à faibles doses) ou de l'héparine, des uricosuriques ou d'autres anti-inflammatoires (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à des doses >3 g/j).



KARDEGIC® 75mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine
poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) Dénomination

KARDEGIC 75 mg

PER :
LOT :
19E002
2021

KARDEGIC 75MG
SACHETS B30

P.P.V : 30DH70



Excipients :

d'ammonium

c) Forme pharmaceutique

poudre pour solution buvable ; sachet-dose ; boîte à 30.

d) Classe pharmaco-thérapeutique :

ANTI-THROMBOTIQUE / INHIBITEUR DE L'AGREGATION
PLAQUETTAIRE, HEPARINE EXCLUE.

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT (Indications)

Ce médicament contient de l'aspirine, mais ce dosage est plus particulièrement destiné au traitement de certaines affections du cœur ou des vaisseaux, seul ou associé aux autres traitements prescrits par votre médecin.

Il ne devra pas être entrepris sans l'avis de celui-ci, seul juge de l'établissement et de la conduite de ce traitement.

3. ATTENTION

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament :

(Contre-indications)

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- En cas d'ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution,
- En cas d'allergie connue à l'aspirine ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (telle qu'éruption cutanée ou asthme),
- En cas de maladie hémorragique,
- En cas de traitement concomitant par le méthotrexate, ou par les anticoagulants oraux (lorsque l'aspirine est prescrite à fortes doses (>3 g/j)),
- En dehors d'utilisations extrêmement limitées, et qui justifient une

surveillance spécialisée, tout médicament à base d'aspirine est CONTRE-INDIQUE à partir du 6ème mois de la grossesse (cf. Grossesse et Allaitement).

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS être utilisé sauf avis contraire de votre médecin, en cas de : - goutte, - règles ou saignements gynécologiques anormaux, - traitement concomitant par les anticoagulants oraux (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à faibles doses) ou par l'héparine, les uricosuriques, ou d'autres anti-inflammatoires (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à des doses >3 g/j) (cf. Interactions médicamenteuses et autres interactions). L'allaitement est déconseillé pendant le traitement (cf. Grossesse et Allaitement).

b) Mises en garde spéciales :

Réservez à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur prescription médicale.

c) Précautions d'emploi :

Il est important de signaler à votre médecin certains problèmes de santé ou situations : - maladie des reins, - asthme, - antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, ou d'hémorragies digestives, hypertension artérielle, - diabète, - port de stérilet. L'aspirine augmente les risques hémorragiques et ceci dès les très faibles doses et même lorsque la prise date de plusieurs jours. Prévenir votre médecin traitant, le chirurgien, l'anesthésiste ou simplement votre dentiste au cas où un geste chirurgical, même mineur, est envisagé.

Ce médicament ne contenant pas de sodium (sel), il peut être administré en cas de régime désodé ou hyposodé.

d) Interactions médicamenteuses et autres interactions :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN notamment si vous prenez des anticoagulants oraux (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à faibles doses) ou de l'héparine, des uricosuriques ou d'autres anti-inflammatoires (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à des doses >3 g/j).

KARDEGIC® 160 mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine
poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) DENOMINATION

KARDEGIC 160

01/19ED06
PER.04/2021



b) COMPOS.

ACETYLSALIC

correspondan

Excipients : Gl.

d'ammonium.

c) FORME PHAI

—IQUE

Poudre pour solution buvable; Sachet-dose ; boîte de 30.

d) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTI-THROMBOTIQUE/INHIBITEURS DE L'AGREGATION

PLAQUETTAIRE, HEPARINE EXCLUE.

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

(Indications)

Ce médicament contient de l'aspirine, mais ce dosage est plus particulièrement destiné au traitement de certaines affections du cœur ou des vaisseaux, seul ou associé aux autres traitements prescrits par votre médecin.

Il ne devra pas être entrepris sans l'avis de celui-ci, seul juge de l'établissement et de la conduite de ce traitement.

3. ATTENTION

a) DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

(Contre-indications)

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- En cas d'ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution,
- En cas d'allergie connue à l'aspirine ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (telle qu'éruption cutanée ou asthme),
- En cas de maladie hémorragique,
- En cas de traitement concomitant par le méthotrexate, ou par les anticoagulants oraux (lorsque l'aspirine est prescrite à fortes doses ($>3g/j$)),
- En dehors

d'utilisations extrêmement limitées, et qui justifient une surveillance spécialisée, tout médicament à base d'aspirine est CONTRE-INDIQUE à partir du 6ème mois de la grossesse (cf. Grossesse et Allaitement).

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS être utilisé sauf avis contraire de votre médecin, en cas de : - goutte, - règles ou saignements gynécologiques anormaux, - traitement concomitant par les anticoagulants oraux (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à faibles doses) ou par l'héparine, les uricosuriques, ou d'autres anti-inflammatoires (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à des doses $>3g/j$) (cf. rubrique Interactions médicamenteuses et autres interactions). L'allaitement est déconseillé pendant le traitement (cf. Grossesse et Allaitement).

b) PRECAUTIONS D'EMPLOI

Il est important de signaler à votre médecin certains problèmes de santé ou situations : - maladie des reins, - asthme, - antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, ou d'hémorragies digestives, hypertension artérielle, - diabète, - port de stérilet.

L'aspirine augmente les risques hémorragiques et ceci dès les très faibles doses et même lorsque la prise date de plusieurs jours. Prévenir votre médecin traitant, le chirurgien, l'anesthésiste ou simplement votre dentiste au cas où un geste chirurgical, même mineur, est envisagé.

Ce médicament ne contenant pas de sodium (sel), il peut être administré en cas de régime désodé ou hyposodé.

c) INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN notamment si vous prenez des anticoagulants oraux (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à faibles doses) ou un traitement par l'héparine, des uricosuriques ou d'autres anti-inflammatoires (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à des doses $>3g/j$).



NOOTROPHYL

PIRACETAM

PRESENTATION :

- Boîte de 12 ampoules injectables autocassables dosées à 1 gr de piracetam.
- Boîte de 60 comprimés pelliculés sécables dosés à 800 mg de piracetam
- Flacon de 125 ml avec seringue doseuse graduée dosée à 1 ml de piracetam par graduation enfant et 1 g de piracetam pour adulte.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Selon prescription médicale.

LOT 192080
EXP 10/2023
PPV 134.80

134.80

CONTRE-INDICATIONS :

- Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale sévère. Lorsqu'il n'y a pas de dialyse, l'utilisation de doses élevées à intervalles rapprochés est déconseillée.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- On sera prudent : chez les insuffisants rénaux dont la clairance à la créatinine est inférieure à 30 ml/minutes.

• On sera aussi prudent chez la femme enceinte.

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ne jamais laisser à la portée des enfants.

EFFETS INDESIRABLES :

- Quelques rares cas d'agitation ont été signalés en début du traitement.
- Rares effets neurologiques et troubles gastro-intestinaux.

Dans tous les cas, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

- Injectables : en injection intramusculaire; intraveineuse directe ou en perfusion.
- La solution peut être diluée dans un peu d'eau pure ou aromatisée, rincer la seringue après usage.
- Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.
- Ne pas utiliser au-delà de la date limite d'utilisation indiquée en clair sur l'emballage.





NOOTROPHYL

PIRACETAM

PRESENTATION :

- Boîte de 12 ampoules injectables autocassables dosées à 1 gr de piracetam.
- Boîte de 60 comprimés pelliculés sécables dosés à 800 mg de piracetam
- Flacon de 125 ml avec seringue doseuse graduée dosée à 1 ml de piracetam par graduation enfant et 1 g de piracetam pour adulte.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Selon prescription médicale.

LOT 192080
EXP 10 2023
PPV 134.80

134.80

CONTRE-INDICATIONS :

- Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale sévère. Lorsqu'il n'y a pas de dialyse, l'utilisation de doses élevées à intervalles rapprochés est déconseillée.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- On sera prudent : chez les insuffisants rénaux dont la clairance à la créatinine est inférieure à 30 ml/minutes.

• On sera aussi prudent chez la femme enceinte.

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ne jamais laisser à la portée des enfants.

EFFETS INDESIRABLES :

- Quelques rares cas d'agitation ont été signalés en début du traitement.
- Rares effets neurologiques et troubles gastro-intestinaux.

Dans tous les cas, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

- Injectables : en injection intramusculaire; intraveineuse directe ou en perfusion.
- La solution peut être diluée dans un peu d'eau pure ou aromatisée, rincer la seringue après usage.
- Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.
- Ne pas utiliser au-delà de la date limite d'utilisation indiquée en clair sur l'emballage.





NOOTROPHYL

PIRACETAM

PRESENTATION :

- Boîte de 12 ampoules injectables autocassables dosées à 1 gr de piracetam.
- Boîte de 60 comprimés pelliculés sécables dosés à 800 mg de piracetam
- Flacon de 125 ml avec seringue doseuse graduée dosée à 1 ml de piracetam par graduation enfant et 1 g de piracetam pour adulte.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Selon prescription médicale.

LOT 192080
EXP 10/2023
PPV 134.80

134.80

CONTRE-INDICATIONS :

- Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale sévère. Lorsqu'il n'y a pas de dialyse, l'utilisation de doses élevées à intervalles rapprochés est déconseillée.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- On sera prudent : chez les insuffisants rénaux dont la clairance à la créatinine est inférieure à 30 ml/minutes.

• On sera aussi prudent chez la femme enceinte.

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ne jamais laisser à la portée des enfants.

EFFETS INDESIRABLES :

- Quelques rares cas d'agitation ont été signalés en début du traitement.
- Rares effets neurologiques et troubles gastro-intestinaux.

Dans tous les cas, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

- Injectables : en injection intramusculaire; intraveineuse directe ou en perfusion.
- La solution peut être diluée dans un peu d'eau pure ou aromatisée, rincer la seringue après usage.
- Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.
- Ne pas utiliser au-delà de la date limite d'utilisation indiquée en clair sur l'emballage.





NOOTROPHYL

PIRACETAM

PRESENTATION :

- Boîte de 12 ampoules injectables autocassables dosées à 1 gr de piracetam.
- Boîte de 60 comprimés pelliculés sécables dosés à 800 mg de piracetam
- Flacon de 125 ml avec seringue doseuse graduée dosée à 1 ml de piracetam par graduation enfant et 1 g de piracetam pour adulte.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Selon prescription médicale.

LOT 192080
EXP 10 2023
PPV 134.80

134.80

CONTRE-INDICATIONS :

- Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale sévère. Lorsqu'il n'y a pas de dialyse, l'utilisation de doses élevées à intervalles rapprochés est déconseillée.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- On sera prudent : chez les insuffisants rénaux dont la clairance à la créatinine est inférieure à 30 ml/minutes.

• On sera aussi prudent chez la femme enceinte.

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ne jamais laisser à la portée des enfants.

EFFETS INDESIRABLES :

- Quelques rares cas d'agitation ont été signalés en début du traitement.
- Rares effets neurologiques et troubles gastro-intestinaux.

Dans tous les cas, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

- Injectables : en injection intramusculaire; intraveineuse directe ou en perfusion.
- La solution peut être diluée dans un peu d'eau pure ou aromatisée, rincer la seringue après usage.
- Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.
- Ne pas utiliser au-delà de la date limite d'utilisation indiquée en clair sur l'emballage.

